

АКАДЕМИЯ  
НАУК  
СССР

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ  
РАСТЕНИЙ  
ПРИМОРЬЯ  
и  
ПРИАМУРЬЯ



БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА  
им. В. Л. КОМАРОВА

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ  
РАСТЕНИЙ  
ПРИМОРЬЯ  
И ПРИАМУРЬЯ




ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД  
1966



Авторы

Д. П. ВОРОБЬЕВ, В. Н. ВОРОШИЛОВ, П. Г. ГОРОВОЙ  
и А. И. ШРЕТЕР

Ответственный редактор  
А. И. ТОЛМАЧЕВ



258842

ПРЕДИСЛОВИЕ

Планомерное использование природных богатств каждой страны невозможно без четкого знания систематического состава ее растительного мира — одной из важнейших частей этих богатств. Дикорастущие растения были и остаются как объектом непосредственного использования человеком (достаточно напомнить о деревьях как основной сырьевой базе лесной и деревообрабатывающей промышленности, о луговых травах как основе природной кормовой базы животноводства, о многочисленных лекарственных растениях), так и источником пополнения «культурной флоры» — растений, выращиваемых человеком в более или менее преобразованных им условиях с различными практическими целями. Видовой состав флоры нашей обширной страны в настоящее время в основном уже выявлен. Важнейшие знания о нем отражаются в фундаментальной, 30-томной сводке «Флора СССР», изданной Ботаническим институтом Академии наук СССР. Наряду с этим «инвентарем флоры», как любил говорить организатор ее обработки покойный В. Л. Комаров, нам необходимы более детальные сводки по флоре отдельных частей нашей страны и специальные пособия для определения растений, содержащие важнейшие сведения о них и предназначенные для пользования как специалистов, так и всех других лиц, заинтересованных в познании и использовании растений. Такими пособиями являются определители растений. Потребность в них ощущается представителями различных отраслей народного хозяйства (агрономами, лесоводами, работниками аптечной сети и т. д.), учителями, учащимися, и, наконец, всеми теми, кто просто любит родную природу и хочет знать ее не только в самых общих чертах, видимых на поверхностному наблюдателю.

Ряд республик и областей нашей страны уже располагает соответствующими пособиями (назовем, для примера, Украинскую ССР, Карельскую АССР, Коми АССР), в других они постепенно создаются, в основном силами местных ботаников. Остро нуждается в таком определителе наш Дальний Восток, в частности наиболее обжитые его части — Приморский край, Амурская область, юг Хабаровского края. Потребность в «своем», местном определителе растений здесь ощущается тем более остро, что дальневосточная флора очень своеобразна по своему видовому составу и всякая попытка ориентироваться в ней, опираясь на пособия, составленные для других частей страны, неизбежно приводит к ошибкам и путанице. Сознание этого давно уже привело к тому, что ботаники, изучавшие дальневосточную флору, уделяли внимание созданию пособий для ее изучения любителями природы. Так, еще в 1925 г. был издан краткий определитель растений бывшего Уссурийского края, составленный крупнейшим исследователем растительного мира Дальнего Востока В. Л. Комаровым и его сотрудницей Е. Н. Клобуковой-Алисовой. Изданный тиражом 2000 экземпляров, книга эта быстро разошлась и стала библио-

графической редкостью. В 1931—1932 гг. Дальневосточным филиалом Академии наук СССР был издан новый «Определитель растений Дальневосточного края», составленный теми же авторами, но с охватом данных по флоре более обширной территории и отвечающий уровню изученности ее примерно к 1930 г. Книга была богато иллюстрирована и, изданный тиражом 5000 экземпляров, получила широкую известность и признание как очень ценное пособие для дальнейшего изучения растительного мира Дальнего Востока. Но и эта книга давно уже разошлась, и новые поколения любителей дальневосточной природы лишены возможности стать ее обладателями. Наряду с этим и в изучении дальневосточной флоры за последние десятилетия достигнуты значительные результаты, главным образом благодаря работам экспедиций Дальневосточного филиала Академии наук СССР, ее Ботанического института, Главного ботанического сада, Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений и отчасти других учреждений и организаций. Существенные успехи сделаны и систематика растений, что привело к изменению трактовки многих видов, представленных во флоре Дальнего Востока. Все это поставило на очередь задачу — дать новый, отвечающий современному уровню знаний определитель растений Дальнего Востока.

1. ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОСНОВНЫХ ГРУПП РАСТЕНИЙ







11 (от 9). Цветки в шаровидных соцветиях, верхние из которых пыльниковые, а нижние пестичные с торчащими рыльцами; болотные травы с плоскими или плоскотреугольными листьями, иногда с острым килем . . . . . 15. *Sparagiaceae* — Ежеголовниковые.

12. Цветки в корзинках или головках на общем дисковидном или выпуклом цветоносе, окруженном оберткой, все более или менее одинаковые, или же краевые цветки более крупные, язычковые, обычно яркоокрашенные (белые, желтые, оранжевые, синие, розовые и др.); благодаря общей обертке такие соцветия кажутся отдельными цветками, а не соцветиями . . . . . 13.

— Цветки различных величин и окраски, одиночные или в самых разнообразных соцветиях, но без общего цветоноса и общей обертки или покрывала . . . . . 14.

13. Завязь отдельных цветков без покрывалка; тычинки 5, с пыльниками, срастающимися боками в трубочку; плод — семлика; цветки различных размеров и окраски; у ряда родов есть млечный сок . . . . . 128. *Compositae* — Сложноцветные.

— Завязь отдельных цветков окружена трубочкой покрывалом; тычинки 4, со свободными пыльниками; цветки суп-фундоновые или синие; плод — орешек с перепончатой зубчатой коронкой; млечного сока нет . . . . . 124. *Dipsacaceae* — Ворсянковые.

14 (от 12). Листья простые, преимущественно цельнокрайные, реже волнистые, выемчато-зубчатые или мелкозубчатые, жилкование листьев параллельное, жилки не ветвящиеся; цветки обычно трехмерные, с венчиковидным околоцветником, или околоцветник зачаточный, щетиновидный или чешуевидный, или его нет вовсе (Однолопастные) . . . . . 15.

— Листья простые, или цельнокрайные до глубоко перистоланцетных и перисторассеченных, или сложные, тройчатые, пальчатые, перистые; жилкование чаще той главной жилкой; цветки чаще пятимерные, преимущественно с хорошо выраженными чашечкой и венчиком, или из венчиковидной чашечки, обычно окрашенной, нет вовсе (Двулопастные) и малоразвитый и не окрашенный или же его околоцветника нет вовсе или он зачаточный и состоит из чешуек, щетинок или чешуевидных чашечек . . . . . 30.

— Листья простые, обычно окрашенные, венчиковидный или же в виде правильно-зубчатых с узлами, у большинства родов внутри полый (солонника) . . . . . 22.

— Листовая пластинка (с внутренней стороны) есть более или менее развитый язычок; соцветие — колос, метелка или кистевидное; цветки (за редким исключением) обоепольные, в одно- или многоцветковых колосках, с чешуевидным околоцветником; плод всегда односемянный — зерновка . . . . . 23. *Gramineae* — Злаки.

Растения с явными признаками, стебель без узлов (не солонника) . . . . . 17.

— Стебель трехгранный или округлый, листья линейные, реже продолговатоланцетные, расположенные в 2 ряда или стебель безлиственный, с 1 колоском на верхушке; околоцветника нет вовсе; часто он заменен щетинками или волосками, или в виде мочковика; цветки в обоепольных или раздельнополых колосках . . . . . 24. *Cyperaceae* — Осоковые.

— Признаки иные; цветки одиночные или в различного типа соцветиях (не колосках) . . . . . 30.

3. Растения водные, полностью погруженные в воду или с плавающими на поверхности листьями . . . . . 18.

— Растения сухопутные или болотные . . . . . 19.

4. Растения полностью погруженные в воду; листья выемчато-щитовиднозубчатые, без жилок; цветки двулопастные, сидячие, с 1 тычинкой или 1 пестиком и с зачатком или полным околоцветником . . . . . 18. *Najadaceae* — Найадные.

— Растения погруженными в воду или частично плавающими листьями, но пестиковидными 2 или 4; у большинства видов цветки в более или менее густых колосовидных соцветиях, реже одиночные, или по 2 в пазухах листа . . . . . 16. *Potamogetonaceae* — Рясковые.

15. Цветки правильные, звездчатые, зеленоватые, буроватые или коричнево-красные; собраны в шаровидные, зонтичные или метельчатые соцветия; плод — трехгранная коробочка; листья линейные, голые или же плоские, похвойно на листьях . . . . . 30. *Juncaceae* — Ситниковые.

— Признаки иные . . . . . 24.

— Листья белые, окруженные белыми листочками обертки, мелких головчатых цветках, расположенных на верхушке тонких цветоносов; все растение имеет запах из шизоидно заостренных листьев . . . . . 27. *Eriocaulaceae* — Шерстегебельниковые, Эрикаулиновые.

— Цветки зеленоватые, в верхушечном колосовидном или метельчатом соцветии; плододлистков 3—6, при созревании распадающихся на отдельные плодики . . . . . 19. *Juncaceae* — Ситниковые.

22 (от 15). Растения водные, полностью погруженные в воду или с плавающими на поверхности почтовыми листьями, имеющими воздушные полости с нижней стороны; цветки раздельнолопастные, язычковые . . . . . 22. *Hydrocharitaceae* — Водокрасные.

— Растения сухопутные, или болотные, или водные с плавающими листьями, но без воздушных полостей . . . . . 23.

23. Завязь великая . . . . . 24.

— Завязь маленькая . . . . . 25.

24. Цветки более или менее правильные, белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, синие . . . . . 25.

— Цветки резко неправильные, зигоморфные, небесно-голубые или розовые . . . . . 28. *Commelinaceae* — Коммелиновые.

25. Растения болотные, или водные, или растущие в канавах, юкветях и на различных отмыках, перистически заливными водой; цветки белые, розовые или синие, одиночные, в простях зонтиках, кистях или в многогранных пирамидальных метелках; плоды сухие, сборные или коробочки . . . . . 26.

— Растения сухопутные, с лувковыми или с более или менее развитыми корнями; цветки правильные, различной окраски, с 6 равнопочатком тычинками; плод — коробочка, или же плоды со-одиночные или в различных соцветиях; плод — коробочка, или же плоды со-одиночные, ягодообразные, красные, черные, оранжевые, синие или почти белые . . . . . 31. *Liliaceae* — Лилейные.

26. Соцветие зонтикообразное; цветки многочисленные, розовые; тычинки 9; листья линейные, плоские, близ основания трехгранные; плод сборный, из 6 односемянных плодиков . . . . . 21. *Butomaceae* — Сухоцветные.

— Признаки иные; цветки белые или синие; тычинки 6 или меньше; сердцевидные . . . . . 27.

27. Цветки синие, в крупной кисти; плод — коробочка; листья овально-сердцевидные, длиннорешетчатые . . . . . 29. *Rhinodactylaceae* — Понтедериевые.

— Цветки белые или кремовые, одиночные, в простях зонтиках или в многогранных пирамидальных метелках; плод сборный, из свободных плодиков, или же пирамидальный; листья различной формы — стреловидные, округлые, почко-костякообразные; цветки раздельнолопастные, широколинейные или ланцетовидные, линейные, зачаточные, язычковые . . . . . 20. *Alismaceae* — Мачушковые, Мачушниковые.

28 (от 23). Двулопастные травянистые лианы с лопастными длиннорешетчатыми листьями, имеющими сердцевидные основания; цветки в пазухах или в узлах кистей, мелкими, зеленовато-желтыми; коробочка с 3 большими и широкими крыльями; семя плоское, крылатое . . . . . 32. *Dioscoreaceae* — Диоскорейные.

— Растения не вьющиеся, с цельными лопастными листьями . . . . . 29.

29. Листья линейные, мечевидные; цветки обычно более или менее крупные, правильные; тычинки 3; семена крупные . . . . . 33. *Iridaceae* — Ирисовые.

— Листья различной формы, чаще линейные, но не мечевидные; цветки различной формы и величин, неправильные; тычинки 1, реже 2; семена очень мелкие, пылевидные . . . . . 34. *Orchidaceae* — Орхидеи, Итрышниковые.

30 (от 14). Листья щитовидные или почти щитовидные . . . . . 53. *Nymphaeaceae* — Кувшинниковые.

— Листья иные, не щитовидные . . . . . 57. *Menispermaceae* — Двусемянные.

31. Растения водные . . . . . 53. *Nymphaeaceae* — Кувшинниковые.

— Растения сухопутные; небольшие двулопастные лианы чаще с полностью отмирающими на зиму стеблями; цветки мелкие, зеленовато-белые; плоды или почковидные, черные, с очень характерной сплюснутой полушарообразной или почковидной кисточкой . . . . . 57. *Menispermaceae* — Двусемянные.

32 (от 31). Околоцветника нет вовсе или он малоразвитый, зачаточный, щетиновидный или чешуевидный, пленчатый, кохчатый или сочный . . . . . 32.

— Околоцветник хорошо заметный, обычно окрашенный, иногда сухой, пленчатый или чешуевидный . . . . . 33.

33. Листья на концах стеблей по 4, перекрестнопарные (как бы мутовчатые), кроме того, на стебле есть еще 2—3 (4) пары чешуевидных листьев; соцветие конечно колосовидное, с ярко-белыми тычинками; плод — зеленоватая коробочка . . . . . 35. *Chloranthaceae* — Хлорантовые.

— Листорасположение иное . . . . . 34.

34. Растения травянистые . . . . . 34.

— Растения деревнистые . . . . . 35.

35. Околоцветник более или менее заметный, сухой, пленчатый, травянистый или мясистый . . . . . 34.

— Околоцветник малоразвитый, зачаточный . . . . . 33.

33. Листья без прилистников; плод — коробочка, стручок или орешек . . . . . 48. *Polygonaceae* — Гречишные.

— Листья с прилистниками . . . . . 48.







- Растения многолетние; листья с более или менее развитыми прилистниками; шпора образована нижним лепестком; цветки различной окраски; чашечка при плодах остающаяся; плод — коробочка с 3 створками . . . 85. *Malvaceae* — **Мальвовые**.
- 66 (от 57). У основания листьев есть переночный разрыв; охватывающий стебель; плод — орешек . . . 48. *Polygonaceae* — **Гречишные**.
- Растения нет . . . 67.
67. Околоцветник простой, венчиковидный, трубчатый, с четырех-пятнадцатилепестным отгибом; плод — орешек или красная, сочная костянка; однолетние или многолетние травы и небольшие кустарники . . . 86. *Thymelaeaceae* — **Волчниковые**.
- Признаки иные; околоцветник с ясно заметными чашечкой и венчиком или же только с яркоокрашенной венчиковидной (не трубчатой) чашечкой . . . 68.
68. Тычинок много, обычно более 15, и они в неопределенном числе, или же их 9, сросшихся в 3 пучка . . . 69.
- Тычинок от 1 до 15 . . . 70.
69. Растения водные, с плавающими или у некоторых видов еще и с возвышающимися над водой листьями; цветки крупные, белые, желтые, синие, ярко-розовые или темно-пурпуровые; семена крупные . . . 53. *Nymphaeaceae* — **Кувшиновые**.
- Растения обычно сухопутные, реже болотные или водные (но тогда только с белыми или желтыми цветками) . . . 70.
70. Чашечка всегда с подчашием; тычинки сростаются нижним почти доверху в трубку; плод сухой, распадающийся на отдельные плодники, или многостворчатая коробочка . . . 81. *Malvaceae* — **Мальвовые**.
- Чашечка простая или с подчашием, но тогда тычинки свободные . . . 71.
71. Чашечка с подчашием или же простая; тычинки свободные, прикреплены к основанию долей чашечки (при образовании долей тычинки отпадают вместе с ними); цветоложе сильно развитое, плоское, выпуклое или бокаловидное; плод — сборная ягода, семянка, костянка или же ложный . . . 64. *Rosaceae* — **Розовые**.
- Признаки иные, чашечка всегда простая; тычинки при образовании чашелистиков остаются в цветке . . . 72.
72. Общий цветоложе крылатый, цветки со стаминодиями; плод — орешек; деревья . . . 80. *Tiliaceae* — **Липовые**.
- Признаки иные; крыла на общем цветоложе нет . . . 73.
73. Тычинки срастены в 3 или 5 пучков; цветки желтые или розоватые; плод — трех-пятитычинная коробочка с многочисленными мелкими семенами . . . 83. *Cutiferae* — **Зверобойные**.
- Тычинки свободные . . . 74.
74. Пестик в цветке несколько; плод — односемянная или многосемянная ягода, или ягода, реже плодник односемянный орешковидный или с длинным ноготком систем столбиком . . . 55. *Ranunculaceae* — **Лютиковые**.
- Пестик в цветке 1, с 1 или многими рыльцами; плод — коробочка, у некоторых родов стручовидная (или же ягода) . . . 75.
75. Растения травянистые; чашечка двулистная, быстро опадающая; лепестков 4; плод — коробочка или стручовидная коробочка . . . 59. *Ranunculaceae* — **Майковые**.
- Деревянистые лианы; растения двулетние; чашелистиков и лепестков по 5; плод — темно-зеленая или оранжевая многосемянная ягода . . . 82. *Actinidiaceae* — **Актинидиновые**.
- 76 (от 85). Тычинок 3, или 5, или от 8 до 15, по 2-3 завязи подушечкой . . . 82. *Actinidiaceae* — **Актинидиновые**.
- Тычинки всегда в определенном числе, от 1 до 12 . . . 51. *Portulacaceae* — **Портулаковые** (роды *Claytonia* — *Клайтония* и *Montia* — *Монтия*).
- Тычинки всегда в определенном числе, от 1 до 12 . . . 77.
77. Листья плотные, кожистые, вечнозеленые или зимующие, иногда сочные . . . 86.
- Листья на зиму отмирающие . . . 78.
78. Кустарники или кустарнички . . . 79.
- Растения травянистые . . . 80.
79. Кустарнички, образующие рыхлые дерновины; листья обратнояйцевидные; цветоложе одноцветковый; венчик белый, колокольчатый; коробочка почти шаровидная . . . 99. *Diapensiaceae* — **Диапенсиновые**.
- Признаки иные . . . 80.
80. Цветки вазузные, раздельнолепестные, с 3 черно-фиолетовыми торчащими тычинками; чашечка кожистая, трехлистая, лепестков 3; плод — ягодообразная черная костянка; листья мясные, узкие, линейные . . . 73. *Eupetraceae* — **Шпанские**.
- Цветки обоеполые или раздельнолепестные, с хорошо заметным околоцветником . . . 81.
1. Листья кожистые, с сильно преломной сетью жилок; цветки мясистые, белые, вазузные, на хорошо заметных цветоножках; плоды мясистые, красные или краснорубиные, с 4 косточками; ветви с 4 возвышающимися ребрами . . . 74. *Aquifoliaceae* — **Остролопастные**.
- Листья иные . . . 82.

2. Настоящие кустарники или кустарнички с цельнокрайними листьями (часто с завороченными краями) или же листья чешуйчидные, черешчатые, налегающие друг на друга; плод — коробочка или костянка . . . 82. *Ericaceae* — **Вересковые**.
- Своеобразные кустарнички, часто принимаются за травянистые растения, однако имеют полностью зимующий (до 8—12 лет) стебель; листья плотные, кожистые, остропильчатые; коробочка шаровидная или приплюснутая шаровидная . . . 85. *Rutaceae* — **Грушанковые**.
- 3 (от 78). Растения сильно мясистые (суккуленты), с зимующими розетками листьев . . . 83. *Cassilaceae* — **Толстяковые**.
4. Растения не суккуленты . . . 84.
54. Листья тройчатые . . . 56. *Berberidaceae* — **Барбарисовые** (род *Epimedium* — Горинка).
- Листья простые . . . 85.
85. Листья крупные, до 10—12 см дл.; корневище длинное, толстое, 1—1.5 (2) см в diam.; цветки ярко-розовые или лиловые; столбиков 2 . . . 63. *Saxifragaceae* — **Камнеломковые** (род *Bergenia* — Бадан).
- Листья меньших размеров; корневище тонкое; цветки белые или красные, с торчащим столбиком . . . 86. *Rutaceae* — **Грушанковые**.
- 86 (от 77). Венчик раздельнолепестный . . . 87.
- Венчик сростнолепестный . . . 103.
87. Венчик четырехлепестный, тычинок 2 или, чаще, 6; плод — стручок или стручочек . . . 60. *Cruciferae* — **Крестоцветные**.
- Признаки иные, лепестков 5—6; плод не стручок . . . 88.
88. Деревянистая лиана, при потирании обнаруживает специфический лимонный запах; цветки раздельнолепестные, белые, кремовые или чуть розоватые; цветоложе по созреванию увеличивается в 25—50 раз, и из этого цветоложа образуется гроздевидное соплодие оранжево-красных, сочных, ягодоподобных плодов . . . 68. *Magnoliaceae* — **Магнолиевые** (род *Schizandra* — Лимонник).
- Признаки иные (лимонного запаха нет) . . . 8.
89. Пестиков 2—10 . . . 8.
- Пестик 1 . . . 90.
90. Пестиков 2, сросшихся основаниями, плод — коробочка . . . 63. *Saxifragaceae* — **Камнеломковые**.
- Пестиков 4—10; плод — листовка; листья обычно сочные, мясистые . . . 62. *Cassilaceae* — **Толстяковые**.
- 91 (от 89). Листья супротивные; тычинок обычно 10, реже 5, 4 или 3; плод — коробочка с центральным семеносемем . . . 52. *Caryophyllaceae* — **Гвоздичные**.
- Листья очередные . . . 92.
92. Пестик с 2—4 свободными столбиками . . . 93.
- Пестик с 1 столбиком . . . 95.
93. Листья овальные, узкие, линейные, цветки бледно-фиолетовые или лиловые; плод — почти шаровидная коробочка . . . 68. *Liliaceae* — **Лилейные**.
- Признаки иные; цветки белые, желтые или розоватые; листья не линейные . . . 94.
94. Листья тройчатые; цветки белые, розовые с темными жилками или желтые; коробочка при созревании трескается и далеко разбрасывает семена . . . 67. *Oxalidaceae* — **Кисличковые**.
- Растения наскомоидные; листья простые, округлые или длинноланцетовидные, с красными, железистыми волосками, все в прикорневой розетке; цветоложе безлиственный; цветки белые, в кисти; или же растение водное, без корней, с мутовчатыми, округло-почковидными листьями, лопастными плавильниками и одиночными зеленовато-белыми цветками . . . 61. *Droseraceae* — **Росликовые**.
- 95 (от 92). Цветки со стаминодиями, одиночные, крупные, белые; стебель с 1 сердцевидно-яйцевидным или округлым листом . . . 63. *Saxifragaceae* — **Камнеломковые** (род *Parnassia* — Безоар).
- Стаминодиев в цветках нет . . . 96.
96. Лепестков и тычинок по 6 или по 8; плод — одногнездная коробочка, красная, продолговатая ягода или черни-синий, сухой, колокольчатый . . . 56. *Berberidaceae* — **Барбарисовые**.
- Тычинок много, количество — 4, 5, 10 или 12 . . . 97.
97. Тычинок обычно 12 (иногда меньше), из них 6 более длинных; лепестки пурпурные . . . 87. *Lythraceae* — **Дербенниковые**.
- Тычинок 5—10 . . . 98.
98. Тычинок 10; листья перистые или лопастные трех-девятираздельные . . . 100.
99. Тычинок 5, иногда 4 . . . 99.
- Листья лопастные, трех-девятираздельные или двоякоперистораздельные; цветки правильные, различной окраски, одиночные, шаровидные, на длинных полустолбчатых; пестик при основании пятигубчатый и узкий в столбике (продолжение цветоложа), к которому прикреплены все столбики; плод раскрывается 5 створками снизу вверх . . . 66. *Geraniaceae* — **Гераниевые**.



- Листья перистые; цветы крупные, ярко-розовые или сиреневатые, плод — коробочка (биссек); или же цветы мелкие, зеленые, плоды черные, ягоды образные; дерево с пробковой корой (бахар) . . . . . 69. Rutaceae — Рутные
- 100 (от 98). Листья цельные, без заострений . . . . . 101
- Листья лопастные, пальчатораздельные или тройчатые . . . . . 102
101. Листья с прилистниками; цветы мелкие, зеленые, в пазушных полузонтиках; плоды сочные, ягодообразные, с 2—4 косточками; небольшие деревья и крупные кустарники . . . . . 78. Hamamelidae — Крушиновые
- Листья без прилистников; цветы зеленые или темно-бурые, в немногочисленных кистях; плод — кожистая коробочка, семена с сочной, яркоокрашенной кроветочкой (присемянником); кустарники с супротивными или ланцетными листьями . . . . . 75. Celastraceae — Берескотовые
- 102 (от 100). Деревья или крупные кустарники; цветы в кистях или щитках; плод сухой — двукрылатка . . . . . 76. Asceae — Асеевые
- Листья с сочными плодами; соцветие метельчатое или кистевидное . . . . . 79. Vitaceae — Виноградные
- 103 (от 80). Растения деревянистые: деревья, кустарники, кустарнички и полукустарники . . . . . 104
- Растения травянистые . . . . . 106
104. Венчик с четырехраздельным отгибом, белый, кремовый или лиловый; плод — коробочка с крупными, окрыленными семенами . . . . . 102. Oleaceae — Масличные (род *Syringa* — Сирени)
- Венчик пятираздельный; плод — коробочка с очень мелкими семенами или ягода . . . . . 105
105. Полукустарники с сильно обмерзающими побегами, непопадающие на другие растения, с овальными или перистонадрезанными листьями; венчик маленький, фиолетовый; плод — красная ягода . . . . . 112. Solanaceae — Пасленовые (род *Solanum* — Паслен)
- Кустарники и кустарнички (с необмерзающими побегами); листья цельнокрайные; венчик крупный, чаще розовый; плод — коробочка с очень мелкими семенами . . . . . 97. Ericaceae — Вересковые
- (от 103). Растения водные, с сердцевидно-округлыми плавающими листьями или болотные, с тройчатыми листьями; венчик белый или желтый, с бахромчатыми долями . . . . . 104. Menyanthes — Бахромчатые
- Растения сухолюбивые; венчик без бахромчатых долей . . . . . 107
107. Растения с млечным соком, выходящим при разрыве; цветы зеленые, желтые, белые, розовые или темно-пурпурные (иногда почти черные), вокруг столбика имеется коронка из придатков пыльников; плод — удлинненная крупная листовка, гладкая или бугорчатая, семена с летучей из белых волосков . . . . . 105. Asclepiadaceae — Ластовые
- Признаки иные; млечного сока нет; коронки нет; семена без летучек из белых волосков . . . . . 108
108. Листья перистые или двоякоперисторассеченные или же частью перистонадрезанные, часть цельные, зубчатые . . . . . 109
- Все листья цельные, перистонадрезные, пальчатые, зубчатые или городчатые . . . . . 111
109. Листья перистые, с 10—12 парами листочков; цветы крупные, сино-фиолетовые, в концевой кисти . . . . . 108. Polemoniaceae — Симохоновые
- Признаки иные . . . . . 110
110. Листья перистонадрезанные или частично цельные; соцветие — конечная короткая колосовидная метелка; венчик маленький, пятилопастный, пурпурно-синий; плод распадается на 4 рубчатых полочкообразных орешка . . . . . 110. Verbenaceae — Вербеновые
- Листья двоякоперисторассеченные; цветы в концевой общественной кисти; венчик трубчато-колокольчатый, красный; плод — коробочка . . . . . 114. Bignoniaceae — Бигнониевые
- 111 (от 108). Соцветие — длинный густой, плотный колос; цветы с сухим, перепончатым фоллолетомом, с сильно выступающими тычинками; плод — коробочка с 2, 4, 6, 8 или 16 семенами; цветоносы без листьев, листья у всех видов, за исключением *Planta indica* L., в прикорневой розетке . . . . . 119. Plantaginaceae — Подорожниковые
- Признаки иные . . . . . 112
112. Цветки в плотных головчатых соцветиях, розовые, с 5 столбиками; плод — одногнездная коробочка; листья собраны в густые прикорневые полузонтики . . . . . 101. Plumbaginaceae — Свинчатковые
- Признаки иные . . . . . 113
113. Плод распадается на 4 округлых или трехгранных орешка или же это кожистая, почти шаровидная коробочка с 4 семенами; цветы в одиночных кистях или завитках, белые, голубые, синие, темно-фиолетовые . . . . . 109. Boraginaceae — Бурачниковые
- Признаки иные; плод — коробочка или же ягодовидный . . . . . 114

114. Венчик четырехраздельный; тычинок 2 или 4; плод — коробочка с мелкими семенами . . . . . 113. Scrophulariaceae — Поричи
- Признаки иные . . . . . 113
115. Цветки всегда одиночные, крупные; венчик розовый или почти белый, изредка; стебли выходящие или лежащие, редко прямые; плод — коробочка с крупными семенами . . . . . 106. Convolvulaceae — Вьюнковые
- Признаки иные . . . . . 106
116. Цветки в верхушечных кистях, зонтиках, метелках или в почти цилиндрических колосках, редко одиночные пазушные или верхушечные, желтые, белые или розовые; плод — коробочка; листья прикорневые или стеблевые, очередные супротивные или собраны на вершине стебля в мутовку . . . . . 100. Primulaceae — Первоцветные
- Признаки иные . . . . . 117
117. Листья супротивные; цветы одиночные или в цимзовых соцветиях; венчик воронковидный или колокольчатый, у некоторых родов трубчатый или колокольчатый, синий, лазоревый, фиолетовый, желтый или белый; плод — коробочка с очень мелкими многочисленными семенами . . . . . 103. Gentianaceae — Горечайниковые
- Признаки иные; листья очередные; плод — ягода, или ягодовидный, или коробочка с крупными шипами (дурман) или без них . . . . . 112. Solanaceae — Пасленовые
- 118 (от 55). Растения водные, с плавающими супротивными листьями; цветы желтые; плоды длинные, цилиндрические, с 2—3 длинными, крочкообразно загнутыми тонкими отростками на концах . . . . . 115. Pedaliaceae — Сесамовые
- Растения сухолюбивые, болотные или прибрежные (с листьями, расползающимися по воздуху) . . . . . 119
119. Венчик двухчлустый, темно-синий, стебель — с длинными, жесткими листьями; листья овально-ланцетные или ланцетные; растения с млечным соком . . . . . 127. Lobeliaceae — Лобелиевые
- Признаки иные . . . . . 120
120. Околоцветник правильный, трехлопастный, зеленый, с темно-пурпурными краями; тычинок 12; растения без надземных стеблей, обычно с 2 сердцевидными или треугольно-сердцевидными листьями или же околоцветник неправильный, у основания шпиковидно расширенный, затем суженный в трубку, которая заканчивается или сурнутой, или сросшимся, зазавоушистым отгибом, или отгиб трехлопастный, тогда тычинок 6 и стебли выходящие, травянистые или деревнистые, с очередными сердцевидными листьями и сильным, специфическим запахом . . . . . 47. Aristolochiaceae — Кипарисовые
- Признаки иные . . . . . 121
121. Венчик раздельнолепестный . . . . . 122
- Венчик сростнолепестный . . . . . 131
122. Лепестков 2—4 . . . . . 123
- Лепестков 5 . . . . . 125
123. Лепестков 2—4, желтых, розовых или белых; плод — шаровидная коробочка или же односемянный орешек, семена с летучками или без них; растения травянистые . . . . . 88. Onagraceae — Кипрейные
- Лепестков 4, белых, зеленых или черно-пурпурных; плод — кубаревидная коробочка или сочный, белый или красный; кустарники или кустарнички с подземными деревянистыми стеблями и ежегодно отмирающими наземными плодородными побегами . . . . . 124
124. Цветки крупные, белые; тычинок 20; плод — кубаревидная коробочка с очень мелкими семенами; крупные кустарники . . . . . 63. Saxifragaceae — Камнеломковые (род *Philadelphus* — Чубушник)
- Цветки мелкие, белые, в многоцветковых пиктоцветных или почти зонтичных соцветиях; плоды белые, с сильным млечным, черно-пурпурным, в верхушечном головчатом соцветии с 4 крупными белыми общими прицветниками (их при определении плода обычно принимают за лепестки); плоды красные; кустарники с подземными деревянистыми стеблями и отмирающими травянистыми надземными побегами . . . . . 94. Cornaceae — Кизильные
- 125 (от 122). Листья линейные; цветы пазушные, мелкие, белые; плод — почти шаровидный зеленый орешек . . . . . 46. Santalaceae — Санталовые
- Признаки иные . . . . . 126
126. Тычинок от 20 до 50 и более . . . . . 64. Rosaceae — Розоцветные
- Тычинок чаще 5 или же их 10 и в одном случае до 15; цветы желтые; коробочка одногнездная; все растение мясистое, распростертое . . . . . 127
127. Тычинок неопределенное количество, от 4 до 15; цветы желтые, распростерто-гнездная; все растение мясистое, распростертое . . . . . 51. Portulacaceae — Портулаковые (род *Portulaca* — Портулак)
- Тычинок 5 или 10 . . . . . 128



- тыя супротивные; тычинок 10; плод — коробочка; кустарники . . . . . 63. Saxifragaceae — Камнеломковые (род *Desisa* — Дейзия).
- Ягоды очередные; тычинок 5; плод — сочный, ягодовидный, или сухой, распадающийся на 2 полулопастки (двусемянника) . . . . . 129.
- Листья сухие, распадающиеся на 2 мерикария (двусемянника); растения травянистые, у ряда родов стебель внутри полый; соцветие — зонтик . . . . . 93. Umbelliferae — Зонтичные.
- Плод сочный — ягода или ягодовидный; преимущественно деревья и кустарники, реже травянистые растения . . . . . 136.
0. Соцветие — кисть, реже цветки одиночные или в пучковидных кистях; листья лопатно-надрезанные; плод — красная, черная или бурая ягода . . . . . 63. Saxifragaceae — Камнеломковые (род *Kibbe* — Смородина и *Gexalaria* — Крыжовник).
- Соцветия сложные, метельчатые или зонтикообразные; листья двоякоперистые, тройчатые, пальчатые или лопатные; плоды сочные, черные или красные, с 2 или 5 косточками . . . . . 92. Araliaceae — Аралиевые.
- 131 (от 121). Растения с усиками, однодомные или двудомные, с сочными, быстро вяжущими при гербаризации листьями . . . . . 125. Cucurbitaceae — Тыквенные.
- Растения без усиков . . . . . 132.
132. Кустарники или кустарнички . . . . . 133.
- Растения травянистые . . . . . 134.
133. Листья очередные, цельные, венчик колокольчатый, цилиндрический, полушаровидный или глубоко четырехраздельный, тычинок 8 или 10; плод — красная, черная или спящая ягода . . . . . 98. Vasciniaceae — Брусничные.
- Листья супротивные, цельные или перистые; венчик колокольчатый, трубчатый или колокольчатый, чаще двугубый, тычинок 5, реже 4; плод сочный, ягодовидный, или костянковидный, с 1—5 семенами, или сухой, односемянный, кожистый, или многосемянная коробочка . . . . . 121. Carpiifoliaceae — Жимолостевые.
- 134 (от 132). Листья супротивные или мутовчатые . . . . . 135.
- Листья очередные . . . . . 126. Cynoglossaceae — Колокольчиковые.
135. Цветки мелкие, зеленоватые, в конической или шаровидной верхушечной цветков с двуплодной чашечкой и 3 тычинками, боковые и трехлопастной чашечкой и 10 тычинками; плод — костянка; стеблевые листья тройчатые или трехраздельные; все растение мясистое . . . . . 122. Adoxaceae — Адоксовые.
- Признаки иные; цветки одиночные, верхушечные, паузные или в различных соцветиях (в головках) . . . . . 136.
136. Цветки паузные, крупные, с двугубым венчиком; плод сухой, костянкообразный, с 3 крупными косточками . . . . . 121. Carpiifoliaceae — Жимолостевые.
- Признаки иные; венчик колокольчатый, трубчатый или колокольчатый . . . . . 137.
137. Листья мутовчатые, цельные, цельнокрайные или пильчатые . . . . . 138.
- Листья супротивные, перистые, лировидные или (у 1 вида) припоребные; листья могут быть цельнокрайными, узколинейными; венчик ярко-желтый, розоватый, белый или бледно-сиреневый, тычинок 3 или 4; плод — семянка . . . . . 123. Valerianaceae — Вальериановые.
138. Растения с мясным соком; цветки колокольчатые, голубые или синие; плод — коробочка . . . . . 568. Sambraculaceae — Камнеломниковые (род *Adenorpha* — Бубенчик).
- Мясистый сок нет; цветки с трубчато-воронковидным, колокольчатым или колокольчато-колокольчатым, белым, желтым или зеленоватым венчиком; плод — слоенный сухой орешек или черный, более или менее сочный, костянковидный . . . . . 120. Rubiaceae — Мареновые.

## У. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ (ПО СЕМЕЙСТВАМ)

### PTERIDOPHYTES — ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

#### FILICES — ПАПОРОТНИКОВЫЕ

#### ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ НАЗЕМНЫХ ПАПОРОТНИКОВ

1. Очень маленько (1,5—4,5 см), похощие на мох растения с просвечивающимися частично однослойными листьями; спорангии на концах листовых язычков с бокаловидным, трубчатым или имеющим форму двугубого мармашка покрывалом . . . . . 2.
- 1 Для удобства пользования в этой таблице объединены все 4 семейства наземных папоротников и дана общая нумерация их родов.

- Растения различной величины (от 3 см до 2 м), с многослойными более или менее плотными листьями и спорангиями, расположенными на нижней стороне листа или же на особых, заметно отличающихся споросных листьях (или их частях) . . . . . 3.
2. Листья веерообразные, лопатно надрезанные; все растение около 2—2,5 м дл.; покрывальце бокаловидное или трубчатое. Растет дернинами в трещинах и на сырых скалах . . . . . 2. Trichomanes L. — Тонкокрайные.
- Листья перистонадрезанные; все растение несколько крупнее — 3—4 (5) см; покрывальце в форме двугубого мармашка. Растет дернинами на сырых скалах, чаще у водоемов . . . . . 1. Cymophyllum L. Smith — Тонкокрайные.
- 3 (от 1). Листья простые, цельнокрайные . . . . . 4.
- Листья перистые, дважды-трижды перистые, перистораздельные или перистонадрезанные . . . . . 8.
4. Стебель всего с 1 широколанцетным, лиственным спорангием листом, выше которого находится линейная споросная часть с очень крупными, хорошо заметными спорангиями, расположенными в 2 ряда . . . . . 24. Ophioglossum L. — Ухолюбив.
- Спорангии на нижней стороне листьев . . . . . 5.
5. Листья очень плотные, кожистые, снизу с густым рыжеватым опушением, частью из звездчатых волосков; сорус покрывает всю нижнюю поверхность листа . . . . . 21. Cyrtophorus Desv. — Круглонос.
- Листья менее плотные, без рыжего опушения; споросные кучки округлые или линейные . . . . . 6.
6. Листья с сердцевидным основанием, крупные, 30—35 (40) см дл. и около 4—5 см шир., споросные кучки линейные . . . . . 11. Phyllitis Ludwig — Листовник.
- Листья с клиновидным основанием, более мелкие — до 20—22 см дл. и 0,5—1 см шир. . . . . 7.
7. Листья тонкие, с длинными, короткими или с длинными частями, корнями; спорангии крупные, длинные, овальные или продолговатые. Растет на сырых скалах . . . . . 12. Camptosorus Link — Крылоушник.
- Листья коротко заостренные, плотные, в сухую погоду свертывающиеся в трубку; споросные кучки округлые, крупные, расположенные в 2 правильных рядах . . . . . 20. Polypodium L., P. ussuriense Rgl. — Многоножка.
- 8 (от 3). Листья слегка мясистые или кожистые, перистые или дважды-трижды перистораздельные; спорангии расположенные двурядно на особых, резко отличающихся ветвистых дольках . . . . . 25. Botrychium L. — Гроздовник.
- Листья не мясистые . . . . . 9.
9. Листовые черешки гладкие, блестящие, темно-коричневые (почти черные); листья широковерные, разделенные на 2 равные части с правильно перистыми долями; споросные кучки укрыты загнутой или вложенной . . . . . 18. Adiantum L. — Адiantум.
- Листовые черешки зеленые или красноватые, с чешуйками или без них . . . . . 10.
10. Листовой черешок трехгранный, значительно длиннее перепончатой светло-зеленой лопастной частью, состоящей из 5—7 долей (с каждой стороны лопастной частью); спорангии внутри шарообразных долей на особых, резко отличающихся «листьях» . . . . . 6. Onoclea L. — Оноклея.
- Листовые черешки коротко чашевидные или равные ей (только в одном случае длиннее, но тогда листья трижды перистые) . . . . . 11.
11. Листья очень тонкие, просто или дважды перистые, с крупными, до 10—15 см, мелко зазубренными долями, язычковые перистые; сорусы линейные, без покрывала . . . . . 15. Coniogramma Fee — Коннограмма.
- Листовые доли разных размеров, но не более 10 см дл., цельнокрайные, городчатые или зубчатые . . . . . 12.
12. Листья всего 3—5 см дл. и 1—2 см шир., дважды перистораздельные, с обеих сторон покрытые короткими волосками; черешки покрыты волосками и рыжими бурными волосковидными пазухами; сорус без покрывала, свисающий; корневые длинные, тонкие, ползучие. Растет среди мхов . . . . . 14. Pleurosoriopsis Fom. — Плещурорусник.
- Растения более крупные, до 10 см выс., если мелкие (4—6 см), то тогда голые . . . . . 13.
13. Споросные листья или споросные части листа резко отличаются от бесплодных . . . . . 16.
- Все листья более или менее однообразные . . . . . 14.
14. Все растение не больше 10—15 см выс., листья овально-треугольные, дважды-четырежды перистораздельные, плоские длинные бесплодные . . . . . 17. Cryptogramma R. Br. — Крытограмма.
- Растения более крупные, 1—1,5 (1,8) м выс., листья дважды перистые . . . . . 15.
15. Спорангии раскрываются в мае—июне; споросные листья или споросные доли листа тонкие, сочные, по созреванию спор быстро засыхают; все растение весной покрыто коричневыми или белыми долькообразными опушениями; дольки листа более или менее плотные . . . . . 22. Selaginella L. — Чистуха.
- Споросные листья плотные, кожистые, появляются только во второй половине

лета, деревенеют и сохраняются до следующего лета; споры созревают осенью; войлочного опушения нет.

- 16 (от 13). Сорусы укрыты загнутым вниз краем листа . . . . . 17.
- Сорусы находятся на нижней стороне листа или же в специальных углублениях . . . . . 18.
17. Крупные растения, 1—1.2 (1.5) м выс. с длинным и толстым черешком с трижды перистораздельными листьями. Вегет. в дубняках и кустарниковых зарослях . . . . . 9. *Peridium* Gled. — Оряж.
- Более мелкие растения, до 20—25 (30) см выс.; листья снизу с белым или желтоватым войлочным налетом, реже без него. Растет на скалах, преимущественно известковых . . . . . 16. *Cheilanthes* Sw. — Красечник.
- 18 (от 16). Сорусы находятся близ листового края в небольших углублениях; покрывальце бокаловидной формы . . . . . 9. *Microlepia* Presl. — Мелкоочешуйник.
- Сорусы находятся на нижней стороне листа . . . . . 19.
19. Сорусы округлые . . . . . 20.
- Сорусы линейные, прямые или изгибающиеся . . . . . 24.
20. Покрывало на споровых кучках нижнее, по созревании спор разрывающееся . . . . . 21.
- Покрывало верхнее, округлое, или его нет вовсе . . . . . 22.
21. Покрывало охватывает сорус снизу со всех сторон, пузыревидное или чашевидное, неправильно разрывающееся; небольшие папоротники скал с перистыми, дважды перистыми или перистораздельными листьями; сорусы на концах жилок . . . . . 3. *Woodia* R. Br. — Вудия.
- Покрывало линейное, прикрепленное с одной стороны у основания соруса; листья трижды перистораздельные. Растет на скалах и в хвойных лесах . . . . . 4. *Cystopteris* Bernh. — Пузырыш.
- 22 (от 20). Споросные кучки крупные, круглые, без покрывала; листья перистораздельные, с продолговатыми долями . . . . . 20. *Polypodium* L. — Мукогоника.
- Споросные кучки более мелкие, с сердцевидным или округлым покрывалом или же без него; листья более крупные, перистые, дважды-четырежды перистые или же перистораздельные . . . . . 23.
23. Крайний внутренний зуб листовых долек заметно крупнее других, зубцы заканчиваются жесткой щетиной; покрывало округлое, прикрепленное в средине соруса. В лесах и на скалах (1 вид укореняется концами листьев) . . . . . 8. *Polystichum* Roth — Муторидник.
- Зубцы листовых долек более или менее одинаковые, т. е. крайний внутренний почти не отличается по размерам от следующего; жестких щетинок нет; покрывало сердцевидное или почковидное, прикрепленное сбоку, или же его нет вовсе; листья различной величины, дважды-трижды перистораздельные. В лесах, на каменистых россыпях и скалах . . . . . 7. *Dryopteris* Adans. — Щитовник.
- 24 (от 19). Растения сравнительно небольшие, от 3 до 30 см выс.; сорусы одиночные, прямые, с покрывалом, прикрепленным наружным краем. Растет на скалах и россыпях . . . . . 13. *Asplenium* L. — Костенец.
- Более крупные растения, от 30 см до 2 м выс., сорусы чаще изогнутые . . . . . 10. *Athyrium* Roth — Кочедыжник.

# ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ПАПОРОТНИКОВЫХ ПО СЕМЕЙСТВАМ

## Сем. 1. HYMENOPHYLLACEAE Bory — ТОНКОЛИСТНИКОВЫЕ


### Род 1. HYMENOPHYLLUM J. Smith — ТОНКОЛИСТНИК

Листья перисто-надрезанные, 3—4 (5) см дл.; сорусы краевые или конечные, покрывальце в форме дугубого кармашка; образует дернины. Часто вместе с раздлинными мхами; на сырых скалах, преимущественно у водопадов; у нас пока известен только на юге Приморья (гора Хуаляза, реки Сучан, Лутанга, верховья р. Дефу) . . . . . 1. *H. wrightii* Bosch — Т. Райта (табл. 1, J).

### Род 2. TRICHOMANES L. — ТОНКОВЛАСНИК

Листья веерообразные, лопастно надрезанные, 2—2.5 см дл.; сорусы краевые или пазушные, покрывальце бокаловидное или трубчатое. Образует дернины на сырых скалах; в СССР известен только на юге Приморья (заповедники Кедровая Падь и Супутинский, окрестности Владивостока, реки Майхе, Сучан) . . . . . 1. *T. parvulum* Poir. — Т. маленький (табл. 1, 2).

Таблица 1



1 — *Hymenophyllum wrightii* Bosch (Тонколистник Райта);  
2 — *Trichomanes parvulum* Poir. (Тонковласник маленький).



## Род 3. WOODSIA R. Br. — ВУДСИЯ

1. Листья перистые, с цельными долями, у основания долек крупный зубец. На скалах; довольно обычна . . . . . 1. *W. polystichoides* Eaton — В. многорядишковая (табл. 2, 1).
- Листья дважды перистые, перисторассеченные или перистораздельные, зубец у основания долек нет . . . . . 2.
2. Растения совершенно голые или с редкими членистыми волосками . . . . . 3.
- Растения с хорошо заметным опушением . . . . . 4.
3. Листья 15—20 см дл., листовая пластинка тонкая, перепончатая, дважды перистая; листовой черешок без сочленения; сорусы крупные, со светло-серым пушистым покрывалом, неравномерно разрывающимся. На более или менее влажных скалах; довольно обычна . . . . . 2. *W. manchuriensis* Hook. — В. маньчжурская (табл. 2, 4).
- Листья 4—6 см дл., перисторассеченные, голые или с редкими, рассеянными членистыми волосками; листовой черешок с сочленением у основания; сорусы мелкие, многочисленные, при созревании покрывают всю нижнюю поверхность листа. Редко; на известковых скалах . . . . . 3. *W. glabella* R. Br. — В. гладкокрая (табл. 2, 2).
- 4 (от 2). Листья дважды перистые, листовой черешок с сочленением почти у самого основания пластинки; опушение из шаровидно вздутых у основания волосков; покрывало шаровидное, вздутое, перепончатое, разделенное на несколько неравных широких лопастей. На скалах; на юге Приморья (Хасанский район, пос. Шкотово) . . . . . 4. *W. macrochaena* Mett. — В. крупнопокрывальцевая (табл. 3, 2).
- Листья перисторассеченные, перистораздельные, глубоко надразно выемчатые или почти дважды перистые; покрывало разделено на волосовидные доли . . . . . 5.
5. Опушение слабо развито; листья почти дважды перистые, 6—20 см дл., дольки тупые или оттянуто заостренные; сочленение черешка около середины; сорусы при созревании сливающиеся. На сухих скалах и россыпях; весьма обычна . . . . . 5. *W. ilvensis* R. Br. — В. северная (табл. 2, 3).
- Опушение слабо развито; листья перистораздельные; перисторассеченные или глубоко надразно выемчатые; дольки треугольно-продолговатые, извилисто-выемчатые, нижние перистораздельные, верхние — глубоко надразно выемчатые. В лесах на скалах . . . . . 6. *W. intermedia* Tagawa, *W. sinuata* (Hook.) H. Christ — В. средняя (табл. 3, 1).

## Род 4. CYSTOPTERIS Bernh. — ПУЗЫРНИК

1. Корневище длинное, тонкое, ползучее; листовой черешок длиннее овально-треугольной пластинки; листья трижды перистые, с тупыми долями. Небольшими группами; в жестких хвойных лесах, обычно близ скал . . . . . 1. *C. subeifera* A. Br. et Mille — П. судетский.
- Корневище сравнительно короткое; листовой черешок короче пластинки, листья дважды или трижды перисторассеченные, с зубатыми долями. Небольшими группами или одиночно; на скалах или на пнях . . . . . 2. *C. filix-fragilis* (L.) Bernh. — П. ломкий (табл. 3, 3).


Род 5. MATTEUCCIA Todaro, *Struthiopteris* Willd. — СТРАУСОПЕР

Листья крупные, 1—1.5 (1.8) м дл., дважды перистые, в правильной воронке; спорососные листья перистые, значительно короче бесплодных, появляются летом, при созревании спор буреют, обычно сохраняются до следующего года, дольки их почти цилиндрические, с завороченными краями. Один из весьма обычных папоротников; по долинам рек и лесным ручьям, на сырых участках . . . . . 1. *M. struthiopteris* Todaro, *Struthiopteris filicastrum* All. — С. германский (табл. 4).

## Род 6. ONOCLEA L. — ОНОКЛЕЯ

Корневище длинное, тонкое, ползучее; листовые черешки трехгранные, длинное ланцетовидных или овально-дельтовидных перисторассеченных перепончатых пластинок; спорососные листья появляются летом, дольки их шаровидные, спорангии внутри долек. Часто; на сырых лугах, близ ручьев и среди кустарников . . . . . 1. *O. sensibilis* L. — О. чувствительная.

Таблица 2




1 — *Woodsia polystichoides* Eaton (Вудсия многорядишковая); 2 — *W. glabella* R. Br. (В. гладкокрая); 3 — *W. ilvensis* R. Br. (В. северная); 4 — *W. manchuriensis* Hook. (В. маньчжурская).

Таблица 3



1 — *Woodsia intermedia* Tagawa (Вудсия средняя); 2 — *W. macrochaena* Mett. (В. крупнопокрывальцевая); 3 — *Cystopteris filix-fragilis* (L.) Bernh. (Пузырник ломкий).

Таблица 4




*Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro (Струсопер германский): а — лист (вайя), б — спороносный лист.



1. Листья перистые с стреловидно-дельтовидной пластинкой, верхушка которой сильно оттянута, нижние листовые доли глубоко перистораздельные, верхние — слабо городчатые или цельнокрайние, со сросшимися с обеих сторон лопастями; опушение из длинных волосков; сорусы без щитка. Часто; в смешанных лесах. . . . . 1. *D. phegopteris* (L.) C. Chr., *Phegopteris dryopteris* Fée. — III. Буковый.
- Листья дважды-четырежды перистые или перисторассеченные . . . . . 2.
- Листья дважды перистые или дважды перисторассеченные . . . . . 12.
- Листья дважды-трижды или трижды-четырежды перисторассеченные . . . . . 4.
- Листья треугольные, нижние доли на черешках; сорусы без щитка . . . . . 3.
- Листья продолговатые, продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные; сорусы с щитком . . . . . 5.
- Листья голые (пленки лишь у самого основания черешка), светло-зеленые, все с плоскими краями. Один из самых обычных папоротников смешанных и лиственных лесов . . . . . 2. *D. nipponica* C. Chr. — III. Лиственный.
- Листья с нижней стороны с короткими железистыми волосками; края споронных листовых долек слегка загнуты. В лесу у скал . . . . . 3. *D. robertiana* (Hoffm.) C. Chr., *Gymnocarpium robertianum* Newth. — III. Роберта.
- 5 (от 3). Корневые ползучие, тонкие, ветвистые; листья одиночные или скученные, листовые черешки длинные, голые или с рассеянными волосками . . . . . 6.
- Корневые короткие, массивные; листья собраны в более или менее правильную верушку; листовые черешки короткие, покрытые щетинками и пленками . . . . . 7.
6. Листовые доли слегка заостренные, с хорошо заметной сетью жилок, голые или с рассеянными волосками; споронные листья заметно отличаются от обычных наличием завороченных вниз краев долек; сорусы многочисленные, сливающиеся. Всюду: на травянистых болотах, сырых лугах и среди кустарников . . . . . 4. *D. thelypteris* (L.) A. Gray, *Lastrea palustris* (Salisb.) J. Smith — III. Луговой.
- Листовые доли тупые, закругленные, со слабо заметной сетью жилок, опушение с обеих сторон из рассеянных волосков; споронные листья внешне не отличаются от вегетативных; сорусы редкие. На юге Приморского края (главным образом в Хасанском районе); в лесах . . . . . 5. *D. nipponica* (Franch. et Sav.) C. Chr., *Lastrea nipponica* (Franch. et Sav.) Copeland — III. Японский.
- 7 (от 5). Листья дважды перисторассеченные, 20—25 см дл. и 4—5 (6) см шир., листовые доли очень мелкие, всего 2—5 мм дл. В горах на каменистых россыпях и скалах, а также на скалах у моря . . . . . 6. *D. fragrans* Schott — III. ароматный («каменный зверобой»).
- Листья более крупные, 50—100 (120) см дл. и 15—20 см шир., листовые доли до 1 см дл. . . . . 8.
8. Черешок листа густо покрыт узколанцетными, реснитчатыми, буроватыми или соломенного цвета пленками и волосками; пластинка мясная, листовые доли с тупыми зубцами и длинными пленчатыми волосками. Горные леса; близ Хабаровска . . . . . 7. *D. barbellata* Fom. — III. бородавчатый.
- Пленки широкие, не реснитчатые, бурые, темно-бурые или почти черные . . . . . 9.
9. Листовые доли у основания избегающие; пластинки тонкие; травянистые пленки редкие, бурые; сорусы мелкие. В хвойных лесах Приморья; редко . . . . . 8. *D. sichotensis* Kom. — III. сихотэлинский.
- Растения густо опушены темными пленками и волосками; листья более плотные, часто жесткие . . . . . 10.
10. Листья в средней части до 25—30 (35) см шир., листовые доли с хвостовидно оттянутыми концами; сорусы мелкие, по 8—10 (12) на дольку . . . . . 11.
- Листья в средней части более узкие, 16—20 (25) см шир., долины листьев более или менее равномерно уменьшаются от основания к верхушке долей; сорусы по 4—8 (10) на дольку, более крупные; пластинка плотная, кожистая; листовая черешок почти весь с пленками, особенно много их у основания, здесь они широкие и темноокрашенные, иногда почти черные. Один из самых обычных крупных папоротников кедрово-широколиственных, елово-широколиственных и черешчатых лесов . . . . . 9. *D. buschiana* Fom. — III. Буша (табл. 5, 2).
- Листья; черешки обычно длинные; очень крупные; листовая пластинка светлая, мясная и хвойно-широколиственных лесах; у нас пока найдены только на юге Приморья (гора Хуалаза близ ст. Кангва) и Сунгучинский заповедник . . . . . 10. *D. crassirhizoma* Nakai — III. толстокорневый (табл. 5, 3).
- Доли первого порядка разделены не до средней жилки, из-за чего стержневой сегмент всегда окрыленный; листовая пластинка более темная. В горных елово-

1 Вид нуждается в дальнейшем изучении, так как все имеющиеся в ДВФАН и БИН гербарные образцы, вероятно, собраны с поврежденных растений.




1 — *Dryopteris coreano-montana* Nakai (Щитовник горнокорейский), часть листа с сорусами; 2 — *D. buschiana* Fom. (III. Буша), лист; 3 — *D. crassirhizoma* Nakai (III. толстокорневый), часть листа.





*Dryopteris subtripinnata* (Miq.) Kuntze (Щитовник почти утсроенноперистый).



1 — *Dryopteris amurensis* H. Christ (Щитовник амурский); а — лист, б — верхняя часть листа, в — долька листа с сорусами; 2 — *D. austriaca* (Lac.) Wougar (Щ. австрийский) часть листа; 3 — *D. miqueliana* (Maxim.) H. Christ (Щ. Микеля), часть листа.

- пихтовых и смешанных лесах; Приморье — III. горнокорейский (табл. 5, 1).
- 12 (от 2). Листовые черешки очень толстые, не более 1 мм у основания, 7—15 (18) см дл., пластинка листа почти такой же длины и 6—13 (15) см шир.; пленки темные. На скалах вблизи морского берега; пока найден только один раз в Суздаунинском заповеднике близ с. Квевки . . . . . 13.
12. *D. subtripinnata* (Miq.) Kuntze — III. почти угросионированный (табл. 6).
- Листовые черешки более толстые, 2—5 (8) мм толщ., и 20—40 (50) см дл. . . . . 13.
13. Листовой черешок обычно длиннее пластинки; листовая пластинка в общем очертании треугольной, 20—35 (40) см шир., три почти такой же длине . . . . . 14.
- Листовой черешок обычно короче пластинки, реже равен ей, 20—30 (40) см дл. . . . . 15.
14. Зубцы листовых долек заканчиваются тонкими щетинками; листья голые, листовые черешки с редкими светло-бурыми пленками; корневище короткое, толстое. В хвойных, преимущественно елово-пихтовых лесах; в массе . . . . . 13. *D. amurensis* H. Christ — III. амурский (табл. 7, 1).
- Зубцы листовых долек туповатые, если острые, то не заканчиваются щетинками; листья обеих сторон с беловатыми, очень короткими, щетинистыми волосками; исчезающими в конце вегетации. В горных елово-пихтовых лесах; у нас большая редкость (пока собран всего 2 раза на горе близ ст. Кангауз Шкотовского района) . . . . . 14. *D. miqueliana* (Maxim.) H. Christ, *Leptorumhra miqueliana* (Maxim.) T. Po — III. Микеля (табл. 7, 3).
- 15 (от 13). Листовые доли оттянуты в длинные, хвостовидные окончания; пленки редкие, узкие, одноцветные; в живом виде листья сверху серовато- или сизовато-зеленые, снизу желтоватые. Встречается одиночно или небольшими группами; в кедрово-широколиственных и пихтово-широколиственных лесах; Приморье и изредка на Амуре (с. Помпеенка) . . . . . 15. *D. wladwostkensis* B. Fedtsch. — III. владивостокский.
- Листовые доли без хвостовидных окончаний, пленки более широкие и в нижней части более обильные, с темной полоской; листья более или менее одноцветные, зеленые. Один из массовых папоротников хвойных лесов Приморья и Приамурья . . . . . 16. *D. austriaca* (Jacq.) Wagn. *D. dilatata* A. Gray — III. австрийский, III. широкий (табл. 7, 2).

#### Род 8. POLYSTICHUM Roth — МНОГОРЯДИНИК

1. Листья разделены на 3 неравные доли, средняя значительно длиннее боковых; листовые доли с крупными зубцами у основания. В смешанных лесах; на юге Приморья . . . . . 1. *P. tripterum* (Kuntze) Presl, *Ptilopteris triptera* (Kuntze) Hayata — М. трехраздельный (табл. 8, 2).
- Листья не разделены на 3 доли, перистые или дважды перистые . . . . . 2.
2. Небольшое растение с перистыми листьями, 12—20 (25) см дл. и около 5 см шир., на концах часто укореняющимися. На скалах, преимущественно известковых . . . . . 2. *P. squarrososum* (Maxim.) Diels — М. укореняющийся (табл. 8, 1).
- Крупный папоротник с дважды перистыми листьями, 50—80 см дл., 20—25 см шир., с пленчатыми волосками, в живом состоянии блестящими. В лесах . . . . . 3. *P. braunii* Fée — М. Брауна (табл. 8, 3).

#### Род 9. MICROLEPIA Presl — МЕЛКОЧЕШУЙНИК

1. Небольшой до 25 (30) см выс., папоротник с членистыми волосками. На сухих скалах . . . . . 1. *M. pilosella* Moore — М. волосистый (табл. 9, 1).
- Несколько более крупный папоротник, до 35 (40) см выс., голый или почти голый; листовые доли широкие, яйцевидно-треугольные. На сырых скалах и по ручьям . . . . . 2. *M. wilfordii* Moore — М. Вилфорда (табл. 9, 2).


#### Род 10. ATNIUM Roth — КОЧЕДЫЖНИК

1. Листья широкие, ширина пластинки обычно превышает ее длину или же почти равна ей . . . . . 2.
- Длина листовых пластинки в несколько раз превышает ее ширину . . . . . 4.
2. Листовые доли с острыми зубцами. Один из обычных папоротников хвойных и смешанных лесов . . . . . 1. *A. spinulosum* (Maxim.) Mille — К. игольчатый (табл. 10, 1).
- Листовые доли с тупыми зубцами; черешки крупные, до 60 см дл. и 5 мм толщ., с отделимыми редкими узкими пленками . . . . . 3.
3. Листья крупные, до 60—70 см дл. и до 50—60 см шир., сорусы без покрывала, округлые или продолговатые. В смешанных, преимущественно долинных лесах;



1 — *Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels (Многорядник укореняющийся), лист; 2 — *P. tripterum* (Kuntze) Presl (М. трехраздельный); 3 — *P. braunii* Fée (М. Брауна), верхняя часть листа.





1 — *Microlepia pilosella* Moore (Мелкочешуйник волосистый), лист; 2 — *M. wilfordii* Moore (М. Вильфорда), лист; 3 — *Asplenium anogrammoides* H. Christ (Костенец письменный); 4 — *A. incisum* Thunb. (К. надрезанный), лист.



1 — *Athyrium spinulosum* (Maxim.) Milde (Кочедыжник иглочатый), лист; 2 — *A. crenatum* (Sommerl.) Rupr. (К. городчатый), часть листа; 3 — *A. pterorachis* H. Christ (К. крылатый), часть листа; 4 — *A. coreanum* H. Christ (К. корейский), часть листа.



1 — *Athyrium subspinosum* (H. Christ) R.-C. Ching (Кочедыжник почти темнистый), часть листа; 2 — *A. yokoscense* (Franch. et Sav.) H. Christ (Р. южнокорейский), лист; 3 — *A. filix-femina* (L.) Roth, s. l. (Р. женский), часть листа.

- на юге Приморья, отдельные реликтовые местообитания известны также в Хабаровском крае (оз. Эворон) . . . . . 2. *A. crenulato-serrulatum* Makino, *A. austro-ussuriensis* (Kom.) Fom. — К. межгородчатопильчатый. Черешки меньших размеров, с черными или темно-бурыми пленками; листья 30—45 см дл. и 40—60 см шир.; сорусы с вынутым перепончатым покрывалом. Один из широко распростертых папоротников хвойных и смешанных лесов . . . . . 3. *A. crenatum* (Sommerf.) Rupr. — К. горчачатый (табл. 10, 2).
- 4 (от 1). Листовые доли тупые, почти цельнокрайние или слабо зубчатые; сорусы с прямыми покрывальцами, в смешанных и широколиственных лесах . . . . . 4. *A. pycnosorum* H. Christ, *Lunathyrium pycnosorum* (H. Christ) Koidz. — К. пильчатый. Листовые доли заостренные, зубчатые или надрезаннозубчатые; покрывальца частично изогнутые . . . . . 5. Листовые доли с округлым черешком . . . . . 6. Черешок листовых долей не окрыленный . . . . . 7. Общий черешок листовых долей окрыленный, с зигзагами; сорусы мелкие, не более 1 мм, и находятся почти у самой срединной жилки долей; очень крупный папоротник, до 1.8—2 м выс. Пока найден только на юге Приморья (курорт Вангоу и р. Судзукхе) и близ устья Амура . . . . . 5. *A. pterorachis* H. Christ, *Dryogothyrium pterorachis* (H. Christ) Ching — К. крылатый (табл. 10, 3).
- Общий черешок листовых долей равномерно окрыленный (без зигзагов), сорусы более крупные; все растение несколько меньших размеров, 1.2—1.5 м выс. В хвойно-широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 6. *A. coccineum* H. Christ — К. коралловый (табл. 10, 4).
- 7 (от 5). Листовые доли острые, заканчиваются одним остроконечием, пильчатые или глубоко выемчато-зубчатые . . . . . 8. Листовые доли туповатые, заканчиваются несколькими зубцами, из которых один может быть несколько крупнее остальных . . . . . 9. Листовые доли равномерно надрезаннозубчатые, с 6—12 слабо изогнутыми сорусами. На юге Приморья; преимущественно в лиственных лесах . . . . . 7. *A. yokoscense* (Franch. et Sav.) H. Christ — К. южнокорейский (табл. 11, 2).
- Листовые доли глубоко выемчато-зубчатые, с большим числом (до 24) сорусов, расположенных почти кольцом. Лиственные леса; на юге Приморья . . . . . 8. *A. subspinulosum* (H. Christ) Ching — К. почти пильчатый (табл. 11, 1).
- 9 (от 7). Листовой черешок весной вишне-красный, как и листовая пластинка, позднее красным остается лишь основание черешка; листовая пластинка мягкая, дважды- или трижды перистая. В лесах и кустарниковых зарослях, главным образом по ручьям; весьма обычен в Приморском крае, к северу и западу реке . . . . . 9. *A. rubripes* Kom. — К. красночерешковый.
- Растение никогда не бывает красным, с более плотной листовой пластинкой. Всюду в лесах, кустарниковых зарослях и вдоль ключей . . . . . 10. *A. filix-femina* (L.) Roth, s. l. — К. женский (табл. 11, 3).

## Род 11. PHYLITIS Ludw. — ЛИСТОВНИК

Листья с сердцевидным основанием, крупные, до 30—35 (40) см дл. и около 4.5 см шир., плотные, кожистые, темно-зеленые; сорусы линейные. Один из наиболее редких папоротников, пока известен всего из нескольких пунктов в Черниговском и Яковлевском районах и из бассейна р. Анюя; в еловых лесах и на скалах . . . . . 1. *Ph. japonica* Kom. — Л. японский (табл. 12, 2).


## Род 12. CAMPTOSORUS Liak — КРИВОКУЧНИК

Небольшой папоротник с цельнокрайними листьями, на концах часто укороченными. На сырых скалах и у шей . . . . . 1. *C. sibiricus* Rupr. — К. сибирский (табл. 12, 4).

## Род 13. ASPLENIUM L. — КОСТЕПЕЧ

1. Листья дважды перистые, до 25—30 см дл.; листовые доли различной формы и величины; черешки с темной полоской. По краям каменистых россыпей и в смешанных лесах; редко . . . . . 1. *A. incisum* Thunb. — К. надрезанный (табл. 9, 2).
- Листья перистые или частично дважды-трижды перистые, черешки зеленые, без полосок; маленькие скальные папоротники . . . . . 2. Листовые доли почти веерообразные; сорусы редкие, одиночные. На сырых скалах довольно часто . . . . . 2. *A. anogrammoides* H. Christ — К. пильчатый (табл. 9, 3).
- Листовые доли овальные или каштановидные; сорусы поздние сливающиеся. Очень редко; на известковых скалах, в долине р. Сучана . . . . . 3. *A. ruta-muraria* L. — К. полевничий.





1 — *Polypodium ussuriense* Rgl. (Многоножка уссурийская); 2 — *Phyllitis japonica* Kom. (Листовник японский); 3 — *Polypodium virginianum* L. (Многоножка виргинская); 4 — *Camplosorus sibiricus* Rupr. (Кривокушник сибирский); 5 — *Cyclophorus lingua* (Thunb.) Desv. (Кругонос язычный).

## Род 14. PLEUROSORIOPSIS Fom. — ПЛЕУРОСОРИПСНИК

Маленький папоротник с дважды перисторассеченными листьями, покрытыми с обеих сторон короткими, членистыми волосками; сорусы сливающиеся. На скалах и в лесу на камнях среди сплошного мохового покрова; один из очень редких папоротников (ст. Океанская, реки Сулутинка, Судзукхе, Майхе) . . . 1. *P. makinoi* (H. Christ) Fom., *Anogramma makinoi* H. Christ — П. Макино (табл. 13, 2).

## Род 15. CONIOGRAMMA Fée — КОНИОГРАММА

Крупный папоротник с очень тонкими, простыми или дважды перистыми листьями, доли которых до 10—15 см дл., с мелко зазубренными краями, жилкование перистое; сорусы без покрывала, линейные. Во влажных лесах, местами по рекам (Хор, Билин, Иман, верховья Немлугу, Сулутинка, Майхе), заповедник «Кедровая падь» . . . 1. *C. intermedia* Hieron., *C. frazierae* auct., non Diels — К. средняя, К. лсецелистная (табл. 14, 1).

## Род 16. CHEILANTHES Sw. — КРАЕКУШНИК

1. Листья до 20—25 см дл., продолговатоланцетные, дважды перисторассеченные, с многочисленными долями. На скалах в лесу; очень редкий папоротник (Хасанский район и р. Бурей) . . . 1. *Ch. kuhni* Milde — К. Куна (табл. 13, 4).

— Листья меньших размеров, в очертании пятиугольные, с 3 парами боковых долей и почти такой же конечной долей, все доли перисторассеченные. Редко; на скалах, преимущественно известковых . . . 2. *Ch. argentea* Kuntz. — К. серебристый (табл. 13, 3).

Изредка встречается также разновидность, у которой снизу нет ярко-белого нового налета — *Ch. argentea* var. *obscura* H. Christ — К. серебристый, К. темный.

## Род 17. CRYPTOGRAMME R. Br. — КРИПТОГРАММА

Все растение 10—15 см выс.; листья овально-треугольные, дважды-четырежды перисторассеченные, плодущие ивой формы и заметно длиннее бесплодных. Пока найдена только на горе Ко в северном Сихотэ-Алине на высоте около 2000 м над ур. м. . . . . 1. *C. raddeana* Fom. — К. Радде (табл. 14, 2).

## Род 18. ADIANTUM L. — АДИАНТУМ

Черешки темно-коричневые, почти черные, блестящие; листья широковерные, разделены на 2 равные части, с правильноперистыми, тонкими долями; спороносные кучки укрыты загнутой вниз пленкой. В смешанных кедрово- и пихтово-широколиственных лесах; часто группами . . . . . 1. *A. pedatum* L. — А. стоповидный (табл. 13, 2).

## Род 19. PTERIDIUM Gled. — ОРЛИК

Черешки длинные, толстые, листья дважды-трижды перистораздельные, кожистые, с оттянутыми хвостовидными оковчинными; сорусы укрыты загнутым краем листа. Один из самых распространенных папоротников в лиственных лесах и кустарниковых зарослях . . . . . 1. *P. aquilinum* Kuhn — О. обыкновенный (табл. 13, 1).


## Род 20. POLYPODIUM L. — МНОГОНОЖКА

1. Листья линейно-ланцетные, темно-зеленые, цельнокрайние; в сухую погоду края свертываются в трубку. На скалах и на стволах деревьев; преимущественно на юге Приморья . . . 1. *P. ussuriense* Rgl. — М. уссурийская (табл. 12, 1).

— Листья перистораздельные, светло-зеленые или снизу желтовато-зеленые. На скалах и у оснований стволов; часто . . . . . 2. *P. virginianum* L. — М. виргинская (табл. 12, 3).

## Род 21. CYCLOPHORUS Desv. — КРУГНОС

Листья плотные, кожистые, цельнокрайние, со сплошным плотным опушением снизу; сорусы сплошные, покрывают всю нижнюю поверхность листа. На сухих скалах . . . . . 1. *C. lingua* (Thunb.) Desv. — К. язычный (табл. 12, 5).



1 — *Pteridium aquilinum* Kuhn (Орляк обыкновенный): вверху — часть листа с сорусами; 2 — *Adiantum pedatum* L. (Адиантум стоповидный): а — верхняя часть листика, б — долька листа с сорусами; 3 — *Cheilanthes argentea* Kuntze (Краекучник серебристый); 4 — *Ch. kuhni* Mild (К. Куна): слева — часть листа с сорусами; 5 — *Pleurosoropsis makinoi* (H. Christ) Fom. (Плауросорусник Макино).



1 — *Coniogramma intermedia* Hieron. (Конциграмма средняя), лист; 2 — *Cryptogramma raddeana* Fom. (Криптограмма Радде).



Сем. 3. OSMUNDACEAE R. Br. — ЧИСТОУСТОВЫЕ

Род 22. OSMUNDA L. — ЧИСТОУСТ, Осмунда

Таблица 15

1. Спороносные листья резко отличаются от бесплодных, появляются весной и не имеют зеленых долей, по созревании спор быстро засыхают; опушение, особенно весной, из коричнево-рыжих волосков. В лесах у ручьев и на сырых местах; один из самых широко распространенных крупных папоротников . . . . . 1. *O. cinnamomea* L. — Ч. коричневый (табл. 15, 1).
- Споросные листья отличаются от вегетативных лишь наличием споросных долей, расположенных немного ближе средине листа среди обычных зеленых долей; опушение менее обильное, из светлых, почти белых волосков. В лесах; группами; на юге Приморского края . . . . . 2. *O. claytoniana* L. — Ч. Клейтона (табл. 15, 2).

Сем. 4. SALVINIACEAE Dum. — САЛЬВИНИЕВЫЕ

Род 23. SALVINIA Michx. — САЛЬВИНИЯ

Небольшое плавающее растение с супротивными, слегка сердцевидными листьями; подводные листья разделены на очень узкие дольки, густо ослепые длинными волосками (очень похожими на корни); кустики спор находятся у основания погруженного листа. Массами; в стоячих водоемах и по берегам стариц; особенно часто на оз. Ханка . . . . . 1. *S. natans* (L.) All. — С. плавающая (табл. 16, 1).

Сем. 5. ORPHOGLOSSACEAE R. Br. — УЖОВНИКОВЫЕ

Род 24. ORPHOGLOSSUM L. — УЖОВНИК

Небольшое растение с 1 широколанцетным зеленым листом на стебле, выше вегетативной части листа находится линейная спороносная часть, его пластинки с очень крупными, расположенными в 2 ряда спорангиями. Пока найден только в Хасанском районе . . . . . 1. *O. vulgatum* L. — У. обыкновенный (табл. 16, 2).

Род 25. BOTRYCHIUM L. — ГРОЗДОВНИК


1. Листья простоящие, но иногда у долек бывают единичные надрезы . . . . . 2.
- Листья дважды-трижды перистораздельные . . . . . 4.
2. Споросная часть листа на длинной ножке; дольки полулунной формы или же почковидные; небольшой папоротник. У нас встречается преимущественно в северной части, особенно часто близ устья Амура; на лужайках и на морском берегу; единично или небольшими группами . . . . . 1. *B. lunaria* (L.) Sw. — Г. лунный.
- Споросная часть листа на короткой ножке . . . . . 3.
3. Листовые дольки ланцетовидные, с хорошо выделяющейся главной жилкой; все растение до 20 см выс. В северной и западной части района; редко; по лесным опушкам, на лугах и у дорог . . . . . 2. *B. lanceolatum* Angstr. — Г. ланцетный.
- Листовые дольки широкояйцевидные или яйцевидные, жилки расходятся веерообразно. Редко; преимущественно на севере вблизи рек . . . . . 3. *B. boreale* Milde — Г. северный.
- 4 (от 1). Листья длинночерешковые, плотные, кожистые, зимующие, расположенные в нижней части; корни толстые, морщинистые. По лесным опушкам и у дорог; из всех видов гроздовника у нас самый распространенный . . . . . 4. *B. robustum* Underw. — Г. крепкий (табл. 16, 3).
- Лист сидячий, тонкий (перепончатый), находится посредине или в верхней части стебля; корни тонкие, гладкие. На лесных полянах и в кустарниковых зарослях; у нас очень редок . . . . . 5. *B. virginianum* (L.) Sw. — Г. виргинский.

EQUISETINAE — ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Сем. 6. EQUISETACEAE Rich. — ХВОЩЕВЫЕ

Род 1. EQUISETUM L. — ХВОЩ


1. Стебли жесткие, простые, зимующие, обычно темно-зеленые . . . . . 2.
- Стебли не зимующие, более мягкие, обычно с мутовчато расположенными веточками, реже простые . . . . . 4.



1 — *Osmunda cinnamomea* L. (Чистоуст коричневый); а — часть вегетативного листа, б — споросный лист; 2 — *O. claytoniana* L. (Ч. Клейтона), споросный лист.




1 — *Salvinia natans* (L.) All. (Сальвиния плавающая); 2 — *Ophioglossum vulgatum* L. (Ужовник обыкновенный); 3 — *Botrychium robustum* Underw. (Гроздовник крепкий).



1 — *Equisetum arvense* L. (Хвощ полевой); а — верхняя часть спороносного стебля с колоском, б — часть стебля; 2 — *E. silvaticum* L. (Х. лесной); а — верхняя часть спороносного стебля с колоском; б — часть стебля; 3 — *E. hiemale* L. (Х. зимующий), часть стебля; 4 — *E. pratense* Ehrh. (Х. луговой), часть стебля.



2. Стебли крупные, до 50—70 см выс. и около 4—6 мм в diam.; листовые кольца широкие, черные, с 18—20 и более зубцами. В массе; в сырых лесах . . . . . 1. *E. hiemale* L. — *X. зимующий* (табл. 17, 3).
- Стебли небольшие, до 25—30 см выс. и всего около 4 мм толщ.; зубцов в листовых мутовках по 3—8 . . . . . 3.
3. Стебли более или менее прямые; листовые зубцы с яркой белой оторочкой. Группами; по песчаным откосам и на речных террасах . . . . . 2. *E. variegatum* Schleich. — *X. пестрый*.
- Стебли изогнутые, листовые зубцы черные. Группами; в мшистых хвойных лесах . . . . . 3. *E. scirpoides* Michx. — *X. камышовый*.
- 4 (от 1). Ветви стебля с веточками; листовые кольца сростаются в тупые, коричневые, перепончатые лопасти. В лесах . . . . . 4. *E. silvaticum* L. — *X. лесной* (табл. 17, 2).
- Стебли с простыми веточками или без них; листовые зубцы свободные . . . . . 5.
5. Стебель в верхней части покрыт мелкими шипиками, хорошо ошупываемыми на ощупь и заметными в лупу; веточки отогнуты книзу или горизонтальные. Всюду; на сырых лугах и среди кустарников . . . . . 5. *E. pratense* Ehrh. — *X. луговой* (табл. 17, 4).
- Стебли без шипиков . . . . . 6.
6. Листовые зубцы многочисленные (по 18—20 в мутовке), узкие; стебель ветвится только в верхней части, реже совсем без ветвей. Растет на болотах, нередко в воде . . . . . 6. *E. limosum* L. — *X. топяной*.
- Листовых зубцов по 5—8 в мутовке . . . . . 7.
7. Листовые зубцы с перепончатой каймой; колоски на верхушках зеленых побегов. На болотах и сырых местах . . . . . 7. *E. palustre* L. — *X. болотный*.
- Листовые зубцы без белых оторочек; колоски на особых бурых стеблях, появляющихся рано весной и быстро засыхающих. Самый распространенный вид хвоща; всюду, по откосам, насыпям, в кюветах у дорог, на лугах и залежах . . . . . 8. *E. arvense* L. — *X. полевой* (табл. 17, 1).



## LYCOPODINAE — ПЛАУНОВЫЕ

### Сем. 7. LYCOPODIACEAE L. C. Rich. — ПЛАУНОВЫЕ

#### Род 1. LYCOPIDIUM L. — ПЛАУН

1. Спорангии расположены в пазухах обычных листьев (колосков не бывает) . . . . . 2.
- Колоски ясно выражены и находятся на концах ветвей или на вершине главного стебля . . . . . 4.
2. Листья по краю ясно пильчатые, к основанию суженные, до 1 мм шир. В хвойных лесах; часто, небольшими группами . . . . . 4. 1. *L. serratum* Thunb. — *П. пильчатый* (табл. 18, 1).
- Листья цельнокрайные или с отдельными, едва заметными зубчиками . . . . . 3.
3. Листья узкие, около 0,5 мм шир., постепенно заостренные; стебли простые или слабо ветвящиеся, тонкие; все растение ярко-зеленое. В темных хвойных лесах верхнего пояса гор; наиболее обычны в южном и среднем Сихотэ-Алине . . . . . 2. *L. chinense* H. Christ — *П. китайский*.
- Листья несколько более широкие, до 0,75—1 мм; стебли более толстые, сильно ветвящиеся; все растение желтоватое. На гольцах среди зарослей кедрового стланника, в каменноберезниках, лиственничниках и ельниках у верхней границы леса; в среднем и северном Сихотэ-Алине и по Амуру . . . . . 3. *L. selago* L. — *П. баранец*.
- 4 (от 1). Стебли прямостоячие; все растение похоже на маленькое деревцо . . . . . 5.
- Стебли ползучие, часто укореняющиеся, с прямостоячими ветвями . . . . . 6.
5. Ветви равномерно облиственные; листья сильно (почти серповидно) изогнуты вверх. В хвойных лесах . . . . . 4. *L. juniperoides* Sw. — *П. можжевельниковый* (табл. 18, 2).
- Ветви облиственны так, что кажутся двусторонними; листья слегка изогнуты. В хвойных лесах . . . . . 5. *L. obscurum* L. — *П. темный*.
- 6 (от 4). Листья бесплодных побегов чешуевидные, прижатые к стеблю; ветви более или менее плоские . . . . . 7.
- Листья линейные или линейно-ланцетные, отклоненные от стебля . . . . . 8.
7. Ветви плоские; колоски на длинных ножках, чаще по несколько. В лесах верхнего пояса гор и на гольцах . . . . . 7. *L. complanatum* L., *L. anceps* Wallr. — *П. обоюдоострый*.
- Ветви не такие плоские; колоски на коротких ножках; почти сидячие, одиночные. На гольцах . . . . . 8. *L. alpinum* L. — *П. альпийский*.

1 — *Lycopodium serratum* Thunb. (Плаун пильчатый); 2 — *L. juniperoides* Sw. (П. можжевельниковый); 3 — *L. annotinum* L. (П. годичный); 4 — *L. clavatum* L. (П. булавовидный). а — лист.

- 8 (от 6). Листья на концах с белыми волосками; колоски на длинных цоколях, чаще по 2. В хвойных лесах и на россыпях . . . . . 9. *L. clavatum* L. — П. булавовидный (табл. 18, 4).  
— Листья без белых волосков; колоски сидячие, одиночные . . . . . 9.  
9. Стебли длинные, ползучие; передние укореняющиеся; листья темно-зеленые; колоски 25—40 мм дл. Часто в темнохвойных лесах и лиственничниках . . . . . 10. *L. annotinum* L. — П. годичный (табл. 18, 3).  
— Стебли короткие; листья желтовато-зеленые; колоски 10—15 мм дл. На сфагновых болотах в горах . . . . . 11. *L. pungens* La Pyl. — П. колючий.

Сем. 8. SELAGINELLACEAE Mett. — ПЛАУНКОВЫЕ.  
СЕЛАГИНЕЛЛОВЫЕ

Род 1. SELAGINELLA Spring — ПЛАУНОК, СЕЛАГИНЕЛЛА

1. Стебли собраны в плотную розетку и в сухую погоду свертываются. На сухих скалах и карнизах . . . . . 1. *S. involvens* Spring — С. завертывающаяся (табл. 19, 2).  
— Растения не образуют розетку . . . . . 2.  
2. Небольшие, похожие на мох растения с очень тонкими листьями, укореняющимися стеблями и цилиндрическими колосками на прямостоящих стеблях. На сырых местах в лесах, у скал . . . . . 2. *S. helvetica* Link — С. швейцарская (табл. 19, 6).  
— Листья более плотные; колоски четырехгранные . . . . . 3.  
3. Лист заканчивается волоском . . . . . 4.  
— Листья не имеют волосовидного окончания . . . . . 5.  
4. Стебли до 1.5—2 мм толщ.; волосовидные окончания листьев, особенно на концах побегов, хорошо заметны. На сухих скалах . . . . . 3. *S. sibirica* (Milde) Hieron. — С. сибирская (табл. 19, 4).  
— Стебли тонкие, менее 1 мм толщ.; волосовидные окончания листьев, короткие (заметны в лупу). На сырых скалах . . . . . 4.  
5. 4. *S. shakotanensis* Miyabe et Kudo — С. шаботанская (табл. 19, 3).  
— Стебли и листья (старые) ярко-красные. На сухих скалах; по Амуру . . . . . 5. *S. sanguinolenta* Spring — С. кроваво-красная.  
— Стебли и листья зеленые или чуть красноватые . . . . . 6.  
6. Листья очень мелкие, прижатые к стеблю, черепитчато налегающие друг на друга. Большими куртинами; на сырых скалах . . . . . 6. *S. borealis* Spring — С. северная (табл. 19, 1).  
— Листья более крупные, расставленные, не налегающие друг на друга. На скалах; преимущественно на юге Приморья . . . . . 7. *S. rossii* (Bak.) Warb. — С. Росса (табл. 19, 5).

ISOETALES — ПОЛУШНИКОВЫЕ

Сем. 9. ISOETACEAE Rich. — ПОЛУШНИКОВЫЕ

Род 1. ISOETES L. — ПОЛУШНИК

Растение подводное, с пучком шизоидных листьев, у основания которых находятся спорангии, прикрытые покрывалом. Пока найден только в Сихотэ-Алинском заповеднике, в оз. Хунтаи близ моря . . . . . 1. *I. asiatica* Makino — П. азиатский (табл. 19, 7).


GYMNOSPERMAE — ГОЛОСЕМЯННЫЕ

CONIFERAЕ — ШИШКОНОСНЫЕ

Сем. 10. TAXACEAE Lindl. — ТИСОВЫЕ


Род 1. TAXUS L. — ТИС

Дерево или крупный куст с красновато-серой корой, лишенное смолы; хвоя плоская, до 2.5 см дл. и 2.5—3 мм шир., на концах заостренная; плоды одиночные, с мясистой красной оболочкой (присемянником), окружающей семя, верхняя часть которого всегда открыта. В хвойных влажных лесах; одиночно и небольшими группами . . . . . 1. *T. cuspidata* Sieb. et Zucc. — Т. остроколючный (табл. 20, 4).



1 — *Selaginella borealis* Spring [Плаунок (Селагинелла северная)]; 2 — *S. involvens* Spring (С. завертывающаяся); 3 — *S. shakotanensis* Miyabe et Kudo (С. шаботанская); 4 — *S. sibirica* (Milde) Hieron. (С. сибирская); 5 — *S. rossii* (Bak.) Warb. (С. Росса); 6 — *S. helvetica* Link (С. швейцарская); 7 — *Isoetes asiatica* Makino (Полушник азиатский).






1 — *Juniperus dahlurica* Pall. (Можжевельник лаурекий); 2 — *J. rigida* Sieb. (М. твердolistный); 3 — *J. sibirica* Burzsd. (М. сибирский); 4 — *Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc. (Тис остроконечный); 5 — *Microbiota decussata* Kom. (Микробийота перекрестнопарная).

## Род 1. ABIES Mill. — ПИХТА

1. Все листья (хвои) на концах целые, твердые, с игольчатой верхушкой; кора на молодых ветвях шероховатая, слегка луплящаяся, на старых стволах продольно борозчатая, серо-бурого цвета; крупное дерево. Встречается только на юге Приморья . . . . . 1. *A. holophylla* Maxim. — П. цельнолистная (табл. 21, 1).

Таблица 21



1 — *Abies holophylla* Maxim. (Пихта цельнолистная); 2 — *Picea ajanensis* Fisch., s. l. (Ель аянская); 3 — *P. obovata* Ldb. (Е. сибирская).  
а — ветви с шишкой, б — семя, в — хвоя.

- Листья (хвои) мягкие, на боковых ветвях концы их слегка раздвоены (что особенно хорошо заметно в луну); кора светло-серая, гладкая и только у некоторых наиболее старых деревьев сильно растрескивающаяся и темно-серая. Одна из основных лесобразующих пород темнохвойных лесов . . . . . 2. *A. nephrolepis* Maxim. — П. белокорая, П. почкочешуйная.

1. Листья (хвои) плоские, с обеих сторон килеватые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с 2 синева-белыми полосками; шишки от 3 до 8,5 см дл. и 1,5—3 см шир., с волнисто-зубчатыми или выемчатыми (выгнутыми) краями чешуй. Одна из основных лесобразующих пород темнохвойных лесов . . . . . 1. *P. japonensis* Fisch., s. l. — Е. японская (табл. 21, 2).

*P. japonensis*, s. l. довольно сильно варьирует как по размерам шишек, так и по кроющим и семенным чешуйкам и может быть разделена на 3 мелких вида.

1. *P. japonica* Fisch., s. str. — Е. японская (низовья Амура, северный Сихотэ-Алинь).  
2. *P. microsperma* (Lindl.) Carr. — Е. мелкосемянная (почти весь Сихотэ-Алинь).  
3. *P. komarovii* V. Vassil. — Е. Комарова (только на крайнем юге Приморья).

Между этими мелкими, географически замещающими видами существует ряд переходных (возможно гибридных) форм; точная граница их распространения в нашем районе не установлена.

- Листья (хвои) четырехгранные; шишки с полото закругленными, почти цельно-крайними чешуями, от 6—10 см дл. и 3—4 см шир. . . . . 2.  
2. Молодые веточки голые. В долинных лесах Приморья . . . . . 2. *P. koraiensis* Nakai — Е. корейская.  
— Молодые веточки густо опушенные. В долинных лесах Приморья . . . . . 3. *P. obovata* Ldb. — Е. сибирская (табл. 21, 3).

## Род 3. LARIX Mill. — ЛИСТВЕННИЦА

1. Молодые побеги более или менее опушенные, реже с односторонними волосками, красноватые или фиолетовые . . . . . 2.  
— Молодые побеги голые, от соломенно-желтых и желтых до серовато-желтых . . . 3.  
2. Шишки всегда мелкие, около 1,5 см дл., с широко раскрытыми семенными чешуями, на концах загнутыми наружу. Изредка, в низовьях Амура . . . . . 1. *L. kurilensis* Mayr — Л. курильская.  
— Шишки различной величины, 1,5—3 см дл.; чешуй молодых шишек с густым опушением, семенные чешуи менее раскрыты, с неоттянутыми наружу концами. На побережье Японского моря . . . . . 2. *L. olgensis* A. Henry — О. ольгинская (табл. 22, 2).  
3 (от 4). Шишки крупные, до 2,5—3 см дл., удлиненно-овальные или оваловые; семенные чешуи по верхнему краю слабо выемчатые и зазубренные или совсем гладкие. Только на юге Приморья . . . . . 3. *L. principis-rupprechtii* Mayr, *L. lubarskii* Sukacz. — Л. принца Рупрехта.  
— Шишки мелкие, обычно около 1,5, реже до 2 см дл., округлые; семенные чешуи по верхнему краю глубоко выемчатые и сильно зазубренные. Амурская область, Хабаровский край и северо-запад Приморского края . . . . . 4. *L. dahurica* Turcz., s. l. — Л. даурская.



Кроме приведенных видов, у нас есть еще несколько более мелких видов, описанных Б. П. Колесниковым и В. Н. Сукачевым.

1. *L. komarovii* Kolesn. — Л. Комарова (преимущественно в южном Сихотэ-Алине).  
2. *L. middendorffii* Kolesn. — Л. Миддендорфа (близ устья Амура).  
3. *L. maritima* Sukacz. — Л. приморская (северный Сихотэ-Алинь, бассейн р. Ботчи).  
4. *L. ochotensis* Kolesn. — Л. охотская (северный Сихотэ-Алинь).

## Род 4. PINUS L. — СОСНА


1. Листья (хвои) в пучках по 2 . . . . . 2.  
— Листья в пучках по 5 . . . . . 3.  
2. Хвои от 5 до 40 см дл. и около 1 мм шир.; молодые шишки почти сидячие, прямые; чешуй на чешуях взрослых шишек ромбические, почти плоские. Только на юге Приморского края; на сухих скалах и крутых обрывах склонах . . . . . 1. *P. fuchensis* Kom. — С. могильная (табл. 23, 4).  
Этот вид почти не отличается от *P. densiflora* Sieb. et Zucc., описанной из Японии.  
— Хвои несколько короче, до 4—8 см дл., но более широкие, до 1,5—2 мм шир. и более грубые; шишки на более или менее длинных ножках, отклоненные вниз; чешуй на концах зрелых шишек выгнутые, почти ромбические. Амурская область и северо-западная часть Хабаровского края (до бассейна р. Горина на

Таблица 22



1 — *Ephedra monosperma* C. A. Mey. (Хвойник односемянный); а — шишко-ягода, б — семя; 2 — *Larix olgensis* A. Henry (Лиственница ольгинская); а — семенная чешуя, б — семя.





1 — *Pinus pumila* Rgl. (Кедровый стланец); а — конец ветви, б — шишка, в — «орешек», г — хвоя; 2 — *P. silvestris* L. (Сосна обыкновенная); а — ветвь с шишкой, б — шишка, в — хвоя; 3 — *P. koraiensis* Sieb. et Zucc. («Корейский кедр», Кедровая сосна); а — конец ветви, в (слева) — хвоя, а — «орешек», г (справа) — шишка; 4 — *P. funebris* Kom. (С. могильная); а — ветвь с молодой шишкой, б — хвоя, в — шишка с опавшими семенами.

восток), в Приморском крае только в культуре (сева Шмакова, Сузунтика, ст. Океанская и др.) . . . 2. *P. silvestris* L. — С. обыкновенная (табл. 23, 2).  
3 (от 1). Хвоя 10—12, реже до 15 см дл. и 1—1,2 мм шир.; шишки крупные, до 12—15 см дл., с загнутыми концами чешуй; «орешки» крупные; крупное дерево. В хвойных и смешанных лесах . . . 3. *P. koraiensis* Sieb. et Zucc. — «Корейский кедр», Кедровая сосна (табл. 23, 3).  
— Хвоя 4—6, реже до 8 см дл., тонкая, всего 0,5—0,8 мм (реже до 1 мм) шир.; шишки мелкие, 4—5 см дл.; чешуй их с широкими, округлыми концами; «орешки» мелкие, 6—10 мм дл. и 4—6 мм шир.; крупный куст, обычно со стелющимися ветвями (изредка небольшое прямостоячее дерево). У верхней границы леса в горах образует заросли, а на севере встречается и на морском берегу . . . 4. *P. pumila* Rgl. — Кедровый стланец, Кедровик (табл. 23, 1).

## Сем. 12. CUPRESSACEAE Neger — КИПАРИСОВЫЕ

### Род 1. JUNIPERUS L. — МОЖЕВЕЛЬНИК

1. Все листья (хвоя) однородные, иглообразные . . . . . 2.  
— Листья частью иглообразные, частью чешуйчатые, черешчатые или же все черешчатые; стелющийся кустарник. На скалах, каменистых склонах и на морском берегу . . . 1. *J. dahurica* Pall. — М. даурский (табл. 20, 1).
2. Листья (хвоя) прямые, 2,5—2,8 см дл., очень острые и жесткие, с резко вырванными концами снизу, из-за чего они кажутся трехгранными; зрелые плоды черные, без сизого налета; небольшое дерево 2—4, реже 6—8 м выс. На юге Приморья; на известковых скалах . . . 2. *J. rigida* Sieb. — М. твердolistный (табл. 20, 2).  
— Большинство листьев более или менее серповидно изогнутые, длина их всего 4—8 мм, на листьях яркая белая полоска; зрелые плоды с сизым налетом; небольшой стелющийся кустарник. На гольцах и в лиственничниках . . . 3. *J. sibirica* Burgsd. — М. сибирский (табл. 20, 3).

### Род 2. MICROBIOTA Kom. — МИКРОБИОТА

Однодомный стелющийся кустарник; большинство листьев черешчатые, но есть и иглообразные (особенно у молодых экземпляров); плоды сухие, мелкие, до 6 мм дл. и 3 мм шир., раскрываются 4 створками, односемные. Образует заросли близ верхней границы леса на каменистых россыпях; в горах Сихотэ-Алиня, особенно часто на юге Приморья. Индем . . . . . 1. *M. decussata* Kom. — М. перекрестнопарная (табл. 20, 5).

## GNETINAE — ГНЕТОВЫЕ

## Сем. 13. EPHEDRACEAE Wettst. — ЭФЕДРОВЫЕ

### Род 1. EPHEDRA L. — ХВОЙНИК

Небольшой двудомный кустарник, основной ствол которого обычно находится в почве, а на поверхности пучки очень похожих на хвост жестких, желтовато-зеленых веточек 15—25 см выс., и всего около 1 мм толщ., с редуцированными до пленок листьями; плоды ягодообразные, красные, 6—9 мм дл., односемные (очень редко двусемные). На песках; по Суифуну близ г. Уссурийска, в устье р. Сундзихе и в Ольгинском районе . . . . . 1. *E. monosperma* C. A. Mey. — Х. односемный (табл. 22, 1).


## ANGIOSPERMAE — ПОКРЫТОСЕМЯННЫЕ

### MONOCOTYLEDONEAE — ОДНОДОЛЬНЫЕ

## Сем. 14. TURPACEAE Juss. — РОГОЗОВЫЕ

### Род 1. TURPA L. — РОГОЗ

1. Листья до 2 см шир.; нестичная часть соцветия тонкая-бурая, массивная, до 2,5 см шир. Часто; по берегам рек и озер и в канавах . . . 1. *T. latifolia* L. — Р. широколистный (табл. 24, 2).
- Листья более узкие, 0,4—1 см; нестичная часть соцветия коричневая или светло-бурая . . . . . 2.



1 — *Typha laxmannii* Lerech. (Рогоз Лаксмана): а — верхняя часть стебля с мужским (вверху) и женским соцветиями, б — лист; 2 — *T. latifolia* L. (Р. широколистный): а — корневище и нижняя часть стебля, б — лист, в — верхняя часть стебля с женским и мужским (вверху) соцветиями

2. Листья до 0,8—1 см шир. . . . . 3.  
— Листья более узкие, обычно не шире 4 мм; пыльниковая и пестичная части соцветия на расстоянии 3—5 см друг от друга. Часто; по рекам и озерам . . . . . 3. *T. laxmannii* Lerech. — Р. Лаксмана (табл. 24, 1).  
3 (от 1). Пыльничковые и пестичные части соцветия соприкасаются или почти соприкасаются друг с другом; пестичная часть соцветия до 12 (14), см дл. и 0,5—0,7 см шир. По озерам и болотам; на юге Приморья . . . . . 2. *T. orientalis* Presl — Р. восточный.  
— Пыльничковые и пестичные части соцветия на расстоянии 3—4 (5) см друг от друга; пестичная часть соцветия 16—17 см дл. и до 1,5 см шир. По берегам водоемов; только на самом юге Приморья . . . . . 4. *T. angustata* Bory et Chauv. — Р. суженный.

## Сем. 15. SPARGANIACEAE Rudolphi — ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

### Род 1. SPARGANIUM L. — ЕЖЕГОЛОВНИК

1. Листочки околоцветника тонкие, бесцветные, почти прозрачные; стебли и соцветия не ветвистые, простые; мужских головок много и тогда листья без кия, при 1—2 головках листьев с кием . . . . . 2.  
— Листочки околоцветника темноокрашенные; соцветие обычно ветвистое, реже простое; листья снизу с острым кием; мужских головок много . . . . . 3.  
2. Листья с острым кием; женские головки сидячие, скученные, вынашающие; столбики короткие, мужская головка обычно 1, расколотая чуть выше женской головки. Болота, ручьи, канавы, ямы . . . . . 1. *S. glomeratum* Laest. — Е. скученный (табл. 25, 4).  
— Листья без острого кия; женские головки не скученные, столбики длинные; мужские головки многочисленные. Берега мелких водоемов . . . . . 2. *S. simplex* Huds. — Е. простой (табл. 25, 2).  
3 (от 1). Соцветие ветвистое; женские головки на ножках; рыльца длиннее 2 мм; плод пирамидальный, с полукруглой верхней частью. В мелких водоемах . . . . . 3. *S. stoloniferum* Buch.-Ham. — Е. побегоносный (табл. 25, 3).  
— Соцветие простое или с 1 ветвью при основании; на главной оси всегда имеются сидячие женские головки; рыльца не длиннее 1,2 мм . . . . . 4.  
4. Листья широкие, 0,6—2 см шир.; соцветие всегда простое; плоды веретеновидные, с перехватом в средней части. Водоемы; Приморье . . . . . 4. *S. japonicum* Rotherl. — Е. японский.  
— Листья узкие, 2—4 мм шир.; соцветие с 1—2 ветвями при основании; плоды обратнопирамидальные, на верхушке суженные в столбик. В стоячих и медленно текущих водах . . . . . 5. *S. stenophyllum* Maxim. — Е. узколистный (табл. 25, 1).  
В северо-западной части Амурской области изредка встречается также *S. minimum* L.


## Сем. 16. POTAMOGETONACEAE Dum. — РДЕСТОВЫЕ

1. Цветки одиночные, реже по 2 в пазухах листьев, однополые . . . . . Род 3. *Zannichellia* L. — Заннichelлия.  
— Цветки в колосовидных соцветиях, обоеполые . . . . . Род 2. *Ruppia* L. — Руппия.  
2. Колос всего на 2 цветков; тычинок 2; плодики на ножке, превышающей длину плода . . . . . Род 2. *Ruppia* L. — Руппия.  
— Соцветие — цилиндрический многоцветковый колос; тычинок 4; плодики сидячие . . . . . Род 1. *Potamogeton* L. — Рдест.

### Род 1. POTAMOGETON L. — РДЕСТ

1. При основании листьев имеется более или менее развитое влагалище; листья 2—3 мм шир., наверху мелкозубчатые, на конце чаще несколько выемчатые; влагалище до 1 см дл.; соцветие около 1 см дл., не густое. В реках и озерах . . . . . 1. *P. pectinatus* A. Benn. — Р. Маака (табл. 26, 4).  
— Влагалища при основании листьев нет . . . . . 2.  
2. Листья узкие, до 2 (2,5) мм шир., все погруженные в воду . . . . . 3.  
— Листья значительно шире, если узкие (до 3 мм шир.), то плавающие . . . . . 6.  
3. Стебель цилиндрический, 0,5 мм шир.; листья мягкие, без островочечек, до 1 мм шир.; плодики 1—2 мм дл. Очень обычны в различных водоемах . . . . . 2. *P. pusillus* L. — Р. малый.  
— Листья 1,5—3 мм шир., стебель часто сплюснутый . . . . . 4.






1 — *Sparganium stenophyllum* Maxim. (Ежеголовник узколистный); 2 — *S. simplex* Huds. (Е. простое); 3 — *S. stoloniferum* Buch.-Ham. (Е. побегоносный); 4 — *S. glomeratum* Laest. (Е. скученный).



1 — *Potamogeton perfoliatus* L. (Рдест пролазностлистный); 2 — *P. oxyphyllus* Miq. (Р. острolistный); 3 — *P. malainus* Miq. (Р. малайский); 4 — *P. maackianus* A. Benn. (Р. Маака); 5 — *P. miduhikimo* Makino (Р. Мидухикимо).

4. Листья около 3 мм шир., сверху постепенно заостряющиеся; стебель плоский; цветонос наверху заметно утолщенный. В стоячих водах . . . . . 3. *P. oxyphyllus* Miq. — *P. остролистный* (табл. 26, 2).
- Листья с параллельными краями, внезапно заостренные . . . . . 5.
5. Стебель плоский, 2 мм шир.; листья 3 мм шир.; плоды до 4 мм дл. В стоячих водах . . . . . 4. *P. zosterifolius* Schum. — *P. взморниклистный*.
- Стебель 1 мм шир.; листья уже. В стоячих водах . . . . . 5. *P. manshuriensis* A. Benn. — *P. маньчжурский*.
- 6 (от 2). Листья при основании с округленными или сердцевидными стеблеобъемлющим основанием, все погруженные . . . . . 7.
- Листья при основании суживающиеся, только плавающие, иногда округленные или слегка сердцевидные . . . . . 8.
7. Листья продолговатоланцетные, при основании округленные, наверху колпачковидные (при сушке обычно на конце дважды расщепленные); прилистники крупные, 3—5 см дл., остающиеся; цветоносы длинные, до 20 см дл. В реках . . . . . 6. *P. praelongus* Wulf. — *P. длинный*.
- Листья (иногда кроме нижних) продолговатояйцевидные до почти округлых, при основании глубоко сердцевидные, стеблеобъемлющие, наверху почти плоские; прилистники короткие (до 1.5 см дл.), опадающие; цветоносы около 5 см дл. В водоемах; часто . . . . . 7. *P. perfoliatus* L. — *P. пронзеннолистный* (табл. 26, 1).
- 8 (от 6). Листья по краям волнистые и яснозубчатые; плодики сростаются в нижней части по 2, носики их длиннее плода. В реках . . . . . 8. *P. crispus* L. — *P. курчавый*.
- Листья по краям не волнистые, цельнокрайние или неясно зубчатые, плодики не сростаются, носики их значительно короче плода . . . . . 9.
9. Растения с плавающими листьями, длина которых не превышает 2.5 см . . . . . 10.
- Плавающие листья значительно более крупные или их нет . . . . . 13.
10. Плоды с длиннозубчатым килем; пластинка плавающего листа около 2 см дл. и 0.7 см шир. В стоячих водах . . . . . 9. *P. cristatus* Rgl. et Maack — *P. гребенчатый* (табл. 27, 3).
- Плоды с гладким или неясно бугорчатым килем . . . . . 11.
11. Плавающие листья до 2.5 см дл., подводные мягкие; плоды 2 мм дл., по килю неясно бугорчатые. В стоячих водах . . . . . 10. *P. javanicus* Hassk. — *P. яванский*.
- Плавающие листья до 2 см дл.; плоды 1.5 см дл., по килю лишь с небольшими зубцом и 2 боковыми . . . . . 12.
12. Плавающие листья в небольшом числе, до 15 мм дл., лопатчатой формы; цветонос 1 см дл., нитевидный. Старцы по Амур . . . . . 11. *P. himosellifolius* Maxim. — *P. лужайниклистный*.
- Плавающие листья более многочисленные, эллиптические, до 20 см дл., как и ветви, отклонены от стебля под прямым углом. В стоячих водах . . . . . 12. *P. miduhikimo* Makino, *P. asiaticus* A. Benn. — *P. мидухикимо* (табл. 26, 5).
- 13 (от 9). Плавающие листья эллиптические, до 4 см шир. (длина их почти в 2 раза превышает ширину), при основании с 2 скандинавскими; погруженные листья тесьмовидные (узколинейные). В разных водоемах; часто . . . . . 13. *P. natans* L. — *P. плавающий* (табл. 27, 2).
- Плавающие листья до 2.5 см шир. или их нет . . . . . 14.
14. Погруженные листья черешковые, часто на конце с шиловидным остроконечием . . . . . 15.
- Погруженные листья сидячие, без шиловидного остроконечия на конце . . . . . 16.
15. Все листья погруженные. В стоячих водах . . . . . 14. *P. malainus* Miq. — *P. малайский* (табл. 26, 3).
- Кроме погруженных, имеются плавающие листья. В стоячих водах . . . . . 15. *P. distinctus* A. Benn. — *P. отличный*.
- 16 (от 14). Плавающие листья к основанию длинно суженные или их нет; цветоносы почти не утолщенные, в 2 раза и более длиннее соцветия (при плодах); погруженные листья до 15 см дл.; плодики с ясным носиком. В стоячих и медленно текущих водах . . . . . 16. *P. tenuifolius* Raf. — *P. тонколистный* (табл. 27, 1).
- Плавающие листья к основанию резко суженные, цветоносы сильно утолщенные, равны или немного длиннее соцветия; погруженные листья около 5 см дл.; плодики почти без носика. В стоячих водах . . . . . 17. *P. gramineus* L. *P. heterophyllus* Schreb. — *P. злаковый*.

Таблица 27



1 — *Potamogeton tenuifolius* Raf. (Раст. тонколистный); 2 — *P. natans* L. (*P. плавающий*); 3 — *P. cristatus* Rgl. et Maack (*P. гребенчатый*).

#### Род 2. RUPPIA L. — РУППИЯ

1. Цветонос при плодах до 10 см дл., спирально закрученный; в морской воде . . . . . 1. *R. spiralis* L. — *P. спиральная*.
- Цветонос при плодах 1—3 см дл. прямой. В морской воде . . . . . 2. *R. maritima* L. — *P. морская*.



Род 3. ZANNICHELLIA L. — ЗАННИКЕЛЛИЯ

В водоемах с пресной водой. Нижний Амур (зал. Николая) . . . . .  
 . . . . . 1. *Z. palustris* L. — З. болотная.

Сем. 17. ZOSTERACEAE Dum. — ВЗМОРНИКОВЫЕ

1. Растения однодомные; соцветие полускрыто краями листа; завязь и плод овальные . . . . . Род 1. *Zostera* L. — Взморник.
- Растения двудомные; соцветие открытое; завязь и плод сердцевидные . . . . . Род 2. *Phyllospadix* Hook. — Филлоспадикс.

Род 1. ZOSTERA L. — ВЗМОРНИК

1. Листья до 2 мм шир.; небольшое растение, до 30 см дл. Морское дно вблизи берега; растет обычно зарослями . . . . . 1. *Z. japonica* Aschers. et Graebn. — В. японский.
- Листья шире 3 мм . . . . . 2.
2. Листья около 3 мм шир. и 50 см дл.; стебли до 100 (150) см дл. Образует заросли по морскому дну на более глубоких местах, чем предыдущий вид . . . . . 2. *Z. marina* L. — В. морской.
- Листья 10–12 мм шир. и до 1 м дл.; стебли 2–3 м дл. В морской воде, на песчаном грунте . . . . . 3. *Z. pacifica* Wats. — В. тихоокеанский.

Растения азиатского побережья Тихого океана относят к *Z. asiatica* Miki, которая отличается от американской *Z. pacifica* Wats. более крупными, бороздчатыми плодами.

Род 2. PHYLLOSPADIX Hook. — ФИЛЛОСПАДИКС

В морской воде у берегов (бухта Ольга, о. Петрова) . . . . . 1. *Ph. scouleri* Hook. — Ф. Скоулера.

Наше растение иногда выделяют в особый вид — *Ph. iwataensis* Makino, который очень близок к американскому *Ph. scouleri* Hook.

Сем. 18. NAJADACEAE Juss. — НАЯДОВЫЕ

Род 1. NAJAS L. — НАЯДА

1. Двудомное растение, более мощное по сравнению с остальными видами, с шипами в междоузлиях и на листьях. В озерах, старицах . . . . . 3. *N. naja* L. — Н. морская.
- Однодомные растения; в междоузлиях и на листьях шипов нет . . . . . 2.
2. Оболочка семян с крупными, квадратными ячейками. Юг Приморья; в воде . . . . . 2. *N. foveolata* A. Br. — Н. ячестая.
- Оболочка семян с узкими, удлиненными ячейками, вытянутыми в поперечном направлении . . . . . 1. *N. minor* All. — Н. малая.

Сем. 19. JUNCAGINACEAE Rich. — СИТНИКОВИДНЫЕ

1. Стебель безлистный; листья все прикорневые, узколинейные или шиловидные; прицветников нет; плодолостики сросшиеся по всей длине . . . . . Род 1. *Triglochin* L. — Триостреник.
- Стебель с 2–3 листьями; цветки с прицветниками; плодолостики сросшиеся только у основания . . . . . Род 2. *Scheuchzeria* L. — Шейхерия.

Род 1. TRIGLOCHIN L. — ТРИОСТРЕНИК

1. Кисть редкая; плодики линейные, по 3, прижатые к стеблю. На болотистых лугах . . . . . 1. *T. palustris* L. — Т. болотный (табл. 28, 3).
- Кисть густая; плодики яйцевидные или почти шаровидные, по 6, на отстоящих ножках. На засоленных участках . . . . . 2. *T. maritimum* L. — Т. морской (табл. 28, 2).

Таблица 28



1 — *Scheuchzeria palustris* L. (Шейхерия болотная); 2 — *Triglochin maritimum* L. (Триостреник морской); 3 — *T. palustris* L. (Т. болотный).

Род 2. SCHEUCHZERIA L. — ШЕЙХЕРИЯ

Корневища с подземными побегами; прикорневые листья 20—25 (30) см дл., стеблевые влагалищные развы или немногим длиннее стебля, от 1 до 2 мм шир.; цветки до 3 мм дл., с зеленоватыми долями околоцветника; плодов чаше 3 (1—6); цветоножки до 25 мм дл. На моховых сфагновых болотах . . . . . 1. Sch. palustris L. — Ш. болотная (табл. 28, 1).

Сем. 20. ALISMATACEAE DC. — ЧАСТУХОВЫЕ

1. Плавающие и воздушные листья обычно стреловидные, подводные лентовидные; цветки раздельнопопые, однодомные, тычинок много . . . . . Род 3. Sagittaria L. — Стрелолист.
- Воздушные и плавающие листья ланцетные, ланцетные, округлые или почковидные; цветки обоопольные, тычинок 6 . . . . . 2.
2. Листья округлые или почковидные, с сердцевидным основанием, часто плавающие, 1—3 (5) см дл. и 0.8—2 (3.5) см шир.; плодolistиков 6 . . . . . Род 2. Caldesia Parl. — Кальдезия.
- Листья ланцетные или ланцетные, с округлым, угловатым или слабо сердцевидным основанием, крупные; плодolistики многочисленые; соцветие метельчатое, пирамидальное многоцветковое . . . . . Род 1. Alisma L. — Частуха.

Род 1. ALISMA L. — ЧАСТУХА

Листья длинночерешковые; соцветие многоцветковое, ветвистое часто; в канавках и по берегам различных мелких водоемов . . . . . 1. A. orientale (Sam.) Juz. — Ч. восточная.

Род 2. CALDESIA Parl. — КАЛЬДЕЗИЯ

Листовые черешки до 20—25 см дл.; лепестки белые. В озерах и старицах; редкость . . . . . 1. C. parnassifolia (Bassi) Parl. — К. белозоролистная.

Род 3. SAGITTARIA L. — СТРЕЛОЛИСТ

1. Лопастн листа длиннее его пластинки; листья почти всегда только воздушные, плавающих и погруженных обычно не бывает. По берегам различных водоемов и на рисовых полях; часто . . . . . 1. S. trifolia L. — С. трилистный (табл. 29, 2).
- Лопастн листа короче пластинки в 2—3 и более раз; подводные листья ланцетные. В реках и озерах; в местах с быстрым течением встречается только форма с подводными длинными, тесьмовидными листьями . . . . . 2. S. natans Pall. — С. плавающий (табл. 29, 1).

Сем. 21. BUTOMACEAE Rich. — СУСАРОВЫЕ


Род 1. BUTOMUS L. — СУСАК

Листья при основании трехгранные, выше плоские, ланцетные, 100 (110) см дл. и 3—10 мм шир.; стебель 50—100 (120) см выс.; цветки в зонтике многочисленые, с ярко-розовыми лепестками, тычинок 9; у основания цветоножек прицветники образуют подобие обертки. По берегам водоемов; у нас очень большая редкость (пока найден только на р. Сунгаче и близ с. Кремове Михайловского района Приморского края и у с. Тамбовки Амурской области) . . . . . 1. B. umbellatus L. — С. зонтичный.

Сем. 22. HYDROCHARITACEAE Juss. — ВОДОКРАСОВЫЕ

1. Листья плавающие на поверхности воды, с округлой пластинкой, имеющей на нижней стороне воздушные ячеистые подушки . . . . . Род 4. Hydrocharis L. — Водокрас.
- Листья погруженные в воду или торчащие из воды, ланцетные, ланцетные или овально-ланцетные . . . . . 2.
2. Листья крупные, прикорневые или в многолистных розетках на стеблевых побегах . . . . . 3.
- Листья в мутовках (по 3—8), мелкие, до 2 см дл. и 2—4 мм шир., неоднородно-шляпчатые, на гонимых стеблях . . . . . Род 1. Hydrilla Rich. — Гидрилла, Подводница.

Таблица 29



1 — *Sagittaria natans* Pall. (Стрелолист плавающий); 2 — *S. trifolia* L. (С. трилистный); а — лист, б — стебель с плодами.



3. Листья ливневые, длинные, 15—30 см дл. и 0,5—1,2 см шир.; цветки мелкие, раздельнополюе . . . . . Род 2. *Vallisneria* L. — **Валиснерия**,  
— Листья узколанцетные (нижние) и широколанцетные, почти овальные, буроватые; цветок одиночный, розовый или синий, обоюполюй . . . . . Род 3. *Ottelia* Pers. — **Оттелия**.

Род 1. *HYDRILLA* Rich. — **ГИДРИЛЛА, ПОДВОДНИЦА**

Междоузлия длинные, листья в мутовках; цветки мелкие, на длинных, 2—4 см, нитевидных цветоносах, выходящих из пазух верхних мутовок. В стоячих водах . . . 1. *H. verticillata* (L. f.) Rich. — **Г. мутовчатая** (табл. 30, 3).

Род 2. *VALLISNERIA* L. — **ВАЛИСНЕРИЯ**

Водные растения с ползучим корневищем и линейными листьями, собранными в розетку; мужские цветки на коротких цветоносах, женские на очень длинных, спирально скрученных цветоножках. На дне неглубоких водоемов; у оз. Ханка . . . . . 1. *V. spiralis* L. — **В. спиральная**.

Род 3. *OTTELLA* Pers. — **ОТТЕЛИЯ**

Подводные растения с корневищем, дающим пучок длинночерешковых листьев, линейных, 1—1,8 см шир., и овальных, до 7—9 см шир., и 10—18 см дл., с хорошо заметной сетью жилок; цветков на длинном цветоносе, с завязью, скрытой в трехкратной трубке; цветет в июле. В водоемах; по нижнему течению р. Лёфу . . . 1. *O. alismoides* (L.) Pers. — **О. частуховидная** (табл. 30, 2).

Род 4. *HYDROCHARIS* L. — **ВОДОКРАС**


Водные растения с побегами; листья на длинных черешках; мужские цветки белые, обычно по 3, со свободными тычинками, женские цветки с двураздельными рыльцами. В водоемах; у оз. Ханка . . . . . 1. *H. asiatica* Miq. — **В. азиатский** (табл. 30, 1).

Сем. 23. *GRAMINEAE* Juss. — **ЗЛАКИ**

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИБ (ГРУПП РОДОВ ИЛИ КОЛЕН)

1. Колоски после созревания опадают целиком;\*одноцветковые или, реже, двухцветковые, но тогда нижний цветок тычиночный или недоразвитый . . . 2.
- После опадения созревших колосков остаются кроющие чешуи; колоски многоцветковые . . . . . 6.
2. Колоски скаты с боков, у наших родов колосковые чешуи недоразвиты или их нет; колоски одиночные или с обоюполюй цветками; крупные полуводные растения . . . . . 3.
- Колоски чаще округлые или скаты со спинки . . . *V. Oryzace* Kunth — **Рисовые**.
3. Соцветие (у нашего вида) всего 2—3 см дл. и около 3 мм шир., колосовидное; корневище длинное, ползучее, с многочисленными, короткими междоузлиями; из каждого узла выходит по короткому стеблю с пучком жестких листьев . . . 3.
- Признаки иные; соцветия больших размеров . . . *P. Zoisiae* Miq. — **Цойские**.
4. Цветковые чешуи всегда твердые и толще колосковых, колосковые чешуи тонкокожистые или бумагообразные; у нас только однолетники . . . . . 4.
- Цветковые чешуи всегда толще и мягче колосковых, они пленчатые или тонкокожистые; многолетники и однолетники . . . . . IV. *Panicaceae* R. Br. — **Просовые**.
5. Нижняя колосковая чешуя меньше верхней, цветковые чешуи, как и колосковые, кожистые; многолетники с мощным корневищем . . . . . 5.
- Нижняя колосковая чешуя всегда больше верхней, кожистая, цветковые чешуи пленчатые; многолетники и однолетники . . . . . III. *Tristegineae* Nees — **Тристегини**.
6. (от 1). Колоски на ножках; соцветие — толстоватый колос, колосовидная, скатая или же более или менее раскидистая метелка или же соцветие кистенное . . . . . I. *Andropogoneae* Presl — **Сорговые**.
- Колоски сидячие, соцветие — одиночный колос или колосья собраны пальчато или кистеобразно . . . . . 7.
- Колоски сидячие, соцветие — одиночный колос или колосья собраны пальчато . . . . . 40.

Таблица 30



1 — *Hydrocharis asiatica* Miq. (Водокрас азиатский); 2 — *Ottelia alismoides* (L.) Pers. (Оттелия частуховидная); 3 — *Vallisneria spiralis* (L. f.) Rich. (Гидрилл, Подводница мутовчатая).

7. Колоски одноцветковые или верхний с 1 обоимолым и 2 тычиночными цветками . . . . . 8.
- Колоски двух-многоцветковые . . . . . 9.
8. Колосковых чешуй 4, из них 2 верхние обычно мельче нижних, или же верхние чешуи хорошо развиты и в них пахуче имеется по тычиночному цветку и колосок двух-трехцветковый (с 1 обоимолым и 2 тычиночными цветками), верхняя цветковая чешуя с 1 жилкой . . . VI. Phalarideae Link — Канареечниковые.
- Колосковых чешуй 2, верхняя цветковая чешуя с 1 жилкой . . . VII. Agrostideae Kunth — Полевцевые.
- 9 (от 7). Цветковые чешуи короче колосковых, обычно со спирально скрученной у основания остью, часто колосчатой, реже ее нет или же она прямая . . . VII. Aveneae Nees — Овсяные.
- Цветковые чешуи длиннее колосковых, с прямой остью или без нее . . . X. Festuceae Nees — Овсянниковые.
- 10 (от 6). Колоски в 2 обильных не супротивных рядах в односторонних колосках или кисти или соцветие состоит из пальчато собранных колосовидных веточек . . . IX. Chlorideae Kunth — Хлорисовые.
- Соцветие — тычиный колос, прямой или повислый . . . XI. Hordeae Benth. — Ячменные.

## ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПО ТРИБАМ

### I. ANDRPOGONEAE Presl — СОРГОВЫЕ

1. Многолетники с хорошо развитыми или менее мощными корневищами и прямыми крепкими стеблями, 70—150 (200) см выс. . . . . 2.
- Однолетники с тонкими, часто приподнимающимися стеблями, 20—70 (100) см выс. . . . . 3.
2. Соцветие метельчатое, волосистое . . . . . 4.
- Соцветие колосовидное, реже с отдельными веточками гладкое; колоски сидят на оси соцветия в выемках, остей нет . . . 4. *Hemarthra* R. Br. — Гемартрия.
3. Метелка до 25—30 см дл., широкая, верообразная или яйцевидная, веточки соцветия не членистые; колоски всегда окружены длинными сербистыми, белыми и красноватыми волосками . . . 1. *Miscanthus* Anders. — Мискантус.
- Метелка 6—15 см дл., узкопродолговатая, более или менее скатая, иногда пречешуйчатая; веточки соцветия членистые, колоски мягковолосистые, с закрученной остью . . . 3. *Spodiopogon* Trin. — Сербодриопогон.
- 4 (от 1). Веточки соцветия не членистые . . . . . 5.
- Веточки соцветия членистые, соцветие пальчатое, стебли тонкие, приподнимающиеся, укореняющиеся в узлах . . . 2. *Microsetum* Nees — Микросетум.
5. Соцветие — пальчато-разветвленная кисть; колоски с боков не сплюснутые, нижняя или от ее основания, ость 5—9 мм дл.; листья сербидовидные чешуи . . . 6. *Arrhaxon* Beauv. — Аррахсон.
- Соцветие из 2 (реже 1) пальчато расположенных колосовидных веточек; колоски с боков сильно сплюснутые, с 1—3 малозаметными жилками; ость выходит из верхушки двурядной или нижней цветковой чешуи; листья линейные . . . 5. *Dimeria* R. Br. — Димерия.

### II. ZOISIAEAE Miq. — ПОЙСНЕВЫЕ

- У нас только один род . . . . . 7. *Zoysia* Willd. — Пойсия.

### III. TRISTEGINEAE Nees — ТРИСТЕГИНОВЫЕ

- У нас только один род . . . . . 8. *Arundinella* Raddi — Арудинелла.

### IV. PANICEAE R. Br. — ПРОСОВЫЕ

1. Колоски у основания голые или с короткими волосками . . . . . 2.
- Колоски окружены длинными, жесткими щетинками, которые остаются после опадания зрелых колосков; соцветие плотное, цилиндрическое или, реже, до 2 мм дл. . . . . 13. *Setaria* Beauv. — Щетинник.
2. Соцветие пальчатое, из нескольких колосовидных веточек; колоски очень мелкие, до 2 мм дл. . . . . 10. *Digitaria* Heist. ex Adans. — Росичка.
- Соцветие пшное, не пальчатое, колоски более крупные, (2,5) 3—5 (7) мм дл. . . . 3.

3. Соцветие из кистеобразно расположенных веточек; колоски с подушкообразным утолщением при основании, мелко опушенные . . . 9. *Eriochloa* H. B. K. — Шерстняк, Плескуна.
- Соцветие пшное; подушкообразного утолщения при основании колосков нет . . . 4.
4. Колоски сидячие или почти сидячие, чаще с более или менее длинными остями, режа без них . . . . . 11. *Echinochloa* Beauv. — Еженик.
- Колоски на длинных веточках, всегда без остей . . . . . 12. *Panicum* L. — Просо.

### V. ORYZEAE Kunth — РИСОВЫЕ

1. Колоски одноплотные, крупные, пестичные 1,5—1,8 см дл., с длинной остью, тычиночные около 1 см.; зерновка около 1,5 см дл.; все растение очень мощное, до 2—3 м выс.; листья 1,5—2 см шир. . . . . 14. *Zizania* L. — Цизания.
- Колоски с обоимолыми цветками, 4—5 мм дл., без остей; колосковых чешуек нет (недоразвиты); растение менее мощное; листья до 3 мм шир. . . . . 15. *Leersia* Sw. — Леерсия.

### VI. PHALARIDAE Link — КАНАРЕЕЧНИКОВЫЕ

1. Крупные растения; стебли 1—1,5 (2) м выс.; листья 15—18 мм шир.; метелка 8—20 см дл.; колоски одноцветковые, обоимолые . . . . . 16. *Digraphis* Trin. — Двухметелник.
- Растения небольшие, 15—50 (70) см выс.; листья 2—3 (5) мм шир.; колоски с 1 (верхним) обоимолым и 2 (нижним) тычиночными цветками; стебли и листья часто со специфическим запахом, хорошо опушенными при увядании растения . . . . . 17. *Hierochloa* R. Br. — Зуброшан.

### VII. AGROSTIDAE Kunth — ПОЛЕВИЦЕВЫЕ

1. Соцветие колосовидное, плотное, цилиндрическое или короткопальчатое; колоски на коротких простых или ветвистых веточках . . . . . 2.
- Соцветие метельчатое или кисть, иногда более или менее скатое, но не колосовидное; колоски обычно на длинных, тонких веточках (у рода колоски в клубочках) . . . . . 28. *Calamagrostis* Adans. — Вейник.
2. Соцветие цилиндрическое или узкоцилиндрическое, длинных волосков при основании цветковых чешуй нет; колоски голые или опушенные . . . . . 3.
- Соцветие не цилиндрическое, с очень короткими ветвями или почти без них; у основания цветковых чешуй всегда есть хохолок на длинных волосках . . . . . 22. *Pleurum* L. — Тимофеевка.
3. Колоски голые или почти голые, с реснитчатыми краями чешуй; колоски чешуи свободные, заканчиваются острием или же небольшой остью или, реже, тупым; цветковые чешуи без остей . . . . . 23. *Alopecurus* L. — Лисохвост.
- Колоски более или менее опушенные, колосковые чешуи более или менее сросшиеся, чаще острыми концами, нижняя цветковая чешуя с длинной остью . . . 24. *Coleanthus* Schreb. — Косачик.
- 4 (от 1). Соцветие — кисть из собранных клубочками колосков; растения маленькие, 2—5 (7) см выс.; одностебельные со вздутыми листовыми основаниями . . . 25. *Polypogon* Monard. — Полюпогон.
- Соцветие метельчатое; многолетники . . . . . 26. *Polypogon* Monard. — Полюпогон.
5. При основании цветковых чешуй всегда есть хохолок из более или менее густых, длинных волосков . . . . . 28. *Calamagrostis* Adans. — Вейник.
- Длинные волосков при основании цветковых чешуй нет . . . . . 6.
6. Колоски с ясно заметными остями . . . . . 7.
- Остей нет вовсе или же они очень маленькие, малозаметные . . . . . 10.
7. Колосковые чешуи короче цветковых; метелки чаще полусферичные, многоколосковые; ости прямые, в 2—6 раз длиннее нижней цветковой чешуи, с волосовидным окончанием . . . . . 21. *Muehlenbergia* Schreb. — Мюленбергия.
- Колосковые чешуи длиннее цветковых; метелка обычно примостная; ости колосчатые, иногда более или менее изогнутые . . . . . 8.
8. Ости 2—2,5 (3) мм дл.; нижние цветковые чешуи мягче колосковых и легко отделяются от зерновки . . . . . 27. *Agrostis* L. — Полевница.
- Ости более длинные, от 1,5 до 2 (28) см дл.; нижние цветковые чешуи твердые, колосковые и плотно обхватывают зерновку . . . . . 9.
9. Небольшие, 20—30 (70) см выс., головчатые растения; ости 2—3 см дл., без перистоволосистости . . . . . 18. *Ptilagrostis* Griseb. — Птиларгостис.
- Более крупные, до 1—2 м выс., ветлоглавые или лесные растения; ости голые или мелко опушенные, 1,5—1,8 см дл., или острошершавые, 10—20 (28) см дл. . . . . 19. *Stipa* L. — Ковыль.



- 10 (от 6). Колосковые чешуи длинные цветковых . . . . . 41.  
— Колосковые чешуи короче цветковых; колоски 4—7 (8) мм дл.; метелка более или менее скатая, 10—20 см дл. и 2,5—5 см шир.; стебли 30—100 (150) см выс.  
25. *Arcagrostis* Griseb. — *Аркагросис*.  
11. Метелка сильно раскидистая, с небольшим количеством округлых, зеленоватых колосков, цветковые чешуи которых тверже колосковых; листья широкие, до 12—15 мм шир. . . . . 20. *Milium* L. — *Бор*.  
— Метелка с весьма многочисленными зеленовато-белыми колосками, крупная или средней величины, со сравнительно небольшим числом колосков (часто красноватых); цветковые чешуи мягче колосковых . . . . . 12.  
12. Нижняя цветковая чешуя короткая колосковой; метелка небольшая, красноватая или, реже, зеленая; листья 2—5 мм шир. . . . . 27. *Agrostis* L. — *Поленица*.  
— Нижняя цветковая чешуя равна колосковой и имеет на верхушке очень маленькую прямую ость; метелка крупная, часто поникающая; листья широкие, до 2 см шир. . . . . 26. *Cinna* L. — *Цинна*.

#### VIII. AVENEAEE Nees — ОВСОВЫЕ

1. Колоски крупные, 1—2 (3) см дл.; зерновка ясно бороздчатая . . . . . 2.  
— Колоски более мелкие; зерновка без бороздок . . . . . 31. *Avena* L. — *Овес*.  
2. Однолетники; колосковые чешуи с многими (более 3) жилками . . . . . 32. *Helictotrichon* Bess. — *Овес*.  
— Многолетники; колосковые чешуи с 1—3 жилками . . . . . 30. *Trisetum* Pers. — *Трищетинник*.  
3. Колосковые чешуи более или менее неодинаковые, нижняя цветковая чешуя с 2 остриями на верхушке; ость изогнутая или коленчатая, длинная, в нижней части слабо закрученная . . . . . 30. *Trisetum* Pers. — *Трищетинник*.  
— Колосковые чешуи заметно неодинаковые; нижняя цветковая чешуя с 2 зубцами на верхушке, у основания окружена колосками; ость короткая, прямая или коленчатая согнутая, в нижней части более или менее закрученная . . . . . 29. *Deschampsia* Beauv. — *Луговик*, *Щучка*.

#### IX. CHLORIDEAE Kunth — ХЛОРИСОВЫЕ

1. Соцветие — сложный или простой колос . . . . . 2.  
— Соцветие из нескольких колосовидных веточек, пальчато собранных на верхушке стебля; нижняя цветковая чешуя с длинной остью . . . . . 33. *Chloris* Sw. — *Хлорис*.  
2. Соцветие однобокое — сложный колос, в нижней части иногда более или менее ветвистый; листья до 7 мм шир. На сырых участках, иногда прямо в воде . . . . . 35. *Bekmannia* Host — *Бекманния*.  
— Соцветие узкое, колосовидное, с прижатыми к оси соцветия колосками; листья узкие, щетиновидно свернутые. На сухих скалах . . . . . 34. *Tripsacum* Roth — *Трипсак*.

#### X. FESTUCEAE Nees — ОВСЯННИЦЕВЫЕ

1. Метелка очень крупная, 15—35 (40) см дл., пушистая, так как колоски покрыты длинными волосками; листья очень широкие, до 3—5 см шир., изредка замещены рядом коротких волосков; стебли 1,5—3,5 (5) м выс.; корневища подземные или надземные, очень длинные, со многими узлами . . . . . 36. *Phragmites* Trin. — *Тростник*.  
— Колоски без длинных волосков; соцветие и все растение меньших размеров . . . . . 2.  
2. Колоски в клубочках, скученных на концах ветвей; соцветие — более или менее лопастная, короткая (6—8 см дл.) метелка; листья 3—6 мм шир. . . . . 42. *Dactylis* L. — *Ежа*.  
— Колоски в клубочки не скучены . . . . . 37. *Cleistogenes* Keng — *Змеица*.  
3. Стебли облиственны до самого соцветия, тонкие, 30—40 (60) см выс.; метелка малоколосковая; ость до 2 мм дл. . . . . 37. *Cleistogenes* Keng — *Змеица*.  
— Стебли облиственны до вершины . . . . . 49. *Lolium* L. — *Пшеница*.  
4. Колоски одиночные, в колосоватых, прямых колосках, многоцветковые, сидячие, прижатые к оси колоса ребром . . . . . 49. *Lolium* L. — *Пшеница*.  
5. Метелка почти цилиндрическая или колосовидная, плотная, иногда в нижней части прерывистая; колосковые чешуи длинные цветковых; остей нет . . . . . 39. *Keeleria* Pers. — *Кеслерия*, *Тонконог*.  
— Метелка более рыхлая, раскидистая или соцветие кистевидное . . . . . 6.

6. Колоски крупные, 1,5—4 см дл., с черешчатко налегающими друг на друга чешуями, с остями или без них; листья 5—8 мм шир. . . . . 50. *Bromus* L. — *Костер*.  
— Колоски меньших размеров, 3—12 (15) мм дл. . . . . 7.  
7. Колоски всегда без остей; колосковые чешуи тупые или заостренные . . . . . 40.  
— Колоски с остями или без остей; колосковые чешуи острые или остистые, килеватые, неодинаковые . . . . . 48. *Schizachne* Hack. — *Схизахна*.  
8. Соцветие — узкая, одноостристая, малоколосковая кистевидная метелка, до 10 см дл.; колоски 10—12 мм дл.; нижняя цветковая чешуя длинная колосковой, с 2 зубчиками на конце и с прямой остью 2—2,5 мм дл. . . . . 48. *Schizachne* Hack. — *Схизахна*.  
— Соцветие широкое, не кистевидное . . . . . 9.  
9. Колосковые чешуи не пленчатые, зеленые, сновидные или нижние фиолетовые, килеватые, нижние с 1 жилкой, верхние с 3 жилками; нижние цветковые чешуи острые, с более или менее шероховатой остью или без нее . . . . . 47. *Festuca* L. — *Овсяница*.  
— Колосковые чешуи безостово-перепончатые, полупрозрачные, более или менее килеватые; нижняя цветковая чешуя неровно зазубренная, без кили, верхняя продолговатая, килеватая, сверху двузубчатая; колоски 6—10 мм дл.; соцветие 3—7 см дл., скученное, почти колосовидное. На голых . . . . . 46. *Leucocoma* Griseb. — *Бесометинник*.  
10 (от 7). Колосковые чешуи с килем, жилкой 1—3; цветковые чешуи по краю перепончатые, нижние с 3—5 жилками, у основания ее большинство видов имеет шерстистый пушок; соцветие — метелка . . . . . 43. *Poa* L. — *Мятлик*.  
— Колосковые чешуи без кили; шерстистого пушка у основания цветковых чешуй нет . . . . . 41.  
11. Многолетники . . . . . 12.  
— Однолетники; колоски с 5—30 (40) цветками с черешчатко налегающими друг на друга чешуйками . . . . . 38. *Eragrostis* Host — *Поленица*.  
12. Зерновка с коническим тупым носиком, заметно выдается из чешуй (в гербарии легко опадает); колоски трехцветковые, цветковые чешуи плотные, кожистые, колосковые пленчатые; листья 10—15 мм шир.; корневище ползучее . . . . . 41. *Diarrhena* Beauv. — *Диаррена*.  
— Зерновка без носика и не выдается из чешуй; колоски двух-многоцветковые . . . . . 13.  
13. Колоски двух-четырёхцветковые, до 10—15 мм дл., с выпуклыми колосковыми чешуйками, обычно более короткими, чем цветковые, или равными им; верхушка колоска имеется клубочек неразвитых цветков . . . . . 40. *Melica* L. — *Перловник*.  
— Колоски многоцветковые; чешуи не выпуклые; клубочка неразвитых цветков нет . . . . . 14.  
14. Крупные болотные, полуводные, реже лесные растения; колосковые чешуи округлые, с 5—9 (чаще с 7) выдающимися жилками, тупые, с белой оторочкой; метелка многоколосковая; листья с замкнутым по всей длине влагалищем . . . . . 44. *Glyceria* R. Br. — *Манин*.  
— Небольшие растения морских берегов, засоленных участков или сорные, придорожные; верхняя колосковая чешуя с 1, нижняя с 3 жилками; метелка раскидистая, малоколосковая; листья с влагалищами, расчлененными почти до основания . . . . . 45. *Puccinellia* Parl. — *Бескильница*.

#### XI. HORDEAE Benth. — ЯЧМЕНЕВЫЕ

1. Колоски на узлах колоса одиночные или, реже, в середине колоска по 2 . . . . . 2.  
— Колоски на узлах колоса по 2—6 . . . . . 5.  
2. Колосковые чешуи ланцетные или широколанцетные, со многими жилками или килеватые, часто с гладкими краями . . . . . 3.  
— Колосковые чешуи линейно-ланцетные, 0,6—0,8 см дл., с 1 жилкой; нижняя цветковая чешуя заострена в очень короткое, 0,5—2 мм, остевидное окончание; колоски длинные, 8—16 см; колоски в средней части колоса по 2, а в верхней и нижней по 1 или же всюду по 1 . . . . . 53. *Aeluropus* Nevski — *Востер*.  
3. Колосковые чешуи без кили, с многими жилками, остей нет или они прямые или отогнутые . . . . . 4.  
— Колосковые чешуи сужены в короткую, 2—3 мм, ость, по килю длинношерстчатые; колоска очень тупые, почти без промежутков между колосками . . . . . 52. *Agropyron* Gaertn. — *Пырей* (подрод *Eragropyron* Nevski — *Пытун*).  
4. Колосковые чешуи ланцетные или линейно-ланцетные, без поперечной борозды при основании, обычно шероховатые, реже слабо шероховатые, не образуют шишки с рудиментарной ножкой колоска; растения дернистые, не образуют ползучих побегов . . . . . 51. *Roegneria* C. Koch — *Регенерия*.



- Колосковые чешуи от ланцетных до продолговатых, с поперечной бороздкой при основании, обычно гладкие или почти гладкие; растения с более или менее длинными, ползучими корневищами . . . . . 52. *Agropyron Gaertn.* — Пырей (подрод *Elytrigia* Desv. — Пырей (настоящий)).
  - 5 (от 1). Колоски одноцветковые, расположены на оси колоса по 3, боковые на коротеньких ножках . . . . . 7.
  - Колоски многоцветковые, все сидячие, расположены по 2—6 . . . . . 56. *Critelia Raf.* — Крителия.
  - 6. Колосья очень густые; колосковые чешуи очень тонкие, волосовидные и очень длинные, до 6—7.5 см дл.; нижняя цветковая чешуя среднего плодущего колоска ланцетная, до 6—7.5 см дл.; нижняя цветковая чешуя среднего плодущего колоска ланцетная, с короткой, 1—3 мм, остью или заостренная . . . . . 57. *Hordeum L.* — Ячмень.
  - 7 (от 5). Колосковые чешуи шиловидные или же часто недоразвитые; нижняя цветковая чешуя остистая, листья сверху шероховатые и волосистые; колосья 8—15 см дл., прямые, наклоненные или повисающие . . . . . 54. *Asperella Humb.* — Шероховатка.
  - Колосковые чешуи линейно-ланцетные или ланцетные; нижняя цветковая чешуя продолжена в ость 1.5—2.5 см дл., или же безостная; колосья 9—25 см дл., прямые или повисающие, листья сверху шероховатые . . . . . 53. *Elymus L.* — Колосник.
- К этой же трибе относятся и наши культурные злаки: *Triticum L.* — Пшеница и *Secale L.* — Рожь.

Род 1. *MISCANTHUS* Anderss. — МИСКАНТУС

- 1. Колоски без остей или же ости очень короткие и не превышают колосок. На дугах и по берегам рек . . . . . 1. *M. sacchariflorus* (Maxim.) Hack. — М. сахароцветный (табл. 31, 1).
- Ости всегда есть и они длиннее колоска. На сухих склонах среди кустарников; только на юге Приморья . . . . . 2. *M. purpurascens* Anderss. — М. краснеющий (табл. 31, 2).

Род 2. *MICROSTEGIUM* Nees — МИКРОСТЕГИУМ

Однолетник с тонкими, приподнимающимися, ветвящимися стеблями, которые в узлах часто укореняются; соцветие пальчатое; листья ланцетные. Часто: на юге Приморья; по лесным тропам и у рек . . . . . 1. *M. nodosum* (Kom.) Tzvel. *Pollinia imberbis* auct., non Nees ex Steud. — М. узлоузлый.

Род 3. *SPODIOPOGON* Trin. — СЕРОБОРОДНИК

Стебель 60—100 (150) см выс.; листья линейно-ланцетные, плоские около 1 см шир.; метелка узкая, кистеобразная, 10—12 (15) см дл.; колоски мягко-волосистые, ость закрученная, колючая. На сухих дугах и каменистых склонах среди разреженных дубов и кустарниковых зарослей; часто . . . . . 1. *S. sibiricus* Trin. — С. сибирский (табл. 31, 3).

Род 4. *HEMARTHRIS* R. Br. — ГЕМАРТРИЯ

Стебли 70—90 (125) см выс., со многими узлами; листья линейные, 5—10 мм шир. и 20—30 см дл.; колосья сильно сжатые, почти цилиндрические, 6—8 см дл. и 2—4 мм шир.; колосковые чешуи кожистые. По берегам рек и у дорог; редко; города Уссурийск, Биробиджан . . . . . 1. *H. sibirica* (Good.) Ohwi — Г. сибирская.

Род 5. *DIMERIA* R. Br. — ДИМЕРИЯ

Однолетник 10—30 см выс., с прямыми или приподнимающимися, тонкими стеблями; листья линейные, плоские, постепенно заостренные на верхушке, 1.5—3 мм шир. и до 8—10 см дл.; колоски 3.5—4 мм дл., сильно сжатые с боков. Пока найдена только один раз близ Владивостока (Русский остров), на окраинах болотистого дуга; внешне это растение очень похоже на аттракцион . . . . . 1. *D. neglecta* Tzvel. — Д. незамеченная.



1 — *Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Hack. (Мискантус сахароцветный);  
 а — колосница с корнями и нижней частью стебля, б — часть стебля с листом,  
 в — соцветие, г — цветок; 2 — *M. purpurascens* Anderss. (М. краснеющий);  
 а — часть соцветия, б — цветок; 3 — *Spodiopogon sibiricus* Trin. (Серобородник  
 сибирский); а — цветок.





1 — *Arthraxon longsdorfii* (Trin.) Hochst. (Артраксон Лангсдорфа); а — верхняя часть растения, б — цветок; 2 — *Digitaria asiatica* Tzvel. (Росичка азиатская).



1 — *Zoysia japonica* Steud. (Пойсия японская); а — плод (семя); 2 — *Arundinella anomala* Steud. (Арундинелла уклоняющаяся); а — цветок.

1. Ость далеко выдается из колоска. Часто: на сырых лугах; во второй половине лета . . . 1. *A. langsdorffii* (Trin.) Hochst. — *A. Лангсдорфа* (табл. 32, 1).  
— Ость не выдается или, реже, едва выдается из колоска. На сырых лугах; на юге (окрестности Владивостока) . . . 2. *A. hispidus* (Thunb.) Makino — *A. щетинистоволокнистый*.

Род 7. *ZOYSIA* Willd. — ЦОПСИЯ

Корневити длинное, ползучее, с многочисленными короткими, 2—3 (5) см, междоузлиями; из каждого узла выходит по стеблю 8—10 см выс. с пучком жестких листьев 7—8 (10) см дл. и около 3 мм шир.; соцветие 2—3 см дл. и около 3 мм шир., колосовидное; колоски около 2 мм дл., остей нет. На песках морского берега; только в Хасанском районе . . . 1. *Z. japonica* Steud. — *Ц. японская* (табл. 33, 1).

Род 8. *ARUNDINELLA* Raddi — АРУНДИНЕЛЛА

1. Стебли 50—100 см, толстые, до 6—7 мм в diam., листья длинноланцетные, 15—20 (30) см дл. и 5—7 (10) мм шир., метелка густая, сжатая, колоски без остей. Позднецветный злак. Часто: на сухих арундинелло-разнотравных лугах и среди кустарников . . . 1. *A. anomala* Steud. — *A. узколанцетная* (табл. 33, 2).  
— Растение, похожее на предыдущее, но с влагалищами нижних листьев, обильно покрытыми длинными волосками. На морском берегу и прилегающих к морю склонах; на юге Приморья . . . 2. *A. hirta* (Thunb.) Tanaka — *A. волосистая*.

Род 9. *ERIOCHLOA* H. B. K. — ШЕРСТЯК, ПЛОСКУША


Однолетник; стебли 25—70 (80) см выс.; листья до 7 мм шир.; соцветие из кистеобразно расположенных веточек; колоски 4—5 мм дл., оси соцветия с шелковистыми волосками. Сорное; в лесных и у дорог . . . 1. *E. villosa* (Thunb.) Kunth — *Ш. волосистый*.

Род 10. *DIGITARIA* Heist. ex Adans. — РОСНЧКА

1. Однолетник; стебли чаще ветвистые, нередко укореняющиеся в узлах; листья линейно-ланцетные, обычно голые, или же при основании с редкими, длинными волосками; соцветие из нескольких колосовидных веточек; колоски 1.5—2 мм дл., без остей; чешуи опушены простыми волосками и лишь изредка имеется небольшая примесь длинных булавовидных волосков. Часто: на речных отмелях и у дорог . . . 1. *D. asiatica* Tzel. — *Р. азиатская* (табл. 32, 2).  
— Растение, похожее на предыдущее, но опушение чешуй состоит из длинных и коротких булавовидно утолщенных волосков (что хорошо заметно в лупу). Заносное; по сорным местам . . . 2. *D. ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Muhl. — *Р. обыкновенная*.

Род 11. *ESCHINOCLOA* Beauv. — ЕЖОВНИК

1. Колоски крупные, до 4—5 мм дл.; при основании листовой пластинки есть колоска из густых волосков, что особенно хорошо заметно у молодых растений; стебли мощные, до 50—150 см выс., ветвящиеся от основания; колосковые чешуи без остей (var. *mutica* Vasing.) или же с остью (var. *aristata* Vasing.). Сорняк рисовых полей . . . 3. *E. oryzicola* Vasing. — *Е. рисовый*.  
— Колоски более мелкие, 2.5—3 мм дл. . . . 2.  
— Ости на колосковых чешуях нет . . . 3.  
— Ости есть . . . 4.  
3. Колосковые чешуи голые или слабо щетинистые, всегда без остей; соцветие очень густое, 5 (6)—10 (15) см дл.; листья до 2 см шир., длинноланцетные. Культурное или одичавшее . . . 2. *E. frumentacea* (Roxb.) Link — *Е. хлебный*, *Панча*.  
— Колосковые чешуи по жилкам с жесткими волосками, без остей, отдельные чешуи с очень короткой остью; листья 1.5—1.8 см шир., широколинейные. Часто: как сорное . . . 1. *E. crus-galli* (L.) Host. et Schul. var. *mutica* Hack. — *Е. щетинный* прося (безостый).  
4 (от 2). Ости очень длинные, до 4.5 см; соцветие чаще темно-фиолетовое, густое. По берегам водоемов, на отмелях . . . 4. *E. caudata* Roshev. — *Е. хвостатый*.  
— Ости до 3 см дл. . . . 5.



1 — *Leersia oryzoides* (L.) Sw. (Теория рисоводства): а — верхняя часть растения, б — колосок; 2 — *Zizania latifolia* Turcz. (Ципания широколистная, «дикий рис»): а — часть корневика с корнями и основанием стебля, б — соцветие и лист, в — колосковая чешуя.



5. Ости короткие, 1—1.5 см дл., у части колосков их нет вовсе . . . . . 1. *E. crus-galli* (L.) Roem. et Schult. — Е. петушие просо короткоостное.  
— Ости до 3 см дл. . . . . 1. *E. crus-galli* (L.) Roem. et Schult. var. *longiseta* Doell. — Е. петушие просо длинноостное.

#### Род 12. PANICUM L. — ПРОСО

1. Листья и стебель голые; метелка раскидистая, 15—20 см дл., колоски до 2.5 мм дл. На сырых лугах; особенно у оз. Ханка . . . . . 2. *P. acroanthum* Steud. — П. верхоплетное.  
— Листья и стебли более или менее волосистые; колоски 3.5—4 мм дл., метелка до 20 см дл., раскидистая или сжатая. Культурное, но иногда встречается как одичавшее у дорог . . . . . 1. *P. miliaceum* L. — П. посевное.

#### Род 13. SETARIA P. B. — ШЕТИННИК

1. Шетинки желтоватые, рыжие или красноватые; цветковые чешуи с ясными поперечными морщинами; стебли 4—40 (50) см выс.; листья сизовато-зеленые; соцветие до 10 см дл., колоски около 3 мм дл. Сорное; часто . . . . . 1. *S. glauca* (L.) Beauv. — Ш. сизый.  
— Соцветие зеленое, темно-фиолетовое или почти красное; морщинок на чешуях нет или они слабые . . . . . 2.  
2. Листовые пластинки 0.8—2 см шир., с длинными, мягкими волосками, выходящими из бороздчатых оснований; стебли 80—100 см выс.; соцветие 15 см дл., рыхлое, цилиндрическое или слабо лопастное; колоски 2.5—3 мм дл., цветковые чешуи слабо морщинистые. Сорное, в посевах пропашных культур . . . . . 2. *S. pycnostachya* Lucznik — Ш. крупноплодный.  
— Листовые пластинки голые, широковатые . . . . . 3.  
3. Соцветие рыхлое и простое, цилиндрическое, колоски 2 мм дл.; шетинки зеленые или темно-фиолетовые; стебли различной величины. Дикорастущее на сухих склонах, по окраинам осыпей, на галечниках, а также сорное в посевах . . . . . 3. *S. viridis* Beauv. — Ш. зеленый.  
— Соцветие густое, лопастное . . . . . 4.  
4. Стебли 50—100 см выс.; листья до 1.5 см шир.; соцветие очень густое, с плотно сомкнутыми короткими ветвями; колоски 2—3 мм дл., эллиптические или почти округлые. Культурное, изредка дичает . . . . . 4. *S. italica* (L.) P. B. — Ш. итальянский, Чумиза.  
— Стебли крупные, до 100—120 см; листья 15—20 мм шир., 20—40 см дл.; колоски 2—2.2 мм дл., эллиптические, плоско-выпуклые. Сорное . . . . . 4. *S. gigantea* (Franch. et Sav.) Makino — Ш. гигантский.

#### Род 14. ZIZANIA L. — ЦИПАННЯ

Многолетник; стебли мощные, до 2 см толщ. и до 2—3 м выс.; листья линейно-ланцетные, 1.5—2.5 см шир.; соцветие до 50—55 см дл.; колоски с длинной остью. По берегам стариц и озер, в воде образует заросли . . . . . 1. *Z. latifolia* Turcz. — Ц. широколистная, «дикий рис» (табл. 34, 2).

#### Род 15. LEERSIA Sw. — ЛЕЕРСИЯ


Многолетник; стебли до 100—120 (150) см выс.; листья линейные, 6—8 мм шир.; соцветие — раскидистая метелка с толстыми веточками; колоски 4—5 мм дл., без остей, беловатые, с зелеными жилками. По берегам озер и рек; у нас большая редкость (Михайловский район Приморья) . . . . . 1. *L. oryzoides* (L.) Sw. — Л. рисовидная (табл. 34, 1).

#### Род 16. DIGRAPHIS Trin. — ДВУКИСТОЧНИК

Многолетник; стебли 40—180 (200) см выс.; листья 12—15 (18) мм шир.; язычок крупный, до 6 мм дл.; метелка чаще сжатая, 8—20 см дл.; колоски 4—5 мм дл., без остей. По берегам рек и ручьев . . . . . 1. *D. arundinacea* (L.) Trin. — Д. тростниковидный.

#### Род 17. HIPOCHOLOE R. Br. — ЗУБРОВКА

1. Колоски с колечкато-суженой остью. На гольцах . . . . . 1. *H. alpina* (Liljeb.) Roem. et Schult. — З. альпийская.  
— Ости нет вовсе или она в виде небольшого острия . . . . . 2.



1 — *Stipa baicalensis* Roshev. (Ковыль байкальский): а — соцветие, б — лист, в — плод («семя»); 2 — *S. effusa* (Maxim.) Nakai (К. развесистый): а — нижняя часть раппод («семя»), б — лист, в — соцветие; 3 — *Ptilagrostis mongholica* (Turcz.) Griseb. (Птилагросте монгольский).

2. Листовые влагалища более или менее густо опушенные . . . . . 3.  
 — Влагалища голые, гладкие, реже шершавые. На лугах и по берегам рек . . . . .  
 3. (от 4). Стебли 30—60 см выс., колоски 4—5 (7) мм дл. По берегам рек, на лугах,  
 по ласьям; часто . . . . . 4. *P. bungeana* Trin. — 3. Бунге.  
 — Стебли 10—15 (35) см выс.; все растение более слабое; колоски 2,5—3 (4) мм дл.  
 На солонцеватых лугах . . . . . 3. *P. glabra* Trin. — 3. Голая.

#### Род 18. *PTILAGROSTIS* Griseb. — ПТИЛАГРОСТИС

Многолетник, образующий густые дерновники; стебли 15—30 (60) см выс.; листья узкие, щетиновидно свернутые; соцветие метельчатое, малоколосковое, 5—10 (15) см дл.; ость 2—3 см дл., перистоволосистая, дважды коленчато согнутая, в нижней части закрученная. На гольцах; в Амурской области и на Сихотэ-Алине (горы Тардажияли и Ко) . . . . . 1. *P. mongholica* (Turcz.) Griseb., *Stipa mongholica* Turcz. — II. монгольский (табл. 35, 3).

#### Род 19. *STIPA* L. — КОВЫЛЬ

1. Ости 7—20 (28) см дл., дважды коленчато согнутые, голые или остро-шершавые; стебель до 120 см выс.; листья щетиновидно свернутые, 0,4—0,7 см в диам.; на сухих степных и остепненных лугах; в Амурской области, Еврейской автономной области и на юге Приморья (в районах Суйфун-Ханкайской низменности) . . . . . 3. *S. baicalensis* Roshev. — К. байкальский (табл. 35, 1).  
 — Ости более короткие, 1,5—2 см дл.; стебли 1—2 м выс.; листья плоские, 12 мм шир., или мало свернутые . . . . . 2.  
 2. Стебель 1,5—2 м выс.; листья плоские, 7—12 мм шир.; метелка раскидистая, 20—40 (45) см дл., ость дуговидно изогнутая, внизу немного закрученная. По лесным опушкам среди кустарников . . . . . 2. *S. effusa* (Maxim.) Nakai — К. развесистый (табл. 35, 2).  
 — Стебель около 1 м выс.; листья обычно вдоль свернутые, реже плоские, широкие; метелка продолговатая, 10—25 (30) см дл.; ость дважды коленчато согнутая. По степям и на сухих лугах; в Амурской области и Еврейской автономной области . . . . . 3. *S. sibirica* (L.) Lam. — К. сибирский.

#### Род 20. *MILIUM* L. — БОР

Многолетник; стебли прямые, 60—100 (150) см выс.; листья широколинейные, 1,5—1,8 см шир., голые, иногда чуть сизоватые; соцветие — развесистая, длинная метелка 15—30 (35) см дл.; колоски без остей. В лесах; часто, но единично . . . . . 1. *M. effusum* L. — Б. развесистый (табл. 36, 3).


#### Род 21. *MUEHLENBERGIA* Schreb. — МОЛЕНБЕРГИЯ

1. Листья длинноланцетные, до 1 см шир.; метелка 20—25 (30) см дл., узкая, поникающая, ость в 5—6 раз длиннее чешуи. На лесных опушках и по рекам . . . . . 1. *M. hügelii* Trin. — М. Гюгеля (табл. 36, 2).  
 — Листья узколинейные, около 4 мм шир.; метелка 8—15 (18) см дл., часто прерывистая, узкая; ость в 2—3 раза длиннее чешуи. По рекам, на лесных опушках и старых залежах; на юге Приморья . . . . . 2. *M. japonica* Steud. — М. японская (табл. 36, 1).

#### Род 22. *PHLEUM* L. — ТИМОФЕЕВКА

1. Стебель 10—40 см выс.; колосковые чешуи с длинными, остистыми остроконечиями; пыльники темно-фиолетовые. На гольцах . . . . . 3. *Ph. alpinum* L. — Т. альпийская.  
 — Стебли 60—100 см и более выс.; чешуи с острием или без него . . . . . 2.  
 2. Стебли 40—60—100 см выс.; метелка колосовидная, почти цилиндрическая; листья плоские, 3—10 мм шир. В поселях, также одичавшие на лугах и у дорог . . . . . 2. *Ph. phleum* L. — Т. луговая.  
 — Стебли 50—60 (80) см выс.; метелка серовато-зеленая, узкоцилиндрическая, листья свернутые около 4 мм шир. Заносное; по ж.-д. путям и у дорог . . . . . 1. *Ph. phleoides* (L.) Simk. — Т. степная.

Таблица 36



1 — *Muhlenbergia japonica* Steud. (Мюленбергия японская); а — плод; 2 — *M. hügelii* Trin. (М. Гюгеля); а — верхняя часть растения, б — плод; 3 — *Milium effusum* L. (Бор развесистый); а — соцветие, б — часть стебля с листом, в — плод



Род 23. *ALOPECURUS* L. — ЛИСХВОСТ, БАТЛАЧЕК

1. Однолетник; соцветие узкоцилиндрическое, до 5 мм шир. . . . . 2.
2. Многолетник; соцветие крупное, цилиндрическое или овальное, 8 мм и шире . . . 3.
3. Ость прямая или несколько изогнутая, прижатая, короткая. На речных отмелях и по берегам водоемов . . . . . 1. *A. amurensis* Kom. — *A. амурский*.
4. Ость колочато изогнутая, в 2—3 раза длиннее колоска. На прибрежных дутах; по Амуру . . . . . 5. *A. longistatus* Maxim. — *A. длинноостный*.
5. (от 3). Ости хорошо заметны и обычно выдаются из соцветия . . . . . 4.
6. Ости короткие, прямые или слабо развитые, обычно не выдаются из колоска . . . 5.
7. Соцветие до 9 см дл.; колосковые чешуи зеленые, реснитчатые; ости до 6 мм дл.; колосчатые стебли 100—120 см выс.; листья плоские, 3—5 мм шир. Заносное; на дутах и у дорог . . . . . 3. *A. pratensis* L. — *A. луговой*.
8. Соцветие до 3,5 см дл.; колосковые чешуи беловатые, мягковолосистые; ости колосчатно-изогнутые, мелкозубчатые, торчащие во все стороны; стебли высокие; листья плоские, узкие. На сырых дутах и как заносное по ж.-д. путям и у населенных пунктов . . . . . 1. *A. brachystachys* M. B. — *A. короткоколосковый*.
9. (от 3). Стебли 60—80 см выс.; соцветие 3,5—4,5 см дл., цилиндрическое, удлиненное; ости прямые или их нет вовсе. На сырых дутах по Амуру и как заносное в Приморском крае . . . . . 2. *A. ventricosus* Pers. — *A. вздутый*.
10. Стебли 10—20 (25) см выс.; соцветие 1,2 см дл., овальное или короткоцилиндрическое; ости короткие, прямые или их нет вовсе. Вдоль горных рек; в Амурской области . . . . . 4. *A. alpinus* Sm. — *A. альпийский*.

Род 24. *COLEANTHUS* Seidl. — КОЛЕАНТУС

Однолетник; стебли 2—7 см выс.; ветвистые; листья узколинейные, сложенные вдоль, серповидно согнутые; колоски в пучках; влагалища верхних листьев сильно вздуты, охватывают соцветие. На речных отмелях; по Амуру (пока найдены только ниже Маринкина и по Амгуни) . . . . . 1. *C. subtilis* (Tratt.) Seidl. — *C. тонкий*.

Род 25. *ARCTAGROSTIS* Griseb. — АРКТАГРОСТИС

1. Стебли 20—50 (60) см выс.; листья линейные, плоские, до 1 см шир.; метелка скатая, 4—12 см дл. и до 2,5 см шир. На сырых и заболоченных дутах; в Амурской области . . . . . 1. *A. latifolia* (R. Br.) Griseb. — *A. широколистный*.
2. Стебли 1—1,5 м выс.; листья плоские, 7—8 мм шириной; метелка до 20 см дл., полускатая. В лесах по берегам рек; в Амурской области . . . . . 2. *A. arundinacea* (Trin.) Beal — *A. тростниковидный*.

Род 26. *CINNA* L. — ЦИННА

Многолетник; стебли 60—120 (140) см выс.; листья широколинейные, до 2 см шир. и 30 см дл.; метелка рыхлая, многоколосковая, 15—30 см дл.; колоски 3—4 мм дл.; цветные. По лесным рекам и ручьям . . . . . 1. *C. latifolia* (Trev.) Griseb. — *C. широколистная*.

Род 27. *AGROSTIS* L. — ПОЛЕВИЦА

1. Колоски с остями . . . . . 2.
2. Остей у колосков нет . . . . . 4.
3. Веточки метелки заметно шероховатые, метелка узкая, 4—11 см дл. и 1,5 см шир.; стебли 20—60 см выс. По берегам водоемов. 1. *A. canina* L. — *C. собачья*.
4. Метелка раскидистая; метелка до 1 мм шир.; стебли 20—50 см выс.; колосковые чешуи часто фиолетовоокрашенные. На дутах; часто . . . . . 3.
5. Метелка скатая; листья до 2,5 мм шир.; стебли 15—40 см выс.; скучены в дерновины. На гольцах; северный Сихотэ-Алинь . . . . . 2. *A. trini* Turcz. — *C. Тринуса*.
6. Метелка с остями; листья до 2,5 мм шир.; стебли 15—40 см выс.; скучены в дерновины. На гольцах; северный Сихотэ-Алинь . . . . . 3. *A. borealis* Hartm. — *C. северная*.
7. Прикорневые листья обычно свернутые . . . . . 5.
8. Метелка с длинными, тонкими веточками, рыхлая, 10—30 см дл.; веточек метелки в мутовке до 10; стебли 30—70 см выс. На дутах . . . . . 6.
9. Метелка с длинными, тонкими веточками, рыхлая, 10—30 см дл.; веточек метелки в мутовке до 10; стебли 30—70 см выс. На дутах . . . . . 3. *A. clavata* Trin. — *C. булавчатая*.

1. Метелка с короткими веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
2. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
3. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
4. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
5. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
6. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
7. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
8. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
9. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.
10. Метелка с длинными веточками, после цветения скатая, 7—30 см дл.; веточек метелки в мутовке чаще по 5; стебли до 100—200 см выс. Заносное, близки населенных пунктов . . . . . 4. *A. alba* L. — *C. белая*.

Род 28. *CALAMAGROSTIS* Adans. — ВЕЙНИК

1. Ости хорошо заметны; они длиннее колосковых чешуй . . . . . 2.
2. Ости нет вовсе или же они слабо заметны и короче колосковых чешуй . . . . . 3.
3. Метелка ветвистая, длинная, 12—18 см . . . . . 4.
4. Метелка с короткими веточками, более короткая, 7—15 см . . . . . 4.
5. Стебли 60—100 см выс.; метелка многоколосковая; ости длинные, колосчатая, до 10 мм дл.; листья 5—8 (10) мм шир.; дерновины густые. На сухих склонах в дубняках; часто . . . . . 3. *C. brachytricha* Steud. — *C. короткоколосчатый*.
6. Стебли 40—80 см выс.; метелка малоколосковая, колоски расставленные; листья более узкие, 4—6 мм шир. На сухих наветренных скалах; описан с горы Зинзун (р. Пейшула, бассейны р. Майхе Шкотовского района) . . . . . 9. *C. distantiflora* Luchnik — *C. расставленноцветковый*.
7. (от 2). Стебли 50—80 см выс.; листья до 1 см шир.; метелка 7—15 см дл. На наветренных склонах в сухих лесах . . . . . 10. *C. turczaninowii* Litv. — *C. Турчаннинова*.
8. Стебли 40—50 см выс.; листья узкие, 3—4 мм шир.; метелка около 4 см дл., малоколосковая. На гольцах . . . . . 11. *C. monticola* V. Petrov — *C. горный*.
9. (от 4). Колосковые чешуи линейно-шиловидные, значительно длиннее цветковых . . . . . 6.
10. Колосковые чешуи ланцетные, только немногие длиннее цветковых . . . . . 7.
11. Стебли до 150 см выс.; листья широколинейные, до 10 мм шир.; метелки до 30 см дл., с короткими, скученными, мелкозубчатыми ветвями. На сухих дутах и прибрежных песках; часто . . . . . 1. *C. epigeios* (L.) Roth — *C. наземный*.
12. Стебли до 100 см выс.; листья линейные, до 6 мм шир., часто вдоль сложенные; метелка 15—20 (25) см дл., густая, с тонкими остро-перистыми веточками. По песчаным берегам рек . . . . . 2. *C. pseudophragmites* (Hall. f.) Koeler — *C. ложнотростниковый*.
13. (от 5). Метелка узкая, скатая, почти колосовидная, иногда прерывистая; листья 2—2,5 (5) мм шир. . . . . 8.
14. Метелка более широкая, не колосовидная; листья 2—4 мм шир. . . . . 9.
15. Листья до 5 мм шир.; метелка скатая, почти колосовидная, 10—15 см дл., ветви ее очень коротки; колоски 3—4 мм дл. На моховых и осочковых болотах, иногда прямо в воде . . . . . 5. *C. neglecta* (Ehrh.) Beauv. — *C. незамеченный, атрофовидный*.
16. Прикорневые листья 1—1,5, стебельные 3—6 мм шир.; метелка 5—15 см дл., почти линейная, часто прерывистая; колоски 4—5 мм дл. На гольцах; в Амурской области . . . . . 6. *C. lapponica* (Wahl.) Hartm. — *C. лапландский*.
17. (от 7). Стебель с 2—3 узлами, 50—130 см выс.; листья линейно заостренные, до 7 мм шир.; метелка до 20 см дл., узкая; ость короткая, колосчатая, выставляется сбоку колоска. На приречных дутах; в западной части Амурской области . . . . . 7. *C. obtusata* Trin. — *C. тупоколосковый*.
18. Стебель с 4—6 и более узлами; ость прямая, не выставляется из колоска . . . 10.
19. Стебель 1—1,5 (2) м выс.; узлы 4—8 (чаще 6); стебельные листья 3—12 мм шир., с обеих сторон шероховатые; метелка до 30 см дл., в период цветения сильно раскидистая, ветви метелки шероховатые. В массе; образует заросли на сырых дутах, по берегам рек и ручьям и на лесных горах . . . . . 3. *C. langesdorffii* Trin. — *C. Лангсдорфа*.
20. Стебли около 1 м выс., чаще с 5 узлами; стебельные листья от 2 до 4 мм шир., слабо шероховатые, снизу гладкие; метелка 10—15 (15) см дл. и до 4 см шир.; ветви метелки с мелкими шишечками. На сырых дутах; на юге Приморья . . . . . 4. *C. angustifolia* Kom. — *C. узколинейный*.

Род 29. *DESCHAMPSIA* Beauv. — ЛУТОВИК, ЦУЧКА

1. Ость нижней цветковой чешуи колосчато согнутая, значительно длиннее колоска; стебель 30—60 см выс.; метелка рыхлая. Среди зарослей кедрового стланника на гольцах северного Сихотэ-Алиня и на лесных дубняках у устья Амура . . . . . 1. *D. flexuosa* (L.) Trin. — *D. извилистый*.
2. Ость прямая, реже слабо изогнутая . . . . . 2.

2. Стебли до 1 м выс.; листья 8—20 см дл. и 2,5—6 мм шир., метелка чаще раскидистая, 6—18 см дл. На лугах и по берегам рек; в Амурской области, а также близ устья Амура, на северном Сихотэ-Алине, на о. Путятии и как заносное в окрестностях Владивостока . . . . . 2. *D. sukatschewii* (Popl.) Roshev. — Л. Сукачева.
- Стебли 20—30 см выс.; листья до 12—15 см дл. и около 1 мм шир.; метелка раскидистая, 5—8 (10) см дл.; колоски мелкие, 3—4 мм дл. На гольцах; Сихотэ-Алинь; пока найден только на горе Тардаки Яни . . . . . 3. *D. borealis* (Trautv.) Roshev. — Л. северный.

Род 30. *TRisetum* Pers. — ТРИЩЕТИННИК

1. Стебли 50—120 (150) см выс.; листья около 1 см шир., длинные; метелка до 20 см дл., раскидистая; колоски пестроокрашенные, ость изогнутая. В лесах и на разреженных участках . . . . . 1. *T. sibiricum* Turcz. — Т. сибирский.
- Стебли 10—20 (35) см выс.; листья около 2 мм шир., мягковолосистые; метелка сжатая, колосовидная, до 8 см дл., колоски темноокрашенные; образует дерновники. На гольцах; по Амуру . 2. *T. spicatum* (L.) Richt. — Т. колосистый.

Род 31. *AVENA* L. — ОВЕС

1. Листья у основания по краю реснитчатые, влагалища нижних листьев опушенные; метелка около 30 см дл.; ости черные, колеччатые. Сорняк . . . . . 1. *A. fatua* L. — О. пустой, Овесог.
- Листья и влагалища голые; метелка до 25 см дл., ости светлые, не колеччатые. Культурное, иногда дичает . . . . . 2. *A. sativa* L. — О. посевной.

Род 32. *HELICTOTRICHON* Bess. — ОБСЕЦ

1. Стебель 50—80 см выс.; листья линейные, до 4 мм шир.; метелка до 15 см дл., колоски до 1,5 см дл., ости пологоколеччатые, в 1,5 раза длиннее чешуи. На сухих лугах; в Приморье и по Амуру . . . . . 1. *H. schellianum* (Hack.) Kitag. — О. Шелля.
- Листья 6—12 мм дл., метелка до 25 см дл.; колоски 20—25 мм дл., ости резко колеччатые, направлены вбок, почти в 2 раза длиннее чешуи. На сухих склонах; по Амуру . . . . . 2. *H. dahuricum* (Kom.) Kitag. — О. даурский.

Род 33. *CHLORIS* Sw. — ХЛОРИС

Многолетник; стебли 12—60 см выс., приподнимающиеся; листья линейно-ланцетные; соцветие из 4—10 колосовидных веточек, собранных пальчато на верхушке стебля; нижняя цветковая чешуя с длинной, прямой остью. Заносное; на юге Приморья . . . . . 1. *Ch. virgata* Sw. — Х. прутьевидный.

Род 34. *TRIPOGON* Roth — ТРЕХБОРОДНИК


Стебли 15—20 см выс.; листья узколинейные, щетиновидно свернутые; соцветие 10—15 см дл., в виде одностороннего колоса с 2 рядами сближенных линейно-ланцетных колосков, ости короткие, прямые. В трещинах сухих скал; на берегу Амура (с. Екатерино-Никольское Еврейской автономной области). . . . . 1. *T. chinensis* (Franch.) Hack. — Т. китайский (табл. 37, 2).

Род 35. *BECKMANNIA* Host — БЕКМАНИЯ

Многолетник; стебли прямые, 30—100 (120) см выс.; листья широколинейные, около 5 мм шир.; соцветие до 25—30 см дл., сложный колос, иногда дважды-трижды ветвистый; колоски сближены черешчатко. По берегам рек и озер, в канавах и на сырых лугах . . . . . 1. *B. syzigachne* (Steud.) Fern. — Б. восточная.

Род 36. *PHRAGMITES* Adans. — ТРОСТИНИК

1. Стебли 1,5—3,5 (5) м выс.; колоски 10—15 мм дл., метелки до 40 см дл.; листья 3—5 см шир.; язычок хорошо выражен, с кольцом коротких волосков. По краям водоемов и на болотах, нередко в воде . . . . . 1. *Ph. communis* Trin. — Т. обыкновенный.



1 — *Cleistogenes chinensis* (Maxim.) Keng (Зисовка китайская); а — верхняя часть стебля, б — плод; 2 — *Triopogon chinensis* (Franch.) Hack. (Трехбородник китайский); а — плод; 3 — *Beckmannia minor* Host (Поленичка малая), верхняя часть стебля с листом и соцветием; 4 — *E. pilosa* (L.) Beauv. (Поленичка волосистая); а — верхняя часть стебля с листом и соцветием, б — колосок.



- Стебли до 2 м выс.; колоски 5—7 мм дл.; метелка 12—15 (18) см дл.; язычка нет или он слабо заметен и без волосков; образует длинные, 3—5 м, наземные укореняющиеся в узлах побеги. На почвах отдален и по оврагам; в Приморском крае . . . . . 2. *Ph. japonica* Steud., *Ph. serotina* Kom. — Т. японский.

Род 37. CLEISTOGENES Keng, *Diplachne* Beauv. — ЗМЕЕВКА

Многолетник; стебли тонкие, 25—40 (60) см выс., хорошо облиственные; листья до 5 (7) мм шир.; метелка малоколосковая с 1—3 веточками; колоски 5—8 мм дл.; ости до 2 мм дл. На каменистых сухих склонах и на разнотравных остепненных лугах . . . 1. *C. chinensis* (Maxim.) Keng — 3. китайская (табл. 37, 1).

В последнее время на сухих участках по р. Суйфуну найдена *C. hancei* Keng, отличающаяся более широкими и длинными листьями и более высокими (до 100 см) стеблями, лишенными внизу утолщений.

## Род 38. ERAGROSTIS Host — ПОЛЕВИЧКА

1. Однолетник; стебли ветвистые, 10—40 см выс.; листья узколинейные, без бородавчатых железок по жилкам; метелка 10—12 (15) см дл., раскидистая, колоски 3—5 мм дл. На откосах и по дорогам . . . . . 1. *E. pilosa* (L.) Beauv. — П. волосистая (табл. 37, 4).  
— Листья и влагалища по жилкам с бородавчатыми железками и редкими, длинными волосками; стебли 10—50 см выс., приподнимающиеся; колоски 4—10 (11) мм дл. Сорное и по дорогам . . . . . 2. *E. minor* Host — П. малая (табл. 37, 3).

Род 39. KOELERIA Pers. — КЕЛЕРИЯ, ТОНКОНОГ<sup>1</sup>

1. Листья голые или слегка жестковолосистые . . . . . 2.  
— Листья опушенные . . . . . 3.  
2. Стебли 30—40 (60) см выс., опушенные лишь в верхней части; листья бесплодных побегов около 1 мм шир.; метелки рыхлые (сильно лопастные), 6—10 (14) см дл.; колоски 4—5 мм дл. На сухих склонах морского побережья . . . . . 2. *K. askoldensis* Roshev. — К. аскольдова.  
— Стебли 5—15 (18) см выс., более или менее опушенные; листья около 2 мм шир., малочисленные; метелка 1—3 (4) см дл. На скалах . . . . . 4. *K. asiatica* Domin — К. азиатская.  
3 (от 1). Стебли 25—40 (60) см выс.; листья узкие, часто свернутые, более или менее опушенные; метелка до 8—10 см дл. На сухих лугах; часто . . . . . 3. *K. gracilis* Pers. — К. тонкая.  
— Стебли 20—70 см выс.; листья 1—2 мм шир., жестковолосистые; метелка до 15 см дл., узкая. В сухих лесах (сосняки и дубяки) . . . . . 1. *K. tokiensis* Domin var. *kensongensis* Domin — К. корейская.


## Род 40. MELICA L. — ПЕРЛОВНИК

1. Растение образует дерновины; стебли 25—100 (150) см выс.; листья до 8—10 (12) мм шир.; колоски яркоокрашенные, крупные. На скалах и скалистых склонах . . . . . 1. *M. turczaninowiana* Ohwi — П. Турчанинова (табл. 38, 3).  
— Растения дернин не образуют; корни ползучие . . . . . 2.  
2. Колоски буро-фиолетовые, с белой окантовкой. В лесах . . . . . 2. *M. nutans* L. — П. поникающий (табл. 39, 1).  
— Колоски серебристо-белые. В сырых лесах . . . . . 3. *M. komarovii* Luchnik — П. Комарова (табл. 38, 2).

## Род 41. DIARRHENA Beauv. — ДИАРРЕНА

1. Метелка узкая, с прижатыми вверх ветвями; стебли 80—100 см выс.; листья тонкие, 10—15 мм шир. В кедрово-широколиственных лесах; часто . . . . . 1. *D. manshurica* Maxim. — Д. маньчжурская (табл. 39, 1).  
— Метелка широкая, раскидистая. В кедрово- и хвойно-широколиственных лесах; на юге Приморья; изредка . . . . . 2. *D. japonica* Franch. et Sav. — Д. японская (табл. 39, 2).

<sup>1</sup> Во многих районах Дальнего Востока «тонконогом» называют войник *Calamagrostis langsdorffii*.




1 — *Melica nutans* L. (Перловник поникающий); 2 — *M. komarovii* Luchnik (П. Комарова); 3 — *M. turczaninowiana* Ohwi (П. Турчанинова).

Стебли (40) 60—120 (150) см выс.; листья плоские, 5—6 мм шир.; метелка 6—8 см дл., с длинными ветвями; колоски в плотных клубочках с короткой, до 1 мм, остью. Заносное; по дорогам . . . 1. *D. glomerata* L. — Е. сборная.

## Род 43. POA L. — МЯТЛИК

1. Листья не шире 6 мм . . . . . 2.
- Листья 8—10 мм шир. и до 30 см дл.; стебли до 1 м выс. и до 5 мм толщ.; метелка до 20 см дл., сжатая, колоски многочисленные, 7—9 (12) мм дл. На морских берегах . . . . . 16. *P. eminens* Presl — М. выдающийся.
2. Метелка широкопирамидальная, 15—25 см дл. и 10—25 см шир., нижние ее ветви отклонены более или менее горизонтально; стебли 45—120 см выс.; листья 2—5 мм шир.; колоски 5—8 мм дл. Заносное; по ж.-д. полотну и на засоленных участках морского берега; у Владивостока . . . . . 15. *P. subfastigiata* Trin. — М. широкометельчатый.
- Метелки мевшиных размеров и более узкие . . . . . 3.
3. Растение однолетнее или двулетнее; стебель полудрекающий, 10—30 см выс.; листья узколинейные; метелка до 7 см дл., раскидистая; колоски 3—4 мм дл. По выгонам и у дорог; заносное . . . . . 1. *P. annua* L. — М. однолетний.
- Растения многолетние . . . . . 4.
4. Нижняя цветочная чешуя с 5 ясно заметными жилками . . . . . 5.
- Жилки слабо заметные или их не более 3 . . . . . 14.
5. Листья около 1,5 мм шир., узколинейные; стебли 30—60 (80) см выс., приподнимающиеся; метелка 5—10 см дл., сжатая; колоски 3—5 мм, яйцевидные. По склонам и сухим остепненным лугам 4. *P. angustifolia* L. — М. узколинейный.
- Листья 2—5 мм шир. . . . . 6.
- ✓ 6. Стебель цилиндрический . . . . . 8.
- Стебель сжатый . . . . . 7.
7. Стебель 15—50 см выс.; листья узколинейные, иногда свернутые; метелка до 10 см дл., с короткими, шершавыми ветвями; колоски до 4 мм дл. Заносное; по ж.-д. полотну и у дорог . . . . . 12. *P. compressa* L. — М. сплюснутый.
- Стебель 40—90 см выс.; листья плоские; метелка не густая, до 30 см дл., с толстыми, низиллисты ветвями; колоски 5—7 мм дл. На лесных опушках . . . . . 7. *P. radula* Franch. et Sav. — М. широкохвостый.
- 8 (от 6). Метелка поникающая, тонкая, 10—20 (30) см дл., веточки ее шершавые, до 7 см дл.; колоски 3—5 мм дл., светло-зеленые; листья плоские, линейные до 5 мм шир. По берегам ручьев в лесу . . . . . 5. *P. ussuriensis* Roshev. — М. уссурийский.
- Метелка примосающаяся . . . . . 9.
9. Колоски не длиннее 6 мм . . . . . 10.
- Колоски 6—8 мм дл.; колосковые чешуи узколанцетные; стебель 70—120 см выс.; листья узколинейные, 4—5 мм шир.; метелка 15—20 см дл. и около 10 см шир. В лиственных лесах . . . . . 6. *P. angustiglumis* Roshev. — М. узкочешуйный.
10. Нижняя цветочная чешуя с выдающимися опушенными жилками; колоски яйцевидные, 3,5—6 мм дл.; метелка до 20 см, веточки ее шершавые, короткие; стебли (10) 30—90 см выс. Очень часто; на лугах и по опушкам . . . . . 3. *P. pratensis* L. — М. луговой.
- Цветковые чешуи совершенно голые, колоски 2—5 (6,5) мм дл., яйцевидные; метелка 6—18 см дл., с длинными, часто поникающими ветвями. По лесным полянам . . . . . 2. *P. sibirica* Roshev. — М. сибирский.
- 11 (от 4). Листья до 2 мм шир. . . . . 12.
- Листья до 5 мм шир.; стебли 60—80 см выс.; метелка 6—20 см дл.; колоски 5—8 мм дл., широколанцетные; колосковые чешуи крупные, около 3/4 длины колоска. На песках морского берега . . . . . 14. *P. macrocalyx* Trautv. et Mey. — М. крупночешуйный.
12. Листья 1—2 мм шир. . . . . 13.
- Листья 0,5—1 мм шир., узколинейные, плоские или свернутые; стебель 30—60 см выс.; метелка прерывистая, 2—6 см дл. и 5—7 мм шир.; колоски узколанцетные, 4—5 мм дл. По сухим склонам в дубяках и сосняках . . . . . 10. *P. botryoides* Trin. — М. кистевидный.
13. Метелка 3—6 см дл. . . . . 14.
- Метелка 10—20 см дл. . . . . 15.
14. Стебли 45—60 см выс.; листья узколинейные, до 2 мм шир.; метелка 3—6 см дл. и 1—1,5 см шир., с короткими ветвями; колоски узколанцетные 3—6 мм дл. В дубяках и сосняках . . . . . 11. *P. sphondyliodes* Trin. — М. перестевиловидный.
- Стебли 10—30 см выс., толстые, приподнимающиеся; листья узколинейные, 1—2 мм шир.; метелка широкопирамидальная, 3—6 см дл.; колоски 4—7 мм дл.



1 — *Diarrhena manshurica* Maxim. (Дикорос маньчжурская);  
а — нижняя часть стеблей и корни, б — верхняя часть стебля  
с соцветием, в — лист; 2 — *D. japonica* Franch. et Sav. (Д. япон-  
ская); а — верхняя часть стебля с листом и соцветием, б — ко-  
лосок.



- более или менее фиолетовые. На голых . . . . . 13. *P. arctica* R. Br. — М. арктический.  
 15 (от 13). Стебли 20—80 см выс.; метелка до 20 см дл., раскидистая, обычно много-  
 колосковая; колоски до 5 мм дл., зеленоватые или пестрые, язычок до 3 мм дл.  
 Часто; на сырых лугах и по лесным опушкам . . . . . 5. *P. palustris* L. — М. болотный.  
 — Стебли 30—100 см выс.; метелка до 40 см дл., раскидистая, колоски 3—4 мм дл.;  
 листья до 2 мм шир., отклоненные от стебля; язычка нет вовсе или же он очень  
 маленький. В лесах и на сухих лугах; часто . . . . . 9. *P. nemoralis* L. — М. боровой.

## Род 44. GLYCERIA R. Br. — МАНИШК

1. Листья узкие, 2—5 мм шир. . . . . 2.  
 — Листья 6—10 мм и более шир. . . . . 4.  
 2. Колоски 2—7 (8) мм дл. . . . . 3.  
 — Колоски 8—12 мм дл. и около 3 мм шир.; метелка узкая, линейная, 8—10 (12) см дл.,  
 стебли 20—30 (40) см выс., приподнимающиеся, тонкие, с 2—3 линейными  
 листьями; листья 1—2 (2,5) мм шир. Берега Амура и его притоков . . . . . 1. *G. kerfolia* (Maxim.) Kom. — М. тонкокоричневой.  
 3. Листья 2 (3) мм шир., 6—12 см дл.; стебли тонкие, 20—40 см выс.; метелка узкая,  
 4—8 см дл.; колоски до 5 мм дл. По берегам водоемов, часто прямо в воде  
 . . . . . 2. *G. natans* Kom. — М. плавающий.

В последнее время (1949 г.) этот вид отнесен к новому роду *Torreyochloa* Church, который отличается от рода *Glyceria* R. Br. рядом весьма существенных признаков: крупными хромосомами в числе кратном 7 (а не 5), свободными до основания влагалищами листьев, иным числом жилдок на колосковых и цветковых чешуях и др. Наш вид при перенесении в этот род должен называться *T. natans* (Kom.) Church.

- Листья 3—5 мм шир., 10—30 см дл.; стебли 20—70 см выс.; метелка рыхлая, 12—  
 15 см дл.; колоски около 3 мм дл. По берегам водоемов, часто прямо в воде  
 и на сырых лугах . . . . . 4. *G. spiculosa* (Fr. Schmidt) Roshev. — М. колосковый.  
 4 (от 1). Метелка не поникающая, 15—25 (30) см дл.; колоски 5—7 (8) мм дл. . . . . 5.  
 — Метелка поникающая; стебли 50—150 см выс.; листья 7—9 мм шир.; колоски  
 до 10 мм дл. В лесах у ручьев и ключей и на лесных болотах . . . . . 3. *G. libanica* (Gorski) Lindm. — М. литовский.  
 5. Стебли 90—140 (150) см выс.; листья шире 10 мм, с резко выделяющейся средней  
 жилкой; язычок 3 мм дл.; метелка густая, 20—30 см дл.; колоски 5—8 мм дл.  
 По берегам озер и стариц, часто прямо в воде . . . . . 5. *G. triflora* (Korsh.) Kom. — М. трехцветковый.  
 — Стебли 60—90 см выс.; листья 6—12 мм шир., с сильно развитыми влагалищами,  
 язычок до 2 мм дл.; метелка 15—25 см дл. и 4—12 см шир., густая; колоски  
 5—8 мм дл. В умеренных лесах и по различным канавам и рывинам . . . . . 6. *G. ussuriensis* Kom. — М. уссурийский.

## Род 45. RUCCINELLIA Parl. — БЕСКИЛЬНИЦА

1. Стебли 15—60 см выс.; листья 1—2 мм шир., тонкие, плоские или свернутые;  
 метелка 15—20 см дл.; колоски 4—5 мм дл. По сырым лугам, болотам и сорным  
 местам . . . . . 3. *P. baupiana* V. Krecz. — Б. Гаупта.  
 — Метелка 5—10 (15) см дл.; колоски 5—8 мм дл. . . . . 2.  
 2. Метелка 8—15 см дл., раскидистая, с длинными, 5—7 см, веточками; стебель 25—  
 50 см выс.; листья около 2 мм шир.; колоски 5—8 мм дл. На морском берегу  
 . . . . . 1. *P. kurilensis* Takeda — Б. курильская.  
 — Метелка 5—7 см дл.; колоски 5—6 мм дл.; стебли 10—30 см выс. На приморских  
 лугах . . . . . 2. *P. paupercula* Fern. et Weath. — Б. обедненная.

## Род 46. LEUCOROA Griseb. — БЕЛОМЯТЛИК

Растение образует густые дерновины; стебли 40—80 см выс.; листья серо-зе-  
 леные, жесткие, щетинистые, 1—2 мм шир.; соцветия скученные, почти ко-  
 лосовидные, 3—7 см дл. колоски обратнойдеицидные, 6—10 мм дл., серебристо-  
 белые или серебристо-фиолетовые. На голых (гора Облачная) . . . . . 1. *L. albidia* (Turcz.) V. Krecz. — Б. беломятный.

По внешнему облику растение очень напоминает овсяницу из группы *Ovinia*.



1 — *Schizachne callosa* (Turcz.) Roshev. (Схизахна мозолистая); а — соцветие, б —  
 1 — *Schizachne callosa* (Turcz.) Roshev. (Схизахна мозолистая); а — соцветие, б —  
 2 — *Festuca pseudosulcata* Drob.  
 цветков, в — колосковые чешуи; а — цветковая чешуя; 2 — *Festuca pseudosulcata* Drob.  
 (Овсяница ложнобороздчатая); а — колосок; 3 — *F. extremiorientalis* Ohwi (О. дальне-  
 восточная); а — лист, б — часть соцветия, в — колосок.

Род 47. *FESTUCA* L. — ОВСЯНИЦА

1. Листья 3—12 мм шир., плоские . . . . . 2.  
— Листья более узкие, 0,3—2,5 мм шир., чаще свернутые или щетиновидные . . . . . 3.  
2. Листья до 12 мм шир.; стебли 50—120 см выс.; метелка 15—20 (30) см дл.; ко-  
— лоски 5—7 мм дл., с остиям. В лесах и кустарниковых зарослях . . . . . 4.  
— Листья 3—5 см шир.; стебли 10—100 см выс.; метелка до 20 см дл.; колоски до  
— 15 мм дл., без остий. Заносное . . . . . 7. *F. pratensis* L. — О. луговая  
3 (от 1). Листья очень узкие, до 1 мм шир. . . . . 4.  
— Листья от 1 до 2,5 мм шир. . . . . 7.  
4. Метелка 2—3 (4) см дл. . . . . 5.  
— Метелка 5—10 см дл. . . . . 6.  
5. Стебли опушенные или шероховатые, 10—30 см выс.; листья 0,3—0,7 мм шир.  
— и 5—15 см дл.; метелка 2—4 см дл., густая; колоски 6—8 мм дл. На голых  
— и по окраинам каменистых россины . . . . . 2. *F. lupulina* Schur — О. приземистая.  
— Стебли гладкие, 20—40 см выс.; листья жесткие, шероховатые, 0,8 мм шир. и 7—  
— 10 см дл.; метелка около 2,5 см дл. По сухим склонам и на степных участках  
— . . . . . 4. *F. lenensis* Drob. — О. лесная.  
6 (от 4). Стебли гладкие, 50—75 см выс.; листья волосовидные, 0,3—0,4 мм шир.  
— и до 30 см дл.; метелка 5—10 см дл.; колоски 5—7 мм дл. На каменистых склонах  
— и в дугах . . . . . 5. *F. jacutica* Drob. — О. якутская.  
— Стебли под метелкой, шероховатые, 20—60 см выс.; листья щетиновидные, 0,3—  
— 0,7 мм шир. и 20—30 см дл.; метелка 3—8 см дл.; колоски 5—9 мм дл. На сухих  
— склонах в лесах . . . . . 7. *F. pseudosulcata* Drob. — О. ложноборозчатая (табл. 40, 2).  
7 (от 3). Стебли 20—75 см выс.; листья до 2,5 мм шир., линейные, 20—30 (40) см дл.;  
— метелка до 10 см дл.; колоски 6—12 мм дл. На скалах и в дугах . . . . . 6. *F. rubra* L. — О. красная.  
— Стебли 15—30 см выс., тонкие; листья мягкие, гладкие, плоские, 1—1,5 мм шир.  
— и 15—30 см дл.; метелка 3 см дл.; колоски 5—6 мм дл. На скалах морских берега  
— . . . . . 3. *F. mollissima* V. Krecz. et Bobr. — О. мягчайшая

Род 48. SCHIZACHNE Наск. — СХИЗАХНА

Стебель 40—60 см выс.; листья плоские или частично вдоль свернутые, 1—4 мм шир., сверху с толстыми, мягкими, негустыми волосками; метелка кистевидная, до 10 см дл.; колоски 10—12 мм дл., с голой прямой остью. Небольшими рыхлыми дерновниками в лесах  
1. *Sch. callosa* (Turcz.) Roshev. — С. мозолистая (табл. 40, 1).

Род 49. *LOLIUM* L. — ПЛЕВЕЛ

1. Однолетник; стебли тонкие, до 80 см выс.; листья плоские, гладкие; соцветие 6—13 см дл.; колоски 0.8—1.4 см дл. Запасное сорное. 1. *L. tenotum* Schrank — П. расстелющийся. Многолетник; стебли 15—65 см выс.; листья узколинейные, 1—4 см шир.; соцветие 8—15 см дл.; колоски 0.6—0.9 см дл. Редкое сорное и запасное растение. 2. *L. perenne* L. — П. многолетний.

Род 50. BROMUS L. — РОСТЕР

1. Многолетники  
Однолетники или двулетники ..... 2.  
2. Ости 3—8 мм дл.  
Остей нет вовсе или же есть, остевидное окончание до 1,5 мм дл.; стебли 30—100 (120) см выс.; листья 4—9 мм шир.; метелка 10—15 см дл.; колоски 1,5—3 см дл. В культуре и как заносные; редко ..... 3.  
3. Стебли высотой 50—60 см, в узлах волосистые; листья до 8 мм шир., метелка до 25 см дл., поникающая с длинными до 3—10 см, веточками; колоски 2,5—4 см дл.; ость прямая, 3—6 мм дл. На сухих ..... 1. *B. inermis* Leys. — К. безостый.  
4. Стебли высотой 10—35 см выс.; листья узколанцетные, до 20—25 см дл., метелка 15—30 см дл.; колоски 2,5—3,5 см дл.; ость прямая, 5—8 мм дл. Заносное: с. Кангауз ..... 2. *B. richardsonii*, дико ..... К. Ричардсона.  
4 (от 1). Листья волосистые ..... 3. *B. riparius* Rehm. — К. береговой.  
5.

- Листья голые, линейные, 3—6 мм шир.; стебли 40—100 см выс.; метелка до 20 см дл., колоски 2—2,5 см дл.; продолговатоланцетные. Заносное.
5. Однолетних или двулетних; стебли 30—100 см выс.; листья и влагалища миктоволнообразные, до 6 мм шир.; метелка до 30 см дл.; колоски ланцетные 1,5—2,5 см дл. Заносное.
- Однолетних; стебли 20—80 см выс.; листья и влагалища продолговатоланцетные, до 4 мм шир.; метелка рыхлая, до 25 см дл.; колосок 2—2,5 см дл., ланцетный. Заносное; в окрестностях Уссурийска. . . 6. *V. japonicus* Thunb. — К. японский.

Род 51. ROEGNERIA C. Koch — РЕГНЕРИЯ

1. Ости нижних цветков чешуй отогнутые, длинные . . . . . 2.
- Ости прямые или слегка извилистые или их нет вовсе . . . . . 5.
2. Колоски прямые или наклонные . . . . . 5.
- Колоски повислые, рыхлые, 10—20 см дл.; отогнутыя, 2—2,5 см дл.; стебли 50—100 см выс.; образуют густые дерновины; влагалища листьев голые, короткоизодонные, листья плоские или с чуть завернутыми краями, до 10 мм шир. На сухих дугах и в долине рек . . . . . 4. *R. confusa* (Roshov.) Nevski — Р. смешанная.
3. Колоски более или менее извилистые, дуговидные, 20—22 см дл., колоски зеленые или сизооливково-зеленые . . . . . 6.
- Колоски прямые, односторонние, 7—15 см дл.; колоски фиолетово-бурые или червовато-фиолетовые; ости длинные, 2,5—4 см дл., сильно отогнутые, шероховатые; стебли 60—100 см выс.; листья 0,4—0,9 см шир., шероховатые, чаще сверху негусоволовистые. На сухих дугах и среди кустарников . . . . . 4. *R. tuzcanzinovii* (Drob.) Nevski — Р. Турчанзинова.
4. Листья снизу уверху слабо волнистые, 0,4—0,8 мм шир., стебли 80—100 см выс.; толстые, до 24 см дл.; отогнутыя, 2—2,5 см дл.; колоски прямые; колоски зеленые; ость отогнутая, 2—2,5 см дл. Приморье и Приамурье . . . . . 2. *R. amurense* (Drob.) Nevski — Р. амурская.
- Листья с обеих сторон голые, шероховатые; стебли 70—100 см выс.; колоски прямые или наклонные, (10) 14—22 см дл.; колоски сизооливково-зеленые, ость отогнутая, до 2,5 см дл. На сухих дугах и по сорным местам; на юге Приморья . . . . . 3. *R. ciliaris* (Trin.) Nevski — Р. ресничатая.
- 5 (от 4). Колоски повислые или поникающие; стебли 70—140 см выс.; в долине рек . . . . . 3. *R. pendula* Nevski — Р. повислая.
- Колоска прямые, 12—45 (18) см дл. Заносное; у дорог и по долинам рек; Чукотский и Анапчинский районы . . . . . 6. *R. trachyeaulon* (Link) Nevski — Р. «американский шипрей».

Род 52. AGROPYRON Gaertn. — ПЫРЕЙ

1. Колосе удлинённый, 7—15 см дл., с разнатыми между колосками промежуточными . . . 2.  
 Колосе очень густоцветный, гребенчатый, без заметных промежуточков между колосками . . . 3.  
 Колоски — 8—15 мм дл.; стебли 20—60 (75) см выс.; листья 2—5 мм шир., завернутые или плоские. На степных дугах; на западе Амурской области и на заносном в Приморье . . . 3. *A. cristatum* (L.) Gaertn. — П. гребенчатый  
 Листья зеленые или сизоватые, до 10 мм шир., плоские, с заостренными концами; стебли 70—120 см выс.; колоски 15 см дл.; колоски 7—12 мм дл.; или голые; стебли 70—120 см выс.; колоски 15 см дл.; колоски 7—12 мм дл.; расставленные. На дугах по долинам рек и на залежах; по-видимому, заносный . . . 2. *A. repens* (L.) Beauv. — П. ползучий  
 Листья более узкие, 2—4 мм шир., плоские, с завернутыми краями, сверху по краям или шероховатые; стебли 50—80 см выс.; колоска 8—11 см дл.; колоски 16—18 (20) мм дл. На каменистых склонах; в Хабаровском крае и Амурской области . . . 1. *A. angustense* Nevski. — П. амурский


## Род 53. ELYMUS L. — КОЛОСНЯК

1. Ости 1,5—2,5 см дл. . . . . 130 . . . . . 2.  
Остой нет; стебли толстые, 50—130 см выс.; листья 5—15 (17) мм шир., плоские  
в засухо свертывающиеся; колосья 13—15 (27) см дл., густые, многово-  
лосистые. Часто: по морскому берегу . . . . .  
1. *E. mollis* Trin. — К. мягкий, Житняк (табл. 41, 3).  
2. Колосья прямые . . . . . 131 . . . . . 2.  
Колосья сильно покатые, 10—23 (25) см дл., ости 1,5—2 (2,5) см дл., листья  
5—10 (15) мм шир., плоские; стебли 45—90 см выс. На дугах и в кустарниковых  
зарослях, по берегам рек . . . . .  
2. *E. sibiricus* L. — К. сибирский, «волосенец» (табл. 41, 2).



3. Стебли мощные, 1—2 м выс.; листья 1—1.8 (2) см шир., волосистые, реже почти голые; колосья 15—25 см дл.; ости 1.5—2.8 см дл. На приречных лугах; довольно часто . . . . . 3. *E. excelsus* Turcz. — К. высокий.  
— Стебли менее мощные, 60—120 (140) см выс.; листья до 8 мм шир., с обеих сторон шероховатые; колосья 9—15 (18) см дл.; ости 10—13 (15) мм дл. На сухих лугах и на склонах . . . . . 4. *E. dahuricus* Trin. — К. даурский.

Таблица 41



1 — *Critesion jubatum* (L.) Nevski (Критезион гривастый); а — соцветие, б — колосок; 2 — *Elymus sibiricus* L. (Колосник сибирский); соцветие; 3 — *E. mollis* Trin. (К. мягкий, Житник); соцветие.

Род 54. ASPERELLA Humb. — ШЕРОХОВАТКА

1. Ости 10—15 мм дл.; колосья 10—15 см дл., поникающие или наклоненные; листья 1—2.8 см шир., зеленые, тонкие; стебли 1—1.5 м выс. В длинных лесах . . . . . 2. *A. Komarovii* Roshev. — Ш. Комарова.  
— Ости короткие, всего 2—3 мм; колосья 8—13 см дл., прямые или слегка наклоненные; листья 0.6—1.1 см шир.; стебли толстые, 60—110 см выс. На песчаногалечниковых отложениях рек и по окраинам каменистых россыпей . . . . . 1. *A. coreana* (Honda) Nevski — Ш. корейская.

Род 55. ANEUROLEPIDIDIUM Nevski — ВОСТРЕЦ

Стебли 40—80 см выс.; листья сизовато-зеленые, 5—8 мм шир., плоские или свертутые; колосья 8—16 (19) см дл., в нижней части часто прерывистые; колоски 1—2 см дл., одиночные или парные, с остреватым околосовым нижним цветковой чешуей. На степных лугах; в западной части Амурской области и в Приморье как заносное по ж.-д. насыпям . . . . . 1. *A. pseudogropyrum* (Trin.) Nevski — В. ложногруппный.

Род 56. CRITESION Raf. — КРИТЕЗИОН

Многолетник; стебли голые, тонкие, до 50 см выс.; листья узколинейные, до 3.5 мм шир.; колосья 3—7 см дл. (без длины остей), ости 2.5—9 см дл. Заносное; по дорогам; особенно часто во Владивостоке и Уссурийске . . . . . 1. *C. jubatum* (L.) Nevski, *Hordeum jubatum* L. — К. гривастый (табл. 41, 1).

Род 57. HORDEUM L. — ЯЧМЕНЬ

1. Ости 1—3 мм дл.; колосья узколинейные, 4—9 см дл. и 3—5 мм шир.; листья узколинейные, прикорневые 1—2.5 мм стеблевые до 4 мм шир. На сухих лугах, часто заселенных . . . . . 1. *H. brevisubulatum* (Trin.) Link — Я. короткоостистый.  
— Ости до 7 мм дл.; листья около 2 мм шир. На лугах; у пос. Краскино (Хасанский район) . . . . . 2. *H. nodosum* L. — Я. узловатый.

Сем. 24. CYPERACEAE Juss. — СОКОРОВЫЕ

1. Цветки однополые . . . . . Род 10. *Carex* L. — Осока.  
— Цветки обоеполые . . . . . 2.  
2. Плодики с летучкой из длинных волосков . . . . . 3.  
— Плодики без летучек . . . . . 4.  
3 (от 1). Колоски маленькие, одиночные; летучка состоит из 6 волосков; густошерстистое растение . . . . . Род 4. *Trichophorum* Pers. — Пухонос.  
— Колоски крупные; летучки из многочисленных волосков . . . . . Род 3. *Eriophorum* L. — Пушица.  
4 (от 2). Околосовые чешуи расположены двурядно, колоски плоские . . . . . 5.  
— Околосовые чешуи расположены спирально; колоски цилиндрические . . . . . 6.  
5. Колоски состоят всего из 1—3 цветков; соцветие головчатое . . . . . Род 2. *Kyllinga* Rottb. — Киллинг.  
— Колоски многоцветковые . . . . . Род 1. *Cyperus* L. — Сынть.  
6. (от 4). Колосок 1, колючий; стебли безлистные; основание столбика утолщенное . . . . . Род 6. *Eleocharis* R. Br. — Болотница.  
— Колоски не одиночные . . . . . 7.  
7. Колоски двух-трехцветковые, окружены у основания бесплодными чешуями . . . . . Род 9. *Rhynchospora* Vahl — Очеретник.  
— Колоски многоцветковые . . . . . 8.  
8. Столбик без утолщения у основания . . . . . Род 5. *Scirpus* L. — Камыш.  
— Столбик у основания утолщенный . . . . . 9.  
9. Столбик волосистый, отваливается после созревания целиком . . . . . Род 8. *Fimbristylis* Vahl — Фимбристиль.  
— Столбик голый, утолщенная его часть сохраняется при плодах; большинство растений с волосовидным стеблем . . . . . Род 7. *Bulbostylis* Kunth — Бульбостиль.

Род 1. CYPERUS L. — СЫНТЬ

1. Рылец 2; орешек плоско-двугранный . . . . . 2.  
— Рылец 3; орешек трехгранный . . . . . 9.  
2. Колоски одиночные, расположенные сбоку стебля. Болотистые луга по Амуре, редко в Приморье (с. Зеньковка Сусского района) . . . . . 1.  
— Колоски многочисленные . . . . . 3.  
— Колоски многочисленные . . . . . 2. *C. setiformis* Korsh., *Cyperus setiformis* Schischk. — С. шестигранный.  
— Колоски многочисленные . . . . . 2. *C. pratorum* Korsh., *Cyperus pratorum* Schischk. — С. луговой.  
— Крюющие чешуи 3—3.5 мм дл.; стебли до 25 см выс. расположены пучками; по окраинам моховых болот, по Амуре . . . . . 4.  
— Крюющие чешуи менее 3 мм дл. . . . . 5.  
4. Колоски бледно-зеленые . . . . . 5.

- Колоски красно-бурые (до буро-фиолетовых) или нестрые (чешуи с зеленоватым клеем) . . . . . 7.  
 5. Соцветие в виде нескольких головок на ножках. Песчаные отмели, илистые берега водоемов . . . . . 3. *C. limosus* Maxim., *Pycreus limosus* Schischk. — *C. плавый*.  
 — Колоски скучены в одну головку . . . . . 6.  
 6. Отдельные колоски в соцветии незаметны; Стебли 2—3 см выс. Отмели . . . . . 4. *C. michelianus* (L.) Link, *Scirpus michelianus* L., *Dichostylis micheliana* Nees — *C. Микели*.  
 — Отдельные колоски хорошо заметны; растение более крупное. Отмели . . . . . 5. *C. nipponicus* Franch. et Sav. — *C. японский*.  
 7 (от 4). Соцветие скученное; колоски сидячие, ланцетные; кроющие чешуи светло-бурые, по краям темно-красные, по краю зазубные. Болота, рисовые поля . . . . . 6. *C. eragrostis* Vahl, *Pycreus eragrostis* Palla — *C. ползучка* (табл. 42, 3).  
 — Соцветие антиквидное, с неравными лучами . . . . . 8.  
 8. Колоски красновато-бурые; орешек обращен к оси колоска своим широким краем. Болота, плавни, рисовые поля . . . . . 7. *C. serotinus* Roth., *Juncellus serotinus* Clarke — *C. поздний*.  
 — Колоски темно-фиолетовые; орешек обращен к оси колоска узким краем. Берега, сырые дуга . . . . . 8. *C. nilagiricus* Hochst., *C. fusco-ster* Meisnl., *Pycreus nilagiricus* Schischk. — *C. пильгирский*.  
 9 (от 1). Колоски очень густые, с густо расположенными цветками . . . . . 10.  
 — Колоски редкие, с редко расположенными цветками . . . . . 11.  
 10. Колоски черноватые, в небольшом соцветии, 6—8 мм толщ.; кроющие чешуи с зеленым клеем. Рисовые поля, болота . . . . . 9. *C. difformis* L. — *C. разнородная*.  
 — Колоски бурые; отдельные соцветия 1.2—2 см толщ.; высокое растение, до 80 см выс. Луга, берега водоемов . . . . . 10. *C. glomeratus* L. — *C. скученная* (табл. 42, 1).  
 11 (от 9). Кроющие чешуи с остроконечием, буровато-красные, с зеленым клеем. Отмели, галечники . . . . . 11. *C. amurensis* Maxim. — *C. амурский*.  
 — Кроющие чешуи без остроконечия, более темные. У дорог, берега водоемов, по краям канав . . . . . 12. *C. truncatus* Turcz. — *C. усеченная* (табл. 42, 2).  
 В Амурской области была найдена *C. fuscus* L., отличающаяся от *C. truncatus* Turcz. более мелкими и темными колосками.

## Род 2. KYLLINGA Rothb. — КИЛЛИНГА


Сухие галечные русла; редко . . . . . 1. *K. brevifolia* Rothb. — *K. коротколистная* (табл. 43, 2).

## Род 3. ERIOPHORUM L. — ПУШИЦА

1. Колоски одиночные . . . . . 2.  
 — Колосков несколько . . . . . 4.  
 2. Густошерстистые растения, образующие кочки; волоски летучки белые . . . . . 3.  
 — Растение с одиночными стеблями; волоски летучки розовато-буроватые. Болота, сырые дуга . . . . . 1. *E. russeolum* Fries — *П. рыжеватая*.  
 В низовьях Амура было найдено растение с белыми волосками летучки — *E. chamissonis* C. A. Mey. — *П. Шамиссо*.  
 3. Приветные чешуи серые, до 4 мм дл. Сфагновые болота . . . . . 2. *E. vaginatum* L. — *П. влагалищная*.  
 — Приветные чешуи черноватые, до 1 см дл.; соцветие короче, чем у предыдущего вида. Болота . . . . . 3. *E. brachyantherum* Trautv. — *П. короткопыльничная*.  
 4 (от 1). Цветоносы гладкие. Болота, сырые дуга . . . . . 4. *E. polystachyon* L., *E. angustifolium* Roth., *E. komarovii* V. Vassil. — *П. многоколосный*.  
 — Цветоносы шероховатые . . . . . 5.  
 5. Листья плоские. Болота и болотистые дуга . . . . . 5. *E. latifolium* Horne — *П. широколистная*.  
 — Листья трехмеховые. Торфяные болота . . . . . 6. *E. согнанум* Palla, *E. asiaticum* V. Vassil., *E. gracile* auct., non Koch — *П. корейская* (табл. 43, 3).

## Род 4. TRICHOPOPHUM Pers. — ПУХОНОС

Торфяные болота на севере, гольцы гор . . . . . 1. *T. alpinum* (L.) Pers., *Eriophorum alpinum* L. — *П. альпийский* (табл. 43, 1).



1 — *Cyperus glomeratus* L. (Сыть скученная); а — верхняя часть стебля, б — колосковая чешуя; 2 — *C. truncatus* Turcz. (С. усеченная); а — верхняя часть стебля с соцветиями и листьями, б — колосковая чешуя; 3 — *C. eragrostis* Vahl (С. ползучка); а — верхняя часть стебля с соцветиями и листьями, б — колосковая чешуя.




Таблица 43



1 — *Trichophorum alpinum* (L.) Pers. (Пухонос альпийский): а — верхняя часть стебля с соцветием, б — плод с летучками; 2 — *Kyllinga brevifolia* Rottb. (Киллинга коротколистная); 3 — *Eriophorum coreanum* Palla (Пушица корейская): а — верхняя часть стебля с соцветием, б — плод, в — часть листа.

Таблица 44




1 — *Scirpus triquetra* L. (Камыш трехгранный), верхняя часть стебля с соцветием; 2 — *S. compactus* Hoffm. (К. скупенный).

1. Корни клубневидные, утолщенные; колоски более 1 см дл. . . . . 2.
- Корни тонкие, не утолщенные . . . . . 3.
2. Все колоски сидячие. Болота, берега водоемов . . . . . 1. *S. compactus* Hoffm., *S. maritimus* var. *compactus* Ldb., *Bolboschoenus compactus* Drob. — К. стученный (табл. 44, 2).
- Некоторые или все колоски на ножках. Болота, берега водоемов . . . . . 2. *S. desoullavi* Ktze., *S. maritimus* auct., non L. — К. Десуави.
- 3 (от 1). Однолетники со слабой мочковатой корневой системой . . . . . 4.
- Многолетники с корневыми или подземными побегами . . . . . 6.
4. Колоски на довольно длинных ножках. Заболоченные дуга, берега водоемов . . . . . 3. *S. depauperatus* Kom. — К. обедненный.
- Колоски сидячие, скученные . . . . . 5.
5. Колоски светло-зеленые, яйцевидные, 5–6 мм дл.; стебли около 30 см выс. Отмели . . . . . 4. *S. komarovii* Roshev. — К. Комарова.
- Колоски коричневатые, продолговатые, до 8 мм дл.; стебли до 60 см выс. Болота, рисовые поля . . . . . 5. *S. erectus* Poir. — К. прямой.
- 6 (от 3). Стебли бесшестые; соцветия кажутся боковыми . . . . . 7.
- Стебли шестилучные; соцветия конечные, сильно ветвистые . . . . . 10.
- Стебли цилиндрические; мощные растения, более 1 м выс. . . . . 8.
- Стебли трехгранные . . . . . 9.
8. Рылец 2; орешек плосковатый, двухгранный. В воде у берегов рек, озер . . . . . 6. *S. tabernaemontani* Gmel. — К. Табернаемонтана.
- Рылец 3; орешек трехгранный. В воде у берегов водоемов; в Амурской области . . . . . 7. *S. lacustris* L. — К. озерный.
- 9 (от 7). Влажные при основании стебли без пластинок; все колоски сидячие. Болота, берега, рисовые поля . . . . . 8. *S. mucronatus* L. — К. острокопечный.
- Влажные с трехгранной пластинкой; колоски, хотя бы некоторые, на ножках. Берега водоемов, болота . . . . . 9. *S. triquetus* L. — К. трехгранный (табл. 44, 1).
- 10 (от 6). Колоски около 1 см дл.; щетинки (в числе 6) красноватые, выдаются из кроющих чешуй. Влажные места в высокогорьях; Сучанский район . . . . . 10. *S. maximowiczii* Clarke, *S. japonica* Fern., non Franch. et Sav., *Eriophorum japonicum* Maxim. — К. Максимовича.
- Колоски 7 мм дл. и меньше; щетинки незаметные . . . . . 11.
11. Колоски ржаво-бурые, яйцевидные, около 3 мм дл. Болота, глинистые канавы . . . . . 11. *S. wichurai* Bekt. — К. Вихуры.
- Колоски черновато-зеленые . . . . . 12.
12. Колоски на веточках одиночные, ланцетные, 5–7 мм дл. Сырые дуга, берега водоемов . . . . . 12. *S. radicans* Schk. — К. укореняющийся.
- Колоски до 4 мм дл., скученные на концах веточек; рыльце двураздельное; колоски очень мелкие, 2–3 мм дл., собранные пюмшоту. Влажные дуга, болота . . . . . 13. *S. orientalis* Ohwi — К. восточный.

## Род 6. ELEOCHARIS R. Br. — БОЛОТНИЦА

1. Однолетнее растение с тонкими, мочковатыми корнями; стебли многочисленные, до 15 см выс.; колоски яйцевидные, тупые или почти шаровидные. Отмели . . . . . *E. ovata* (Roth) Roem. et Schult. — Б. яйцевидная.
- Многолетники с подземными побегами . . . . . 2.
2. Плод постепенно переходит в стилоподий; небольшое растение, до 7 см выс., с колосками 2–3 мм дл. Берег моря; очень редко . . . . . 2. *E. parvula* (Roem. et Schult.) Link — Б. маленькая.
- Стилоподий ясно отшнурован от плода . . . . . 3.
3. Мелкие растения, до 15 см выс., с очень тонкими стеблями; плод продольнополосатый, поперечношпильчатый между полосами . . . . . 4.
- Растения более крупные, с более толстыми стеблями; плод гладкий . . . . . 5.
4. Щетинки короче плода или их нет. Берега водоемов, иногда в воде . . . . . 3. *E. acicularis* (L.) Roem. et Schult. — Б. игольчатая (табл. 45, 3).
- Щетинки в 1.5–2 раза длиннее плода. Берега водоемов, у дорог, рисовые поля . . . . . 4. *E. svenssonii* Zinsler. — Б. Свенсона.
- 5 (от 3). Стебли гранитные . . . . . 6.
- Стебли цилиндрические, иногда тонкобороздчатые . . . . . 8.
6. Стебли трехгранные; плод двоякозубчатый, с мохнатыми щетинками. Сырые дуга, болота . . . . . 5. *E. petasata* (Maxim.) Zinsler. — Б. шляпоносная (табл. 45, 2).
- Стебли четырехгранные; плод округло-трехгранный; щетинки не мохнаты . . . . . 7.
7. Стебли нитевидные; щетинки короче плода; стилоподий широкий. Болота, сырые дуга . . . . . 6. *E. maximowiczii* Zinsler. — Б. Максимовича (табл. 45, 1).



1 — *Eleocharis maximowiczii* Zinsler. (Болотница Максимовича); сверху — плод; 2 — *E. petasata* (Maxim.) Zinsler. (Б. шляпоносная); а — верхняя часть стебля и соцветие; 3 — *E. acicularis* (L.) Roem. et Schult. (Б. игольчатая); а — плод; 4 — *E. mamillata* Lindb. f. (Б. сосочковая); а — плод.



- Стебли более толстые; щетинки длиннее плода; стилоподий уже, чем у предыдущего вида. Сырые луга; на юге Хасанского района; редко . . . . . 7. *E. afflata* Steud. — Б. издутая.
- 8 (от 5). Стилоподий по величине почти равен плоду; Нижние щетинки целиком охватывают колосок; довольно тонкое растение, 20—40 см выс. Болота, берега рек . . . . . 8. *E. kamtschatica* (C. A. Mey.) Kom. — *E. sachalinensis* Kom. — Б. камчатская.
- Стилоподий мелкие плоды; нижние щетинки наполовину охватывают колосок . 9.
- 9. Длина стилоподия значительно меньше его ширины; щетинки 5—8, с длинными, оттопыренными зубцами; стебли не толстые, жестковатые, ясно вдоль борозчатые; колосок много толще стебля. Берега рек, луга . . . . . 9. *E. mamillata* Lindb. f., *E. ussuriensis* Zinsler. — Б. сосисковая (табл. 43, 4).
- Длина стилоподия приблизительно равна его ширине; щетинки 4, с небольшими, вниз направленными зубцами; стебли разнообразной толщины, часто довольно толстые; колосок часто не шире стебля. Сырые луга, болота, берега водоемов; часто . . . . . 10. *E. intersita* Zinsler, *E. palustris* auct., non R. Br. — Б. промежуточная.

# Род 7. BULBOSTYLIS Kunth — БУЛЬБОСТИЛИС

Луга; встречается в Хасанском районе; редко . . . . . 1. *B. capillaris* (L.) Nees — Б. волосовидный.

# Род 8. FIMBRISTYLIS Vahl — ФИМБРИСТИЛИС

- 1. Орешек линейнопродолговатый; колоски яйцевидные, многоцветковые. Отмели, илстые берега . . . . . 1. *F. verrucifera* (Maxim.) Makino — Ф. бородавчатый.
- Орешек почти округлый . . . . . 2.
- 2. Кроющие щетинки с отогнутыми наружу остроконечиями; соцветие зонтиковидное, разветвленное. Рысьевые поля, болота . . . . . 2. *F. squarrosa* Vahl — Ф. растопыренный.
- Кроющие щетинки без остроконечий; колоски продолговатые; орешек 0,5 мм дл., гладкий. Илстые берега рек . . . . . 3. *F. leucocarpa* Maxim. — Ф. гладкоплодный.


# Род 9. RHYNCHOSPORA Vahl — ОЧЕРЕТНИК

- 1. Колоски 5—6 мм дл., бесцветные, при плодах слегка буроватые; прицветный лист короче соцветия; щетинки при плодах 9—13, с ресничками при основании. Болота, сырые луга . . . . . 1. *Rh. alba* (L.) Vahl — О. белый.
- Колоски до 4 мм дл., каштановые; прицветный лист длиннее соцветия; щетинки при плодах 6, без ресничек. Болота, берега рек; на юге; редко . . . . . 2. *Rh. lauriei* Franch. — О. Фори.

# Род 10. CAREX L. — ОСОКА

- 1. Колоски одиночные наверху стебля . . . . . 2.
- Колосков на стебле несколько . . . . . 10.
- 2. Растение двудомное; стебли тонкие, почти волосовидные, цилиндрические; листья щетиновидно свернутые. Болота, сырые луга . . . . . 1. *C. gynocrates* Wormsk. — О. женосныная.
- Растения однодомные . . . . . 3.
- 3. Рылец 2; стебли округло-трегранные, 20—30 см выс.; листья щетиновидные. Сырые луга, болота . . . . . 2. *C. capitata* L. — О. головчатая.
- Рылец 3 . . . . . 4.
- 4. Щетинки пестичных цветков охватывающие . . . . . 5.
- Щетинки пестичных цветков остающиеся . . . . . 9.
- 5. Мешочки шпоровидно-завертные, вниз отогнутые; стебли тонкие, 10—30 см выс.; листья 1—1,5 мм шир. Торфяные болота . . . . . 3. *C. pauciflora* Light. — О. малоцветковая.
- Мешочки яйцевидные или яйцевидно-ланцетные . . . . . 6.
- 6. Стебли четырех-пятигранные, очень тонкие; растение густодернистое; листья до 1 мм шир. Сырые луга . . . . . 4. *C. jankowskii* Gorodk. — О. Янковского (табл. 46, 1).
- Стебли трехгранные . . . . . 7.
- 7. Колосковые щетинки тупые; мешочки 2—3 мм дл., стебли 10—20 см выс.; листья до 1 мм шир. Моховые болота . . . . . 5. *C. chosensis* Ohwi — О. чосенская.
- Колосковые щетинки острые; мешочки 3—4 мм дл. . . . . 8.

Таблица 46



1 — *Carex jankowskii* Gorodk. (Осика Янковского); 2 — *C. capituliformis* Meinh. (О. головчатая); колосок; 3 — *C. ussuriensis* Kom. (О. уссурийская); а — соцветия, б — лист; 4 — *C. siderosticta* Hance (О. рванопылистная); а — колосковая щетинка, б — мешочек.

8. Стебли остро-шероховатые; в дернинах много беловатых пропильных листьев. Листовые и смолчатые. . . . . 6. *C. capituliformis* Meish. — О. головоквидная (табл. 46, 2).
- Стебли гладкие; пропильные листья в дернинах не бросаются в глаза. Сырые дуга и леса. . . . . 7. *C. uida* Maxim. — О. можажника.
- 9 (от 4). Листья шероховатые, 1,5–2 мм шир.; колосковые чешуи острые. Сухие склоны, основные леса. . . . . 8. *C. obtusata* Liljeb. — О. притупленная.
- Листья более или менее гладкие; колосковые чешуи тупые, светлые; меточки 2–2,5 мм дл. Голыш; по Аугуру. . . . . 9. *C. allicola* Popl. ex Sukacz. — О. высокогорная.
- 10 (от 1). Колоски обоюдоные (если раздельнополюсы, то пыльниковые колоски находятся в середине соцветия) или растения двудомные. . . . . 11.
- Колоски раздельнополюсы, пыльниковые колоски находятся наверху стебля (реже двупольные), ниже пестичные. . . . . 34.
11. Растения двудомные; меточки очень крупные, 10–13 мм дл.; приземистые, темно-зеленые растения приморских песков. . . . . 12.
- Растения однодомные; меточки значительно мельче, до 7 мм дл. . . . . 13.
12. Меточки 3–3,5 мм шир. Приморские пески; в Хасавском районе. . . . . 10. *C. kobomugi* Ohiwi — О. кобомуги.
- Меточки 4,5–5,5 мм шир. Приморские пески; широко распространенное растение. . . . . 11. *C. macrocephala* Willd. — О. большоголового.
- 13 (от 11). В верхней части колоска цветки тычиночные или колоски раздельнополюсы. . . . . 14.
- В верхней части колоска цветки пестичные. . . . . 25.
14. Колоски сильно расставленные, в числе 2–4, малочетовые; стебли слабые, ползучие. Леса, кустарники. . . . . 12. *C. dispersa* L. — О. рассеянная.
- Колоски более или менее скученные, в большем числе и более многоцветковые. . . . . 15.
15. Колоски, хотя бы частично, раздельнополюсы; в средней части соцветия помещаются тычиночные цветки, в верхней и нижней — пестичные или смешанные. Сырые дуга, кустарники. . . . . 13. *C. lithophila* Turcz. — О. камнелюбивая.
- Все колоски обоюдоные. . . . . 16.
16. Стебли ветвистые, с вертикальными побегими из узлов, часто растут в воде. . . . . 17.
- Стебли не ветвистые. . . . . 18.
17. Растение покрыто мелчайшими сосочками, заметными в лупу. Болота, водоемы. . . . . 14. *C. pseudo-caucaica* Fr. Schmidt — О. ложнокавказская.
- Растение гладкое. Моховые болота. . . . . 15. *C. chordorhiza* Ehrh. — О. стенокоренная.
- 18 (от 16). Стебли до 4 мм толщ.; колоски ветвистые. Сырые леса. . . . . 16. *C. stipata* Muehl. — О. стесненная.
- Стебли гораздо тоньше, до 2 мм толщ.; колоски не ветвистые. . . . . 19.
19. Растения с удлиненными корнями; стебли одиночные. . . . . 20.
- Растения густодеревистые, подземных побегов нет; стеблей помногу в одном кусте. . . . . 21.
20. Соцветие густое, головчатое, яйцевидной формы, до 1 см дл.; серо-зеленое растение до 15 см выс. Степи, сухие склоны. . . . . 17. *C. duriuscula* C. A. Mey. — О. твердочетовая.
- Соцветие более редкое, если густое, то гораздо более длинное. . . . . 24.
21. Кроющие чешуи светлые; меточки 5–6 мм дл.; корневище с дуговидной корой. В светлых лесах. . . . . 18. *C. pallida* C. A. Mey. — О. бледная.
- Кроющие чешуи ржавые; меточки 3,5–4 мм дл.; корневище с неотстающей корой. Растение приморских песков. . . . . 19. *C. arenicola* Fr. Schmidt — О. песчаная.
- 22 (от 19). Приветные листья во много раз длиннее соцветия; стебли тыпогнати, совершенно гладкие. Сырые дуга, берега водоемов. . . . . 20. *C. neurogaster* Maxim. — О. жидкоплодная.
- Приветные листья не длиннее соцветия; стебли острогранатные, шероховатые. . . . . 23.
23. Болотное растение с бурными безлиственными влагалищами внизу стебля; орешки колючие. . . . . 21. *C. diandra* Schrank — О. дутычничковал.
- Растения сухих мест со светлыми влагалищами; орешки перепончатые. . . . . 24.
24. Соцветие около 1 см толщ., очень густое, со сливающимися колосками; кроющие чешуи бурые; растение до 50 см выс. Сырые леса и дуга. . . . . 22. *C. isorhyncha* C. A. Mey. — О. гладкоколючая.
- Соцветие 0,5 см толщ., более редкое (отдельные колоски хорошо различаются); кроющие чешуи более светлые; растение до 30 см выс. На юге Приморья. . . . . 23. *C. laevissima* Nakai — О. гладчайшая.
- 25 (от 13). При соцветии имеется прицветный лист, превышающий все соцветие. . . . . 26.
- Прицветных листьев нет или они только нижнего колоска. . . . . 27.
26. Колоски тесно скученные в головку. Иловатые берега водоемов. . . . . 24. *C. euproides* Murr. — О. сытевидная.

- Колоски сильно расставленные. В камнях, трещинах скал. . . . . 25. *C. tenuiflora* Wahl. — О. раздвинутая.
- 27 (от 25). Меточки более или менее крылатые. . . . . 29.
- Меточки не крылатые. . . . . 29.
28. Стебли тонкие, 20–40 см выс., одиночные; корневища ползучие. На дугах. . . . . 26. *C. diplosacra* Krecz. — О. большеплодная.
- Растение дернистое, со многими стеблями, 30–60 см выс. На иловатых местах. . . . . 27. *C. taackii* Maxim. — О. Маяка.
- 29 (от 27). Меточки 3,5–4 мм дл.; пыльниковые колоски скученные, с несколько растопыренными меточками. Леса, торфяные болота. . . . . 28. *C. pseudo-loliacea* Fr. Schmidt — О. ложнолиловая.
- Меточки 1,5–3 мм дл., яйцевидные или эллиптические. . . . . 30.
30. Колоски малочетовые, почти шаровидные; чешуи бледные; меточки без волоса. . . . . 31.
- Колоски более или менее удлиненные, более многоцветковые. . . . . 32.
31. Соцветие скученное в яйцевидно-продолговатую головку, до 1,5 см дл.; стебли 20–40 см выс. Моховые болота, леса. . . . . 29. *C. tenuiflora* Wahl. — О. тонкоцветовая.
- Соцветие расставленное, 1,5–3 см дл. Торфяники, леса. . . . . 30. *C. loliacea* L. — О. илевая.
- 32 (от 30). Меточки 1,5–2 мм дл., внезапно суживающиеся в очень короткий, гладкий носик; чешуи бледные. Болота, болотистые дуга. . . . . 31. *C. lapponica* O. F. Lang — О. лапландская.
- Меточки 2,2–2,7 мм дл., постепенно суживающиеся в более длинный, шероховатый носик. . . . . 33.
33. Носик удлиненный, до основания расщепленный. Луга, болота. . . . . 32. *C. brunneus* Poir. — О. буроватая.
- Носик короче, чем у предыдущего вида, короткопечетчатый на конце. Луга, болота. . . . . 33. *C. canescens* L. — О. сероватая.
- 34 (от 10). Носик меточки короткий, в 5–10 раз короче меточки. . . . . 35.
- Носик меточки длинный, равен ему, длиннее или в 4 раза короче. . . . . 36.
35. Рылец 2. . . . . 36.
- Рылец 3. . . . . 37.
36. Пестичные колоски сидячие или на коротких ножках, прямые. . . . . 37.
- Пестичные колоски на более или менее длинных ножках, повислые. . . . . 41.
37. Колоски скучены наверху стебля почти двоякообразно, верхний (реже все) обоюдополюс. Болота, голыш. . . . . 34. *C. eleusoides* Turcz. ex Bess. — О. элевусовидная.
- Колоски более или менее расставленные, верхние тычиночные, пестичные. . . . . 38.
38. Стебель под соцветием гладкий, наверху повислый; ножка нижнего пестичного колоска до 2 см дл., нижний прицветный лист не более своего колоска, на голышах и высокогорьях. . . . . 35. *C. rigidoides* Gorodk. — О. жестковатая.
- Стебель под соцветием шероховатый. . . . . 39.
39. Меточки вздутые, округло-яйцевидные. Луга, болота. . . . . 36. *C. schmidtii* Meish. — О. Шмидта.
- Меточки вздутые, плоские или двояковыпуклые. . . . . 40.
40. Нижние влагалища пурпурно-бурые, блестящие; листья 2–4 мм шир., нижний прицветный лист едва равен своему колоску, реже чуть длиннее. Луга, болота. . . . . 37. *C. rubra* Lévl. et Vaniot — О. красная.
- В нашей области чаще растет близкий вид — *C. minuta* Franch. с более узкими, жесткими листьями и пенелло-серыми меточками.
- Нижние влагалища желто-бурые или светло-каштановые; нижний прицветный лист много длиннее своего колоска, часто равен всему соцветию. Луга, болота, берега рек. . . . . 38. *C. appendiculata* Kük. — О. придатковая.
- *C. squamigera* Krecz. et Luchnik, произрастающая по р. Суйфуну, отличается от *C. appendiculata* по краю пыльниковых меточками, коротке чешуй.
- 41 (от 36). Колоски расположены пучками; стебли вислые, до 1 м выс. Берега рек, отмыли. . . . . 39. *C. luminensis* Kom. — О. туминская.
- Колоски сидят поодиночке. . . . . 42.
42. Влагалища при основании стебля желтоватые. . . . . 40. *C. middendorffii* Fr. Schmidt — О. Миддендорфа.
- Влагалища при основании стебля красные или темно-бурые; меточки 2–3,5 мм дл. . . . . 43.
43. Кроющие чешуи в 2–3 раза превышают меточки; пестичные колоски часто наверху пыльниковые. Болота, влажные дуга. . . . . 41. *C. erythrogastra* C. A. Mey. — О. скарлатовидная.



- Кроющие чешуи ржавые, равны меточкам или не более чем в 2 раза превышают их; стебли 45—70 см выс. Песчаные берега; на юге . . . . . 42. *C. sulfureus* Kom. — *O. суйфунская*.
- 44 (от 35). Листья зашпеченные, до 3 см шир.; стебли сидонутые. Смешанные леса, на перегнойной почве . . . . . 43. *C. siderosticta* Hance — *O. равниннолистная* (табл. 46, 4).
- Листья линейные, более узкие; стебли трехгранные . . . . . 45.
45. Верхний колосок обоюдопый, с пестичными цветками наверху колоска; колоски повисающие . . . . . 46.
- Верхний колосок с тычиночными цветками . . . . . 47.
46. Кроющие чешуи каштановые, более или менее остистые на конце; растение 30—60 см выс. Лукайки у морских побережий . . . . . 44. *C. gmelinii* Hook. et Arn. — *O. Гемелина*.
- Кроющие чешуи светлые, шиновато заостренные; растение 40—60 см выс. Леса, трещины скал . . . . . 45. *C. peiktusani* Kom. — *O. пейкутанская*.
- 47 (от 45). Меточки голые . . . . . 48.
- Меточки волосистые . . . . . 60.
48. Нижний прицветный лист без влагалища . . . . . 49.
- Нижний прицветный лист с более или менее длинным влагалищем . . . . . 53.
49. Меточки резко ребристые; чешуи темно-красные; листья до 2 мм шир.; нижние влагалища ярко-красно-красные. Луга, склоны . . . . . 46. *C. glauciformis* Meish. — *O. ложносерая*.
- Меточки гладкие или с выступающими жилками . . . . . 50.
50. Меточки янчно-желтые, яркие, лоснящиеся; чешуи светло-бурые; высота растения 20—40 см, листья 1—2 мм шир. Сухие склоны, лукайки . . . . . 47. *C. korshinskyi* Kom. — *O. Коржинского*.
- Меточки с блестящими, чешуи темные . . . . . 51.
51. Меточки по краю шероховатые; чешуи безостые; высота растения 40—60 см; листья 3—6 мм шир. На горах высокогорий . . . . . 48. *C. podocarpa* R. Br. — *C. korshinskyi* Meish. — *O. пожизнолистная*.
- Меточки по краю гладкие . . . . . 52.
52. Колоски расставленные, узкоцилиндрические; высота растения 30—60 см; листья 2—3 мм шир. По лесным ручьям . . . . . 44. *C. augustowiczii* Meish. — *O. Августовича*.
- Колоски скученные, яйцевидные или продолговатые; высота растения 30—50 см; листья до 1 мм шир. Болота, сырые луга . . . . . 49. *C. meyeriana* Kunth — *O. Мейера*.
- 53 (от 48). Меточки твердые, кожистые . . . . . 54.
- Меточки тонкие, переполчатые . . . . . 56.
54. Прицветный лист без пластинок; чешуи бледные, почти белые; листья и стебли волосовидные; влагалища внизу стебля буровато-жестоватые. Леса . . . . . 50. *C. ussuriensis* Kom. — *O. уссурийская* (табл. 46, 3).
- Прицветный лист с пластинкой . . . . . 55.
55. Влагалища нижнего прицветного листа 1—2 см дл.; стебель 20—40 см выс; листья плоские, 1—2 мм шир. Моховые болота, берега рек . . . . . 51. *C. laxa* Wahl. — *O. рыхлая*.
- Влагалища нижнего прицветного листа 2—5 мм дл.; стебель 20—50 см выс; листья желобчато сложенные, килеватые. Моховые болота . . . . . 52. *C. himala L.* — *O. толстая*.
- 56 (от 53). Растение 50—70 см выс.; пестичные колоски тонкие, длинные, до 10 см дл.; листья 3—5 мм шир. В лесах . . . . . 53. *C. blunensis* Kom. — *O. блунская*.
- Небольшие растения с редкими колосками до 2 см дл. . . . . 57.
57. Стебли и листья волосовидные; верхние колоски внизу с пестичными цветками. Моховые болота . . . . . 54. *C. sedakowii* C. A. Mey. — *O. Седанова*.
- Листья плоские; верхние колоски тычиночные . . . . . 58.
58. Чешуи пестичных колосков резко-бурые; листья 3—4 мм шир. В лесах . . . . . 55. *C. tenuiformis* Lev. et Vaniot (C. korshinskyi Kom.) — *O. корейская*.
- Чешуи пестичных колосков бесцветные . . . . . 59.
59. Меточки 2—2.5 мм дл., быстро суженные наверху; пыльниковые колоски почти не возвышаются над пестичными. Луга; в Амурской области . . . . . 56. *C. karoi* Frey. — *O. Каро*.
- Меточки 3—3.5 мм дл., постепенно суженные наверху; пыльниковые колоски возвышаются над пестичными. Болота . . . . . 57. *C. lenacensis* Kük. — *O. ленская*.
- Возможно, оба последние вида идентичны широко распространенной *C. capillaris* L.
61. Листья почти волосовидные, около 0.5 мм шир., во много раз длиннее стебля; хвойные леса . . . . . 58. *C. callitrichos* V. Krecz. — *O. красное*.
- Листья не уже 1 мм . . . . . 62.
62. Внизу стебля имеются ярко-красные бесцветные влагалища; меточки 4—5 мм дл. В лесах . . . . . 59. *C. quadrifloro* Ohwi — *O. четырехцветная*.
- Бесцветных влагалищ внизу стебля нет; меточки 2—3 мм дл. . . . . 63.
63. Листья 10—15 см дл., 1 мм шир., много длиннее стебля. Сухие склоны . . . . . 60. *C. nanella* Ohwi — *O. изящная*.
- Бодле высокие растения с листьями не уже 1.5 мм . . . . . 64.
64. Ось пестичных колосков зигзагообразно изогнута; прицветный лист без пластинок. Сухие склоны . . . . . 61. *C. lanceolata* Boott — *O. заширенная*.
- Ось пестичных колосков прямая; прицветный лист с пластинкой . . . . . 65.
65. Пыльниковый колосок крупный, значительно превышает пестичные; стебли под соцветием гладкие; листья длинные стебли (по крайней мере старые); меточки с резкими жилками. Сухие склоны . . . . . 62. *C. subcuneata* Kom. — *O. сучковатая*.
- Пыльниковый колосок слабо развит, не превышает пестичных . . . . . 66.
66. Стебель под соцветием шероховатый, нижние влагалища часто красные. В лесах . . . . . 63. *C. reventa* V. Krecz. — *O. возматричная*.
- Стебель под соцветием гладкий; нижние влагалища бурые; листья коротко стебли; меточки без жилок. Стены, каменные склоны; на западе Амурской области . . . . . 64. *C. pediformis* C. A. Mey. — *O. стеновидная*.
- 67 (от 60). Колоски сидчие; носик прицветный лист без влагалища . . . . . 68.
- Колоски на ножках, нижний прицветный лист с влагалищем . . . . . 72.
68. Меточки с резкими жилками . . . . . 69.
- Меточки без жилок . . . . . 70.
69. Нижние влагалища ярко-красные; растение до 50 см выс., с ползучим корневищем. Болота, луга . . . . . 65. *C. globularis* L. — *O. круглая*.
- Густодернистые, до 20 см выс. растение с красновато-бурыми, малозаметными влагалищами. Сухие склоны . . . . . 66. *C. ulobasis* V. Krecz. — *O. курчавая*.
- 70 (от 68). Нижние прицветный лист чешуевидный, иногда с шловодным окаймлением; нижние влагалища пурпуровые; высота растения 15—40 см. Светлые леса, склоны . . . . . 67. *C. vanheurekii* Muell. Arg. — *O. Ван-Хьюрия*.
71. Меточки 2 мм дл.; высота растения 20—50 см; листья 1—1.5 мм шир. Горные леса . . . . . 68. *C. chinganensis* Litw. — *O. хинганская*.
- Меточки 3—3.5 мм дл.; высота растения 15—30 см. Основные леса, каменистые склоны . . . . . 69. *C. angustensis* Fr. Schmidt — *O. амурская*.
- 72 (от 67). Меточки 5—6.5 мм дл.; колоски расставленные, с 4 см дл.; листья коротко стебли. Травянистые склоны . . . . . 70. *C. tasorum* Kom. — *O. тазовская*.
- Меточки 2—4 см дл. . . . . 73.
73. Колоски остистые, бледно-зеленые (чешуи бесцветные, с зеленым килем); высота растения 20—40 см; листья 2—3 мм шир. Открытые склоны . . . . . 71. *C. leucochlora* Bge. — *O. бледно-зеленая*.
- Колоски не остистые . . . . . 74.
74. Нижние влагалища сильно волокнисто расщепленные . . . . . 75.
- Нижние влагалища цельные или почти цельные; колоски более или менее скученные наверху стебля; чешуи бурые; высота растения 10—25 см; листья 1.5—2.5 мм шир. Сухие леса, склоны . . . . . 72. *C. nervata* Franch. et Sav. — *O. жилковатая*.
75. Ножки колосков не длиннее 5 мм; меточки 2—2.5 мм дл., зеленые; чешуи бледные; листья 1—1.5 мм шир. Сухие склоны, светлые леса . . . . . 73. *C. hypochlora* Frey. — *O. зеленая*.
- Ножки нижних колосков длиннее 1 см; меточки 3—4 мм дл., буроватые; чешуи ржавые; листья 2—3 мм шир. . . . . 74. *C. subcuneata* Ohwi — *O. малоприцветниковая*.
- 76 (от 34). Меточки волосистые . . . . . 77.
- Меточки голые или только сверху слабо опушенные . . . . . 78.
77. Листья щетиновидно свернутые, 1—2 мм шир. Высота растения 60—100 см. Болота . . . . . 75. *C. lasiocarpa* Ehrh. — *O. волосистоплодная*.
- Листья плоские, 2.5—4 мм шир.; высота растения 30—60 см. Озунки, поляны . . . . . 76. *C. mundicarpa* Meish. — *O. маньчжурская*.
- 78 (от 76). Колоски многочисленные (до 10); рыльца 3—5 мм шир. Сырые леса . . . . . 77. *C. hostrichostigma* Maxim. — *O. курчанорыльцевая*.
- Колоски в меньшем числе; рыльца короче . . . . . 79.
79. Рылец 2 . . . . . 80.
- Рылец 3 . . . . . 81.
80. Колоски сидчие; носик меточка глубоко дугообразный; меточки 4 мм дл.; высота растения 60—80 см; листья 3—5 мм шир.; влагалища в основании стебля глян-



- нисто-бурые, сетчато расчленившиеся. Болота, берега рек . . . 78. *C. forficula* Franch. et Sav. — О. уховертка.
- Колоски на почках, цилиндрические, до 3 см дл.; носик метелки едва выемчатый; метелки 4—4,5 мм дл., гладкие. Болота, зарастающие берега . . . 79. *C. procerula* V. Krecz. — О. вытянутая.
- 81 (от 79). Нижние прицветный лист без влагалища . . . 82.
- Нижние прицветный лист с влагалищем . . . 83.
82. Стебли сильно сжатые почти крыловидно . . . 84.
- Стебли трехгранные . . . 85.
83. Листья серо-зеленые, жесткие, до 1 см шир.; нижние влагалища красные; высота растения 60—100 см. Болота, берега рек . . . 80. *C. dispallata* Boott — О. расходящаяся.
- Листья зеленые, мягкие . . . 84.
84. Метелки 3,5—4 мм дл. с загнутым носиком; листья до 1 см шир.; нижние влагалища сетчатые; высота растения 40—50 см. Леса . . . 81. *C. paniculmis* Kom. — О. плоскостебельная.
- Метелки 5—5,5 мм дл.; листья до 7 мм шир.; высота растения 25—40 см. Растет в воде . . . 82. *C. mollissima* Christ ex Schütz — О. мягчайшая.
- 85 (от 82). Небольшое растение 10—30 см выс.; листья щетинковидные, 1—1,5 мм ширины; стебли гладкие. Моховые болота, топи . . . 83. *C. rotundata* Wahl. — О. кругловатая.
- Крупные растения 60—100 см выс.; листья шире . . . 86.
86. Метелки продолговатые, оттопыренные от оси колоска; листья до 15 мм шир. Болота, берега водоемов . . . 84. *C. rhynchophylla* C. A. Mey. — О. вудзюновская.
- Метелки косо вверх направленные; листья уже . . . 87.
87. Нижние влагалища безлистные, красные, волокнисто расчленившиеся; колоски до 4 см дл.; растение зеленое. Болота, берега водоемов . . . 85. *C. vesicata* Meinh. — О. пухляковатая.
- Нижние влагалища без волокон; колоски до 8 см дл.; растение серо-зеленое. Берега, болота . . . 86. *C. inflata* Huds., *C. utriculata* Boott — О. мешочковая.
- 88 (от 81). Метелки колючие . . . 89.
- Метелки переполчатые . . . 93.
89. Метелки с жидкими, широкояйцевидными или яйцевидными, 4,5—5,5 мм дл.; листья плоские, 2—3 мм шир.; высота растения 50—70 см. Только в Хасанском районе . . . 87. *C. gothi* Ohwi, *C. haematostachys* Lev. et Vaniot — О. Гого, О. кровавоколосая.
- Метелки продолговатояйцевидные или ланцетные . . . 90.
90. Метелки с вдавненными жилками . . . 91.
91. Метелки с выступающими жилками . . . 92.
92. Растение неустойчивое, 10—20 см выс.; листья в несколько раз длиннее стебли; влагалища внутри стебля светло-бурые. Морские побережья . . . 88. *C. pumila* Thunb. — О. малорослая.
- Луговое растение 30—50 см выс.; нижние влагалища красные. Морские побережья . . . 89. *C. scabrifolia* Steud. — О. шершаволистная.
- 92 (от 90). Метелки 6 мм дл., постепенно сужившиеся в тонкий, глубоко дугообразный носик; высота растения 50—70 см; листья 2—4 мм шир. Болота и болотистые луга . . . 90. *C. kirgizica* Kom. — О. киргизская.
- Метелки 5 мм дл., быстро сужившиеся в короткий, слабо выемчатый носик; высота растения 60—80 см; листья 4—8 мм шир. Морские побережья . . . 91. *C. rugifolia* Kük. — О. морщинистая.
- 93 (от 88). Метелки ланцетно-ланцетные, очень густо сжатые (колоски имеют вид щетки — ежика); колоски скучены вверх стебля; высота растения 40—60 см; листья 7—12 мм шир. Берега водоемов . . . 92. *C. sarcocornis* Meinh. — О. козерогая.
- Метелки шире, в стебле густо расположенные . . . 94.
94. При основании стебля имеются обильные волокна — остатки прежних листьев . . . 95.
- Волокон нет или почти нет . . . 96.
95. Колоски примосточные, малоцветковые, короткие (около 1 см дл.); растение 15—25 см выс. Леса, кустарники . . . 93. *C. longirostrata* C. A. Mey. — О. длинноносая.
- Колоски похлупные, многоцветковые, 3 см дл.; растение 50—60 см выс. . . 94. *C. arnellii* Christ ex Schütz — О. Арнелли.
- 96 (от 94). Пестичные колоски редкоцветковые . . . 97.
- Пестичные колоски густоцветковые . . . 101.
97. Растения ввиду с пурпурными, безлиственными влагалищами . . . 98.
- Растения не имеют безлистных влагалищ . . . 99.
98. Листья 5—10 мм шир., с волосками, жесткие; метелки 4—5 мм дл.; высота растения 40—60 см. В лесах . . . 95. *C. campylobasis* V. Krecz. — О. приносящая.
- Листья голые, мягкие; метелки 6—7 мм дл.; высота растения 50—70 см. Лиственные леса . . . 96. *C. oligostachys* Meinh. ex Maxim. — О. малозолотая.

- 99 (от 97). Носик метелки хоботобразно согнутый; высота растения 30—60 см; листья 3—6 мм шир. Леса, кустарники. 97. *C. falcata* Turcz. — О. серповидная.
100. Носик метелки шероховатый; стебли в основании расширенный; высота растения 30—50 см; листья 5—10 мм шир. Леса . . . 98. *C. xiphioides* Kom. — О. мечевидная.
- Носик метелки гладкий; тычиночные колоски в 2 раза и более крупнее пестичных; высота растения 20—40 см; листья 3—6 мм шир. Суховатые луга . . . 99. *C. papillosa* Boott, *C. nikolskensis* Kom. — О. осыпая.
- 101 (от 96). Тычиночный колосок 1; светло-зеленое растение 30—50 см выс.; листья 4—7 мм шир. Лесные луга, кустарники . . . 100. *C. latispauca* Kom. — О. широкопестичная.
- Тычиночных колосков несколько . . . 102.
102. Пестичные колоски густые, толстые; чешуи не оттопыренные; метелки 6—9 мм дл. постепенно сужившиеся в носик. Болота, берега водоемов . . . 101. *C. orthostachys* C. A. Mey. — О. призматическая.
- Очень крупные экземпляры этого вида с листьями до 10 мм шир., встречающиеся в одном месте близ с. Копрятенкова, были описаны под названием *C. pergrandis* Krecz. et Luchnik.
- Пестичные колоски не столь густые, довольно узкие, чешуи оттопыренные; метелки 4—6 мм дл., быстро суживающиеся в носик. Болота . . . 102. *C. sordida* Cham., *C. amurensis* Kük., *C. drymophila* Turcz. — О. грязная.

## Сем. 25. ARACEAE Neck. — АРОИДНЫЕ

1. Листья линейные или мечевидные, без расчленения на черешки и пластинки . . . Род 1. *ACORUS* L. — Аир.
2. Листья не линейные, а более или менее выраженным черешком . . . 2.
3. Листья длаевидно- или перисторассеченные . . . Род 5. *ARISAEA* Martin — Аризем.
4. Листья цельные . . . 3.
5. Листовая пластинка блестящая, 5—10 (15) см дл. и 5—10 см шир. . . Род 2. *CALLA* L. — Белокрыльник.
6. Пластинки листьев матовые, крупные 40—100 (120) см дл. и 20—35 (40) см шир. . . 4.
7. Листья сердцевидные или сердцевидно-овальные, крыло початка темно-красное, кожистое . . . Род 3. *SYMPLOCARPUS* Salisb. — Симпlocarpus.
8. Листья продолговатые или широкоовальные, до 100—120 см дл. и до 30—35 см шир.; крыло початка белое . . . Род 4. *LYSICHTON* Schott — Лизихитон.

### Род 1. ACORUS L. — АИР

Корневище и листья с приятным запахом; початок цилиндрический, с зеленоватыми жидкими обильными цветками, с листовым крылом, которое кажется продолжением стебля. По берегам озер и стариц . . . 1. *A. calamus* L. — Аир, Приый корень.

### Род 2. CALLA L. — БЕЛОКРЫЛЬНИК

Листья длинночерешковые; крыло початка белое. На болотах и зарастающих водоемах (обычно в воде) . . . 1. *C. palustris* L. — Б. болотный.

### Род 3. SYMPLOCARPUS Salisb. — СИМПЛОКАРПУС


Все растение с характерным чесночным запахом; крыло початка закрывает соцветие, оно темно-красное, а при отцветании становится почти черным. В лесах, на сырых болотистых участках . . . 1. *S. foetidus* Salisb. — С. вонючий (табл. 47).

### Род 4. LYSICHTON Schott — ЛИЗИХИТОН

Листья в прикорневой розетке; листовые черешки крылатые, длинные, 15—45 см; крыло початка белое и соцветия не закрывает. В сырых лесах по ручьям и на болотистых лугах; близ устья Амура . . . 1. *L. camtschulense* (L.) Schott — Л. камчатский.



Таблица 47




*Symplocarpus foetidus* Salisb. (Симилокарпус вонючий), соцветие:  
а — вид спереди, б — вид сбоку.

Род 5. *ARISAEMA* Martius — АРИЗЕМА

1. Листья с 3—5 обратноовальными или овально-ланцетными долями; цветоносный стебель 20 (30) см выс., одноплодный. В смешанных и лиственных лесах, преимущественно в долинах . . . 1. *A. amurense* Maxim. — А. амурская (табл. 48).

Таблица 48



*Arisaema amurense* Maxim. (Аризема амурская).

- Листья с 5—11 узкими, продолговатыми или удлинено-ланцетными долями; цветоносный стебель 30—50 см выс., с темными полосами и пятнами. В лесах; только на юге Приморья . . . . . 2. *A. japonicum* Blume — А. японская.  
Клубни обоих видов и их плоды ядовиты и вызывают сильные воспаления («ожоги») слизистой оболочки.

Сем. 26. *LEMNACEAE* S. Gray — РЫСКОВЫЕ

1. Корешки отходят от листообразного стебля пучками . . . . . Род 1. *Spirodela* Schleid. — Многокоренник . . .  
— Корешки отходят от листообразных стеблей по одному или их нет . . . . . Род 2. *Lemna* L. — Риска.

Род 1. SPIRODELA Schleid. — МНОГОКОРЕННИК

Листообразные стебли, плавающие на поверхности воды, округлые или обратно-яйцевидные, 4—6 мм дл. и 3—5 мм шир., сверху зеленые, снизу красновато-фиолетовые, с заметными полосами. В стоячих и медленно текущих водах . . . . . 1. *S. polyrrhiza* (L.) Schleid. — М. обыкновенный.

Род 2. LEMNA L. — РЫСКА

1. Листообразные стебли широколанцетные или тройчато рассеченные, с боковыми долями, перпендикулярными центральной, 4—9 мм дл., полупрозрачные, погруженные в воду и только во время цветения находящиеся на поверхности воды; корней мало или они отсутствуют. В стоячих водах . . . . . 1. *L. trisulea* L. — Р. тройчатая.
- Листообразные стебли широкоэллиптические, яйцевидные или почти округлые, 2—5 мм дл., толстые, непрозрачные, плавающие на поверхности воды; цветет с мая до осени. В стоячих водах старца . . . . . 2. *L. minor* L. — Р. маленькая.

Сем. 27. ERIOCAULACEAE Desv. — ШЕРСТЕТЕБЕЛЬНИКОВЫЕ

Род 1. ERIOCAULON L. — ШЕРСТЕТЕБЕЛЬНИК

1. Головки узкие, бокальчатые, с немногочисленными (около 10) цветками. На сырых лугах . . . . . 1. *E. decemflorum* Maxim. — Ш. десятицветковый.
- Головки подушаровидные . . . . . 2.
2. Головки многоцветковые (30—80 цветков); доли обертки широкие, округлые, значительно короче головки. На речных отмелях . . . . . 2. *E. tobianus* (Maxim.) Makino — Ш. мощный.
- Доли обертки равны головке или же лишь немного короче ее . . . . . 3.
3. Листья 3—4 (7) мм шир. или около 10 см дл.; листочки обертки желтоватые. На отмелях; часто . . . . . 3. *E. ussuriense* Koern. — Ш. уссурийский (табл. 49, 4).
- Листья всего до 2 мм шир.; листочки обертки беловатые. На приморских болотах . . . . . 4. *E. chinorossicum* Kom. — Ш. китайско-русский (табл. 49, 1).

Сем. 28. COMMELINACEAE Reichb. — КОММЕЛИНОВЫЕ

1. Цветки ярко-синие, соцветие с влагалищным, листовидным прицветником; растения сухолюбивые . . . . . Род 1. *Commelina* L. — Коммелина.
- Цветки бледные, розоватые, соцветие без влагалищного прицветника; растения полуводные . . . . . Род 2. *Aneilema* R. Br. — Анейлема.

Род 1. COMMELINA L. — КОММЕЛИНА

Стебли и листья сочные, стебли легко укореняются. На речных галечниках, у скал и россыпей и как сорное, особенно на огородах (является карантинным сорняком) . . . . . 1. *C. communis* L. — К. обыкновенная (табл. 50, 1).

Род 2. ANEILEMA R. Br. — АНЕЙЛЕМА


Стебли слабые; цветки мелкие, беловатые или бледно-розовые. На илистых отмелях, часто наполовину погруженные в воду . . . . . 1. *A. keiskei* Hassk. — А. Кейсака (табл. 50, 2).

Сем. 29. PONTEDERIACEAE Kunth — ПОНТЕДЕРИЕВЫЕ

Род 1. MONOCHORIA Presl — МОНОХОРИЯ

1. Листья сердцевидные; цветки крупные, ярко-синие, в колосчатой кисти. В стоячих водоемах; на юге Приморья . . . . . 1. *M. korsakowii* Rgl. et Maack — М. Корсакова (табл. 49, 3).
- Листья ланцетовидные; все растение более мелкое, кисти малоцветковые. В стоячих мелких водоемах; на юге Приморья . . . . . 2. *M. plantaginifolia* (Roxb.) Kunth — М. подорожниковая (табл. 49, 2).

Таблица 49



1 — *Eriocaulon chinorossicum* Kom. (Шерстетебельник китайско-русский); а — соцветие, б — пыльниковый цветок, с — пыльник; 2 — *Monochoria plantaginifolia* (Roxb.) Kunth (Монохория подорожниковая); 3 — *M. korsakowii* Rgl. et Maack (М. Корсакова); 4 — *Eriocaulon ussuriense* Koern. (Шерстетебельник уссурийский).



1. Листовые влагалища открыты; листья, если они есть, голые; коробочка трехгнездная, многосемянная . . . . . Род 1. *Juncus* L. — **Ситник**.  
 — Листовые влагалища замкнутые; листья более или менее волосистые; коробочка одногнездная, трехсемянная . . . . . Род 2. *Luzula* DC. — **Ожика**.


Таблица 50



1 — *Commelina communis* L. (Коммелина обыкновенная); 2 — *Aneilema heisch* Hassk. (Анейлема Кейсак).

## Род 1. JUNCUS L. — СИТНИК

1. Стебли безлистные . . . . . 2.  
 — Стебли ослиственные . . . . . 4.



1 — *Juncus haenkei* E. Mey. (Ситник Ганке): а — цветок; 2 — *Luzula rufescens* Fisch. et Mey. (Ожика рыжеватая): а — коробочка; 3 — *L. palleseus* Bess. (О бледноватая): а — семена.

2. Стебли 1—1.5 мм толщ. . . . . 3.  
 — Стебли до 2.5 мм толщ. располагаются рядами, внизу с блестящими желто- или светло-бурыми влагалищами. Пестичные побеги отмирают . . . . . 1. *Ju. haenkei* (E. Mey.) — С. Генге (табл. 51, 2).  
 3. Цветки 2 мм дл.; влагалища часто красновато-бурые, более или менее расширенные; коробочка обратнояйцевидная, наверху плоская или вдавленная. Сырые дуга, болота . . . . . 2. *Ju. decipiens* (Buch.) Nakai — С. обманчивый.  
 — Цветки 3—4 мм дл.; влагалища ржавые; коробочки почти шаровидные. Болота, берега водоемов . . . . . 3. *Ju. filiformis* L. — С. нитевидный.  
 4 (от 1). Однолетники; растения без подземных побегов . . . . . 5.  
 — Многолетники; растения с побегами или густошерстистые . . . . . 8.  
 5. Цветки без прицветников; многочисленные, в пучках; стебли около 1 мм толщ. несколько удлиненные; листья плоские, 0.75—1.5 мм шир.; соцветие раскидистое. По берегам водоемов; с. Старая Девица Ханкайского района . . . . . 4. *Ju. leschenaultii* J. Gay — С. Лешено.  
 — Цветки с прицветниками, одиночные или по 2—3 в пучках . . . . . 6.  
 6. Коробочка округлая; цветки 2.5—3 мм дл. Отмели; по Амуре . . . . . 5. *Ju. amurensis* (Maxim.) V. Krecz. et Gotsch. — С. амурский.  
 — Коробочка удлиненная; цветки крупные, 4—7 мм дл. . . . . 7.  
 7. Цветки одиночные, 5—6 мм дл.; стебли 10—30 см выс., более или менее прямые. Сырые места, берега водоемов . . . . . 6. *Ju. bufo-nius* L. — С. жабый.  
 — Цветки по 1—3 в пучках; стебли 5—15 см выс., от середины разветвленные. Плодотворные отмирают . . . . . 7. *Ju. ambigua* Guss., *Ju. parvius* Song. et Perr. ex Billot — С. сомнительный.  
 8 (от 4). Цветки с прицветниками . . . . . 9.  
 — Цветки без прицветников . . . . . 11.  
 9. Прицветных листьев 2—3; зеленое густошерстистое растение 15—40 см выс. Луга, лесные дороги; заносное . . . . . 8. *Ju. tenuis* Willd. — С. тонкий.  
 — Прицветный лист 1 . . . . . 10.  
 10. Соцветие боковое, пучковатое, состоящее из 1—2 цветков, сидячих и на цветоножках; коробочка эллиптическая, 4—5 мм дл.; стебли тонкие, 10—30 см выс.; листья до 1 мм шир. Отмели, дуга, берега водоемов . . . . . 9. *Ju. brachysperma* Maxim. — С. короткоприцветниковый.  
 — Соцветие конечное, раскидистое; цветки около 2 мм дл.; коробочка яйцевидная, 2.8—3 мм дл.; стебли 50—70 см выс. Сырые дуга, берега водоемов . . . . . 10. *Ju. gracillimum* V. Krecz. — С. тончайший.  
 11 (от 8). Листья без поперечных перегородок; листья околонецветника соломенно-желтые; коробочка почти в 2 раза длиннее листочков околонецветника; дернистое растение 10—25 см выс. Моховые болота; р. Ботча . . . . . 11. *Ju. stygium* L. — С. стигийский.  
 — Листья с поперечными перегородками . . . . . 12.  
 12. Цветки скученные в многоцветковые плотные пучки, собранные в раскидистое соцветие; листочки околонецветника равны между собой; коробочка бурая, до 3 мм дл., несколько длиннее листочков околонецветника. Болота, сырые дуга . . . . . 12. *Ju. tureczaninowii* V. Krecz. — С. Турецкого.  
 — Цветки в пучках по 1—3, собранных в соцветия с косо вверх направленными ветвями; внутренние листочки околонецветника несколько длиннее наружных; коробочка 3.5 мм дл.; стебли 20—40 см выс. Луга, берега водоемов . . . . . 13. *Ju. virens* Buchenau — С. зеленая.  
 13. *Ju. virens* Buchenau — С. зеленая.

## Род 2. LUZULA DC. — ОЖИКА

1. Цветки одиночные; листочки околонецветника 2.5 мм дл.; листья 2—4 мм шир.; высота растения 10—30 см. Теса . . . . . 1. *L. rufescens* Fisch. et E. Mey. — О. рыжеватая (табл. 51, 2).  
 — Цветки в головках или в пучках по 1—3, в последнем случае листья более 6 мм шир. . . . . 2.  
 2. Веточки соцветия пучковатые; цветки в пучках по 1—3; растение до 50 см выс. и более; листья 6—10 мм шир.; цветки до 2 мм дл. Высокогорья . . . . . 2. *L. patylova* (Ehrh.) Beauv. — О. мелкоцветковая.  
 — Веточки соцветия прямые; цветки в многоцветковых головках . . . . . 3.  
 3. Цветки 1.5 мм длины, светлые; внутренние листочки околонецветника короче наружных. Лужайки, лесные поляны у дорог . . . . . 3. *L. pallescens* Bess. — О. бледноватая (табл. 51, 3).  
 — Цветки 2—3.5 мм дл., более темные; листочки околонецветника равны между собой, черно-бурые; головка яйцевидная или продолговатая. Луга . . . . . 4. *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. — О. многоцветковая.

1. Растения с зелеными веточками (клародидами), похожими на игловидные листья; настоящие листья в виде мелких боковых веточек, появляющихся в мае, незначительные; плод — красная или почти черная ягода . . . . . Род 13. *Aragetes* L. — Спирея.  
 — Растения с развитыми листьями . . . . . Род 13. *Aragetes* L. — Спирея.  
 2. Растения с длинными выходящими стеблями и усиками; листья сердцевидные; цветки небольшие, в паузах полузонтиках; плод — черная ягода . . . . . 2.  
 — Растения с прямыми стеблем или с безлистной стрелкой . . . . . Род 23. *Smilax* L. — Саспарилья.  
 — Листья собраны в мутовку на верху стебля . . . . . Род 22. *Trillium* L. — Триллиум.  
 — Листья не в мутовках, а если в мутовках, то их несколько на стебле, или кроме мутовки есть очередные листья . . . . . Род 21. *Papa* L. — Вороний глаз.  
 4. Листья в мутовке 3; цветки белые, трехмерные; корневище короткое, с пучком корней; плод — коробочка . . . . . Род 22. *Trillium* L. — Триллиум.  
 — Мутовка состоит из 4—8 (чаще из 6) листьев; цветки четырехмерные, зеленоватые; корневище ползучее; плод черный, ягодообразный . . . . . Род 21. *Papa* L. — Вороний глаз.  
 5 (от 3). В основании стебля сложная луковича, состоящая из более мелких долек; цветки крупные, не менее 3 см дл. . . . . Род 6. *Gagea* Salisb. — Гусиный лук.  
 — Растения с простыми луковичками или с корневищами . . . . . Род 9. *Lilium* L. — Лилия.  
 6. Цветки желтоватые, оранжевые, красные или светло-лиловые; тычиночная нить отходит от середины пыльников . . . . . Род 9. *Lilium* L. — Лилия.  
 — Цветки фиолетовые, фиолетово-бурные, фиолетовые или светло-бурные; нить отходит от основания пыльников . . . . . Род 10. *Fritillaria* L. — Рубин.  
 7 (от 5). Цветки небольшие, до 1 (1.5) см дл., в зонтикообразном соцветии или одиночные на конце стрелок; если цветки в кисти, то они желтые; плод — коробочка . . . . . Род 8. *Allium* L. — Лук.  
 — Цветки в кистях, в метелках или по 1—5 в паузах листьев; если цветки скученные на концах стрелок, то крупные, не менее 3 см дл. . . . . Род 10. *Fritillaria* L. — Рубин.  
 8. Цветки многочисленные, очень редко одиночные, в основании соцветия имеется обвертка из 2 перепончатых листьев; растения с характерным запахом лука или чеснока . . . . . Род 8. *Allium* L. — Лук.  
 — Цветки малочисленные, без обертки в основании соцветия . . . . . Род 9. *Lilium* L. — Лилия.  
 9. Цветки желтые . . . . . Род 7. *Gagea* Salisb. — Гусиный лук.  
 — Цветки белые . . . . . Род 11. *Lloydia* Salisb. — Ллойдия.  
 10 (от 7). Растения бесстебельные; все листья в прикорневой розетке или во время цветения листья отсутствуют . . . . . Род 12. *Scilla* L. — Прозея.  
 — Растения с обшественными стеблями; розетки прикорневых листьев выражены . . . . . Род 12. *Scilla* L. — Прозея.  
 11. Цветки мелкие, около 5 мм дл.; плод — коробочка . . . . . Род 12. *Scilla* L. — Прозея.  
 12. Цветки более крупные, не менее 1 см дл. . . . . Род 12. *Scilla* L. — Прозея.  
 12. Растения во время цветения без прикорневых листьев, до 30 см выс.; цветки розоватые, попилиются в конце лета; коробочка с долями, до верха сросшимися . . . . . Род 12. *Scilla* L. — Прозея.  
 — Цветущие растения с розетками прикорневых листьев, 5—10 см выс.; цветки буроватые или красноватые; коробочка со свободными, распадающимися долями . . . . . Род 1. *Tofieldia* Huds. — Тобфелдия.  
 13 (от 11). Цветки белые, около 1 см дл.; листья крупные, широколанцетные, сверху блестящие; плод ягодообразный, сплюснутый . . . . . Род 14. *Clintonia* Raf. — Клинтопия.  
 — Цветки не белые, значительно более крупные; плод — коробочка со сросшимися до верха долями . . . . . Род 14. *Clintonia* Raf. — Клинтопия.  
 14. Цветки желтые или оранжевые; листья длинные, тесновидные . . . . . Род 6. *Hemerocallis* L. — Крокус.  
 — Цветки сине-фиолетовые; листья ланцетные или яйцевидноланцетные . . . . . Род 5. *Funkia* Spreng. — Функия.  
 15 (от 10). Цветки в обшественных метелках; плод — коробочка со свободными распадающимися долями . . . . . Род 16. *Veratrum* L. — Чемерица.  
 — Цветки в кистях или в паузах листьев, реже в безлистных метелках; плод ягодообразный . . . . . Род 18. *Veratrum* L. — Чемерица.  
 16. Листья крупные, яйцевидные, продолговатояйцевидные или почти ланцетные; стебли более или менее равномерно обшественные . . . . . Род 4. *Veratrum* L. — Чемерица.  
 — Листья линейные, на стебле малочисленные . . . . . Род 17. *Zygadenus* Rich. — Зигаденус.  
 17. Цветоножки длиннее цветков; листья узколинейные, до 6 (7) мм шир. . . . . Род 3. *Zygadenus* Rich. — Зигаденус.  
 — Цветоножки короче цветков; листья до 10—12 мм шир. . . . . Род 2. *Aceldanthus* Trautv. et Mey. — Акедлантус.  
 18 (от 15). Цветки в безлистных верхушечных соцветиях . . . . . Род 15. *Aceldanthus* Trautv. et Mey. — Акедлантус.  
 — Цветки паузистые . . . . . Род 15. *Aceldanthus* Trautv. et Mey. — Акедлантус.



19. Листья (в числе 2, очень редко 3), с сердцевидным основанием; кисть цилиндрическая, прямая; цветки мелкие, до 4 мм дл.; плод бурый или темно-красный, с пестрым рисунком . . . . . Род 16. *Maianthemum* Wigg. — Майник.  
— Листья с клиновидным основанием, более крупные . . . . . 20.  
20. Цветки колокольчатые, со сросшимися почти до верха околоцветником, душные, в поникающих однобоких кистях; листья в числе 2 (редко 3); плод красный . . . . . Род 20. *Convallaria* L. — Ландыш.  
— Цветки со сросшимися только в основании околоцветником, не душные, в прямостоящих кистях или метелках; листьев на стебле 3—4, очень редко 2; плод красный или темно-красный . . . . . Род 15. *Smilacina* Desf. — Смилацина.  
21 (от 18). Стебли простые; околоцветник трубчатый, длинно сросшийся; плоды черные . . . . . Род 19. *Polygonatum* Adans. — Купена.  
— Стебли наверху большей частью ветвистые; околоцветник сросшийся только в основании . . . . . 22.  
22. Листья со стеблеобъемлющим основанием; плод красный . . . . . Род 18. *Streptopus* Rich. — Стрелитис.  
— Листья не стеблеобъемлющие; плод черный . . . . . Род 17. *Disporum* Salisb. — Дипсориум.

Род 1. *TOFIELDIA* Huds. — ТОФИЛЬДИЯ

Голцы высокогорий . . . . . 1. *T. nutans* Willd. — Т. поникающая.

Род 2. *ACELIDANTHUS* Trautv. et Mey. — АЦЕЛИДАНТ

Голцы и горные склоны . . . . . 1. *A. anticleoides* Trautv. et Mey. — А. антиклевидный.

Род 3. *ZYGADENUS* Rich. — ЗИГАДЕНУС

В лесах и в трещинах скал; только в Приморье, редко . . . . . 1. *Z. sibiricus* (L.) A. Gray — З. сибирский.

Род 4. *VERATRUM* L. — ЧЕМЕРИЦА

1. Цветки черно-пурпурные . . . . . 2.  
— Цветки белые или зеленоватые . . . . . 3.  
2. Кисть редкая, негусто опушенная ветвистыми волосками; листья до 3 см шир. Луга, кустарники . . . . . 1. *V. maackii* Rgl. — Ч. Маака.  
— Кисть густая, густоопушенная; листья до 8 см шир. Сухие луга и леса . . . . . 2. *V. ussuriense* Nakai, *V. nigrum* auct., non L. — Ч. Уссурийская.  
3 (от 1). Цветки белые; соцветие раскидистое; листья снизу густоопушенные, редко почти голые. Сырые луга и леса . . . . . 3. *V. dahuricum* (Turcz.) Loes. — Ч. Даурская.  
— Цветки желто-зеленые; листья голые или коротко-шероховатые . . . . . 4.  
4. Листочки околоцветника цельнокрайние, широкие; соцветие раскидистое; листья голые или почти голые. Пойменные луга; на западе Амурской области . . . . . 4. *V. lobelianum* Bernh. — Ч. Лобелия.  
— Листочки околоцветника уже и острее, по краю мелко вырезанно-зубчатые; соцветие скатое; Листья голые или коротко-шероховатые. Луга, кустарники . . . . . 5. *V. oxysperalum* Turcz. — Ч. Остродольная.

Со среднего Амура была описана *V. calycinum* Kom. с более раскидистым соцветием. Вероятно, это лишь форма *V. oxysperalum*.

Род 5. *FUNKIA* Spreng. — ФУНКИЯ


Склоны и песчаные морские берега; на юге Хасанского района . . . . . 1. *F. lancifolia* Spreng. — Ф. защитолистная.

Род 6. *HEMEROCALLIS* L. — КРАСОДНЕВ

1. Соцветие кистевидное или метелчатое; цветки желтые; листья до 8 мм шир., короче стебля. Сухие луга, склоны . . . . . 1. *H. minor* Mill. — К. малый (табл. 52, 2).

На юге Приморья встречается красоднев с более крупными, лимонно-желтыми цветками, зацветающий позднее К. малого. Таксономическое значение этой формы пока неясно. Западноевропейский *H. flava* L. на Дальнем Востоке не встречается.

Таблица 52



1 — *Hemerocallis middendorffii* Trautv. et Mey. (Красоднев Миддендорфа);  
2 — *H. minor* Mill. (К. малый); а — цветок, б — лист.

- Соцветие головчато-скупенное, окруженное широкими прицветниками . . . . . 2.  
 2. Цветки желтые; прицветники айлендидо-ланцетные, короче трубки околоцветника; листья 0.5 см шир., короче стебля. Луга, кустарники . . . . . 3. *H. dumortieri* Morr. — К. Дюмортье.  
 . . . . . 3. *H. dumortieri* Morr. — К. Дюмортье.

Пока имеются сборы только со среднего Амура.

- Цветки оранжевые; прицветники широкояйцевидные, по длине равны трубке околоцветника; листья около 1 см шир., длиннее стрелки. Леса, луга . . . . . 4. *H. middendorffii* Trautv. et Mey. — К. Миддендорфа (табл. 52, 1).

#### Род 7. GAGEA Salisb. — ГУСИНЫЙ ЛУК

1. Рыльце трехраздельное; листья очерчатые; соцветие — кисть. Сухие горные склоны . . . . . 1. *G. raciflora* Turcz. — Г. л. мелкоцветковый.  
 — Рыльце головчатое; стебли безлистные; соцветие — зонтик . . . . . 2.  
 2. Луковича при основании с группой мелких луковичек; прикорневой лист до 2 мм шир. Травянистые склоны, леса . . . . . 2. *G. hiensis* Pascher — Г. л. гусиный.  
 — Луковича без мелких луковичек; прикорневые листья 7—10 мм шир. Леса . . . . . 3. *G. nakaiana* Kitag. — *G. coreana* Nakai, *G. lutea* auct., non Ker-Gawl. — Г. л. Накай.


Форма с более узкими прикорневыми листьями названа *G. longiscapa* Grossh. — Г. л. длинностебельный.

#### Род 8. ALLIUM L. — ЛУК

1. Листья до 8 см шир.; цветки беловатые, в шаровидном соцветии; в лесах . . . . . 1. *A. ochotense* Prokh., *A. latissimum* Prokh., *A. victorialis* auct., non L. — Л. охотский, Черемша.  
 — Листья не шире 0.5 см . . . . . 2.  
 2. Цветки одиночные, на концах стрелок; листья плоские, 5 мм шир., длиннее стебля; эфемероид, цветет рано весной. Леса . . . . . 2. *A. monanthum* Maxim. — Л. одноцветковый.  
 — Соцветие многоцветковое; растения не эфемероидные . . . . . 3.  
 3. Луковичи одиночные; без корневич; соцветие с луковичками, реже без них; стебель гладкий; листья гладкие, трехгранные, желобчатые, луга . . . . . 3. *A. macrostemon* Bge. — Л. крупнотычиный.  
 — Луковичи скупенные, с корневичем; соцветие без луковичек . . . . . 4.  
 4. Наружные оболочки луковичи сетчато-волокнистые; листья плоские; цветки розовые . . . . . 5.  
 5. Оболочки луковичи цельные или лишь слегка волокнистые . . . . . 6.  
 5. Луковича яйцевидная, ясно выраженная; соцветие чаще шаровидное; листья отклоненные, короткие, снизу, как и влагалища, по жилкам ясно шероховатые; стебли внизу не окрашенные; цвет в июне. Скалы и каменистые склоны . . . . . 4. *A. masekii* Prokh. ex Kom. — Л. Мазка.  
 — Луковича продолговатая, не выраженная; соцветие чаще шаровидное; листья торчащие, более длинные, чем у предыдущего вида, с обеих сторон, такие как и влагалища, совершенно гладкие, лишь по краям пластинки шероховатые; стебли внизу антоцианово окрашенные; цветет в июле — августе. Леса, скалы . . . . . 5. *A. strictum* Schrad. — Л. торчаный.

Промежуточная между двумя последними видами форма с листьями и влагалищами чуть шероховатыми или почти голыми, не выраженными луковичками, зацветающая в июне, есть, вероятно *A. splendens* Willd.

- 6 (от 4). Цветки желтоватые; мощный лук с коричневыми, слегка блестящими, кожистыми наружными оболочками лукович. Скалы, сухие склоны . . . . . 6. *A. condensatum* Turcz. — Л. густой.  
 — Цветки розовые или белые . . . . . 7.  
 7. Растения с узкими (2 мм шир.) листьями; соцветие редковатое, обратноконусовидное; цветоножки в 5—6 раз длиннее цветков . . . . . 8.  
 — Растения с более широкими листьями; соцветие густое, с более короткими цветоножками . . . . . 9.  
 8. Цветки белые; растение совершенно гладкое; листья плоские, луга и сорные . . . . . 7. *A. odorum* L. — Л. душистый.  
 — Цветки бледно-розовые, стебель и листья очень коротко шероховатые; листья полуцилиндрические, желобчатые. Пески, сухие склоны . . . . . 8. *A. anisopodium* Ldb. — Л. перьянолучевой.  
 9 (от 7). Листья дугчатые; цветки блестящие . . . . . 10.



1 — *Allium pulchellum* Fisch. (Лилия красненькая); 2 — *A. distichum* Nakai (Л. двуязычная); 3 — *A. dahuricum* Ker-Gawl. (Л. даурская).



- Листья трехгранные или плоские; цветки не блестящие . . . . . 11.  
10. Цветоножки короче околоцветника. Цветки 8—12 мм дл. Луга, склоны . . . . .  
9. *A. schoenoprasum* L. — *А. скорода*.  
Форма с цветками 5—6 мм дл. носит название *A. maximowiczii* Rgl.

- Цветоножки длиннее околоцветника. Луга; по Амру . . . . . 10. *A. pedemontanum* Roem. et Schult. — *А. Ледябугра*.  
11 (от 9). Листья плоские; стебли вверх узкокрылатый; околоцветник розовый,  
5 мм дл.; листья в 2 раза короче стебля. Сухие склоны; в Амурской области  
12. *A. komarovianum* Vved. — *А. Комарова*.  
11. *A. senescens* L. — *А. стареющий*.

В Приморье распространена форма со стеблем, крылатым почти до низа, длинным околоцветником 6—7 мм дл. и более длинными листьями — *A. spirale* Willd.

- Листья трехгранные или килеватые, желобчатые . . . . . 12.  
12. Листья плоские, только в верхней части килеватые, по краям и килю совершенно гладкие, 5 мм шир.; цветки розовые, 4 мм дл. Сухие склоны, скалы . . . . .  
12. *A. komarovianum* Vved. — *А. Комарова*.  
— Листья трехгранные, по краям мельчайшие шероховатые, 1,5 мм шир.; цветки розово-фиолетовые. Луга . . . . . 13. *A. sacculiferum* Maxim. — *А. мешочковатый*.


#### Род 9. LILIUM L. — ЛИЛИИ

1. Листья муточчатые; цветки оранжевые . . . . . 2.  
— Листья очерченные . . . . . 3.  
2. Листья яйцевидно-ланцетные, до 5 см шир., внезапно заостренные; цветки около 4 см дл., желтовато-красные, в кистях. Леса . . . . .  
1. *L. distichum* Nakai — *А. двурядный* (табл. 53, 2).  
— Листья ланцетные, 15 (25) мм шир., постепенно заостренные; цветки до 3 см дл., красно-оранжевые, в пучках на концах стеблей. Леса; в более северной части . . . . .  
2. *L. medeoloides* A. Gray, *L. asenacum* Fisch. — *А. медведишник*.  
3 (от 1). Цветки прямостоячие . . . . . 4.  
— Цветки поникшие . . . . . 5.  
4. Стебель ребристый, под соцветием клочковато-белоопушенный; цветки 6—8 см дл.; мощное растение. Луга, кустарники . . . . .  
3. *L. dahuricum* Ker-Gawl. — *А. даурская* (табл. 53, 3).  
— Стебли не ребристые, до верхней части голые; цветки 3—3,5 см дл. Луга, склоны . . . . .  
4. *L. pulchellum* Fisch. — *А. крапивоножка* (табл. 53, 1).  
5 (от 3). Цветки светло-сиреневые; листья узколинейные, многочисленные. Скалы, сухие склоны; на юге . . . . . 5. *L. certium* Kom. — *А. поникшая*.  
— Цветки красные или бледно-желтоватые . . . . . 6.  
6. Цветки одноцветные, сравнительно небольшие, до 4,5 см дл. . . . . 7.  
— Цветки с черными крапичками, значительно крупнее, до 10 см дл. . . . . 8.  
7. Листья до 5 мм шир., редко расположенные; в соцветиях на концах имеются мозолистые утолщения. Луга, кустарники . . . . .  
6. *L. callosum* Sieb. et Zucc. — *А. мозолистый*.  
— Листья 1 мм шир., многочисленные, густорасположенные, все без мозолистых утолщений. Скалы, сухие склоны . . . . .  
7. *L. tenuifolium* Fisch. — *А. тонколистный*.  
8 (от 6). В пазухах листьев имеются луковички. Размножится. Скалы; в Хасанском районе; по-видимому, дико . . . . . 8. *L. tigrinum* Ker-Gawl. — *А. тигровая*.  
— В пазухах листьев луковичек нет. Луга; на юге . . . . .  
9. *L. maximowiczii* Rgl. — *А. Максимовича*.

#### Род 10. FRITILLARIA L. — РЯБЧИК

1. Верхние листья на конце усикообразно завитые. Леса, речные долины . . . . .  
1. *F. ussuriensis* Maxim. — *Р. уссурийский* (табл. 54, 2).  
— Все листья без усикообразных окончаний . . . . . 2.  
2. Листья линейные, до 6 (7) мм шир., собраны на стебле в 1—2 мутонки. Леса . . . . .  
2. *F. maximowiczii* Freyn — *Р. Максимовича* (табл. 54, 1).  
— Листья продолговатояйцевидные, до 3 см шир., собраны на стебле в 3—4 мутонки. Луга, горная тундра; окрестности Владивостока (о. Попова) . . . . .  
3. *F. camtschatsensis* (L.) Fisch. — *Р. камчатский* (табл. 54, 3).

Таблица 54



1 — *Fritillaria maximowiczii* Freyn (Рябчик Максимовича); 2 — *F. ussuriensis* Maxim. (Р. уссурийский); 3 — *F. camtschatsensis* (L.) Fisch. (Р. камчатский).

1. Луковича сверху одета чешуевидными влагалищами; прикорневых листьев 2—3; нижний стеблевой лист 1 мм шир. Азильские луга . . . . . 1. *L. serotina* (L.) Rehb. — Л. поздняя.  
— Луковича сверху без чешуевидных влагалищ; прикорневой лист 1; нижний стеблевой лист 5 мм шир. В лесах . . . . . 2. *L. triflora* (Ldb.) Baker — Л. трехцветковая.

## Род 12. SCILLA L. — ПРОЛЕСКА

Травянистые склоны; на юге Хасанского района; редко . . . . . 1. *S. japonica* (Thunb.) Baker — П. японская.

## Род 13. ASPARAGUS L. — СПАРЖА

1. Цветки и плоды сидячие; плоды красные. Луга, кустарники . . . . . 1. *A. schoberioides* Kunth — С. поберезинский.  
— Цветки и плоды на цветоножках . . . . . 2.  
2. Цветоножки не превышают по длине пыльниковые цветки; плоды черно-красные. Скалы, щебнистые склоны; сорное; в Амурской области . . . . . 2. *A. dahuricus* Fisch. — С. даурский.  
— Цветоножки длиннее пыльниковых цветков; плоды красные. Сухие луга, остепненные склоны, прибрежные пески . . . . . 3. *A. oligoclados* Maxim. — С. маловетвистый.

## Род 14. CLINTONIA Raf. — КЛИНТОНИЯ

Хвойные леса . . . . . 1. *C. udensis* Trautv. et Mey. — К. удская.

## Род 15. SMILACINA Desf. — СМЛАЦИНА

1. Растение голое; плоды около 9 мм в поперечнике; листья на стебле 2—3. Моховые болота, болотистые леса . . . . . 1. *S. trifoliata* Desf. — С. трехлистая.  
— Растения более или менее волосистые; плоды до 5 мм в поперечнике . . . . . 2.  
2. Соцветие ветвистое; листья яйцевидные или широколанцетные. Леса мальчуганского типа . . . . . 2. *S. hirta* Maxim. — С. волосистый.  
— Соцветие простое; листья яйцевидно-ланцетные, в числе 7—14 на стебле. Леса . . . . . 3. *S. dahurica* Turcz. — С. даурский.

## Род 16. MAJANTHEMUM Wigg. — МАЙНИК


1. Листья совершенно голые, широко- или почти округло-яйцевидные, плотные, 7—10 см шир.; плоды красные, 5—6 мм в поперечнике; цветоножки короткоцветков и плодков. Хвойные и смешанные горные леса . . . . . 1. *M. dilatatum* (Howell) Nels. et Macbr. — *M. kamschatcense* Kom. — М. широколистный.  
— Листья снизу более или менее опушенные, яйцевидные, цветоножки длиннее цветков и плодков . . . . . 2.  
2. Листья 5—7 см шир., 8—10 см дл., коротко заостренные; доли околоцветника 3—3.5 мм дл.; плоды темно-красные, 5—7 мм в поперечнике. Листственные и смешанные леса . . . . . 2. *M. intermedium* Worosch. — М. средний.  
— Листья 2.5—3.5 см шир., 6—7 см дл., длинно заостренные; доли околоцветника 2—2.5 мм дл.; плоды грязно-бурые, 3—4 мм в поперечнике. Хвойные и смешанные леса . . . . . 3. *M. bifolium* (L.) Schmidt — М. двулиственный.

## Род 17. DISPORUM Salisb. — ДИСПОРУМ

В лесах, по берегам рек . . . . . 1. *D. viridescens* (Maxim.) B. Fedtsch. — Д. зеленоватый.

## Род 18. STREPTOPUS Rich. — СТРЕПТОПУС

1. Листья по краю сосочковидно реснитчатые; небольшие, до 30 см выс., растения большей частью с простым стеблем. В горах по Амуру и на побережье Татарского пролива . . . . . 1. *S. streptopoides* (Ldb.) Nels. et Macbr. — С. стрептопусовидный (табл. 55, 2).



1 — *Smilax oldhamii* Mig. (Сасанария Ольдгема); а — часть стебля с листьями и цветками; б — часть стебля с листьями и плодами; 2 — *Streptopus streptopoides* (Ldb.) Nels. et Macbr. (Стрептопус стрептопусовидный); а — отрезок стебля с листом и цветком; 3 — *S. amplexicaulis* (L.) DC. (С. стеблеобъемлющий); а — лист и плод (ягода), б — отрезок стебля с листом и цветком.



- Листья по краю гладкие; более высокое, ветвистое растение. Мишистые леса, ку-  
старники . . . . . 2. *S. amplexicaulis* (L.) DC. — С. стеблеобъемлющий (табл. 55, 3).

Род 19. *POLYGONATUM* Adans. — КУШЕНА

1. Листья мутовчатые; стебли 60—70 см выс. Леса, кустарники . . . . . 1. *P. stenophyllum* Maxim. — К. узколистная (табл. 56, 4).  
— Листья очередные . . . . . 2.  
2. При цветках имеются прицветники, часто очень крупные; цветоносы разветвлен-  
ные; основание цветоножки с сочленением в виде поперечного рубчика . . . . . 3.  
— Прицветников нет; цветоножки без сочленения . . . . . 5.  
3. Прицветники яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные, равные по длине  
цветкам; цветоносы двухцветковые; стебли 15—30 см выс. . . . . 4.  
— Прицветники ланцетно-линейные, короче цветков; цветоносы дву- или трехцветковые;  
высота растения 40—80 см; листья эллиптические или обратнояйцевидные,  
до 14 см дл., 6 см шир. Леса; найдено в последнее время в Хасанском районе .  
. . . . . 2. *P. inflatum* Kom. — К. вздутая.  
4. Прицветники яйцевидно-ланцетные, расположены в основании цветоножек. Леса,  
часто . . . . . 3. *P. involucreatum* (Franch. et Sav.) Maxim. — К. оберточная (табл. 56, 3).  
— Прицветники уже, чем у предыдущего вида, помещаются под цветками. Очень  
редко; Русский остров, Ханкайский район . . . . . 4. *P. desoulavii* Kom. — К. Десулави (табл. 56, 2).  
5 (от 2). Листья в числе 3—4, скученные наверху стебля, на концах оттянуты в остро-  
конечия; цветков 2—3, крупных; высота растения 15—30 см. Южное Приморье;  
леса . . . . . 5. *P. acuminatifolium* Kom. — К. остроконечностная (табл. 56, 6).  
— Листья и цветки многочисленные; стебли более или менее равномерно облиствен-  
ные . . . . . 6.  
6. Листья продолговатоэллиптические, снизу голые, до 12 см дл., 5 см шир.; стебли  
ребристые; высота растения 30—60 см. Леса, кустарники . . . . . 6. *P. odoratum* (Mill.) Druce, *P. officinale* All. — К. душистая (табл. 56, 5).  
— Листья продолговатые, снизу опушенные, до 6 см дл., 2 см шир.; высота растения  
15—30 см. Леса, дуга, кустарники . . . . . 7. *P. humile* Fisch. et Maxim. — К. низкая (табл. 56, 1).

Род 20. *CONVALLARIA* L. — ЛАНДЫШ

- В лесах . . . . . 1. *C. keiskei* Miq., *C. majalis* var. *manshurica* Kom. — Л. Кейске.

Род 21. *PARIS* L. — ВОРОНИЙ ГЛАЗ

1. Листья до 6 см шир., внезапно оттянуты в остроконечие; цветки часто превышают  
листья. Леса . . . . . 1. *P. manshurica* Kom. — В. г. маньчжурский.  
— Листья 2,5—3 см шир., постепенно заостренные; цветки всегда короче листьев.  
Леса . . . . . 2. *P. hexaphylla* Cham. — В. г. шестилыстый.

Род 22. *TRILLIUM* L. — ТРИЛЛИУМ

- В лесах . . . . . 1. *T. kamtschaticum* Ker-Gawl., *T. kamtschaticum* Pall., *T. rhombifolium* Kom. — Т. камчатский.

Род 23. *SMILAX* L. — САССАПАРИЛЬ


- Дуга, кустарники, склоны . . . . . 1. *S. oldhamii* Miq. — С. Олдамга (табл. 55, 1).

Сем. 32. *DIOSCOREACEAE* R. Br. — ДИОСКОРЕЙНЫЕ


Род 1. *DIOSCOREA* L. — ДИОСКОРЕЯ

Многолетняя травянистая двудомная лиана с мощным корневищем; листья  
очередные, черешковые, с толстоперепончатыми (трех) пяти-семилопастными  
широкосердцевидными пластинками; цветки зеленовато-желтые, в длинных,  
редких кистях; плоды трехклетчатые. В кустарниковых зарослях и в разрежен-  
ных широколиственных и смешанных лесах . . . . . 1. *D. nipponica*  
*Makino*, *D. polystachya* auct., non Turcz. — Д. японская (табл. 57).

Таблица 56



1 — *Polygonatum humile* Fisch. et Maxim. (Кушена низкая); 2 — *P. desoulavii* Kom. (К. Десулави); 3 — *P. involucreatum* (Franch. et Sav.) Maxim. (К. оберточная); 4 — *P. stenophyllum* Maxim. (К. узколистная); 5 — *P. odoratum* (Mill.) Druce (К. душистая); 6 — *P. acuminatifolium* Kom. (К. остроконечностная).



*Dioscorea nipponica* Makino (Диоскорея японская): а — часть стебля с листьями и плодами, б — часть стебля с листьями и прутками, в — тычиночные цветки



1 — *Iris ventricosa* Pall. (Касатик надутый); 2 — *I. ensata* Thunb. (К. мечевидный), верхняя часть стебля с незрелыми плодами.







- Растения с ползучими корневищами, усаженными тонкими корнями или с пучково-много расходящимися корнями . . . . . 14.
12. Соцветия с подкашающими, зеленовато-желтыми цветками; губа трехлопастная, при основании с 2 киловидными выдающимися пластинками; лист 1, крупный (8—25 см), ланцетный или мечевидный, острый . . . . . Род 7. *Oreorchis* Lindl. — Орехорхис.
- Соцветия на прямых цветоносах с неподкашающими цветками, имеющими пещную губу, без пластинок; листья овально-ланцетные, тупые . . . . . 13.
13. Губа плоская, по краю курчаво-волнистая, цветки крупные, желтовато-зеленые или томо-розовые, собранные в редкое (2—6 цветков) соцветие; прикорневых или томо-розовых, собранных по размеру, мясистых, блестящих, с черешками, облегающими цветонос только в основании . . . . . Род 3. *Liparis* Rich. — Липарис.
- Губа короткая, в основании расширенная, к концу линейно заостренная; цветки мелкие, зеленоватые, собранные в плотную, длинную, узкую кисть 7—17 см дл.; прикорневых листьев 1—3, один из них крупнее других; листовые черешки высоко облегают цветонос . . . . . Род 2. *Microstylis* Nutt. — Стагачика.
- 14 (от 11). Листья супротивные, расположенные на середине стебля, широколанцетные или ромбические . . . . . Род 9. *Listera* R. Br. — Тайник.
- Листья одиночные, очерченные или только прикорневые (в розетке) . . . . . 15.
15. Губа с двусторонней вырезкой или перетяжкой, расщепленная на заднюю (вогнутую) и переднюю (плоскую) части . . . . . 16.
- Губа без перетяжки, языковидная; растения с 1 прикорневым листом и ползучим корневищем . . . . . Род 5. *Ephippianthus* Rehb. — Седлоух.
16. Цветки в густой (плотной) кисти, желтовато-белые лепестки внутреннего круга образуют шлем; листья прикорневые, в числе 3—8; цветоносная стрелка 10—20 см дл., с продолговатыми листовыми чешуями . . . . . Род 16. *Goodyera* R. Br. — Гуайера.
- Цветки в рыхлой кисти, шлема нет; стебель густо облиственный, 30—60 см выс. 17.
17. Цветки белые, сидячие, с закругленной при основании завязью; губа в задней части вогнута подобно короткому шпору . . . . . Род 12. *Cephalanthera* (L.) C. Rich. — Шлемифолистный.
- Цветки желто-розовые, более крупные, сидящие на закругленной цветоножке; шпорцеобразного роста вет . . . . . Род 11. *Eripactis* Adans. — Дремлик.
- 18 (от 9). Растения с корневищами или корневыми клубнями; пальчатолопастными или удлинено-ййцевидными и на конце оттянутыми в шпуровидное окончание . . . . . 19.
- Растения с цельными, почти шаровидными, тупыми корневыми клубнями . . . . . 24.
19. Цветки фиолетово-розовые или фиолетово-пурпурные . . . . . 20.
- Цветки белые или зеленовато-желтоватые . . . . . 21.
20. Растения с ползучим корневищем; лист 1, обратноййцевидный, тупой, расположен у основания цветочной стрелки, несущей 1—4 цветка . . . . . Род 25. *Galeorchis* Rydb. — Галеорхис.
- Корнеклубни оттянуты в шпуровидное окончание; стебли равномерно облиственные; цветки собраны в густую кисть, однотонные, без пятен; подлинки (комочки пыльца) с иголками и железками; листья линейные или ланцетно-линейные . . . . . Род 24. *Gymnadenia* R. Br. — Кокунник.
- 21 (от 10). Губа цельная . . . . . 22.
- Губа трехлопастная или на конце трехзубчатая . . . . . 23.
22. Стебель густо облиственный; листья заостренные, линейно-ланцетные, с сильно выдающимися жилками . . . . . Род 23. *Limnorchis* Rydb. — Лимнорхис.
- Стебель в нижней части или около середины с 1—2 эллиптическими, обратноййцевидными или продолговатыми листьями . . . . . Род 22. *Platanthera* Rich. — Любка.
- 23 (от 21). Шпора длиннее губы, 5—25 мм дл.; губа при основании с 2 сторон с короткой треугольной лопастью или зубчиком . . . . . Род 21. *Perularia* Lindl. — Перулария.
- Шпора в несколько раз короче губы, 1,5—2,5 мм дл.; губа на конце трехзубчатая, с средним зубчиком обычно более коротким, чем боковые . . . . . Род 20. *Coeloglossum* Hartm. — Подозеленник.
- 24 (от 18). Соцветие правильное, многоцветковое или цветков 1—2; губа крестообразная или почковидная, длинная; рыльца на обособленных, длинных, толстостенных выростах; листья линейные или узколанцетные . . . . . Род 17. *Habenaria* Willd. — Поник.
- Соцветие однобокое; губа трехлопастная, рыльца сидячие, железистые; листья линейно-ланцетные . . . . . 25.
25. Прикорневых листьев 2, почти супротивных, из которых нижний ийцевидный, более мелкий, верхний ланцетовидный; соцветие плотное; листочки наружного круга околоцветника срастаются и образуют шлем . . . . . Род 19. *Neottianthe* Schlechter — Неоттианта.



1 — *Cypripedium ventricosum* Sw. (Башмачок вздутый); а — верхняя часть стебля с цветком, б — губа (вид сбоку), в — губа (вид сверху); 2 — *C. calceolus* L. (Б. настольный); а — верхняя часть стебля с цветком, б — губа (вид сверху), в — губа (вид сбоку); 3 — *C. macranthum* Sw. (Б. крупноцветковый); а — верхняя часть стебля с цветком, б — губа; 4 — *Calypso bulbosa* (L.) Rehb. f. (Каллипсо луковичная); а — с цветком, б — губа; 5 — *Neottianthe* Schlechter — Неоттианта; а — верхняя часть стебля с цветком, б — губа (вид сбоку), в — губа и прицветные листья.



- Прикорневой лист чешуевидный, продолговатый, стеблевые более крупные, широколанцетные, тупые; соцветие редкое, из 3—8 цветков; боковые листочки наружного круга околоцветника свободные, а средний сливается с листочками внутреннего круга и образует шлем . . . . . Род 26. *Chusua* Nevski — Чусва.

#### Род 1. *CYPRIPEDIUM* L. — БАШМАЧОК

1. Листьев на стебле 2, прикорневой лист короче лепестков; губа и лепестки пятнистые, розово-белые; отверстие мешка широкое, почти равное по размерам боковым лепесткам. Смешанные и листовенные леса . . . . . 1. *C. guttatum* Sw. — Б. пятнистый.
2. Листьев на стебле несколько, прикорневой лист превышает лепестки околоцветника, которые без листочков . . . . . 2.
3. Мешок жесткий, иногда желто-буrowатый; лепестки темно-бурые, без пятен и полосок, ланцетные, в 1,5—2 раза превышающие мешок; губа снаружи узкая, почти сложена вдоль, пятнистая, без сердцевидного основания. Леса . . . . . 4. *C. calceolus* L. — Б. настоящий (табл. 59, 2).
4. Мешок иного цвета; лепестки и мешок с темными жилками . . . . . 3.
5. Губа в основании с сердцевидным расширением, без пятен, погружена в крупный мешок; верхний лепесток яйцевидный, не превышающий мешка, боковые лепестки короче мешка. Среди кустарников и в лесах . . . . . 2. *C. macranthum* Sw. — Б. крупноцветковый (табл. 59, 3).

Нередко встречается форма с белыми цветками — *f. albidiflorum*.

- Губа с пятнами, наполовину погружена в мешок; верхний лепесток превышает мешок, который чаще буро-розоватого цвета. Заросли кустарников и леса . . . . . 3. *C. ventricosum* Sw. — Б. вздутый (табл. 59, 1).

Вид гибридного происхождения: *C. calceolus* × *C. macranthum*.

#### Род 2. *MICROSTYLIS* Nutt. — СТАГАЧКА

У основания стебля луковицеобразное утолщение, покрытое волокнистыми остатками влагалищ листьев; корни мочковатые; лист 1 (2), широкоэллиптический, 6—10 см дл., 3—6 см шир., тупой; при наличии 2 листьев верхний более крупный; цветочная кисть 7—17 см дл., узкая; цветки мелкие на цветоножках, превышающих по длине завязи; цветет в июле. В смешанных лесах, в горах чаще у верхней границы леса . . . . . 1. *M. monophyllos* (L.) Lindl. — С. однолистный.

#### Род 3. *LIPARIS* Rich. — ЛИПАРИС

1. Губа и внутренние листочки околоцветника вишне-красные, неяркие; листья эллиптические, иногда слегка заостренные; растение 10—25 см выс., цветет в июле. В листовенных лесах; Приморье и Приамурье . . . . . 1. *L. makinoana* Schlechter — Л. Макино.
2. Губа и внутренние листочки околоцветника желтовато-зеленые, более мелкие, чем у предыдущего вида; листья широкоэллиптические или яйцевидные, тупые; растения 20—50 см выс.; цветет в июне—июле. В листовенных лесах; Приморье . . . . . 2. *L. japonica* (Miq.) Maxim. — Л. японский.

#### Род 4. *CALYPSO* Salisb. — КАЛПСО


Лист 1, яйцевидный, 3—5,5 см дл., 2—4 см шир., с выдающимися жилками; на цветоносе имеются 1—3 влагалища, охватывающих стебель; растение 8—22 см выс., цветет в мае—июне. В тенистых хвойных лесах в горах; на юге Приморья . . . . . 1. *C. bulbosa* (L.) Rehb. f. — К. луковичная (табл. 59, 4).

#### Род 5. *EPHIPPIANTHUS* Rehb. f. — СЕДЛОЦВЕТ

Растение 10—15 см выс., с тонким цветоносом и 2 едва заметными перепончатыми влагалищами; лист 1, прикорневой, овально-яйцевидный, 1,5—2,5 см дл., 1—2,3 см шир.; соцветие с немногочисленными (2—5) повислыми, расставленными цветками; цветет в июне—августе. В хвойных лесах; в северной части Приморья . . . . . 1. *E. schmidtii* Rehb. f. — С. сахалинский.

Сахалинский *E. schmidtii* Rehb. f. — С. сахалинский (табл. 60, 1).

Таблица 60



1 — *Ehippianthus sachalinensis* Rehb. f. (Седлоцвет сахалинский); 2 — *Listera nipponica* Makino (Тайник японский); 3 — *L. corniculata* (L.) R. Br. (Т. серцевидный); 4 — *L. jatabe* Makino (Т. Ятабе); 5 — *Pogonia japonica* Rehb. f. (Бородачка японская); а — цветонос.

Многолетнее безлистное растение с мясистым коралловидным корневищем, лишенным корневых мочек; стебли тонкие, 10—30 см выс., с 2—4 перепончатыми влагалищами; цветки поникающие, голые, с мелкими прицветниками; верхний наружный листок околоцветника и 2 внутренних сложены плеомовидно; губа с зубчатообразными боковыми долями; цветет в июне. В сырых лесах; Примурье . . . . . 1. *C. trifida* Chatel. — Л. трехнадрезный.

## Род 7. OREORCHIS Lindl. — ОРЕОРХИС

Луковичеобразное утолщение у основания цветоноса 1—1.5 см в диам., одето волокнистыми остатками листовых влагалищ, часто утолщений несколько, образующих цепочку; прикорневой лист 1, мечевидный, заостренный, с выдающимися линейными жилками, 15—25 см дл., 1.2—2.5 см шир. доходящий до основания соцветия; цветет в июне. Смешанные леса у рек . . . . . 1. *O. patens* Lindl. — О. раскидистый.

## Род 8. POGONIA Juss. — БОРОДАТКА

Корни тонкие, пучковидно расходящиеся; стебли тонкие, одиночные, 10—30 см выс. Одиночный лист в средней части стебля, ланцетный, сидячий; прицветник листовидный, 1.5—3 см дл., ланцетный; лепестки околоцветника свободные; цветет в июле. На сырых лугах . . . . . 1. *P. japonica* Rehb. — Б. японская (табл. 60, 5).

## Род 9. LISTERA R. Br. — ТАЙНИК

1. Губа на конце разделена до середины на 2 узкие, линейные, заостренные доли; прицветники маленькие, до 1.5 мм дл., цветоносы 2.5 мм дл., голые; соцветие густое; листья тупые; цветет в июле. В тенистых лесах; на севере Приморья и северо-востоке Примурья . . . . . 1. *L. cordata* (L.) R. Br. — Т. сердцевидный (табл. 60, 3).
- Губа на конце разделена на 2 широкие, тупые доли; прицветники и цветоносы более крупные, цветоносы опушенные . . . . . 2.
2. Губа у основания пальчатокрая; цветоносы опушенные; листья на конце заостренные, с нижней стороны более бледные, чем с верхней; жилки хорошо заметны; крупные остальных видов рода; цветет в июле—августе. В хвойных лесах; Приморье и Примурье . . . . . 3. *L. yatabei* Makino, *L. major* Nakai — Т. Ятабе (табл. 60, 4).
- Губа у основания с обеих сторон с тупыми зубчиками; листья с коротеньким остроконечием или тупые; блестящие; цветоносы голые или слегка опушенные, 10 мм дл.; цветет в июле—августе. В хвойных лесах; в северной части Приморья и на северо-востоке Примурья . . . . . 2. *L. nipponica* Makino — Т. японский (табл. 60, 2).


## Род 10. NEOTTIA Sw. — ГНЕЗДОВКА

1. Губа цельная, заостренная, 2—3 мм дл., короче наружных листьев околоцветника; ось соцветия голая; растение 15—20 см выс. . . . . 1. *N. asiatica* Ohwi — Г. азиатская.
- Губа двулопастная, 7—9 мм дл., длиннее листьев околоцветника; ось соцветия, цветоносы, завязи покрыты рыжевато-бурыми сосочковидными железистыми волосками; растение 20—40 см выс. . . . . 2. *N. papilligera* Schlechter — Г. сосочконосная.

## Род 11. EPIRACTIS Adams. — ДРЕМЛИК

1. Листья по нервам и краям густо усажены беловатыми сосочками, шероховатые; прицветники линейно-ланцетные, длинные завязей и цветоносов. Хвойные леса; Приморье и восточный Амур . . . . . 1. *E. papillosa* Franch. et Sav. — Д. сосочковый (табл. 61, 1).
- Листья без сосочков; прицветники яйцевидно-ланцетовидные, короче завязей и цветоносов . . . . . 2. *E. thunbergii* A. Gray — Д. Тунберга (табл. 61, 2).

Таблица 61



1 — *Epipactis papillosa* Franch. et Sav. (Дремлик сосочковый); а — верхняя часть растения, б — часть стебля с листом; 2 — *E. thunbergii* A. Gray (Д. Тунберга); а — верхняя часть растения, б — цветок, в — основание стебля с корневищем, г — часть стебля с листом.



Род 12. *CERHALANTHERA* Rich. — ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК

Стебли 35—50 см выс., густо облиственные; ось соцветия с немногочисленными соцветиями; лепестки околоцветника сложены колокольчато; подлинки (комочки пыльца) двураздельные; губа в задней части вытянута подобно маленькому шпору; цветет в июне. Листственные леса; на юге Приморья . . . . . 6. *C. longibracteata* Blume — П. длиннопильцевниковый.

Род 13. *ERIPOGON* S. G. Gmel. — НАДБОРОДНИК

Растение 7—30 см выс., с полым стеблем, несколько вздутым выше основания; цветки поникающие, пахучие; листочки околоцветника с жилкой; шпорец светло-фиолетовый; цветет в июле—августе. В тенистых хвойных и смешанных лесах . . . . . *E. aphyllum* (Fr. Schmidt) Sw. — Н. безлистный.

Род 14. *GASTRODIA* R. Br. — ПУЗАТКА

Корневище клубнеобразное, кольчатое, горизонтальное; стебли 50—100 см выс., с короткими, чешуйчатыми влагалищами; прицветники равны завязям, линейные; околоцветник трубчатый, вздутый, бледно-зеленоватый, буроватый, с беловатой губой; цветет в июле. В сыроватых лесах; редкость . . . . . 1. *G. elata* Blume — П. высокая.

Род 15. *SPIRANTHES* Rich. — СКРУЧЕННИК

1. Цветки мелкие, собранные в узкое, до 0.8 см шир., соцветие; губа продолговатая, с коротеньким ноготком и сильным перехватом; на конце расширенная; растение 30—50 см выс.; цветет в июле—августе. На лугах . . . . . 1. *S. sinensis* (Pers.) Ames — С. китайский (табл. 62).
- Цветки более крупные (до 0.7 см в диам.), собранные в широкое соцветие, 0.8—1.3 см шир.; губа сидячая, продолговатоовальная, к концу суживающаяся; растение 15—30 см выс., менее облиственное; цветет в июле—августе. На лугах . . . . . 2. *S. amoena* (M. B.) Spreng. — С. приятный.

Род 16. *GOODYERA* R. Br. — ГУДАЙЕРА

Растение с шнуровидными ползучими корневищами, дающими побеги; стебли 10—30 см выс., вверху коротко железисто опушенные; листья сосредоточены в нижней части стебля, в числе 4—8, эллиптические, 2—3.5 см дл., 1—2 см шир., с 5 жилками, выделяющимися больше, чем остальные; соцветие однобокое; цветет в июле—августе. В тенистых хвойных и смешанных лесах . . . . . 1. *G. repens* (L.) R. Br. — Г. ползучая.

Род 17. *HABENARIA* Willd. — ПОВОДНИК

1. Наружные листочки околоцветника белые; губа крестообразная; листья линейные, часто сложенные вдоль; цветки в конечной кисти в числе 5—12. Сырые луга, берега болот и озер . . . . . 1. *H. linearifolia* Maxim. — П. линейнолистный.
- Наружные листочки околоцветника зеленые; губа с широкими бахромчато-зубчатыми лопастями, в общем очертании почковидная; листья линейно-ланцетные; цветок одиночный, на вершине стебля (реже 2—3); цветет в июле. Только на юге Приморья . . . . . 2. *H. radiata* Spreng., *H. dianthoides* Nevski — П. лучистый.


Род 18. *HERMINIUM* R. Br. — БРОВНИК

Листья в числе 2 (3), в основании стебля, ланцетные или обратнояйцевидные, короткозасеренные, 4—10 см дл.; стебель 10—30 см выс.; цветки в узкой кисти, зеленовато-желтоватые, с резким медовым запахом; листочки околоцветника сложены колокольчато; цветет в июне—июле. Тесные поляны, луга . . . . . 1. *H. monorchis* (L.) R. Br. — Б. одноклубенный.

Род 19. *NEOTTIANTHE* Schlechter — НЕОТТИАНТА

Корнеклубни шаровидные; стебель 10—25 см выс., ребристый; соцветие рыхлое, из 7—20 фиолетово-розовых цветков; губа до половины трехраздельная, с ли-

Таблица 62



*Spirantes sinensis* (Pers.) Ames (Скрученник китайский).

нейными допастями; цветет в июле—августе. В смешанных лесах; Приморье и Приамурье . . . . . 1. *N. cucullata* (L.) Schlechter — Н. клубочковая.

Род 20. COELOGLOSSUM Hartm. — ПОЛОЛЕЩЕШНИК

Корнеклубни двураздельные, продолговатые; стебель 10—35 см выс.; с 2—5 эллиптическими, заостренными листьями; все листочки околоцветника обращены кверху, зеленые; губа на конце трехзубчатая; цветет в июне—июле. На лесных лугах и высокогорных лугах . . . . . 1. *C. viride* (L.) Hartm., s. l. — П. зеленый.

Род 21. PERULARIA Lindl. — ПЕРУЛЯРИЯ

1. Цветки с листьями околоцветника 4—6 мм дл.; листья обратнойцевидные, нижние крупные, 2—9 см шир., верхние более мелкие, ланцетные, цветет в июне—июле. В лесах, чаще у рек . . . 1. *P. fuscescens* (L.) Lindl. — П. буроватая.
- Цветки с более мелкими листьями околоцветника, 2—3 мм дл., листья продолговато-ланцетные, 1.5—2.5 см шир.; растение более мелкое; цветет в июле—августе. Среди кустарников . . . 2. *P. ussuriensis* (Maxim.) Schlechter — П. уссурийская.

Вероятно, *P. ussuriensis* является лишь формой *P. fuscescens*.

Род 22. PLATANATHERA L. C. Rich. — ЛЮБКА

1. Стебель при основании с 2 сближенными или почти супротивными овально-ланцетными листьями и мелкими прицветничкообразными стеблевыми . . . . . 2.
- Стебель в средней части или немного ниже, с 1 сидячим линейным листом и с 1—3 прицветничкообразными листочками . . . . . 3.
2. Внутренние листочки околоцветника эллиптно-ланцетные, тупые; шпора к концу булавовидно утолщенная. В лесах и среди кустарников; в Приморье и в на востоке Приамурья . . . 1. *P. extremiorientalis* Nevski — Л. дальневосточная.
- Внутренние листочки околоцветника из неравнобокого согнутого основания, быстро суженные в узколинейное окончание; шпора к концу сильно булавовидно издутая, загнута кверху, более или менее сильно изогнутая и искривленная. В лиственных лесах и среди зарослей кустарников . . . . . 2. *P. freynii* Kränzl. — Л. Фрейна.
- 3 (от 1). Стеблевой лист 1, линейно-ланцетный; шпора нитевидная, изогнутая, слегка длиннее завязи; пыльники со сближенными гнездами. Болота и мари . . . . . 3. *P. tripuloides* (L. f.) Lindl. — Л. комарниковая.
- Стеблевой лист 1, ланцетно-эллиптический; шпора дуговидно согнутая, толстая, почти в 2 раза длиннее завязи (15—20 мм дл.); пыльники с широким (3 мм) связником и расставленными гнездами; цветет в июле. В лесах и кустарниковых зарослях . . . . . 4. *P. maximoviciana* Schlechter — Л. Максимовича.

Род 23. LIMNORCHIS Rydb. — ЛИМНОРХИС

Стебель от основания к вершине утолщающийся, полый, густо облиственный, соцветие густое, 6—10 см дл.; шпора слегка согнутая, длинная (1.6—2 см), нитевидная; губа тупая, языкообразная; цветет в июле. На сырых лугах . . . . . 1. *L. hologlottis* (Maxim.) Nevski — Л. цельногубый.


Род 24. GYMADENIA R. Br. — КОКУШНИК

Стебель 20—70 см выс., с 4—7 линейно-ланцетными листьями, сложными вдоль; соцветие густое, цилиндрическое, многоцветковое; цветки лилово-розовые; шпора нитевидная, заостренная, серповидно изогнутая, в 2 раза длиннее завязи, скрученная; цветет в июне—июле. На лугах, лесных полянах, среди зарослей кустарников . . . 1. *C. conopsea* (L.) R. Br. — К. комарниковый.

Род 25. GALEORCHIS Rydb. — ГАЛЕОРХИС

Стебель 10—20 см выс., у основания с 4 обратнойцевидным, тупым, при основании сильно суженным листом (5—8 см дл. и 3—6 см шир.); цветков 1—2, бледно-розовых, с ланцетными прицветниками; губа около 1 см дл., по краю крупногородчатая; шпора 0.7—0.8 см дл.; цветет в июне. В смешанных и хвойных сыроватых лесах . . . . . 1. *G. cyclophilus* (Franch. et Sav.) Nevski — Г. круглогубый.

Таблица 63



1 — *Chloranthus japonicus* Sieb. [Хлорант (Зеленоцвет) японский]: а — плодоносящее растение, б — цветущее растение.



Корнеклубень в основании стебля, 0,5–1 см в диам.; стебель 14–30 см выс., с 2–3 очередными, продолговатоэллиптическими листьями; цветки лилово-пурпурные, малочисленные, в однобоком соцветии; шпора горизонтальная или загнута вверх, тупая, 1–1,5 см дл.; цветет в июне—июле. Сырые долины и горные леса . . . . . 1. *Ch. secunda* Nevski — Ч. однобокая.

## DICOTYLEDONEAE — ДВУДОЛЬНЫЕ

## Сем. 35. CHLORANTHACEAE R. Br. ex Lindl. — ХЛОРАНТОВЫЕ

## Род 1. CHLORANTHUS Swartz — ХЛОРАНТ, ЗЕЛЕНОЦВЕТ



Многолетник с ветвистым, ползучим корневищем; стебель 15–40 (50) см выс., с 4 сближенными, как бы мутовчатыми листьями (порядка 1 пара бывает заметнее выходящими наружу); листья обратноовальные или эллиптические, острозубчатые; стебель заканчивается цветочной кистью; цветки с ярко-белыми тычинками (околоцветника нет); плод — мелкая зеленоватая костянка; цветет весной. В смешанных и широколиственных лесах; чаще группами . . . . . 1. *Ch. japonicus* Sieb. — Х. японский (табл. 63).

## Сем. 36. SALICACEAE Mirbel — ИВОВЫЕ

1. Все почечные чешуи свободные, почки часто клейкие, с характерным приятным запахом; тычинок 8–30, с короткими нитями, пыльники пурпурно-красные, позднее бледнеющие; рыльца с широкими, красными лопастями; листья широкие, округлые или ромбовидные, не смолистые, или же широко- или овально-эллиптические, смолистые; ветроопыляемые деревья . . . . . Род 1. *Populus* L. — Тополь.
- Почки с колпачком из 2 чешуй; тычинок 2–5, рыльца с узкими лопастями; листья менее широкие, самой различной формы, не смолистые . . . . . 2.
2. Листья, особенно молодые, интенсивно сизые, 5–6 (8) см дл., 1–2 см шир.; прилистников нет; дуб белый; столбиков 2, свободных от основания, с двухраздельными рыльцами; тычинок 5, они короче, чем прицветные чешуи; крупные ветроопыляемые деревья. На галечниках горных рек . . . . . Род 2. *Chosenia* Nakai — Чозения.
- Деревья, кустарники или травянистые, с жесткоопушенными, с цветочными, листьями различной формы и величины, с прилистниками или без них; дуб белый или ярко-желтый; столбик 1, цельный, или двураздельный, тычинок 2–5 (12). . . . . Род 3. *Salix* L. — Ива.

## Род 1. POPULUS L. — ТОПОЛЬ

1. Листовой черешок в верхней части сплюснутый, благодаря чему листья дрожат даже от очень слабого движения воздуха; листья округло-дeltовидные или округлые, неравно-зубчатые, при распускании красноватые, опушенные, позднее зеленые, голые или же снизу с мажоретным опушением; почки мелкие . . . . . 1. *P. davidiana* Dode — Т. Давида (Осина) (табл. 64, 3).
- Листовые черешки не сплюснуты, листья иной формы, почти цельнокрайные или пильчатые; почки крупные, клейкие с характерным приятным запахом . . . . . 2.
- Листовые черешки голые, иногда с коротким пушком, 3–4 см дл., с верхней стороны желобчатые; листья с железисто-пильчатым краем, 7–12 см дл. и 5–8 см шир., со слегка сердцевидным основанием; крупные деревья. По рекам, в северной части . . . . . 2. *P. suaveolens* Fisch. — Т. душистый.
- Листовые черешки более или менее опушенные, иногда почти войлочные . . . . . 3.
- Листовые черешки густо опушенные, до 3 см дл. завыя и плоды волосистые; листья плодущих ветвей с округлым основанием, широкоэллиптические, с коротким остроконечием, гладкие. Пока известны только с Амурского края . . . . . 6. *P. amurensis* Kom. — Т. амурский.
- Листья плодущих ветвей с полусердцевидным основанием, от яйцевидных и широкоэллиптических . . . . . 4.
- Листовые черешки с торчащими волосками, листья с узкосердцевидным основанием и очень коротким остроконечием на закругленной верхушке, по краю слабо городчатые и чуть заметно реснитчатые; молодые побеги в сечении квадратные. По рекам; близ Хабаровска . . . . . 5. *P. ussuriensis* Kom. — Т. уссурийский.



1 — *Populus maximowiczii* A. Henry (Тополь Максимовича), часть ветви с листьями; 2 — *P. koronae* Rehder (Т. корейский); а — часть ветви с листьями и соцветием, б — цветок; 3 — *P. davidiana* Dode [Т. Давида (Осина)]; а — часть ветви с листьями, б — цветок; 4 — *Chosenia argentea* (Pall.) A. Skvortz. (Чозения крупночешуйчатая); а — ветвь с листьями и соцветиями, б — цветок.

- Листовые черешки более или менее густо и ровно опушенные, без торчащих волосков . . . . . 5.
5. Листья с резко выделяющейся, врезанной сетью жилок, заметно морщинистые, кожистые (как бы шагреньные); поврежденные листья при отмирании буреют; побеги округлые; почки и молодые листья очень липкие, с сильным, приятным запахом. По рекам в их нижнем и среднем течении; в южной половине Дальнего Востока . . . . . 4. *P. kokana* Rehder — Т. корейский (табл. 64, 2).
- Сеть жилок менее заметна, листья опушены с обеих сторон; побеги угловатые; молодые листья и почки со слабым запахом и менее клейкие; поврежденные листья при отмирании чернеют. На юге в среднем и верхнем течении рек, а в более северных районах — в среднем и нижнем течении . . . . . 3. *P. maximowiczii* A. Henry — Т. Максимовича (табл. 64, 1).

## Род 2. *CHOSEMA* Nakai — ЧОЗЕНИИ

Крупное дерево; молодые ветви и листья с характерным сильным пахотом; листья почти цельнокрайные или же в верхней части мелкопильчатые; сережки повислые. На галечниках горных рек . . . . . 1. *Ch. albidifolia* (Pall.) A. Skvorts. *Ch. macrolepis* (Turcz.) Kom. — Ч. крупночешуйчатая (табл. 64, 4).

## Род 3. *SALIX* L. — ИВА<sup>1</sup>

1. Листья почти супротивные, перекрестнопарные, узкопродолговатые, с обеих сторон округлые, обычно цельнокрайные или в верхней части слабо пильчатые; кустарник от 1 до 2—3 (5) м выс. и 3—5 (7) см в диам. у основания ствола; цветет в начале мая, тычинок 2. В долинах рек, реже по скрым дугам; больших чистых зарослей не образует . . . . . 1. *S. integra* Thunb. — И. цельнолистная (табл. 65, 1).
- Листья явно очередные . . . . . 2.
2. Листья линейные, ланцетные, продолговато- или обратноланцетные . . . . . 3.
- Листья яйцевидные . . . . . 23.
3. Врослые листья толстые, реже с приятным, рассеянными волосками . . . . . 4.
- Врослые листья более или менее опушенные . . . . . 18.
4. Листья снизу сизые или сизовато-зеленые, молодые ветви часто с сизым или беловатым пахотом или же без него . . . . . 5.
- Листья снизу зеленые или бледно-зеленые, молодые ветви без сизого налета . . . . . 16.
5. Прилистников нет . . . . . 6.
- Прилистники есть . . . . . 7.
6. Листья продолговато- или обратноланцетные, 4—8 см дл., 1—2 см шир., по краю от середины мелкопильчатые или цельнокрайные, молодые ярко-сизые; молодые ветви голые, с сизым пахотом; крупное дерево. По горным рекам, на галечниковых отложениях . . . . . *Chosenia arbutifolia* (Pall.) A. Skvorts. *Ch. macrolepis* (Turcz.) Kom. — Чозения крупночешуйчатая.
- Листья ланцетные, продолговато- или яйцевидно-ланцетные, густо- и остропильчатые, сверху зеленые, снизу сизые; молодые ветви короткочешуйчатые; высокое дерево или крупный куст. По берегам рек и в их нижнем течении . . . . . 2. *S. dolichostyla* O. v. Seem. *S. mixta* Horsh. — И. длинностолбиковая (табл. 66, 4).
- 7 (от 5). Листья почти цельнокрайные или городчато-выемчатые, часто с волнистым краем, ланцетные, 4,5—7 см (на растущих побегах до 12—15 см) дл. и 0,6—1,2 (2) см шир., сверху темно-зеленые, блестящие, голые, снизу сизые, голые или наредка с приятным, рассеянными волосками; крупный кустарник, до 4—5 м выс. По берегам рек на песчано-галечниковых и плывото-песчаных отложениях; часто . . . . . 3. *S. sibirica* O. v. Seem. — И. Сибирская (табл. 66, 1).
- Листья с плоскими (не волнистыми) краями, зубчатые, пильчатые или мелкопильчатые, очень редко цельнокрайные . . . . . 8.
8. Листья узкие, 0,3—0,8 (1,2) см шир. . . . . 9.
- Листья более широкие, 0,5—1,4 (5) см шир. . . . . 11.
9. Листья очень узкие, 0,4—0,6 см шир. и 3,5—7 см дл., линейные, остроколючие, равномерноостропильчатые, снизу сизовато-зеленые, при сухости часто чернеющие; крупный кустарник. По берегам рек . . . . . 4. *S. tenuifolia* Turcz. — И. тонколистная.
- Листья не такие узкие (0,6—1,2 см шир.) и более длинные (до 9—15 см), железисто-пильчатые . . . . . 10.

<sup>1</sup> Определенные из нас часто бывают затруднены тем, что многие из них дают гибриды. В таблицу для определения нас мы включили также и чозении, которые в недостаточном состоянии легко может быть принята за иву. Так как обычно во время полетов и бесплодных исследований ивы бывают уже без цветков и плодов, то и в основу таблицы положены различия по вегетативным органам.

Таблица 65



1 — *Salix integra* Thunb. (Ива цельнолистная); 2 — *S. myrtilloides* L. (И. черничная); 3 — *S. brachypoda* (Trautv. et Mey.) Kom. (И. короткопильчатая); 4 — *S. gracilistyla* Miq. (И. тонколистная); 5 — *S. cardiophylla* Trautv. et Mey. (И. сердцелистная); 6 — *S. maximowiczii* Kom. (И. Максимовича).



10. Листья линейно-ланцетные, 4—9 см дл., 0.6—1.2 см шир., плотные у основания цельнокрайные, выше (или же по всей длине) грубо и неравномерно пильчатые, сверху серые, снизу сизоватые с хорошо заметными жилками; небольшое дерево или крупный куст. По берегам рек . . . 5. *S. dahurica* Turcz. — II. даурская (табл. 66, 6).
- Листья линейные, до 15 см дл. и от 0.3—1.2 см шир., расставлено и выемчато железисто-пильчатые, сызые, очень плотные, с малоаметными жилками; высокий кустарник. По берегам рек . . . 6. *S. mongolica* Siuz. — II. монгольская.
- 11 (от 8). Листья крупнозубчатые, ланцетные или удлинено-ланцетные, 10—12 см дл. и до 2.5 см шир., сверху блестящие, снизу сизые, голые; высокий кустарник. По берегам рек . . . 7. *S. lepidostachys* O. v. Seem. — II. чупуссерекская.
- Листья пильчатые . . . 12.
12. Ветви тонкие, обычно с сизым налетом; прилистники крупные, почти равны листовому черешку, 0.4—0.8 см дл., косо яйцевидные или почковидные; листья ланцетные, заостренные, до 10—12 см дл. и 0.7—3.2 см шир. по краю равномерно железисто-пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу сизые; крупное дерево. По песчано-галечниковым отложениям рек . . . 8. *S. rorida* Laksch. — II. росистая.
- Ветви без сизого налета, голые или более или менее волосистые; прилистники иной формы . . . 13.
13. Листья ланцетные, эллиптические, продолговатые или яйцевидные, 1.5—7 см дл. и 1—3.5 см шир., мелкопильчатые или же цельнокрайные; кустарник до 1.5—2 м выс. В горах; Амурская область . . . 9. *S. hastata* L. — II. копьевидная.
- Листья ланцетные или ланцетно-продолговатые, более крупные, до 10—12 (15) см дл., мелкопильчатые или расставленно зубчатые; деревья или крупные кустарники. По берегам рек . . . 14.
14. Листовые черешки до 1—1.5 см дл. . . . 15.
- Листовые черешки до 5 мм дл. и 2—3 см шир., ланцетные или ланцетно-продолговатые, мелкопильчатые, молодые снизу опушенные, взрослые голые или же опушены только по жилкам; дерево или высокий кустарник. Указывается только для самого юга Приморья . . . 10. *S. pierottii* Miq. — II. Пьеро.
15. Молодые побеги войлочно опушенные, листовые черешки 0.4—1 см дл.; листья ланцетные, 7—10 см дл. и 2—3 см шир., тонкопильчатые, с пологими зубчиками; дерево или крупный древовидный куст. В нижнем течении рек на песчаных и иловато-песчаных отложениях, часто группами на лугах в более южных районах . . . 11. *S. pinnifolia* Franch. et Sav. — II. пилюсовая.
- Молодые побеги голые или с редкими, быстро исчезающими волосками; листовые черешки 1—1.5 см дл.; листья продолговато-ланцетные, или ланцетные, 4—15 см дл. и 0.5—3.5 см шир., железисто-пильчатые и расставленно зубчатые; дерево или высокий кустарник. По рекам и на лугах . . . 12. *S. triandra* L. — II. трехлистниковая.
- 16 (от 4). Листья выемчато-мелкозубчатые, горечатые или почти цельнокрайные, ланцетные, эллиптически-ланцетные или обратнояйцевидно-ланцетные, 5—10 см дл. и 0.5—0.3 см шир., сверху голые, снизу с единичными волосками; крупное дерево. По рекам и на лесных опушках . . . 13. *S. sachalinensis* Fr. Schmidt — II. сахалинская.
- Листья пильчатые . . . 17.
17. Листья остроязычатые, продолговатые, к основанию длинно суженные, до 2.5—4 см дл. и до 1 см шир., молодые веточки шелковистые; высокий кустарник. По берегам рек; на нижнем Амуре . . . 14. *S. udensis* Trautv. et Mey. — II. удская.
- Листья мелкие и редко пильчатые, широколанцетные или яйцевидно-ланцетные, плотные, сверху темно-зеленые, снизу более светлые; низкий (20—30 см выс.) кустарник с расходящимися ветвями. На холмах; в Амурской области . . . 15. *S. divaricata* Pall. — II. расходящаяся.
- 18 (от 3). Листья явно зубчатые или пильчатые . . . 19.
- Листья цельнокрайные, иногда с загнутым краем . . . 21.
19. Прилистники крупные, хорошо развитые . . . 20.
- Прилистники мелкие, преимущественно у верхних листьев или их нет вовсе; листовые черешки 3—17 мм дл., волосистые; пластинки ростовых побегов линейно-продолговатые, до 20 см дл. и около 6—6.5 см шир.; листья пестроцветных побегов ланцетные, продолговато-ланцетные или линейно-продолговатые; пластинки сверху голые (опушение только по жилкам), снизу серые, прижатолобоватые, 4—10 см дл. и 1.5—2 см шир., небольшое дерево или крупный куст. По рекам; на самом юге Приморья (пос. Краскино, г. Владивосток) . . . 16. *S. kangensis* Nakai — II. кангская.
20. Листовые черешки до 10 мм дл., листья обратноланцетные или ланцетно-продолговатые, 10—12 см дл. и до 3.5 см шир., молодые и острозубчатые; крупный кустарник, реже небольшое дерево. По берегам рек и ручьев на песчано-галечнико-

Таблица 66



1 — *Salix siuzewii* O. v. Seem. (II. Сюзена); 2 — *S. schuererianii* E. Wolf (II. Шверерина); 3 — *S. caprea* L., s. l. (II. козья); 4 — *S. dolichostachya* O. v. Seem. (II. длинностолбиковая); 5 — *S. rorida* Laksch. (II. росистая); 6 — *S. dahurica* Turcz. (II. даурская).



- вых отложениях; один из самых обычных видов на . . .
17. *S. gracilistylus* Miq. — II. тонкостолбовая (табл. 65, 4).  
 Листовые черешки более короткие; листья широколанцетные, продолговатоланцетные или ланцетные, 8—20 см дл. и 2—3,5 см шир., железисто-зубчатые или цельнокрайные, с завернутыми краями; небольшое дерево или высокий кустарник. По берегам рек; в Амурской области . . .
18. *S. dasycarpus* Winkl. — II. шерстистоголовая.  
 Листовые черешки более короткие; листья широколанцетные, продолговатоланцетные или ланцетные; прилистники крупные; кустарник до 1 м высоты. Весьма обычна на болотах и сырых лугах и выгонах . . .
19. *S. blanchardii* (Trautv. & Mey.) Kom. — II. короткостолбовая (табл. 65, 3).  
 Листья более длинные, до 10—20 см дл. . . .
22. Прилистники узколанцетные, ланцетные, серповидные или их вовсе нет; листовые черешки 0,5—1,4 см; листья узко- или линейно-ланцетные, до 15—20 см дл. и 0,3—2 (4) см шир., сверху темно-зеленые, голые, реже более или менее опушенные, с бугорчатыми железками у краев листа, снизу со сплошным шелковистым покровом, блестящие, серебристые; крупный куст или небольшое дерево до 6—8 м выс. (реже до 10 м) и до 30 (50) см в diam. Везде; по берегам рек, где местами образует чистые или почти чистые заросли . . .
20. *S. schweinfii* E. Wolf, *S. vitalis* L., s. l. — II. Шверина, И. коряночная (табл. 66, 2).  
 Прилистники ланцетные; листовые черешки 0,3—0,8 см дл., листья ланцетные, 6—15 см дл. и 1,5—3,5 см шир., сверху темно-зеленые, тусклые, слегка беломелковатые, снизу с редкими, короткими волосками или даже голые, серо-зеленые или сизоватые; высокий кустарник или небольшое дерево. По берегам рек; на Амуре . . .
21. *S. aprica* Anders. — II. теплолюбивая.  
 Листья сильно морщинистые, от яйцевидных, почти округлых, до эллиптических или даже ланцетных, до 14—18 см дл. и 5—8 см шир., листовые черешки толстые, до 2—2,5 см дл.; крупный куст или дерево, до 6—8 м выс. и до 20—30 см в diam. В смешанных и лиственных лесах, по окраинам рослых, по всевозможным обнажениям и на гаях после пожаров . . .
22. *S. caprea* L., s. l. — II. козья (табл. 66, 3).  
 Листья не морщинистые или слабо морщинистые . . .
24. Листья сверху-голые или слабо опушенные . . .
- Листья сверху густо-сероволосистые, обратояйцевидно-ланцетные или продолговато-обратояйцевидные, 3—6 см дл. и 1,2—2,8 см шир.; кустарник до 1,5 м выс. В горах Амурской области . . .
23. *S. glauca* L. — II. сизая.  
 Листья ланцетные или продолговато-ланцетные . . .
- Листья иной формы . . .
- Листья ланцетные, или же частично обратояйцевидные, 1—2,5 см дл. и 1—2 см шир., жесткие, со слегка вдавленными сверху пинками, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые; небольшой, до 50 см, часто стелющийся кустарник. На моховых и травяных болотах; преимущественно в нижнем течении Амура . . .
24. *S. fuscescens* Anders. — II. буроватая.  
 Листья продолговато-клиновидные, частично обратояйцевидные или эллиптически-овальные, до 5 см дл. и до 1,8 см шир.; небольшой распростертый кустарник. На гольцах; в Амурской области . . .
25. *S. emicata* Turcz. — II. клиновидная.  
 Листья клиновидные . . .
- 27 (от 25). Взрослые листья голые или, реже, с редкими, рассеянными волосками . . .
- Взрослые листья более или менее опушенные . . .
- Листья свыше 5 см дл. . . .
- Листья более мелкие, большинство листовых пластинок не длиннее 5 см . . .
- Молодые листья и веточки клейкие (прилипают к бумаге), взрослые листья плотные, кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу более светлые, от яйцевидно-продолговатых до широколанцетных, 5—13 см дл. и 2—4 см шир., густо железисто-пильчатые; семена созревают в конце сентября — начале октября; крупный куст. На болотах . . .
26. *S. pentandra* L., s. l. — II. пятиточечниковая.  
 Молодые листья и веточки не клейкие; семена созревают весной, реже в самом начале лета . . .
- Листовые черешки до 1—1,5 (1,6) см дл. . . .
- Листовые черешки более короткие, и большинство их не превышает 5—6 мм дл. . . .
- Листья цельнокрайные, обратояйцевидно-клиновидные, 5—6 см дл. и 2—5 см шир., сверху темно-зеленые, снизу светлые; стелющийся кустарник с ветвями до 50 см дл. На гольцах; в Амурской области . . .
27. *S. torulosa* Trautv. — II. узколанцетная.  
 Листья остропильчатые или с загнутым краем; более крупные кустарники или деревья . . .
- Края листьев не загнуты, листья остропильчатые, яйцевидно-продолговатые или яйцевидно-ланцетные, наиболее широкие близ основания, 3—12 см дл. и 1,2—3,5 см шир., сверху темно-зеленые, снизу тускло-сизые; крупные деревья. В верхнем течении горных рек . . .
28. *S. maximowiczii* Kom. — II. Максимовича (табл. 65, 6).  
 Листья с загнутым краем или крупно остропильчатые, округло-эллиптические или яйцевидно-ланцетные, до 8 см дл. и 4—5 см шир.; крупный кустарник, зарослей и на полянах; группами и единично . . .
29. *S. starkoviana* Willd. — II. Старка.  
 Листья яйцевидно-эллиптические с сердцевидным, реже почти круглым выемчатым; листовые черешки 0,2—0,6 см дл.; крупное дерево. В верхнем течении . . .
30. *S. cardiophylla* Trautv. & Mey. — II. сердцелистная (табл. 65, 5).  
 Основания листьев не сердцевидные; кустарники различной величины . . .
- Листья продолговатые, к основанию длинно выемчатые, ланцетно-ланцетные, 3—8 см дл. и до 1,5 см шир., на вегетативных побегах пильчатые, на цветущих цельнокрайные; кустарник около 2 м выс. По опушкам и долинам горных рек; на Амуре . . .
31. *S. chlorostachya* Turcz. — II. зеленосерокожая.  
 Листья равномерно от продолговатоланцетных до обратояйцевидных . . .
- Листья широко- или грубо-ланцетные, железисто-пильчатые, яйцевидно-ланцетные, округло-эллиптические или обратнояйцевидно-продолговатые, до 7,5 см дл. и до 5 см шир.; крупный кустарник или, реже, небольшое дерево. В горных лесах; в Амурской области . . .
32. *S. viridula* Anders. — II. зеленостая.  
 Листья цельнокрайные или неравномерно крупнопильчатые, обратояйцевидные, эллиптические или узкоэллиптические . . .
- Листья обычно цельнокрайные, эллиптические или продолговатоланцетные, 2,5—7 см дл. и 2—3 см шир., с сильно выступающими снизу жилками; кустарник до 2 (3) м выс. На сырых лугах, по берегам рек и озер; на Амуре . . .
33. *S. koschiana* Trautv. & Mey. — II. Козья.  
 Листья цельнокрайные, мелкозубчатые или крупно и неравномерно пильчатые, обратояйцевидные или широколанцетные, 2—6 см дл., 1,5—3 см шир., сверху зеленые, снизу свинцово-сизые; кустарник от 0,5 до 1 (1,5) м выс. На лугах, в редких лесах, на опушках, у русел рек . . .
34. *S. livida* Wahlb. — II. синево-серая.  
 Ветви с остатками старых, увядших листьев; небольшие кустарники. На гольцах . . .
- Ветви без остатков старых, увядших листьев . . .
- Листья пильчатые или надрезанно-колючие, с загнутыми назад зубцами, жесткие, с обеих сторон ярко-зеленые, голые, блестящие, эллиптические или обратнояйцевидные, 1—2 см дл. и 0,3—1 см шир.; маленький стелющийся кустарник с укореняющимися ветвями до 35 см дл. На гольцах; Сихотэ-Алинь (Терейский район) и в Амурской области . . .
35. *S. berberifolia* Pall. — II. барбарисолистная.  
 Листья цельнокрайные или мелкозубчатые, узкие, линейные, яйцевидные, 1—3—3,5 см дл. и 0,7—2 см шир.; небольшой, до 50 см выс, кустарник. На гольцах; в Амурской области . . .
36. *S. myrsinites* L. — II. мыриносная.  
 Листья 0,8—1,2 см дл. и 0,5—0,9 см шир., широколанцетные, с почти завернутыми краями; маленький кустарник. На гольцах и на галечниках горных рек; в Амурской области . . .
37. *S. saxatilis* Turcz. — II. скальная.  
 Листья до 2—3,5 см дл. и более . . .
- Прилистники есть . . .
- Прилистников нет; листья обратояйцевидные или эллиптические, до 1,2—2 см дл. и 0,6—1,8 см шир.; небольшой, до 30 см выс, распростертый кустарник. На гольцах; нижний Амур . . .
38. *S. ovalifolia* Trautv. — II. овальнолистная.  
 Прилистники крупные, округло-почковидные; листья округлые, округло-яйцевидные или округло-эллиптические, 2—8 см дл. и 1,5—6 см шир., пильчатые; небольшое дерево или кустарник. В лесах на Амуре . . .
39. *S. pyrolifolia* Led. — II. пиролалистная.  
 Прилистники мелкие, яйцевидные, эллиптические, ланцетные или линейные, иногда быстро опадающие . . .
- Листья сверху желто-зеленые, почти блестящие, реже тусклые, 2,5—3 см шир. и от 2,5 до 5 см дл., продолговатоланцетные или обратояйцевидно-эллиптические, остро- и редкопильчатые или цельнокрайные; кустарник до 2 м выс. На сырых участках, чаще в лиственных лесах . . .
40. *S. oblongifolia* Trautv. & Mey. — II. продолговатолистная.  
 Листья сверху зеленые или темно-зеленые (не желтоватые) . . .
- Листья снизу зеленые или темно-сизые, сверху зеленые, до 3,5 см дл. и 2 см шир., расставленно-ланцетные или цельнокрайные; распростертый кустарник с приподнимающимися ветвями, до 0,5 м выс. На гольцах или галечниках горных рек; на Амурской области . . .
41. *S. fumosa* Turcz. — II. дымчатая.  
 Листья снизу зеленые, светлые или сизоватые (не свинцовые) . . .



44. Почка темно-бурная, почти черная; листья яйцевидно-ланцетные или широко-ланцетные, плотные, сверху темно-, снизу светло-зеленые, до 3 см дл. и 1,5 см шир., мелко- и редкочерешчатые . . . . . 15. *S. divaricata* Pall. — II. расхопренная (см. также ступень 17).
- Почка светлая, листья цельнокрайные или мелкопильчатые . . . . . 45.
45. Прилистники ланцетные, листья снизу сизые, с ясно выступающими жилками, яйцевидные, эллиптические или продолговатоэллиптические, 1—3,5 см дл. и 0,7—1,5 см шир., обычно цельнокрайные; небольшой прямостоящий кустарник, 30—80 см выс. (гибриды бывают до 1,5—2 м). Частые на болотах . . . . . 42. *S. myrsinoides* L. — II. черничная (табл. 65, 2).
- Прилистники полусердцевидные, косые яйцевидные или почковидные; листья яйцевидные, продолговатоэллиптические или ланцетные, чаще мелкопильчатые 1,5—7 см дл. и 1—3,5 см шир. . . . . 9. *S. hastata* L. — II. копьевидная (см. также ступень 13).
- 46 (от 27). Ветви с остатками старых увядших листьев . . . . . 36. *S. myrsinites* L. — II. мырилистная (см. также ступень 38).
- Ветви без остатков старых листьев . . . . . 47.
47. Листья обратнояйцевидно-округлые, обратнояйцевидные и обратнояйцевидно-эллиптические, 3,5—7 см дл. и 3—4 см шир., сверху темно-зеленые, снизу мягко бархатисто-войлочные; кустарники или деревья. На склонах по лесным опушкам . . . . . 43. *S. raddeana* Laksch. — II. Радде.
- Листья от обратнояйцевидных и яйцевидных до продолговатоэллиптических и даже ланцетных, сверху тускло- или темно-зеленые, снизу от слабо опушенных до бархатисто-войлочных . . . . . 48.
48. Взрослые листья сверху и снизу или только снизу с густым, белым, блестящим войлоком, с округлым или клиновидным основанием, яйцевидные, эллиптические, продолговатоэллиптические или обратнояйцевидно-продолговатые, остро-зубчатые или же с слегка завороченными краями, 2,5—7,5 см дл. и 2—4 (5) см шир.; кустарник или небольшое дерево. На низком Амуре . . . . . 44. *S. bobbiniana* Sarg. — II. Бобба.
- Взрослые листья сверху темно-зеленые или тускло-зеленые . . . . . 49.
49. Листие побеги беловолючные; листовые черешки 3—5 мм дл.; листья продолговатоэллиптические, 5—7 см дл. и около 2 см шир., сверху темно-зеленые, реже тускло-серые, снизу прижат беловолючные; кустарник до 1,5—2 м выс. В горах; в Амурской области . . . . . 45. *S. krylovii* E. Wolf — II. Крылова.
- Листие побеги серые, пушистые; листовые черешки 6—8 мм дл.; листья обратнояйцевидные, эллиптические или ланцетные, сверху тускло-зеленые, слегка прижатоволючные, снизу от слабо опушенных до бархатисто-войлочных, 4—8,5 см дл. и 0,5—4,5 см шир.; куст или небольшое дерево до 4—5 (6) м выс. Единично и небольшими группами; по ручьям и у подножия склонов, а также на дугах; часто . . . . . 46. *S. xerophila* Floder. — II. сухолобная.

Таблица 67



1 — *Myrica tomentosa* (DC.) Aschers. et Graebn. (Восковица пушистая); 2 — *Alnus hirsuta* Turcz. (Ольха пушистая); 3 — *A. fruticosa* Rupr. (О. кустарничко-вая); 4 — *A. japonica* Sieb. et Zucc. (О. японская).

## Сем. 37. MYRICACEAE Blume — ВОСКОВНИЦЕВЫЕ

### Род 1. MYRICA L. — ВОСКОВНИЦА

Кустарник 100—120 см выс., с многочисленными густыми ветвями; молодые веточки опушенные; все растение с характерным смолистым запахом; листья продолговатые, обратноовальные, с клиновидным основанием, 3—5,5 см дл. и 1—1,5 (1,3) см шир., с несколькими (2—3) зубцами с каждой стороны, с обеих сторон опушенные, особенно с нижней, кромки опушения есть железки; растение двудомное; цветет до появления листьев. По окраинам моховых болот; у устья Амура и вдоль морского берега на юг почти до р. Сулаухе . . . . . 1. *M. tomentosa* (DC.) Aschers. et Graebn. — В. пушистая (табл. 67, 1).

## Сем. 38. JUGLANDACEAE A. Rich. ex Kunth — ОРЕХОВЫЕ

### Род 1. JUGLANS L. — ОРЕХ

Дерево до 15—25 (28) м выс. и до 30—75 (100) см в диам.; листья крупные, из 9—19 листочков, с зазубренным снизу, с характерным резким запахом; мужские сережки толстые, длинные, 10—30 см дл.; цветет в конце мая—июне; плоды крупные, разнообразной формы, в толстой зеленой или буроватой наружной оболочке. По долинам рек, реже на прилегающих склонах . . . . . 1. *Ju. manshurica* Maxim. — О. маньчжурский (табл. 68).

Таблица 68



*Juglans manshurica* Maxim. (Орех маньчжурский): а — лист, б — типичный листок, в — часть ветви с тычиночными сережками, г — часть ветви с пестичными цветками.

1. Листья с узкосердцевидным основанием, остролишьчатые, 8—10 (12) см. дл. и 4,5—5 (6—6,5) см. шир.; почки длинные, острые; плодущие сережки зеленые, 4—15 см дл. (очень похожи на шишки культурного хмеля); небольшое дерево . . . . . Род 3. *Carpinus* L. — Граб.
- Листья не сердцевидные (реже слабо сердцевидные); почки округлые, тупые или острые, до тогда мелкие . . . . . Род 2. *Corylus* L. — Лещина.
2. Листья 6—10 см шир., верхней части более или менее донасто-зубчатые; плод — орех, заключенный в листоватую или трубчатую обвертку; кустарник от 1—1,5 до 3, реже 4 м выс. . . . . Род 1. *Alnus* Gaertn. — Ольха.
- Плоды мелкие, орешки с более или менее развитыми крылышками (реже без них), в рассыпающихся по созреванию сережках или в остающихся на дереве «шишках» . . . . . Род 2. *Betula* L. — Береза.
3. Почки крупные, часто на коротких ножках; листья крупные, до 7—10 (15) см дл. и 3—8 (40—11) см шир.; плодущие сережки («шишки») с деревенеющими чешуями остаются на дереве после вылета из них семян до следующего года . . . . . Род 1. *Alnus* Gaertn. — Ольха.
- Почки более мелкие, часто острые, всегда сидячие; листья обычно более мелкие, 1—6 (14) см дл. и 1—6 (10) см шир.; плодущие сережки после созревания рассыпаются . . . . . Род 2. *Betula* L. — Береза.

Род 1. *ALNUS* Gaertn. — ОЛЬХА

1. Листья железистые, более или менее клейкие (особенно молодые), без опушения; цветение происходит одновременно с распусканием листьев, так как плодущие сережки перемещаются внутри почек . . . . . Род 2.
- Листья более или менее опушенные, реже голые, не клейкие; цветение наблюдается до распускания листьев; плодущие сережки перемещаются открыто . . . . . Род 3. *A. maximoviczii* Call. — О. Максимовича.
2. Листья широко- или округлояйцевидные, с широким, иногда сердцевидным основанием, 7—10 см дл. и 7—8 см шир., меднолишьчатые; крупный куст или дерево до 10 м выс. По рекам, в северной части у морского побережья . . . . . Род 1. *A. fruticosa* Rupr. — О. кустарниковая (табл. 67, 3).
- Листья широкоэллиптические или овальные . . . . . Род 3.
3. Листовые черешки короткие, менее 2 см дл.; листья чаще остроковичные, широко-яйцевидные; крупный куст, реже небольшое дерево. По горным рекам; в западной части Амурской области . . . . . Род 4. *A. kamtschatica* (Call.) Kom. — О. камчатская.
- Листовые черешки более длинные, 2—2,5 (3) см дл., листья обычно с коротким, тупым остроковичием . . . . . Род 4.
4. Листья чаще широкоэллиптические, с ширококлиновидным основанием; крупный куст или небольшое дерево до 6—8 м выс. По горным рекам в их верхнем течении, по окраинам российских и японских скал в горах . . . . . Род 2. *A. manshurica* (Call.) Hand.-Mazz. — О. маньчжурская.
- Листья овальные или яйцевидные, с округлым, чаще неравнобоким основанием. По рекам и россам; в устье Амура . . . . . Род 4.
- 5 (от 1). Листья узкоэллиптические или ланцетные, к основанию клиновидно суженные, реже закругленные, 5—10 см дл. и до 5 см шир., остролишьчатые; дерево до 8—10 м выс. По морскому побережью; на юге (на север до пос. Ольги) . . . . . Род 5. *A. japonica* Sieb. et Zucc. — О. японская (табл. 67, 4).
- Листья округлые или широкояйцевидные . . . . . Род 6.
6. Листья округлые, 10—15 см дл. и 8—10 см шир., сверху голые, снизу с редким опушением, тупо и неглубоко донастные, двояколишьчатые; шишки крупные, 2,5—4 см дл.; дерево или крупный куст. Только на юге Приморья . . . . . Род 7. *A. finckiana* Sieb. — О. красильная.
- Листья до 12 см дл. и 11 см шир., округлые, широкоэллиптические или широкояйцевидные, двояко или неглубоко донасто-зубчатые, снизу рыжковато-бархатистые (var. *glabrescens* Call.); шишки 1—2 (2,5) см дл.; дерево до 15—17 м выс., реже крупный куст. По сырым местам, берегам рек и ключей; всюду . . . . . Род 6. *A. hirsuta* Turcz. — О. пушистая (табл. 67, 2).

Часто образует гибриды с японской ольхой.

Род 2. *BETULA* (Touraj.) L. — БЕРЕЗА

1. Листья мелкие, не длиннее 4 см . . . . . Род 1.
- Листья более крупные, обычно не менее 4,5—5 см дл. . . . . Род 2.
2. Ширина листьев обычно равна длине или даже немного ее превышает . . . . . Род 3.



- Длина листьев всегда превышает их ширину . . . . . 4.
3. Листья очень мелкие, 1—2 см дл. и 1—2,5 см шир., круговатые; маленький кустарник, часто со стелющимися ветвями. На моховых болотах; в северной части . . . . . 1. *B. exilis* Sukacz. — *B. тощая* (табл. 69, 1).
- Листья несколько крупнее, до 25 мм шир. и 22 мм дл., большей частью широко-яйцевидные; маленький кустарничек до 50 см выс. На гольцах; Сихотэ-Алиа . . . . . 2. *B. Komarovii* Perl. et Kolesn. — *B. Комарова* (табл. 69, 2).
- 4 (от 2). Листья плотные, голые, сверху темно-зеленые, блестящие, обратнойяйцевидные, круговатые или округло-ромбические, 15—40 мм дл. и 10—30 мм шир.; кустарник 0,5—2 м выс. На моховых болотах и в лиственничных лесах; в северном Приморье и Приамурье . . . . . 3. *B. middendorffii* Trautv. et Mey. — *B. Миддендорфа* (табл. 69, 3).
- Листья ишице . . . . . 5.
5. Листья овальные или яйцевидно-овальные, 2—4 см дл. и 1,2—3 см шир., сверху темно-зеленые, иногда с рассеянными белыми волосками, снизу бледные, по жилкам волосистые, густо железисто-точечные; кустарник 1—2 м выс. По моховым болотам, заболоченным берегам рек и на избыточно увлажненных участках, где часто образует заросли — «ерники» . . . . . 4. *B. ovalifolia* Rupr. — *B. овальнолистная* (табл. 69, 2).

Часто дает гибриды с белыми березами *B. manshurica* и *B. platyphylla*.

- Листья ишице . . . . . 6.
6. Листья яйцевидно-ланцетные, 2,5—3 см дл. и 2—2,5 см шир., сверху голые или по средней жилке у основания опушенные, более или менее покрыты точечными железками, снизу по жилкам волосистые, смолисто-железистые, негравированные почти двоякозубчатые; небольшое дерево. Каменистые склоны; на Амуре (реки Уркиан, Гиловы) . . . . . 5. *B. prochorovii* Kuzen. — *B. Прохорова*.
- Листья яйцевидно-эллиптические, 1,5—2,5 см дл., 1—2 см шир., острые, голые или сверху рассеяно опушенные, снизу по жилкам опушенные, мелкозильчатые; кустарник 0,5—2 (2,5) м выс. Образует «ерники» на участках с избыточным увлажнением; по Амуре . . . . . 6. *B. fruticosa* Pall. — *B. кустарниковая*, «ерник» (табл. 69, 6).
- 7 (от 1). Листья с 7 и более парами резко выделяющихся жилок, ребристые . . . . . 8.
- Листья обычно с 5, реже с 7 парами слабо выделяющихся жилок, не ребристые . . . . . 11.
8. Листья удлиненно-овальные, длинноостроконечные, с 10 и более парами жилок, 5—8 см дл., 2—4 см шир.; кора светло-желтая или коричнево-желтая, отслаивающаяся крупными кусками, особенно на молодых экземплярах; дерево до 30 м выс. и до 80—90 см в диам. В смешанных лесах; чаще на юге . . . . . 7. *B. costata* Trautv. — *B. ребристая*, *B. желтая* (табл. 70, 1).
- Листья с 7—9, реже 10 парами жилок; кора светло-серая, темно-серая или темно-бурая, почти черная . . . . . 9.
9. Листья яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, 4—8 см дл., 2—6 см шир., с 7—10 парами жилок, сверху красноватых, снизу выступающих, сверху голые, снизу с редкими смолистыми железками и по жилкам опушенные, острозубчатые; кора темная, иногда почти черная, гладкая или (у старых деревьев) раскрывающаяся на тонкие пластинки; семена (орешки) бескрылые, с очень узкой каймой по краю; дерево. По крутым склонам и грёбням; только на самом юге Приморья . . . . . 8. *B. schmidtii* Rgl. — *B. Шмидта*, *B. железная* (табл. 70, 3).
- Листья яйцевидные, овальные или широкоовальные, с 7—9 парами жилок, двояко-остро- или зубчато-пильчатые; кора светло-серая, иногда почти белая, а у более старых деревьев темно-серая, бурооватая, шелушащаяся; семена (орешки) крылатые . . . . . 10.
10. Молодые веточки густо покрыты рыжим бархатистым опушением; почти густо бархатисто опушенные; дерево . . . . . 9. *B. velutina* V. Vassil. — *B. бархатистая*.


Указывается для Охотского побережья, ввозное вероятно нахождение в устье Амра.

- Молодые веточки менее железистые, опушены короткими бархатистыми и длинными беловатыми волосками; почти густошерстистые или войлочко опушенные; дерево. В горах по окраинам каменистых россыпей; местами образует у верхней границы леса свой пояс . . . . . 10. *B. lanata* V. Vassil., *B. ermanii* aust., non Cham. — *B. каменистая*, *B. перистая* (табл. 69, 5).
- 11 (от 7). Листья овальные или яйцевидные; кора старых деревьев темно-серая, иногда черноватая, растрескивающаяся и отслаивающаяся многими слоями; дерево до 20—25 м выс. и до 50—70 см в диам. Широко распространена в дубняках, реже в дубово-кедровых лесах . . . . . 11. *B. dahurica* Pall. — *B. даурская*, *B. черная* (табл. 70, 3).
- Листья иной формы; кора гладкая, светлая, белая . . . . . 12.

Таблица 69



1 — *Betula exilis* Sukacz. (Береза тощая); 2 — *B. ovalifolia* Rupr. (*B. овальнолистная*); 3 — *B. middendorffii* Trautv. et Mey. (*B. Миддендорфа*); 4 — *B. Komarovii* Perl. et Kolesn. (*B. Комарова*); 5 — *B. lanata* V. Vassil. (*B. перистая*); 6 — *B. fruticosa* Pall. (*B. кустарниковая*, «ерник»), а — часть побега с листьями и сережками, б — крылатый орешек, а — «семя».



1 — *Betula costata* Trautv. (Береза ребристая, Б. желтая): а — часть ветви с листьями и сережкой, б — прицветная чешуя, в — семя; 2 — *B. platyphylla* Sukacz. (Б. плосколистная, Б. белая), часть ветви с листьями; 3 — *B. schmidtii* Rgl. (Б. Шмидта, Б. железная): а — часть ветви с листьями, б — сережка, в — прицветная чешуя, г — «семя»; 4 — *B. mandshurica* (Rgl.) Nakai (Б. маньчжурская, Б. белая): а — верхняя часть ветви с листьями и сережкой, б — прицветная чешуя, в — «семя»; 5 — *B. dahurica* Pall. (Б. даурская, Б. черная): а — лист, б — лист и сережка, в — прицветная чешуя, г — «семя».



1 — *Carpinus cordata* Blume (Граб сердцелистный): слева — верхняя часть побега с листьями, б — сережка; 2 — *Corylus heterophylla* Turcz. ex Bess. (Песчица разнолистная): а — лист, справа — пестичные цветки, в — сережка (Песчица разнолистная); 3 — *C. mandshurica* Maxim. ex Rupr. (Л. маньчжурская): а — лист, б — плоды.



12. Листья очень крупные, 8—12 см дл. и 6—11 см шир., кругловатые или яйцевидные, коротко туповато заостренные; небольшое дерево. В лесах; Амурская область . . . . . 12. *B. demetrii* Ig. Vassil. — Б. Дмитрия.
- Листья меньших размеров, 5—7 см дл. . . . . 13.
13. Листья просто, реже двояко зубчато-пильчатые; основание листа усеченное; прицветные чешуи с длиноклиновидным основанием. В лесах и на горах; главным образом в Амурской области, частично в Хабаровском крае . . . . . 13. *B. platyphylla* Sukacz. — Б. плосколистная, Б. белая (табл. 70, 2).
- Основание листа ширококлиновидное; привневные чешуи с короткоклинковидным основанием; боковые лопасти их широкие, отклоненные в стороны. В лесах и на горах; в Приморском крае, на юге Хабаровского края, частично в восточной части Амурской области . . . . . 14. *B. mandshurica* (Rgl.) Nakai — Б. маньчжурская, Б. белая (табл. 70, 4).

#### Род 3. *CARPINUS* L. — ГРАБ

Небольшое дерево с серой корой; почки довольно крупные, острые, яйцевидные; листья овальные, яйцевидные или продолговатояйцевидные, с узкосердцевидным основанием, 7—12 см дл. и около 6 см шир., с резко выраженным жилкованием, неравномерно удвоенно пильчатые (зубчики с острием); плодущие сережки зеленые, цилиндрические, очень похожие на шишки хмеля. Только на самом юге Приморья, где весьма обычны в смешанных лесах . . . . . 1. *C. cordata* Blume — Г. сердцелистный (табл. 71, 1).

#### Род 4. *CORYLUS* L. — ЛЕЩИНА

1. Листья широкие, на конце с лопастями, центральные остроконечные лопасти обычно не превышают боковых; обертка орехов листоватая, не колючая, веточки темные; кустарник около 1,5, реже до 2 м выс. Образует заросли на открытых местах и по опушкам . . . . . 1. *C. heterophylla* Turcz. ex Bess. — Л. разнолистная (табл. 71, 2).
- Листья без резко выдающихся боковых лопастей; обертка орехов трубчатая, с многочисленными колючими волосками . . . . . 2.
2. Обертка в 2—3 раза длиннее ореха; орех остроконечный; крупный куст или даже дерево до 3—4,5 м выс. В хвойно-широколиственных лесах . . . . . 2. *C. mandshurica* Maxim. ex Kupr. — Л. маньчжурская (табл. 71, 3).
- Обертка более короткая, всего лишь в 1,5—2 раза длиннее ореха; орех на конце притупленный. В смешанных лесах; Амурская область . . . . . 3. *C. brevifolia* Kom. — Л. короткотрубчатая.

Сомнительный вид, по-видимому, лишь форма *C. mandshurica*. В местах совместного произрастания Л. разнолистной и Л. маньчжурской иногда дают гибриды, имеющие листоватую обертку, более или менее густо покрытую длинными, но не колючими волосками.


### Сем. 40. *FAGACEAE* Dum. — БУКОВЫЕ

#### Род 1. *QUERCUS* L. — ДУБ

1. Листья снизу сильно опушенные, крупные, листочки плоские со свободными концами, удлиненные. Только на юге Приморья, на север до Сучана, Находки и устья Судзухе . . . . . 1. *Q. dentata* Thunb. — Д. зубчатый (табл. 72, 2).
- Листья более мелкие, снизу голые или же опушены только по жилкам (опушение часто заметно только в дупу); листочки плоские, плотные, лишь слегка торчащие . . . . . 2.
2. Листья с неправильно расположенными, главным образом тупыми зубцами; листочки плоские утолщенные, слегка торчащие, почти голые или со слабым заметным серым опушением. Одна из самых распространенных широколиственных пород, образует леса и порослево-кустарниковые заросли . . . . . 2. *Q. mongolica* Fisch. — Д. монгольский (табл. 72, 1).
- Листья с правильно расположенными заостренными зубцами (иногда двоякозубчатые), остроконечные; плоская из узких, тонких листочков, слегка бархатистая . . . . . 3. *Q. crispula* Blume — Д. курчавый.

Сюда, по-видимому, относятся некоторые экземпляры, собранные в Хасанском районе. *Q. mongolica* и *Q. dentata* образуют на п-ове Корея ряд гибридов, которые, возможно, обнаруживаются и у нас.

Таблица 72



1 — *Quercus mongolica* Fisch. (Дуб монгольский); 2 — *Q. dentata* Thunb. (Д. зубчатый). а — лист, б — жолудь с плюской.

## Род 1. ULMUS L. — ПЛЬМ, ВЯЗ

Таблица 73

1. Листья со сравнительно равнобоким основанием, мелкие, 3—5 см дл. (на порослевых и концевых побегах до 6—7 см); крупный куст или дерево до 12 (16) м выс. и до 1 м в диам. Встречается по долинам крупных рек (Судзукхе, Сучан, Улахе, Даубихе, Фудзин, Лефу и др.). Одна из самых распространённых в культуре на Дальнем Востоке (особенно в Приморском крае) пород . . . . . 2. *U. pumila* L. — П. низкий.
- Листья с явно неравнобоким основанием, большинство их более крупные, 5—10 см дл. (на порослевых и концевых побегах до 15—20 см) . . . . . 2.
2. Листья плодущих веток на вершине трех-пятилопастные; листья при сухке неприятно пахнут; крупное дерево. В смешанных лесах . . . . . 3. *U. laciniata* (Trautv.) Mayr — П. лопастный, И. горный.
- Все листья без зубчатостей и заканчиваются одним остроконечием . . . . . 3.
3. Листья плотные, по краю двоявнопильчатые, с короткими зубчиками; плоды очень крупные, 3—3,5 см дл. и 2,2—2,5 см шир., крылатки по всей поверхности и по краю коротко-шнуроволосистые; небольшое дерево. По каменистым склонам; преимущественно в Приморье (реки Лефу, Даубихе, Сучан, Кангауз, Шуфан и др.) . . . . . 4. *U. macrocarpa* Hance — П. крупноплодный.
- Листья разлitchной консистенции, от мягких и голых до жестких и шершавых, по краю угрюмо неправильно пильчатые, с сильно изогнутыми и оттянутыми вверх зубчиками; крылатка голая, 10—16 мм дл. и 4—8 мм шир.; дерево от 3—4 до 25—28 м выс. или же крупный куст. По горным склонам у скад и россыпей, по ключам и долинам рек; часто . . . . . 1. *U. propinqua* Koidz. — П. сродный, И. долинный.

Вид сильно варьирует по величине, форме и окраске стволов, по консистенции, опушению и форме листьев. Нуждается в дальнейшем углубленном изучении.

В. Л. Комаров выделяет следующие разновидности:

1. Листья гладкие; крупное дерево с белой корой . . . . . *U. p. var. laevis* Kom.
- Листья опушенные или шероховатые . . . . . 2.
2. Листья сверху гладкие, снизу пушистые (до бархатистых); небольшое дерево или кустарник. По открытым склонам . . . . . *U. p. var. puberula* Kom.
- Листья сверху остро-шероховатые . . . . . 3.
3. Листья сверху остро-шероховатые, снизу пушистые. По скалам, обрывам и россыпям, небольшое дерево, чаще кустарник . . . . . *U. p. var. saxatilis* Kom.
- Листья сверху остро-шероховатые, снизу голые; деревья до 10—12 (15) м выс. По долинам небольших рек, реже на прилегающих склонах . . . . . *U. p. var. scabra* Kom.

## Сем. 42. MORACEAE Link — ТУТОВЫЕ, ШЕЛКОВИЧНЫЕ

## Род 1. MORUS L. — ТУТ, ШЕЛКОВИЦА


Небольшое двудомное дерево или кустарник с серыми или буроватыми ветвями; листья яйцевидные или округло-овальные, от пельных до глубоколопастных (на одном и том же растении); шелковистые сережки продолговатоцилиндрические, пестичные яйцевидно-продолговатые; соцветия (ложные ягоды) сочные, сладкие, черные или темно-красные. В культуре и одичавшее; на юге Приморья . . . . . 1. *M. alba* L. — Т. белый.

## Сем. 43. CANNABINACEAE Lindl. — КОНОПЛЕВЫЕ

1. Растения вьющиеся или ползучие, с трех-пятилопастными листьями . . . . . Род 1. *Humulus* L. — Хмель.
- Растения с прямыми стеблями и пальчато-лопастными листьями . . . . . Род 2. *Cannabis* L. — Конопля.

## Род 1. HUMULUS L. — ХМЕЛЬ

1. Растение однолетнее, с ползучими или слабо вьющимися стеблями; чешуи у плодущих соцветий не разрастаются. По берегам рек и в низинах, в полях зарослях, у дорог; часто . . . . . 1. *H. japonicus* Sieb. et Zucc. — Х. японский.



1 — *Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd. (Липортее клубненосная); а — верхняя часть растения с паузиными луковичками; 2 — *Girardinia cuspidata* Wedd. (Жирардиния остроконечная), лист; 3 — *Achudemia japonica* Maxim. (Ахудемия японская).



- Растение многолетнее, с выходящими четырехгранными стеблями; чешуй плодущих соцветий сильно разрастаются и образуют подобие шишки. Культивируется, в ряде районов одичал, встречается в вниках, бережках и других лесных группировках (ст. Кангауз, села Глазкова, Марьяновка, Крыловка) . . . . . 2. *H. lupulus* L. — Х. обыкновенный.

#### Род 2. *CANNABIS* L. — КОНОПЛЯ

Растение двулетнее; стебель 30—150 (180) см. выс.; листья пальчатосложные. Культурное, часто дичает и встречается по сорным местам и у дорог . . . . . 1. *C. sativa* L. — К. посевная.

### Сем. 44. *URTICACEAE* Endl. — КРАПИВНЫЕ

1. Растения со жгучими волосками . . . . . 2.
- Жгучих волосков нет . . . . . 4.
2. Листья супротивные . . . . . Род 1. *Urtica* L. — Крапива.
- Листья очередные . . . . . 3.
3. Однолетник; листья выемчато-крупнозубчатые; жгучие волоски очень крупные, до 5—8 (8) мм дл. . . . . Род 3. *Girardinia* Gaudin — Жирардиния.
- Многолетник; листья городчато-пильчатые; жгучие волоски мелкие; во второй половине лета в пазухах листовых черешков появляются мисистые почковидные клубки . . . . . Род 2. *Laportea* Gaudin — Лапортея.
- 4 (от 1). Листья очередные, очень тонкие; стебель толстый . . . . . Род 6. *Parietaria* L. — Постенница.
- Листья супротивные . . . . . 5.
5. Околоцветник пестичных цветков трехраздельный; листья цельнокрайные или зубчато-пильчатые . . . . . Род 4. *Pilea* Lindl. — Пилей.
- Околоцветник пестичных цветков пятираздельный; нижние листья цельнокрайные, остальные крупнопильчатые, с хорошо выраженным остроконечием . . . . . Род 5. *Achudemia* Blume — Ахудемия.

#### Род 1. *URTICA* L. — КРАПИВА

1. Листья глубоко рассеченные, с перисто-зубчатыми долями; стебли до 100—150 см выс.; многолетник. Заносное; по сорным местам . . . . . 2. *U. cannabina* L. — К. конопцевая.
- Листья не рассеченные, с более или менее зубчатыми или пильчатыми краями . . . . . 2.
2. Соцветия короче листовых черешков, с тычиночными и пестичными цветками; листья эллиптические или яйцевидные; однолетник. Заносное; по сорным местам . . . . . 1. *U. urens* L. — К. жгучая.
- Соцветия длиннее листовых черешков, несет только пестичные или только тычиночные цветки . . . . . 3.
3. Все растение светло-зеленое, однолетнее; пильчатые соцветия вверх, пестичные ниже их и несколько укороченные; листья широкояйцевидные или яйцевидные, остро- и крупнопильчатые. В смешанных лесах . . . . . 3. *U. laetevirens* Maxim. — К. светло-зеленая.
- Листья светло-зеленые; растения двулетние . . . . . 4.
4. Листья овально-эллиптические, крупно остропильчатые, при сухости часто синеват; стебли резко четырехгранные, до 80 см выс. В смешанных лесах; пока известна только с юга Приморья . . . . . 4. *U. cynepesens* Kolp. — К. синеватая.
- Листья продолговатоэллиптические или ланцетные, реже яйцевидно-ланцетные; стебли до 100—150 см выс. Всюду; в лесах, по ключам и рекам, у скал и россыпей, а также местами и у жилья . . . . . 5. *U. angustifolia* Fisch. — К. узколистная.

#### Род 2. *LAPORTEA* Gaudin — ЛАПОРТЕЯ

Многолетник; стебли гранитные, до 100—120 см выс.; все растение с мелкими, жгучими волосками; листья городчато-пильчатые, с ясно выделяющимися 3 явками; во второй половине лета в пазухах цветков развиваются почковидные мисистые клубеньки; пестичные соцветия верхушечные, тычиночные пазушные. По долинкам горных рек в лесах; пока известна только из нескольких пунктов Приморья (близ притоки р. Суифуна — Сандуга и Эльдуга, Спасский район близ с. Евсеяки, Итодзюский район) . . . . . 1. *L. bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd. — Л. клубниконая (табл. 73, 1).

#### Род 3. *GIRARDINIA* Gaudin — ЖИРАДИНИЯ

Поздно развивающийся однолетник; стебли от 20 см до 1—1.2 м выс. (в зависимости от условий местообитания и погодных условий данного года); стебли, черешки и листья с крупными, сильно жгучими, редкими волосками; листья длинночерешковые, округло-яйцевидные, выемчато-крупнозубчатые, с острой верхушкой. В лесах по каменистым россыпям и у скал; пока известна только на ряде пунктов юга Приморья (реки Сандуга, Эльдуга, заповедник «Кедровая пагода», реки Шуфан, Сунгунька) . . . . . 1. *G. cuspidata* Wedd. — Ж. остроконечная (табл. 73, 2).

#### Род 4. *PILEA* Lindl. — ПИЛЕЯ

1. Растение до 60—80 см выс., с гранитным, сочным, подупругим стеблем; листья яйцевидные, зубчато-пильчатые, без железок. На сырых лугах, у скал и по ручьям в лесу . . . . . 1. *P. viridissima* Makino — П. зеленейшая.
- Небольшое растение, до 5—7 (10) см выс.; листья цельнокрайные, реже с 1—2 зубчиками, со ржавыми точечными железками. На сырых скалах, реже на кочках . . . . . 2. *P. peplifolia* Hook. et Arn. — П. круглолистная.

#### Род 5. *ACHUDEmia* Blume — АХУДЕМИЯ

Стебли от 3—4 до 30—35 см выс.; нижние листья обычно цельнокрайные, верхние крупнопильчатые, длинночерешковые, с оттянутым, ясно выраженным остроконечием; поздно развивающийся однолетник. На скалах в лесу; юг Приморья (Хасанский и Владивостокский район и Сунгуньский заповедник) . . . . . 1. *A. japonica* Maxim. — А. японская (табл. 73, 3).

#### Род 6. *PARIETARIA* L. — ПОСТЕННИКА

Однолетник с очень тонкими и нежными стеблями; листья от яйцевидных или ромбически-овальных до ланцетно-овальных, мелкие; цветки мелкие, в пазухах листьев, в небольших полузонтиках. На сырых скалах в тени . . . . . 1. *P. micrantha* Ldb. — П. мелкоцветная.

### Сем. 45. *LORANTHACEAE* D. Don — РЕМНЕЦВЕТНИКОВЫЕ

#### Род 1. *VISCUM* L. — ОМЕЛА

Ветви гильчатые ветвистые; листья очень плотные, кожистые, супротивные, продолговатые; плоды сочные, клейкие, ярко-красные или желтоватые. Вечнозеленый полупаразит на липе, иве, березе, тополе, ильме, груше, яблоне, клене и других лиственных породах . . . . . 1. *V. coloratum* (Kom.) Nakai — О. окрашенная.

### Сем. 46. *SANTALACEAE* R. Br. — САНТАЛОВЫЕ

#### Род 1. *THESIUUM* L. — ЛЕНЕЦ

1. Стебель 20—40 см выс.; приветников 3, средний в 2—3 раза превышает цветок, а боковые почти равны цветку. На сухих каменистых склонах . . . . . 1. *Th. chinense* Turcz. — Л. китайский.
- Приветники почти равны цветку или короче его . . . . . 2.
2. Стебли 10—45 см выс., средний приветник почти равен цветку, боковые значительно короче. На сухих лугах и в степях . . . . . 2. *Th. rostratum* C. A. Mey. — Л. предомонский.
- Стебель 10—20 (40) см выс.; боковые приветники почти равны цветку, средний несколько его превышает; цветочный широкохвостатый. Шибетские склоны и псы; на верхнем Амуре . . . . . 3. *Th. saxatile* Turcz. — Л. шибетский.

### Сем. 47. *ARISTOLOCHACEAE* Blume — КИРКАЗОПОВЫЕ

1. Все листья прикорневые, на длинных черешках; стеблей нет . . . . . Род 1. *Asarum* Tourn. — Копытень.
- Стебли вьющиеся, травянистые или деревянистые . . . . . Род 2. *Aristolochia* Tourn. — Кирказон.

Корни с резким, специфическим запахом; листья длинночерешковые, почковидно-остроконечные; цветки на коротких одноцветковых цветоножках, с трехнадрезанным грязно-пурпурным околоцветником, до 1 см дл., цветет в мае. В хвойно-широколиственных лесах и в кустарниковых зарослях; лекарственное растение тибетской медицины . . . . . *A. sieboldii* Miq. — *K. Зибольда* (табл. 74, 2).

## Род 2. ARISTOLOCHIA Tournef. — КИРКАЗОН

1. Крупная деревянистая лиана до 8 см в диам., с мягкой пробковой корой; листья очень крупные, 8—25 (30) см дл., округло-сердцевидные; коробочка длинная, 8—10 см, шестигранно-цилиндрическая. Только на самом юге Приморья (реки Шуган, Сандуга, Эльдуга); в лесах, по опушкам, у скал и по ручьям . . . . . 1. *A. manshuriensis* Kom. — *K. маньчжурский* (табл. 74, 3).
- Небольшая травянистая лиана с треугольно-сердцевидными листьями до 10 см дл.; коробочка близкая к шаровидной. В приречных кустарниковых зарослях и в поличниках; на юге Приморья . . . . . 2. *A. contorta* Bge. — *K. приречный* (табл. 74, 1).


## Сем. 48. POLYGONACEAE Juss. — ГРЕЧИШНЫЕ

1. Околоцветник зеленый, травянистый, 3 его внутренние доли при плодах увеличиваются . . . . . 2.
- Околоцветник венчиковидный, все 6 долей его при плодах одинаковые . . . . . 4.
- 2 Долей околоцветника 4; плоды крылатые, округлые; листья почковидные . . . . . Род 2. *Oxysia* Hill. — *Кислячник*.
- Долей околоцветника 6; листья не почковидные . . . . . 3.
- Плоды с 3 крыльями; рыльца головчатые . . . . . Род 3. *Rheum* L. — *Ревень*.
- Плоды без крыльев; рыльца кистистые . . . . . Род 1. *Rumex* L. — *Щавель*.
- 4 (от 1). Зрелые плоды в 2—4 раза превышают околоцветник . . . . . Род 5. *Fagopyrum* Mill. — *Гречиха*.
- Зрелые плоды гладкие, не выдаются или слегка выдаются из околоцветника . . . . . Род 4. *Polygonum* L. — *Гореч.*

## Род 1. RUMEX L. — ЩАВЕЛЬ

1. Листья стреловидные или копьевидные . . . . . 2.
- Листья при основании сердцевидные, округлые или клиновидные . . . . . 4.
2. Листья копьевидные, с оттопыренными долями; околоцветник при плодах не увеличивается; корни шнуровидные, с корневыми отпрысками. Песчаные берега рек, у дорог, сорное на полях . . . . . 1. *R. acetosella* L. — *Щ. кисельный*.
- Листья стреловидные; околоцветник при плодах увеличивается; корни не шнуровидные и без корневых отпрысков . . . . . 3.
3. Корни мочковатые. Луга, залежи . . . . . 2. *R. acetosa* L. — *Щ. кислый*.
- Корень мощный, стержневой. Луга; в Амурской области . . . . . 3. *R. thyrsiflorus* Fingerh. — *Щ. пирамидальный*.
- 4 (от 1). Однолетники с тонкими корнями; листья узкие, линейные или продолговато-линейные; доли околоцветника при плодах с длинными, щетинистыми зубцами . . . . . 5.
- Многолетники с мощными корнями; листья шире; доли околоцветника цельнокрайные или с небольшими треугольными зубцами . . . . . 6.
5. Все доли околоцветника с зубцами. Болота, берега водоемов . . . . . 4. *R. maritimus* L. — *Щ. приморский*.
- Только одна доля околоцветника с зубцами. Берега Амура и его притоков . . . . . 5. *R. amurensis* Fr. Schmidt — *Щ. амурский*.
- 6 (от 4). Доли околоцветника при плодах с молчаливыми треугольными зубцами; листья узкие, при основании клиновидные. Луга, берега рек . . . . . 6. *R. stenophyllus* Ldb., *R. ussuriensis* Losinsk. — *Щ. узколистный*.
- Доли околоцветника цельнокрайные . . . . . 7.
7. Листья треугольно-стреловидные, снизу мелко опушенные. Гари, берега рек, на севере области . . . . . 7. *R. gmelinii* Turcz. — *Щ. Гемли*.
- Листья сверху голые . . . . . 8.
8. Околоцветник при плодах крупный, около 7 мм дл.; листья крупные, до 35 см дл., 10 см шир., к обоим концам суживающиеся, при основании более или менее клиновидные или слегка закругленные. Берега, лужайки, залежи . . . . . 8. *R. patientia* L. — *Щ. миндальный*.

Таблица 74



1 — *Aristolochia contorta* Bge. (Кирказон приречный): а — часть лианы с листом и цветком, б — часть лианы с плодом, в — семя; 2 — *Asarum sieboldii* Miq. (Комтгенг Зибольда); 3 — *Aristolochia manshuriensis* Kom. (Кирказон маньчжурский): а — лист, б — цветок.



- Околоцветник при плодах мелкий, до 5 мм дл. . . . . 9.  
 9. Листья сужающиеся к основанию, клиновидные; все или одна доля околоцветника с желваками или с расширенной вырезкой. Луга, сорное на полях . . . . . 9. *R. crispus* L. — Шавель курчавый.  
 — Все доли околоцветника без желваков . . . . . 10.  
 10. Листья при основании широкие, усеченные или чуть сердцевидные; доли околоцветника яйцевидно-сердцевидные. Сырые луга, берега водоемов . . . . . 10. *R. prostratus* Rech. f., *R. aquaticus* auct., non L. — Ш. удлиненный.  
 — Листья к основанию суживающиеся, по краю обычно волнистые; доли околоцветника округло-сердцевидные или несколько почковидные. Луга, берега водоемов . . . . . 11. *R. longifolius* DC., *R. domesticus* Martin. — Ш. длиннолистный.

#### Род 2. OXYRIA Hill. — КИСЛИЧНИК

Гольцы высокогорий; на северном Сихотэ-Алине и севернее Амура . . . . . 1. *O. digyna* (L.) Hill. — Р. двухлобчатый.

#### Род 3. RHEUM L. — РЕВЕНЬ

Леса, склоны в Амурской области, высокогорья среднего Сихотэ-Алиня . . . . . 1. *Rh. compactum* L. — Р. плотный.

#### Род 4. POLYGONUM L. — ГОРЕЦ

1. Цветки сидят по одному или, чаще, пучками по 2—6 в пазухах обыкновенных, реже слегка уменьшенных, сидячих или короткочерешковых, более или менее удлинённых листьев . . . . . 2.  
 — Цветки образуют на концах стеблей и ветвей безлистные (иногда кроме нижней части) соцветия или собраны в более или менее обильных кистях в пазухах листьев . . . . . 3.  
 2. Цветки очень мелкие, в пучках, многочисленны; околоцветник всего 1 мм дл.; плод блестящий, буро-коричневый, трехгранный, около 1,5 мм дл.; не больше 4—15 см выс., растение с линейно-лопастными, толстоватыми, тупыми листьями 10—13 мм дл. и 1,5—2 мм шир. и короткими, буроватыми раструбами. Обнаженные места; по Амуру . . . . . 1. *P. plebejum* R. Br., *P. humifusum* var. *mandschuricum* Skvortz., *P. persiflorum* Chang et Li, non Schott — Г. низкий.  
 — Околоцветник не менее 1,5 мм дл.; цветки в пучках не столь многочисленны; листья крупные . . . . . 3.  
 3. Околоцветник разделен приблизительно на  $\frac{1}{2}$  его дл.; доли его по краям беловатые или желтоватые; плоды узкоотреугольные, к верхушке постепенно заостряющиеся . . . . . 4.  
 — Околоцветник разделен не менее чем на  $\frac{2}{3}$  его длины, доли его по краям часто розовые или красные; плоды широко треугольные, на верхушке внезапно оттянутые в острие . . . . . 5.  
 4. Плоды матовые, около 2,5 мм дл.; раструбы серебристые, около 5 мм дл.; доли околоцветника по краям с широкой, белой каймой. Сорное на улицах и у дорог, редки (запасное) . . . . . 2. *P. aviculare* L. — Г. гичный.  
 — Плоды гладкие, блестящие, мельче чем у предыдущего вида; раструбы буроватые или желтоватые, короткие, часто малоаметные; доли околоцветника по краям с узкой, желтоватой или беловатой каймой. Сорное на улицах, у дорог . . . . . 3. *P. calcatum* Lindm., *P. planum* Skvortz., *P. prostratum* Skvortz., non R. Br., *P. sylvaticum* Skvortz. — Г. топорный.  
 5 (от 3). Плоды гладкие, коричневые, доли околоцветника по краям чаще красные; очень разнообразно по характеру стебля, форме листьев, окраске и величине околоцветника. Заселенные приморские дуга, пашенные берега рек, у дорог . . . . . 4. *P. fusco-ochreatum* Kom., *P. Boissianense* Kitag., *P. rigidum* Skvortz., *P. salinum* Baran. et Skvortz. — Г. буро-раструбный.  
 — Плоды мелкозернистые, матовые, почти черные; стебли простертые . . . . . 6.  
 6. Плоды 2 мм дл., заметно выступают из околоцветника, доли которого по краям чаще красные; листья острые, снизу с заметными жилками. Редко; у дорог (запасное?) . . . . . 5. *P. prostratum* Gilib., *P. mandschuricum* Skvortz. — Г. лежачий.  
 — Плоды до 3 мм дл.; почти не выступают из околоцветника, доли которого по краям беловатые; листья на верхушке тупые или закругленные, снизу с мисистыми малоаметными жилками. Пески морского берега близ устья Амура . . . . . 6. *P. buxifolium* Nutt. ex Bong. — Г. самшитовидный.  
 7 (от 1). Раструб цилиндрический, по верхнему краю обрубленный, стенки его корот более или менее одинаковой высоты; цветки в нитевидных или колосовидных соцветиях . . . . . 8.

- Раструб косой, открытый со стороны стебля или косо обрубленный . . . . . 19.  
 8. Многолетник с толстым, ползучим корневищем; растение плавающее или пазное; цветки белые. В водоемах и на сырых лугах . . . . . 7. *P. amphibium* Nieuw., *P. amphibium* auct., non L. — Г. амурский.  
 — Однолетник . . . . . 9.  
 9. Стебли наверху под узлами клейкие, щетинистые; цветки мелкие, зеленоватые. Берега рек, гари; на юге . . . . . 8. *P. viscosum* Makino, *P. excurrens* Stew., *P. makinoi* Nakai — Г. клейкий.  
 — Стебель под узлами не клейкий . . . . . 10.  
 10. Стебли наверху и околоцветники или только околоцветники железистые . . . . . 11.  
 — Растения лишены железок; иногда на околоцветнике попадаются плоские, округлые образования с возвышенными краями, возможно, следы от укусов насекомых . . . . . 12.  
 11. Только околоцветники имеют погруженные железки (приветники, цветники) и цветоносы без железок; плоды матовые, с одной стороны плоские, с другой выпуклые; растение в свежем виде с острым, перечным вкусом. Болота, сырые луга, берега водоемов . . . . . 9. *P. hydropiper* L. — Г. перечный. Водный перенос . . . . . 13.  
 — Стебли сверху, а иногда также приветники и околоцветники со стебелями или сидячими (но не погруженными) железками . . . . . 12.  
 12. Плоды с обеих сторон плоские; цветники, приветники и околоцветники с сидячими или почти сидячими железками . . . . . 13.  
 — Плоды более или менее трехгранные; железистые волоски вверх стебля не сидят; околоцветники голые . . . . . 14.  
 13. Плоды в основании угловатые, около 3 мм дл.; цветки крупные, около 4 мм дл., кисти 10—15 мм толщ.; раструбы по краям с ресничками; мощное растение с крупными яйцевидно-сердцевидными листьями. На сырых местах . . . . . 10. *P. orientale* L. — Г. восточный.

● Декоративные формы часто разводятся в цветниках.

- Плоды совсем плоские, около 2 мм дл.; цветки не более 2,5 мм дл., розоватые или беловатые; кисти тонкие, до 6 мм толщ.; раструбы без ресничек; листья ланцетные, линейно-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, в основании клиновидные. Берега водоемов, дуга, канавы, сорное . . . . . 11. *P. lapathifolium* L., *P. nodosum* Pers. — Г. шавельчатый.  
 14 (от 12). Раструбы, как и все растение, с отстоящими, длинными щетинками; черешки листьев крылатые; цветки малиново-красные; свежее растение с приятным ароматом. В кустарниках; на юге . . . . . 12. *P. viscosum* A. Hamilt. ex D. Don — Г. липкий.  
 — Раструбы с приятными щетинками; стебли внизу голые или в низа согнутыми крепкими пилками; черешки листьев не крылатые; цветки зеленоватые, на концах красноватые; растение без запаха. У дорог, на лугах . . . . . 13. *P. bungeanum* Turcz. — Г. Бунге.  
 15 (от 10). Реснички наверху раструба в несколько раз короче его . . . . . 16.  
 — Реснички равны раструбу или только слегка короче его . . . . . 17.  
 16. Кисти густые, не менее 0,5 см толщ.; цветки розовые или беловатые, до 3 мм дл. У берегов, на выгонах, в населенных пунктах . . . . . 14. *P. persicaria* L. — Г. полевой.  
 — Кисти прижатые, тонкие, всего 1,5—2 мм толщ.; цветки до 2 мм дл., зеленоватые, с розовыми концами. Болота, берега водоемов . . . . . 15. *P. foliosum* Lindb. f. — Г. листоватый.  
 17 (от 15). Плоды очень мелкие, 1,5 мм дл.; листья линейные или линейно-ланцетные; цветки розоватые или зеленоватые. Сырые кустарники . . . . . 16. *P. trigonostemon* (Nakai) Kudo et Masam., *P. intricatum* Kom., *P. minus* auct., non Huds. — Г. треугольнолистный.  
 — Плоды крупные, около 2 мм дл.; листья ланцетные или линейно-ланцетные . . . . . 18.  
 18. Плоды черные, широкие (длина их лишь немного превышает ширину); кисти довольно густые; цветки, часто по несколько, в пазухах приветников; околоцветник розовый. Сырые леса, у рек, на лугах . . . . . 17. *P. longisetum* De Bruyn, *P. blumei* Meisner — Г. длиннощетиный.  
 — Плоды короче, тоньше, более узкие (длина их лишь в 1,5 раза превышает ширину); кисти очень тонкие и редкие, доли сидят в пазухах приветников поодиночке; околоцветники зеленоватые, с розоватыми концами. Сырые леса; на самом юге . . . . . 18. *P. posumbu* A. Hamilt., *P. caespitosum* Blume — Г. дернистый.

Наше растение отличается от типичного более узкими и длинными, всегда голыми снизу листьями и возможно принадлежит к особому виду — *P. roseoviride* (Kitag.) Li et Chang

- 19 (от 7). Многолетники . . . . . 20.  
 — Однолетники . . . . . 35.



20. Цветки розовые, реже беловатые, в одиночных колосовидных соцветиях на концах стеблей; корневище утолщенное, часто каудеовидное . . . . . 21.
- Цветки белые или зеленоватые, в кистях, образующих широкое метельчатое соцветие . . . . . 27.
21. Часть цветков в соцветии превращена в дуговички; черешки листьев бескрылые. Голцы высокорослый . . . . . 19. *P. viviparum* L. — Г. живородящий.
- Все цветки в соцветии нормально развитые; черешки листьев более или менее крылатые . . . . . 22.
22. Все листья в основании закругленные или ширококлиновидные, продолговатые или эллиптически-ланцетные, почти кожистые, снизу с ясной сетью жилок; соцветия короткоцилиндрические. Голцы высокорослый . . . . . 20. *P. ellipticum* Willd. — Г. эллиптический.
- Стеблевые листья, хотя бы некоторые, при основании сердцевидные или стреловидные, стеблеобъемлющие, с развитыми нижними долями . . . . . 23.
23. Прикорневые листья при основании сердцевидные, усеченные или закругленные . . . . . 24.
- Прикорневые листья при основании клиновидные . . . . . 25.
24. Средние стеблевые листья яйцевидно-сердцевидные (длина их около 2 раз превышает ширину), с довольно крупными нижними долями. Склоны, дуга . . . . . 21. *P. pacificum* V. Petrov — Г. тихоокеанский.
- Средние стеблевые листья продолговатые или линейно-продолговатые (длина их в 4–5 раз превышает ширину), с небольшими нижними долями. Склоны, дуга . . . . . 22. *P. ussuriense* Petrov, *P. regelianum* Kom. — Г. уссурийский.
- 25 (от 23). Стеблевые листья линейные или почти ланцетные, плотные, при основании закругленные или несколько сердцевидные. Дуга; в Амурской области и в Прикавказской низменности . . . . . 23. *P. alopecuroides* Turcz., *P. zeaeana* Kom. — Г. льняхоподобный.
- Стеблевые листья более или менее стеблеобъемлющие, с широкими ушками при основании листовых пластинок . . . . . 26.
26. Привитики почти белые; листья крупные, плотные, по краям волнистые, с довольно крупными долями при основании. Горные дуга . . . . . 24. *P. subauriculatum* Petrov — Г. ушкотовый.

Возможно, представляет собой только форму уссурийского горца.

- Привитики бурые; листья менее плотные, не волнистые, лопасти при основании более выражены. Дуга . . . . . 25. *P. manshuriense* Petrov — Г. маньчжурский.
- 27 (от 20). Зрелые плоды с широкими крыльями; цветоножки с сочленением около середины . . . . . 28.
- Плоды бескрылые, цветоножки с сочленением под цветком . . . . . 29.
28. Листья овальные, очень крупные, в среднем 10–15 см дл. и 5–7 см шир., снизу волосистые; плоды образуются редко, они до 7 мм дл., в 4–5 раз превышают околоцветник; крупное растение, часто свыше 4 м выс. Ели морозного леса, река около устья Амура . . . . . 26. *P. relicum* Kom. — Г. реликтовый.
- Листья продолговатые или продолговато-ланцетные, до 2 см шир.; плоды образуются нормально. Голцы высокорослый; на севере области . . . . . 27. *P. tripterocarpum* A. Gray — Г. крылоподный.
- 29 (от 27). Листья узко- или продолговато-линейные, 0,5–3 мм шир.; плоды 2–3 мм дл., не выдаются из околоцветника. Сухие песчаные склоны; в Амурской области . . . . . 28. *P. angustifolium* Pall. — Г. узколистный.
- Листья не уже 6 мм . . . . . 30.
30. Стебель простой, лишь с небольшими веточками в соцветии; листья (без черешков) до 8 см дл., 4 см шир., волосистые, особенно сверху; черешки до 2,5 см дл., вверх крылатые. У рек . . . . . 29. *P. linosum* Kom. — Г. клычатый.
- Стебли сильно распрямлены ветвями . . . . . 31.
31. Високорные или северные, обычно густоволосистые растения 10–30 см выс. . . . . 32.
- Дугиные и луго-степные, почти голые, крупные растения до 1 м выс. и более . . . . . 33.
32. Листья продолговато-линейные или линейно-эллиптически, наиболее широкие около середины, 5–7 см дл., 0,7–2 см шир.; плоды 2,5–3,5 мм дл., слегка выдаются из околоцветника. Голцы Сихотэ-Алиня и обширные склоны в низовьях Амура . . . . . 30. *P. ajanense* (Nakai) Grig. — Г. айский.
- Листья линейные или линейно-ланцетные, не шире 5 мм; стебель сильно распрямлен ветвями; цветы зеленовато-желтоватые. Голцы и галечники; только в Приморье . . . . . 31. *P. laxmannii* Lessch. — Г. лакеманна.
- 33 (от 31). Листья яйцевидные или продолговато-эллиптические, 2,5–4 см шир.; плоды 3,5–4 (5) мм дл., более или менее выдающиеся из околоцветника. Горные дуга . . . . . 32. *P. platyphyllum* Li et Chang, *P. luzuriense* Grig., non Danser — Г. широколистный.
- Листья ланцетные, продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные, 0,5–2 см шир. . . . . 34.

34. Стебель оканчивается крупным безлистным соцветием; цветы белые, густо расположенные на веточках; стебель с торжками небольшими ветвями; плоды более или менее свисающие с околоцветника. Горные дуга; в Амурской области, редко в Приморье (гора Сеньина Шапка) . . . . . 33. *P. alpinum* All., *P. undulatum* Murr., non Berg, *P. polymorphum* Ldb. — Г. альпийский.
- Соцветие почти до верха облистненное; цветы желтоватые, редко расположенные на веточках; стебель с сильно оттопыренными ветвями; плоды значительно выступают из околоцветника. Сухие дуга . . . . . 34. *P. divaricatum* L. — Г. расползающийся.
- 35 (от 19). Растение с подземными побегами, несущими подземные клеистомазные цветки; кромоного, имеются наземные цветы (розовые или белые) в укороченных кистях. Влажные леса, берега рек . . . . . 35. *P. thunbergii* Sieb. et Zucc. — Т. Тунберга.
- Подземных клеистомазных цветков нет . . . . . 36.
36. Черешки листьев крылатые, пластинка яйцевидная или сердцевидно-яйцевидная; стебли голые; цветы бледные; привитики с золотистыми железками. Сырые леса, сорное на огородах . . . . . 36. *P. alatum* A. Hamilt. — Г. крылатый.
- Черешки листьев без крыльев . . . . . 37.
37. Цветоносы и стебли в верхней части с отстоящим, рубиново-красным жестким опушением; цветы одиночные, расставленные, красные; листья в основании стреловидные. Уремы; на юге Приморья . . . . . 37. *P. dissitiflorum* Hemsl. — Г. расставленноцветковый.
- Красного опушения в верхней части стебля нет . . . . . 38.
38. Стебель прямой или лазающий по рекам с загнутыми вниз шишками, иногда очень мелкими и малочисленными . . . . . 39.
- Стебель изогнутый, голый или опушенный, но без крючковатых шишечек . . . . . 40.
39. Листья цитовидные (место прикрепления черешка отстоит от края пластинки); раструбы листовидные; околоцветник при плодах синеватый, сочный. Галечники, кустарники . . . . . 38. *P. perfoliatum* L. — Г. пронзеннолистный.
- Листья не цитовидные (черешок прикреплен к краю пластинки) . . . . . 40.
40. Стебель под соцветием голый; листья стреловидные . . . . . 41.
- Стебель под соцветием опушенный . . . . . 42.
41. Листья сверху чаще голые, довольно крупные, до 8 см дл., 2 см шир., со слабыми нижними долями; орешки 2,5–3 мм дл.; стебель с довольно крупными шишками. На галечниках; по сырм степям . . . . . 39. *P. sieboldii* Meissn. — Г. Зибольда.
- Листья сверху чаще с прижатыми волосками, до 6 см дл., 1,5 см шир., с несколько расставленными нижними долями; орешки 1,5–2 мм дл.; стебель мелкопиловатый. Канавы, обочины дорог . . . . . 40. *P. heterophyllum* Lit. — Г. стреловидный.
- 42 (от 40). Листья удлиненно-линейные, при основании сердцевидные или почти сердцевидные, с небольшими закругленными долями или почти усеченные. По сырм, заболоченным местам . . . . . 41. *P. strigosum* R. Br. — Г. пестичный.
- Листья при основании с ясными ушками . . . . . 43.
43. Листья линейные или продолговато-линейные, с небольшими острыми долями при основании. Болота . . . . . 41. *P. shinkianum* Nakai, *P. sagittatum* var. *ussuriense* Rgl. — Г. Корковского.
- Листья более или менее широкоэллиптические, с крупными долями . . . . . 44.
44. Нижние лопасти резко оттянуты от срединной доли, длина лопастей в 2 и более раз превышает их ширину. Край водоемов, болота . . . . . 43. *P. maackianum* Rgl. — Г. Маака.
- Нижние лопасти широкие, треугольные, слабо ограничены от срединной доли, длина их не более 1,5 раза превышает ширину. Берега рек, галечники . . . . . 44. *P. senticosum* Meissn. — Г. шершавый.
- 45 (от 38). Околоцветники при плодах бескрылые . . . . . 45. *P. convolvulus* L. — Г. вьюнковый.
- Околоцветники при плодах крылатые . . . . . 46.
46. Плоды блестящие, 2 мм дл. или чуть больше; крылья околоцветника цельнокрайные. Прибрежные кустарники, скалы . . . . . 46. *P. dumetorum* L. — Г. кустарный.
- Плоды 4–5 мм дл. . . . . 47.
47. Крылья околоцветника выемчатые; плоды блестящие. Прибрежные кустарники . . . . . 47. *P. dentato-alatum* Fr. Schmidt — Г. зубчатокрылый.
- Крылья узкие, цельнокрайные; орешка матовые. Кустарники, берега рек . . . . . 48. *P. pauciflorum* Maxim. — Г. малоцветковый.

#### Род 5. FAGOPYRUM Mill. — ГРЕЧИХА

1. Плоды с утолщенными, морщинистыми, внизу тупыми ребрами и тусклыми, морщинистыми гранями; цветы зеленоватые. Сорное и дикорастущее по ж.-д. путям . . . . . 1. *F. tataricum* (L.) Gaertn. — Г. татарская.



- Плоды с цельными острыми ребрами и гладкими гранями; цветки розовые или белые. Разводится и как сорное. . . 2. *F. sagittatum* Gilib. — *Г. посевная*.

#### Сем. 49. CHENOPODIACEAE Vent. — МАРЕВЫЕ

1. Растения без развитых листьев; стебли сочные, членистые, с супротивными веточками . . . . . Род 6. *Salicornia* L. — *Солерос*.
- Листья развитые, стебли не членистые . . . . . 2.
2. Листья широкие, плоские . . . . . 3.
- Листья вальковатые, а если плоские, то узкие; линейные или линейно-ланцетные . . . . . 4.
3. Цветки двуполые; плоды заключены в остающийся, не разрастающийся околоцветник; травы с муцистым налетом или с простыми волосками . . . . . Род 1. *Chenopodium* L. — *Марь*.
- Цветки однополые . . . . . 4.
4. Женские цветки без околоцветника, но с 2 более или менее сросшимися прицветниками, разрастающимися при плодах; растения с пузыревидными волосками . . . . . Род 2. *Atriplex* L. — *Лебеда*.
- Женские цветки с околоцветником и с 2 свободными, не разрастающимися прицветниками; опушение звездчатое . . . . . Род 3. *Axyris* L. — *Аксирис*.
- 5 (от 2). Листья зачаточные с острым шишком; цветки с сухим околоцветником и крупными прицветными листьями . . . . . Род 8. *Salsola* L. — *Сольнка*.
- Листья не заканчиваются острым шишком . . . . . 6.
6. Плодики крылатые, довольно крупные; листья очень узкие, прицветные листья в основании широкоперепончатые . . . . . Род 5. *Corispermum* L. — *Верблюдка*.
- Плодики не крылатые . . . . . 7.
7. Листья мясистые, вальковатые, линейные или ланцетные; растение голое . . . . . Род 7. *Suaeda* Forsk. — *Сведа*.
- Листья плоские, черешчатые, линейно-ланцетные; растение волосистое . . . . . Род 4. *Kochia* Roth — *Кохия*.

##### Род 1. CHENOPodium L. — МАРЬ

1. Ветви соцветия заканчиваются остью; листья ланцетные, цельнокрайные. Галечники, пашни . . . . . 1. *Ch. aristatum* L. — *М. остистая*.
- Ветви соцветия заканчиваются цветками . . . . . 2.
2. Семена крупные, 1,5—2 мм в поперечнике; крупное растение с яйцевидно-треугольными, крупно- и редкозубчатыми, в основании усеченными или слегка сердцевидными листьями; метелка раскидистая. В населенных пунктах, у дорог и в гарах . . . . . 2. *Ch. hybridum* L. — *М. гибридная*.
- Семена не более 1,25 мм в поперечнике . . . . . 3.
3. Листья цельнокрайные, ланцетные или яйцевидно-ланцетные, в основании клиновидные, на конце с остроконечием. Галечники . . . . . 3. *Ch. vachellii* Hook. et Arn. — *М. Вахеля*.
- Листья более или менее зубчатые . . . . . 4.
4. Листья почти треугольные, в основании с 1 зубом с каждой стороны, до 2 см дл., 1,5 см шир. Каменистые россыпи . . . . . 4. *Ch. bryoniifolium* Bge. — *М. брioniелистная*.
- Листья более чем с 1 зубом с каждой стороны . . . . . 5.
5. Растение без муцистого налета; листья толстоватые, нижние в основании почти усеченные; паузные соцветия прижаты к стеблю. Сорное . . . . . 5. *Ch. urbicum* L. — *М. городская*.
- Растение, хотя бы молодое, с муцистым налетом . . . . . 6.
6. Листья двукратные, сверху темно-зеленые, снизу сизые; околоцветник обычно с 4 долями, тычинок 4. Сорное . . . . . 6. *Ch. glaucum* L. — *М. сизая*.
- Листья с обеих сторон почти одинакового цвета; околоцветник пятираздельный; листья яйцевидно-ромбические, молодое с сильным муцистым налетом. Сорное . . . . . 7. *Ch. album* L. — *М. белая*.

В нашей области настоящая *Ch. album* встречается, по-видимому, редко, как заносное. Везде обычна родственная ей *Ch. tatarica* L., отличающаяся слабым муцистым налетом даже в молодости, прерывистым соцветием, листьями с немногими островатыми зубцами.

##### Род 2. ATRIPLEX L. — ЛЕБЕДА

1. Листья (иногда, кроме самых верхних) супротивные, пластинка их в очертании треугольно-копьевидная, с довольно крупными зубцами при основании. Засоленные луга; пос. Шмидтовка . . . . . 1. *A. hastata* L. — *Л. копьевидная*.

- Листья (иногда, кроме самых нижних) очередные, не треугольно-копьевидные . . . . . 2.
2. Прицветники при плодах крупные, до 7 мм дл., 5 мм шир., зеленые (слабо покрытые беловатыми чешуйками), часто с 2 острыми буграми на спинке; листья толстоватые, цельнокрайные или редкозубчатые и тогда с зубцами при основании; от основания широкоперепончатое ветвистое растение. Морские берега . . . . . 2. *A. gmelinii* C. A. Mey. — *Л. Гмелина*.
- Прицветники менее крупные, около 3 (до 5) мм дл., сероватые от беловатых чешуек, снаружи без бугров . . . . . 3.
3. Нижние листья повислые, продолговатосердечные, с копьевидным основанием; верхние ланцетные и цельнокрайные. Сорное . . . . . 3. *A. patula* L. — *Л. раскидистая*.
- Все листья вверх направленные (не повислые), ланцетные или продолговатоланцетные, по краю с вперед направленными зубцами или более или менее цельнокрайные, всегда без зубцов при основании. Морские берега . . . . . 4. *A. horalis* L. — *Л. прибрежная*.

##### Род 3. AXYRIS L. — АКЦИРИС

- Берега рек, пустыри, у дорог . . . . . 1. *A. amaranthoides* L. — *А. ширцевидный*.

##### Род 4. KOCHIA Roth — КОХИЯ

- Сорные места . . . . . 1. *K. scoparia* (L.) Schrad. — *К. венчанная*.

##### Род 5. CORISPERMUM L. — ВЕРБЛЮДКА

1. Плоды крупные, 4,5—6 мм дл. Песчаные берега рек . . . . . 1. *C. macrocarpum* Bge. — *В. крупноплодная*.
- Плоды мелкие, до 3,5 (4) мм дл. . . . . 2.
2. Плоды почти округлые; прицветники наверху внезапно остроконечные; соцветия густые, широкие. Песчаные берега рек . . . . . 2. *C. confertum* Bge. — *В. скученная*.
- Плоды продолговатые; прицветники постепенно заостряющиеся; соцветия редковатые, узкие. На песках . . . . . 3. *C. elongatum* Bge. — *В. вытянутая*.

##### Род 6. SALICORNIA L. — СОЛЕРОС

- Засоленные луга у моря . . . . . 1. *S. europaea* L. — *С. европейский*.

##### Род 7. SUAEDA Forsk. — СВЕДА

1. Цветочные клубочки расположены на черешочках листьев (отступая от пазухи листа). Вдоль морских берегов . . . . . 1. *S. glauca* Bge. — *С. сизая*.
- Цветочные клубочки сидят непосредственно в пазухах листьев. По морскому побережью . . . . . 2. *S. ussuriensis* Hlft. — *С. уссурийская*.

##### Род 8. SALSOLA L. — СОЛННКА

1. Листья до 3 см дл., толстые, гладкие; листочки околоцветника при плодах без крыльев. Морские берега . . . . . 1. *S. komarovii* Hlft. — *С. Комарова*.
- Листья до 6 см дл., витевидные, по всей длине со щетинками; листочки околоцветника при плодах с полукруглыми крыльями. Прибрежные пески, у дорог . . . . . 2. *S. collina* Pall. — *С. холмовая*.

#### Сем. 50. AMARANTHACEAE Juss. — АМАРАНТОВЫЕ

##### Род 1. AMARANTHUS L. — АМАРАНТ, ЩИРНИЦА

1. Листья с шишком на конце; прицветники колокольчатые; цветки мелкие, в клубочках, расположенных в пазухах листьев; все растение сильно ветвистое, низкое, засоряющее; по железным дорогам и шоссе; редкость . . . . . 1. *A. albus* L. — *А. белый*.
- Листья без шишков . . . . . 2.
2. Листья на концах выемчатые; цветки в пазухах листьев в коротких зеленых клубочках. Заносное; сорное; на огородах и по дорогам . . . . . 2. *A. blitum* L. — *А. жемчужный*.



- Листья без выемки на верхушке . . . . . 3.
- 3. Метелка раскидистая, с удлинненными боковыми колосками. Сорное растение; редко . . . . . 3. *A. paniculatus* Murr. — *А. метельчатый*.
- Боковые колоски укороченные и почти под прямым углом к главному колосу или же соцветие плотное, колосовидное . . . . . 4.
- 4. Соцветие очень плотное, сжатое, колосовидное; листья на верхушке тупые или чуть выемчатые, часто с небольшим шишком. Сорное; часто на огородах и у дорог . . . . . 4. *A. retrofractus* L. — *А. запрокинутый*, *А. подсекозый*.
- Соцветие менее плотное, с хорошо развитыми боковыми ветвями; листья на верхушке острые . . . . . 5.
- 5. Соцветие зеленое; семена белые или розовые; стебли до 100—120 (150) см выс., толстые, ветвистые. Сорное . . . . . 5. *A. leucospermus* S. Wats. — *А. белосемянный*.
- Соцветие красное; семена или темно-коричневые; стебли до 100 см выс., толстые, простые или слабо ветвистые, обычно красноватые. Культивируется как декоративное растение, местами дичает . . . . . 6. *A. caudatus* L. — *А. хвостатый*.

## Сем. 51. PORTULACACEAE Juss. — ПОРТУЛАКОВЫЕ

- 1. Завязь нижняя, цветки желтые; однолетники; стебли ветвистые, прижатые к почве; листья мясистые . . . . . Род 1. *Portulaca* L. — *Портулак*.
- Завязь верхняя, цветки белые или розовые; однолетники или многолетники . . . . . 2.
- 2. Маленькие, 2—8 (12) см, однолетние растения с очень тонкими стеблями; листья продолговатые, обратноовальные или линейно-ланцетные, 2—12 мм дл. и 1—3 мм шир.; лепестков 3, белых, 2—3 мм дл.; тычинок 3; семена мелкие, блестящие, почти черные . . . . . Род 2. *Montia* L. — *Монция*.
- Растения многолетние, с толстым веретенообразным корнем; стебли 8—15 (25) см дл. восходящие; листья 3—15 см дл. и 2—3 (5) см шир.; цветки розовые или беловато-розовые, 10—12 (15) мм дл. . . . . Род 3. *Claytonia* Gronov. — *Клайтония*.

### Род 1. PORTULACA L. — ПОРТУЛАК

Стебель прижатый к почве, ветвистый от самого основания; цветки одиночные или по 2—3 в разветвленном стебле или в пазухах листьев; листья клиновидные, мясистые; коробочка 5—8 мм дл., яйцевидная или кругловатая. Сорное; по огородам и садам, по дорогам и ж.-д. насыпям . . . . . 1. *P. oleracea* L. — *П. огородный*.

### Род 2. MONTIA L. — МОНЦИЯ

Листья супротивные; цветки мелкие, в конечных двух-пятицветковых кистях, реже одиночные; коробочка, как и лепестки, превышает чашечку. По кючушкам; в северной части морского побережья . . . . . 1. *M. lamproseperta* Cham. — *М. блестящесеменная*.

### Род 3. CLAYTONIA Gronov. — КЛАЙТОНИЯ

Прикорневые листья многочисленные, линейные или линейно-ланцетные; стебель толстый ползучий (реже 1—2); соцветие малоцветковое; прививетники небольшие; коробочка почти равна чашечке. На гольцах; у нас пока найдена на горе Тараканки в Сихотэ-Алине, на высоте около 2000 м над ур. м., и на хр. Тукурингра в Амурской области . . . . . *C. eschscholtzii* Cham. — *К. Эшшольца*.

## Сем. 52. CARYOPHYLLACEAE Juss. — ГВОЗДИЧНЫЕ

- 1. Венчика нет; доли чашечки жесткие, острые, слегка колючие; плод нераскрывающийся, односемянный . . . . . Род 11. *Scleranthus* L. — *Сухорец*.
- Цветки с чашечкой и венчиком . . . . . 2.
- 2. Чашечка слайнолистная . . . . . 3.
- Доли чашечки не сростшиеся между собой . . . . . 11.
- 3. При основании чашечки имеются более или менее чашелистикообразные остистые прицветные чешуи . . . . . Род 19. *Dianthus* L. — *Гвоздика*.
- Прицветных чешуй при основании чашечки нет . . . . . 4.
- 4. Чашечка при плодах с 5 крыльями; лепестки розовые . . . . . Род 15. *Vaccaria* Medic. — *Тысячеголов*.

- Чашечка бескрылая . . . . . 5.
- 5. Плод — черная, сухая ягода; чашечка широко колокольчатая . . . . . 5. *S. carnifolia* L. — *Водяник*.
- Плод — коробочка . . . . . 6.
- 6. Зубцы чашечки листообразные, очень длинные, много длиннее венчика; цветки крупными, темпо-розовые . . . . . Род 12. *Agrostemma* L. — *Куюль*.
- Зубцы чашечки не столь длинные, малоцветные . . . . . 7.
- 7. Цветки многочисленные, мелкие, с колокольчатой чашечкой, у которой места сращения чашелистиков безоперенчатые . . . . . Род 17. *Gypsophila* L. — *Камни*.
- Цветки крупные, с более или менее удлиненной чашечкой . . . . . 8.
- 8. Столбиков 2; коробочка раскрывается 4 зубцами; лепестки цельнокрайные или слегка выемчатые . . . . . Род 20. *Saponaria* L. — *Мыльница*.
- Столбиков 3—5; коробочка раскрывается 6—10 зубцами; лепестки глубоковыемчатые . . . . . 9.
- 9. Цветки однополые, дуговые; коробочка открывается 10 зубцами . . . . . 10.
- Цветки обоеполые . . . . . Род 15. *Melastrium* Koeh. — *Дрема*.
- 10. Столбиков 5, лепестки ярко-красные; коробочка открывается 5 зубцами . . . . . Род 14. *Lychnis* L. — *Лихнис*.
- Столбиков 3, лепестки белые . . . . . Род 13. *Silene* L. — *Смолетка*.
- 11 (от 2). Листья с прилистниками . . . . . 12.
- Листья без прилистников . . . . . 13.
- 12. Столбиков 3; плод раскрывается 3 створками; листья попарно сростшиеся основаньями . . . . . Род 10. *Spergularia* Presl. — *Торчица*.
- Столбиков 5; плод раскрывается 5 створками; листья в ложных мутовках . . . . . Род 9. *Spergula* L. — *Торпа*.
- 13 (от 11). Столбиков 3 . . . . . 14.
- Столбиков 5 или 4 . . . . . 19.
- 14. Лепестки на верхушке глубоко выемчатые или раздельные . . . . . 15.
- Лепестки цельные или лишь слегка лопастные . . . . . 16.
- 15. Корни с клубнеобразными утолщениями . . . . . Род 2. *Krascheninnikovia* Turcz. — *Красеннишниковия*.
- Корни без клубнеобразных утолщений . . . . . Род 1. *Stellaria* L. — *Звездчатка*.
- 16 (от 14). Листья толстые, мясистые; цветки асеноватые, с околоцветным диском . . . . . Род 6. *Ammodendron* Patr. — *Моринка*.
- Листья не мясистые; цветки с белыми лепестками, без диска . . . . . 17.
- 17. Листья плоские; плод раскрывается 6 створками; семена с белым придатком . . . . . Род 8. *Moehringia* L. — *Мерингия*.
- Листья шиловидные или почти нитевидные, собраны преимущественно в прикорневые розетки . . . . . Род 7. *Arenaria* L. — *Песчанка*.
- Стебли раскидистые; листья более короткие, преимущественно стеблевые, расположенные пучками . . . . . Род 5. *Mitularia* L. — *Митурария*.
- 19 (от 13). Лепестки цельные; число створок коробочки равно числу столбиков; листья сростные основаньями во влагалища; маленькие однолетники . . . . . Род 4. *Sagina* L. — *Мшанка*.
- Лепестки на конце более или менее глубоковыемчатые; коробочка открывается 10 зубцами . . . . . Род 3. *Cerastium* L. — *Ясколка*.

### Род 1. STELLARIA L. — ЗВЕЗДЧАТКА

- 1. Лепестки пяти-семьраздельные; крупное растение, густо опушенное короткими волосками; листья продолговатоланцетные, сидячие или почти сидячие. Берега рек, кустарники . . . . . 1. *S. radialis* L. — *3. лучистая*.
- Лепестки двураздельные . . . . . 2.
- 2. Листья, по крайней мере нижние, с хорошо развитыми черешками, приподнимающиеся по длине пластинки; листья более крупные, с волосистыми линиями с одной стороны междоузлий, и остальным голые . . . . . 3.
- Листья сидячие или почти сидячие; стебли четырехгранные, голые . . . . . 5.
- 3. Лепестки короткие чашелистиков; растение небольшое, распростертое, густоветвистое. Сорное . . . . . 2. *S. media* (L.) Cyr. — *3. средняя*, *Моринка*.
- Лепестки длинные чашелистиков; более высокие растения с прямыми, лишь в основании восходящими стеблем . . . . . 4.
- 4. Листья 2—3 см дл., 0,4—1 см шир. Верхний Амур; на влажных местах . . . . . *S. obrectata* Kom. — *3. бесприветниковая*.
- Листья 4—8 см дл., 1,5—4 см шир. Деса . . . . . 4. *S. bungeana* Fenzl — *3. Бунге*.
- 5 (от 2). Растение, образующее ползучие дерновины; в пазухах листьев находится многочисленные укороченные веточки; лепестков нет; коробочка однодусемянная. Верхний Амур; сухие каменистые склоны . . . . . 5. *S. cherleriae* (Fisch.) Will. — *3. шерлеровидная*.



- Растения не образуют дерновины; укороченных веточек в пазухах листьев нет . . . . . 6.
- 6. Железистое опушенное растение с дихотомическими ветвистыми стеблями, образующими шаровидный кустик до 30 см выс.; чашечка 4—5 мм дл. Верхний Амур, каменистые склоны . . . . . 6. *S. dichotoma* L. — 3. нильчатая.
- Растения без железистого опушения . . . . . 7.
- 7. Цветки сидят в пазухах уменьшенных листьев; чашелистики 3—6 мм дл. . . . . 9.
- Цветки с пленчатыми прицветниками; чашелистики короче . . . . . 9.
- 8. Листья сердцевидно-яйцевидные, до 12 мм шир., острозаострые, жесткие, растение обычно слабое. Морские берега . . . . . 7. *S. ruscifolia* Pall. — 3. иглолистная.
- Листья продолговато-ланцетные или ланцетные, до 6 мм шир., растение зеленое. Морской берег в устье Амура . . . . . 8. *S. humifusa* Rottb. — 3. приземистая.
- 9 (от 7). Листья мелкие, продолговатые или продолговато-яйцевидные, длина их не более 3 раз превышает ширину; густоветвистое, распростертое растение. У ручьев и сорное на влажных местах . . . . . 9. *S. alsine* Grimm, *S. uliginosa* Murr. — 3. тонкая.
- Листья линейные или ланцетные, длина их не менее чем в 4 раза превышает ширину . . . . . 10.
- 10. Листья линейные или узколинейные, до 2 (2.5) мм шир. . . . . 11.
- Листья ланцетные или линейно-ланцетные, 4—6 мм шир. . . . . 12.
- 11. Лепестки не длиннее чашечки. Хвойные леса . . . . . 10. *S. diffusa* Willd., *S. mosquensis* M. B. — 3. раскидистая.
- Лепестки почти вдвое длиннее чашечки. Луга . . . . . 11. *S. jaluana* Nakai — 3. ялуская.
- 12 (от 10). Листья тонкие, по краям плоские и с волосками; соцветие широко дихотомически ветвящееся. Леса . . . . . 12. *S. fenziellii* Rgl. — 3. Фенция.
- Листья толстые, с гладкими, завороченными краями; соцветие маловетковое, небольшое. Склоны . . . . . 13. *S. discolor* Turcz. — 3. дуэтная.

#### Род 2. KRASCHENNIKOWIA Turcz. — КРАШЕНИННИКОВИЯ

- 1. Листья в основании закругленные, сидячие или короткочерешковые, до 4 см дл., 2 см шир., снизу по жилке с волосками. Леса . . . . . 1. *K. japonica* Korsh. — К. японская.
- Листья к основанию суживающиеся, снизу совершенно голые . . . . . 2.
- 2. Стебли на концах укореняющиеся; листья яйцевидные или овальные. Леса . . . . . 2. *K. davidii* Franch. — К. Давида.
- Стебли на концах укореняющиеся . . . . . 3.
- 3. Клубеньки расположены по одному в основании стебля; нижние листья продолговатые или линейно-продолговатые, верхние яйцевидные или и верхние продолговатые. Россия, Жесные берега . . . . . 3. *K. maximowicziana* Franch. et Sav. — К. Максимовича.
- Клубеньки находятся по несколько в узлах ползучих корневид . . . . . 4.
- 4. Листья жесткие; корни на большом протяжении (10 см и более) утолщенные. Трещины скал . . . . . 4. *K. rigida* Kom. — К. жесткая.
- Корневище в узлах с небольшими (до 1 см дл.) шаровидными или веретеновидными клубеньками . . . . . 5.
- 5. Листья линейные, до 4 мм шир.; поверхность семян мелко-остребованная. Леса . . . . . 5. *K. silvatica* Maxim. — К. лесная.
- Листья ланцетные или продолговатые, 3—8 мм шир.; семена покрыты длинными, на концах яворевидными шипиками. Скалы по Амуру . . . . . 6. *K. tyrestis* Turcz. — К. скальная.

#### Род 3. CERASTIUM L. — ЯСКОЛКА

- 1. Лепестки не длиннее чашелистиков; небольшое (до 25 см выс.) растение с продолговатыми или яйцевидными листьями. Сорное и у дорог . . . . . 1. *C. caespitosum* Gilib. — Я. дернистая.
- Лепестки вдвое длиннее чашелистиков . . . . . 2.
- 2. Прицветные листья совершенно зеленые; цветки крупные (лепестки 15 мм дл.); листья до 5 см дл., 2 см шир. Лесные склоны . . . . . 2. *C. rusciflorum* Stev., *C. pilosum* Ldb. — Я. малоцветковая.
- Прицветные листья по краям более или менее пленчатые; цветки не столь крупные . . . . . 3.
- 3. Листья совершенно сидячие, продолговатые или эллиптические; чашелистики снаружи и цветоножки наверху почти мохнаты от отстоящего длинного опушения. Склоны; в высокогорном поясе . . . . . 3. *C. fischerianum* Ser. — Я. Фангера.

- Листья к основанию суживаются в черешок; чашелистики снаружи и цветоножки с густым, коротким железистым опушением. Склоны и сорное . . . . . 4. *C. arvense* L. — Я. полевая.

#### Род 4. SAGINA L. — МШАНКА

- Приморские пески и галечники . . . . . 1. *S. maxima* A. Gray, *S. litoralis* Hult. — М. крупная.

#### Род 5. MINUARTIA L. — МИНУАРИЯ

- 1. Чашелистики острые; лепестки немного длиннее чашечки; образует густые дерновины. Скалы . . . . . 1. *M. gracilipes* Kom. — М. тонконожкая.
- Чашелистики тупые; лепестки вдвое длиннее чашечки; растение не столь густо-дернистое. Сухие каменистые склоны; по Амуру . . . . . 2. *M. laricina* (L.) Matf. — М. листовничная.

#### Род 6. AMMODENIA Patr. — МОЯРКА

- Морские берега . . . . . 1. *A. peplodes* (L.) Rupr. — М. бутераковидная.

#### Род 7. ARENARIA L. — ПЕСЧАНКА

- Сухие склоны . . . . . 1. *A. juncea* M. B. — П. ситниковая.

#### Род 8. MOENHRINGIA L. — МЕРИНГИЯ

- Леса . . . . . 1. *M. lateriflora* (L.) Fenzl — М. бокоцветная.

Для Ставлянского района указывается еще *M. elongata* Schischk. — вид для нас не вполне ясный, якобы отличающийся от *M. lateriflora* более крупными размерами цветочных стеблей и разовеликами на бесплодных и плодущих побегах листьями.

#### Род 9. SPERGULA L. — ТОРНИЦА

- Сорное . . . . . 1. *S. arvensis* L., *S. vulgaris* Benn. — Т. полевая.
- Кроме *S. arvensis*, имеющей семена около 1 мм в диам., для Дальнего Востока указывается еще *S. maxima* Welw., с семенами в 2 раза более крупными.

#### Род 10. SPERGULARIA Presl — ТОРНИЧНИК

- 1. Коробочка длиннее чашечки; цветоножки голые, при плодах в 2—3 раза длиннее чашечки; прилистники буроватые, малочисленные, луга у моря . . . . . 1. *S. salina* Presl, *S. media* Presl — Т. солончаковый.
- Коробочки не длиннее чашечки; цветоножки железисто опушенные, не длиннее чашечки; прилистники белоперепончатые почти блестящие. Сорное . . . . . 2. *S. rubra* (L.) Presl, *S. campestris* Aschers. — Т. красный.

#### Род 11. SCLERANTHUS L. — ДИВАЛО

- Сорное (заносное с запада) . . . . . 1. *S. annuus* L. — С. однолетний.

#### Род 12. AGROSTEMMA L. — КУКОЛЫ

- Сорное, редко . . . . . 1. *A. githago* L. — К. обыкновенный.


#### Род 13. SILENE L. — СМОЛЕВКА

- 1. Чашечка вздутая, с 20—30 продольными жилками. Сорное . . . . . 1. *S. cucubalus* Willd., *S. latifolia* Rendl. et Britt., *S. vulgaris* Garcke — С. водьяриковская.
- Чашечка не вздутая, с 10 жилками. Сорное . . . . . 2.
- 2. Лепестки лилово-розовые или розоватые; чашечка более или менее вздутая, 10—15 мм дл. Лепестки лилово-розовые или розоватые; чашечка более или менее вздутая, 10—15 мм дл. 5—9 мм шир.; стебли сверху слегка клейкие. В высокогорных . . . . . 2. *S. stenophylla* Ldb. — С. узколистная.




- Лепестки белые или слегка зеленоватые 3.
3. Чашечки, цветоножки и стебли вершью густо опушенные, растение с тонким, ползучим корневищем. Сухие дуга, кустарники 3. *S. repens* Patrín — С. ползучая. 4.
4. Чашечки и цветоножки голые 4.
4. Стебли паверу более или менее клейкие 5.
5. Стебли паверу совершенно лишены клейкого налета 6.
5. Одноствольный монокарпик со стержневым корнем и с сухими остатками прикорневых листьев; стебли высокие, около 70 см выс., прямые. Сухие склоны 4. *S. koreana* Kom. — С. корейская.
- Многоствольный поликарпик с мощным, боковым, коротким корневищем, без остатков прикорневых листьев; стебли высокие или низкие, более или менее дуговидно ползучие. Скалы, сухие и влажные склоны 5. *S. foliosa* Maxim. — С. обшественная.
- 6 (от 4). Растение во время цветения с розеткой прикорневых листьев; корень мощный, стержневой. Сухие дуга, кустарники 6. *S. jenseisensis* Willd. — С. синецвильная.
- Во время цветения растений прикорневых листьев нет; корневище многоглавое; листья крупные, до 7 см дл., 1,5 см шир. Скалы 7. *S. macrostylis* Maxim. — С. длинностолбчатая.





*Nelumbium komarovii* Grossh. (Лотос Комарова): а — лепесток, б — сопло-  
дие, в — плод, г — лист.



1 — *Euryale ferox* Salisb. (Зарпала устратающая); 2 — *Brasenia schreberi* J. F.  
Gmel. (Бразения Шребера); 3 — *Nymphaea tetragona* Georgi (Кувшинка чоти-  
рехтратная); 4 — *Nuphar pumila* (Hoffm.) DC. (Кубышка малая): а — лист,  
б — цветок.

Однолетник; листья длинночерешковые, до 100—130 см в поперечнике, сверху ярко-зеленые, снизу красно-фиолетовые, листовые черешки, жилки листьев, завязи и особенно плоды с шипиками и шипами; лепестки яркие, синие-фиолетовые, многочисленными. В мелких озерах по рекам Лефу, Иману и близ Хабаровска . . . . . 1. E. ferox Salisb. — Э. устрашающая (табл. 76, 1).

Род 4. NYMPHAEA L. — КУВИШКА

Листья обычно около 8 см дл. и 7 см шир., реже более крупные, до 12—15 (27) см дл. и 12 (16) см шир.; цветки (2) 4—5 см в поперечнике, лепестков 10—12. В озерах, старицах и заводах; часто . . . . . 1. N. tetragona Georgi — К. четырехгранная, К. малая (табл. 76, 3).

Род 5. NUPHAR Smith — КУБИШКА

1. Листья плавающие, листовые доли округлые, жилка не доходит до краев листа. В озерах и заводах; часто . . . . . 1. N. pumilum (Hoffm.) DC. — К. малая (табл. 76, 4).
- Листья прямостоящие, листовые доли заостренные, жилка доходит до краев листа; все растение более мощное. В старицах; пока найдена только в бассейне р. Хора . . . . . 2. N. japonicum DC. — К. японская.

Сем. 54. CERATOPHYLLACEAE S. Gray — РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

Род 1. CERATOPHYLLUM L. — РОГОЛИСТНИК

Слабостебельное подводное растение; листья ланцетными разделенными 1—2 раза на 2—4 линейных доли с мелкими зубчиками по краю; цветки тычиночные, с маленьким безлопастным околоцветником и 12—14 сидящими тычинками, пестичные зеленые; плод — продолговатый орешек 4—5 мм дл. и 1,5 мм шир., бескрылый, с 5 колючками. В озерах и старицах . . . . . 1. C. angustatum Kom. — Р. рисовый.

Сем. 55. RANUNCULACEAE Juss. — ЛЮТИКОВЫЕ

1. Плоды ягодообразные, черные или красные . . . . . Род 9. Actaea L. — Воронец.
- Плоды сухие или мясистые, но не ягодообразные . . . . . 2.
- Каждый плод многосемянный . . . . . 12.
3. Листья супротивные; плоды с длинным, перистым столбиком; цветки с 4 чашелистиками . . . . . 4.
- Листья очередные или стебли сверху с покрывалом из мутовчато расположенных листочков . . . . . 5.
4. Цветки с лепестками (они небольшие, беловатые, лопатчатой форма) . . . . . Род 17. Atragene L. — Книжник.
- Лепестков в цветках нет, есть лишь лепестковидные чашелистики . . . . . Род 18. Clematis L. — Ломонос.
- 5 (от 3). Плоды с удлиненными перистыми столбиками . . . . . Род 16. Pulsatilla Adams. — Прострел.
- Столбики короткие . . . . . 6.
6. Стебли сверху с мутовчато собранными листочками покрывала; цветки белые или розовые . . . . . 7.
- Стеблевые листья очередные; покрывала нет . . . . . 8.
7. Листья рассеченные . . . . . Род 14. Anemone L. — Ветреница.
- Листья лопастные . . . . . Род 15. Hepatica Mill. — Печеночница.
- 8 (от 6). Цветки с чашечкой и венчиком . . . . . 9.
- Цветки только с рано опадающими чашелистиками . . . . . 11.
9. Лепестки без медовой ямки; одли из наиболее рано зацветающих растений с крупными, желтыми цветками . . . . . Род 23. Adonis L. — Адонис.
- Лепестки с основанием с медовой ямкой . . . . . 10.
10. Плодики с продолговатыми желавками; небольшие растения с мелкими, желтыми цветками и небольшими округлыми листьями . . . . . Род 20. Halerpestes Green — Ползучик.
- Плодики гладкие или поперечнооросчатые . . . . . Род 21. Ranunculus L. — Лютик.
- 11 (от 8). Листья пальчатообразные . . . . . Род 19. Trautvetteria Fisch. et Mey. — Траутфеттерия.

- Листья сложноперистые или сложнотройчатые . . . . . Род 22. Thalictrum L. — Висциценция.
- 12 (от 9). Цветки неправильные . . . . . 13.
13. Цветки правильные . . . . . 14.
- Цветки со шпорцем . . . . . Род 12. Delphinium L. — Живокость.
- 14 (от 12). Листья цельные, по краям зубчатые или почти цельнокрайные; цветки довольно крупные, желтые или белые . . . . . Род 13. Aconitum L. — Борец.
- Листья более или менее рассеченные . . . . . Род 2. Calltha L. — Калужница.
15. Цветки оранжевые, яркие; листья пальчатые . . . . . Род 3. Trollius L. — Кукулицик.
- Цветки белые, розовые, синие, вишневые, иногда желтоватые, но не оранжевые . . . . . 16.
16. Цветки со шпорцами . . . . . Род 11. Aquilegia L. — Водосбор.
- Цветки без шпорцев . . . . . 17.
17. Цветки крупные, 2,5—10 см в поперечнике, белые или розовые; тычинки сростные основаниями в кольцо; плоды (листочки) крупные, мясистые, внутри красные; семена крупные, с горюшкой, черные . . . . . Род 1. Paeonia L. — Пион.
18. Цветки мелкие . . . . . 18.
18. Однолетники с мелко разрезанными листьями; цветки желтоватые . . . . . Род 5. Leptopyrum Rchb. — Лептопирум.
- Многолетники; цветки белые . . . . . 19.
19. Маленькие растения (до 15 см выс.) с тройчатыми кожистыми листьями . . . . . Род 8. Coptis Salisb. — Коптис.
- Листья не кожистые, более рассеченные . . . . . 20.
20. Цветки мелкие, собраны в крупные, многоцветковые соцветия, появляющиеся в конце лета; мясистые растения с двояко- или тройчатыми листьями, несущими крупные, широкие листочки . . . . . Род 10. Cimicifuga L. — Княжик.
- Равновесные небольшие растения с более крупными цветками, одиночными или собранными по несколько . . . . . 21.
21. Корневища с многочисленными клубеньками; прикорневой лист 1, стеблевых 1—2, тройчато раздельные на мелкие доли; цветков 1—2 . . . . . Род 7. Semiaquilegia Makino — Полуводосбор.
- Корневища без клубеньков, утолщенные, почти клубеньковые; стеблевые листья расположенные мутовчато, а прикорневых нет . . . . . 22.
22. Цветки одиночные, довольно крупные . . . . . Род 4. Eranthis Salisb. — Весенник.
- Цветки по 2—5, в зонтикообразном соцветии, мелкие . . . . . Род 6. Eranthis Raf. — Эмменон.

Род 1. PAEONIA L. — ПИОН

1. Листья мелко хрицего зазубренные по краю; цветки белые или розоватые. Луга, кустарники . . . . . 1. P. lactiflora Pall., P. albiflora Pall. — П. белоцветковый.
- Листья совершенно цельнокрайные . . . . . 2.
2. Цветки светло-красные, крупные, до 10 см в поперечнике; листья толстые, снизу с тонкой сетью жилок и с редкими волосками; боковые листочки сидячие. В лесах . . . . . 2. P. vernalis Mandl — П. весенний.
- Цветки густо розовые; листья снизу густо опушенные . . . . . 3.
3. Цветки раскрытые, до 8 см в поперечнике; листья снизу узкие, конечный листочек широкий (длина его менее чем в 2 раза превышает ширину), боковые за ним на черешочках. В лесах; на юге . . . . . 3. P. japonica Miyabe et Takeda — П. японский.
- Цветки не раскрывающиеся, около 2,5 см в поперечнике; листья плотные, снизу очень узкие, конечный листочек продолговато-обратнояйцевидный (длина его более чем в 2 раза превышает ширину), боковые за ним сидячие. В лесах . . . . . 4. P. obovata Maxim. — П. обратнояйцевидный.

Род 2. CALTHA L. — КАЛУЖНИЦА

1. Цветки белые, небольшие, около 1 см в поперечнике; водное растение с плавающими почти округлыми листьями . . . . . 1. C. natans Pall. — К. плавающая.
- Цветки желтые, более крупные (до 3,5 см в поперечнике) . . . . . 2.
2. Растение небольшое; листья при столах до 7 см дл., 4 см шир., выемка при основании листа достигает половины длины всей пластинки; цветки 2 (2,5) см в поперечнике. Болота . . . . . 2. C. rupestris Nakai — К. карликовая.
- Более крупные растения; листья 10—20 см дл., до 15 см шир.; цветки 3—3,5 см в поперечнике . . . . . 3.
3. Выемка при основании листа достигает почти половины длины пластинки, последняя часто почковидная; стебли поникающие и часто укореняющиеся в узлах; . . . . . Род 19. Trautvetteria Fisch. et Mey. — Траутфеттерия.



- соцветия рыхлое, малоцветковое; цветоножки по 5,5 см дл. Берега водоемов, болота . . . . . 3. *C. membranacea* Schipcz. — К. перепончатая.  
 — Пластина округлая; выемка в основании листа в 3—4 раза короче всей пластинки; стебли почти прямые; соцветие более многоцветковое, компактное; цветоножки до 2 см дл., при плодах сильно удлинняющиеся (до 10 см). Влажные леса . . . . . 4. *C. silvestris* Worosch., *C. palustris* aust., non L. — К. лесная.

### Род 3. TROLLIUS L. — КУПАЛЬНИЦА

1. Лепестки короткие, не длиннее тычинок. В горах на юге и на севере области . . . . . 1. *T. hederianus* Fisch. et Mey. — К. Ридера.  
 — Лепестки более длинные, длиннее тычинок . . . . . 2.  
 2. Лепестки лишь слегка превышают тычинки, до 15 мм дл., узкие, до 1 мм шир., не бросающиеся в глаза. Преимущественно по Амуру; дуга . . . . . 2. *T. ledebourii* Rehb. — К. Ледебура.  
 — Лепестки в 2 раза длиннее тычинок, около 25 мм дл., до 2 мм и более шир., яркие, бросающиеся в глаза. Леса . . . . . 3. *T. chinensis* Bge. — К. китайская.

### Род 4. ERANTHIS Salisb. — ВЕСЕННИК

- В лесах . . . . . 1. *E. stellata* Maxim. — В. звездчатый (табл. 77, 1).

### Род 5. LEPTOPYRUM Rehb. — ЛЕПТОПИРУМ

- Сорное; по Амуру . . . . . 1. *L. fumarioides* (L.) Rehb. — Л. дымчатый.

### Род 6. ENEMION Raf. — ЭНЕМИОН

- В лесах . . . . . 1. *E. raddeanum* Rgl. — Э. Радде.

### Род 7. SEMIAQUILEGIA Makino — ПОЛУВОДОСБОР

- В лесах . . . . . 1. *S. manshurica* Kom. — П. маньчжурский (табл. 78, 2).

### Род 8. COPTIS Salisb. — КОПТИС

- Хвойные леса, болота и болотистые лиственничные леса; по Амуру и на севере Приморья . . . . . 1. *C. trifolia* (L.) Salisb. — К. трехлистый (табл. 78, 1).

### Род 9. ASTAEA L. — ВОРОНЕЦ

1. Плоды красные; конечные листочки листьев при основании округлые или усеченные, трехлопастные. В хвойных лесах . . . . . 1. *A. erythrocara* Fisch. — В. краснолодный.  
 — Плоды черные; конечные листочки листьев при основании клиновидные или глубоко трехраздельные, с клиновидной средней долей. Леса маньчжурского типа . . . . . 2. *A. acuminata* Wall. — В. заостренный.


### Род 10. CIMICIFUGA L. — КЛОПОГОН

1. Соцветие простое или почти простое; листья морщинистые, снизу с волосками; лепестки цельные, наверху пленчатые. Луга, болотистые леса, склоны . . . . . 1. *C. simplex* Worosch. — К. простой.  
 — Соцветие ветвистое . . . . . 2.  
 2. Листья менее плотные, снизу с волосками; лепестки двураздельные, с 2 пустыми выемками на концах; корневища длинные. Леса (преимущественно дубовые), заросли кустарников . . . . . 2. *C. dahurica* (Turcz.) Maxim. — К. даурский.  
 — Листья более плотные, снизу голые; лепестки цельные, наверху пленчатые; корневища укороченные. Заросли лещины, дубянки; на юго-западе Приморья . . . . . 3. *C. heracleifolia* Kom. — К. борщевикоподобный.


### Род 11. AQUILEGIA L. — ВОДОСБОР

1. Шапки короткие, в 2 и более раза короче чашелистиков; листья плотные, снизу голые; листовки голые. Сухие склоны . . . . . 1. *A. parviflora* Ldb. — В. мелкоцветковый.


Таблица 77



1 — *Eranthis stellata* Maxim. (Весенник звездчатый); 2 — *Adonis amurensis* Rgl. et Radde [Адонис (Горницвет) амурский] в фазе цветения, до распускания листьев.



1 — *Coptis trifolia* (L.) Salisb. (Коптис трехлиственный); а — цветок, б — лепесток; 2 — *Semiaquilegia manshurica* Kom. (Полуводосбор маньчжурский); а — надземная часть растения с плодами, б — цветок, в — подземная часть растения.



1 — *Aconitum kirinense* Nakai (Борец гириньский); 2 — *A. albo-violaceum* Kom. (Б. бело-фиолетовый); 3 — *A. acutum* Maxim. (Б. дуговидный); а — лист, б — цветок.



- Шпорцы не короче или лишь немного короче чашелистиков . . . . . 2.
- 2. Цветки зеленовато-желтые или коричнево-красные, с длинными, тонкими прямыми шпорцами и выдающимися из цветков столбиками; растение голое, с железистыми волосками. Каменистые склоны; в Амурской области . . . . . 2. *A. viridiflora* Pall. — *A. зеленоцветковый*.
- Шпорцы на конце согнутые, цветоножки на конце опушенные, стебли и листья (особенно в верхней части черешков) с длинными, слегка спутанными волосками; листовики волосистые . . . . . 3.
- 3. Цветки лилово-синие; цветоножки на конце с мягким отстоящим опушением; листья тонкие с мелкими листовиками. Высокогорья . . . . . 3. *A. amurensis* Kom. — *A. амурский*.
- Цветки вино-красные, в середине желтые; цветоножки с железистым опушением; листовики крупные, более жесткие. Леса, кустарники . . . . . 4. *A. oxysperla* Trautv. et Mey. — *A. острокопачистый*.

#### Род 12. DELPHINIUM L. — ЖИВОКОСТЬ

- 1. Листья разделены до основания пластинки; стаминодии и нектарники синие . . . . . 2.
- Листья не бывают разделены до основания пластинки; стаминодии и нектарники черно-бурые, резко отличающиеся по окраске от чашелистиков . . . . . 3.
- 2. Доли листьев узколанцетные, 1—2 мм шир.; соцветие сильно ветвистое, редкочлениковое; цветки крупные, очень яркие, синие. Амурская область . . . . . 1. *D. grandiflorum* L. — *Ж. крупноцветковая*.
- Доли листьев линейно-ланцетные, 3—4 мм шир.; соцветие — простая кисть. Амурская область . . . . . 2. *D. cheilanthum* Fisch. — *Ж. губоцветная*.
- 3 (от 1). Стебель равномерно опушенный; прицветнички эллиптические или широкоэллиптические, расположенные при основании цветоножек. Леса, дуга . . . . . 3. *D. pascuicolum* Rgl. — *Ж. Маака*.
- Листья расположены в нижней части стебля или прикорневые; прицветнички линейные или линейно-ланцетные, расположены под цветками. Амурская область . . . . . 4. *D. crassifolium* Schrad., *D. korshinskyanum* Nevski — *Ж. толстолистная*.

#### Род 13. ACONITUM L. — БОРЕЦ

- 1. Шлем цилиндрический или узкоконический, высота его не менее чем в 2 раза превышает ширину; нижняя и задняя линии шлема образуют прямой угол; корневище многолетнее; листовок 3 . . . . . 2.
- Шлем полусферический, конический или свободобразный, высота его более или менее равна ширине или меньше ее, нижняя и задняя линии шлема образуют острый угол; корнеклубни дуговые . . . . . 3.
- 2. Цветки (или только шлем) фиолетовые . . . . . 8.
- Цветки желтые . . . . . 3.
- 3. Стебель вьющийся; оснований листовых черешков прилистниковидно расширенные. Леса . . . . . 1. *A. albo-violaceum* Kom. — *Б. бело-фиолетовый* (табл. 79, 2).
- Стебель прямой; оснований листовых черешков не расширенные прилистниковидно; растение целиком густо опушенное. Высокогорные кустарники, голые . . . . . 2. *A. desoulavii* Kom. — *Б. Десюлави*.
- 4 (от 2). Листья расцелены до основания пластинки; шпорец нектарника короткий, прямой или слегка согнутый . . . . . 5.
- Листья надразны не до основания пластинки; шпорец нектарника длинный, согнутый полукольцом, кольцом или спирально . . . . . 6.
- 5. Листья трижды рассеченные, с широкими дугообразными, слаболопастными сегментами и крупными, треугольно-яйцевидными зубцами. Дубовые леса, сухие склоны . . . . . 3. *A. kirinsene* Nakai — *Б. гирицкий* (табл. 79, 1).
- Листья пальчато-пятирассеченные, с глубоко двояды перистораздельными сегментами и линейными зубцами. Сухие склоны; в Амурской области . . . . . 4. *A. barbatum* Pers. — *Б. бородастый*.

Наше растение отличается от типичного *A. barbatum* тупыми зубцами листьев и голыми или почти голыми листовыми и может быть отнесено к особому виду — *A. sibiricum* Pot.

- 6 (от 5). Цветки небольшие, шлем до 15 мм выс.; листья линейные, малочисленные, Амурская область . . . . . 5. *A. ranunculoides* Turcz. — *Б. лютковидный*.
- Цветки крупные, шлем более 17 мм выс.; листья крупные . . . . . 7.
- 7. Почти все листья прикорневые, расположенные по земле, толстоватые, почковидные или почти округлые, с острокопачистыми зубцами; стебли внизу опушен-

ные; цветки желтые, шлем внизу сильно расширенный. Район Советской Гавани . . . . . 6. *A. crassifolium* Steinh. — *Б. толстолистный*.

— Листья тонкие, в очертании ланцетные; стебли опушенные; цветки грязно-желтые, шлем широкий, до 9 мм шир., внизу почти не расширенный. В лесах . . . . . 7. *A. umbrosum* Kom. — *Б. тенистый*.

Ближайший вид — *A. puchonraetium* Ueki et Sakata отличается более узкими, длинными долями листьев и желтыми цветками с расширенным внизу шлемом. Между этим видом и *A. imbricatum* передки промежуточные формы, точное определение которых затруднительно.

- 8 (от 1). Цветки желтые, лишь иногда с фиолетовым оттенком; семена только по углам крылатые, по краям гладкие. Сухие склоны; на юге . . . . . 8. *A. koreanum* Rapres, *A. koreanum* Steinh. — *Б. корейский*.
- Цветки фиолетовые или синие, редко белые; семена по краям поперечно морщинисто-крылатые, реже почти гладкие . . . . . 9.
- 9. Листья разделены не до основания пластинки или самые нижние расцелены до основания, а средние и верхние — не до основания, реже все листья расцелены до основания или почти до основания, но тогда пластинка нектарника длинная и узкая (до 1 см дл., 2—3 мм шир.), постепенно переходящая в длинный, загнутый шпорец; листовок 3 . . . . . 10.
- Листья всегда расцелены до самого основания; пластинка нектарника короткая, вадутая, 5—6 мм дл., 4—5 мм толщ., внезапно переходящая в тонкий, загнутый шпорец, реже пластинка нектарника не вадутая, 2,5—3 мм толщ., но тогда шпорец короткий, головчатый; листовок 5, реже 3 . . . . . 15.
- 10. Цветоножки голые . . . . . 11.
- Цветоножки, хотя бы в верхней части, опушенные . . . . . 14.
- 11. Стебли, кроме верхней части, с отстоящими волосками; цветки в горах, на морях, на горных склонах . . . . . 9. *A. vorobievii* Worosch. — *Б. Воробьева*.
- Стебли голые; растения цветут в августе . . . . . 10.
- 12. Листовики голые; стебли зигзагообразно изогнутые, часто в верхней части более или менее вьющиеся; черешки листьев дуговидно согнутые, в узлах имеются наплывообразные утолщения. Леса, по ручьям . . . . . 10. *A. acutatum* Maxim. — *Б. дуговидный* (табл. 79, 3).

В районе Татарского пролива и нижнего Амура встречается близкий вид с прямым стеблем, более выраженным верхушечным соцветием и вздутыми нектарниками — *A. fischeri* Rehb. — *Б. Фишера*.

- Листовики опушенные . . . . . 13.
- 13. Листья тонкие, даже верхние разделены почти до основания; цветки на длинных, изгибных, согнутых цветоносах, парные или одиночные, слабее крупными, листовидно разрезанными прицветничками; стебли вверху почти вьющиеся. По Амуру . . . . . 11. *A. raddeanum* Rgl. — *Б. Радде*.
- Листья плотные, только нижние разделены до основания, остальные лишь на  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  длины пластинки; цветки в короткой конечной и многочисленных укороченных пазушных кистях; стебли прямые, дуговидно повисающие на концах. Лесистые склоны . . . . . 12. *A. axilliflorum* Worosch. — *Б. пазушноточный*.
- 14 (от 10). Листья расцелены до основания или почти до основания; пластинки узкие, остроконечные, на пазухах листьев часто отходят длинные, тонкие побеги; высота растения 40—70 см. В лесах; на севере области . . . . . 13. *A. karafutense* Miyabe et Nakai, *A. flagellare* Steinh. — *Б. японско-кавказский*.
- Листья разделены на  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  длины пластинки на немногочисленные яйцевидные или яйцевидно-ланцетные остроконечные доли; побегов в пазухах листьев нет; нектарники длинные, очень узкие, на конце закрученные кольцом; небольшие (10—25 см выс.) скальные растения с 1—4 цветками. Каменистые склоны; в бассейне р. Сулухе . . . . . 4. *A. saxatile* Worosch. et Vorobiev — *Б. скальный*.
- 15 (от 9). На черешках листьев имеются отстоящие, длинные, почти щетинистые волоски; стебли вьющиеся, реже прямые . . . . . 16.
- Черешки листьев голые или с коротким, прижатым, курчавым опушением, но без примеси длинных, отстоящих волосков; стебли прямые . . . . . 18.
- 16. Дочерние корнеклубни всегда расположенные на тонких стеблах 2—5 см дл. (в гербариях дочерние клубни никогда не сохраняются, стелони же сохраняются); стебли вьющиеся; листовок 3. Леса . . . . . 15. *A. sezukinii* Turcz. — *Б. Шукина*.

*A. subvillosum* Worosch. — *Б. слабоволосистый* отличается прямым стеблем и тонкими листьями, разделенными на длинные, узкие, 2—4 мм шир. доли. Связан рядом переходов с *A. sezukinii*.

- Дочерние корнеклубни вильчато прирастнуты к материнским (в гербариях дочерние клубни обычно сохраняются); листовок 5 . . . . . 17.



17. Стебли вьющиеся; корневлубины маленькие, около 5 мм толщ.; листья тонкие, в очертании ланцетные, с длинными или широколанцетными остроконечными долями и зубцами; цветоножки с недлинными, прижатыми, реже отстоящими прямыми волосками. Амурская область. 16. *A. volubile* Pall. — *A. вьющийся*.

На самом юге Приморья в сырых кустарниках растет борец, похожий на *A. volubile*, но отличающийся от него плотными листьями с более широкими долями — *A. phragmiticola* Kom. — Б. тростниковый; *A. posselticum* Worosch. — Б. посетский отличается от него прямыми стеблями и листьями с более узкими долями.

- Стебли прямые; корневлубины 1 см толщ. и более; листья в очертании округлые, более плотные, с линейными тупыми долями; цветоножки и шлем снаружи густо длинно мохнаты. На голых . . . 17. *A. sichotense* Kom. — Б. сихотелинский.
- 18 (от 15). Листовки 5, опушенные; листья узкоэллиптические, черешки их, как и стебель сверху и цветоножки, покрыты коротким, курчавым, прижатым опушением; стебель внизу передо с ланцетными бесплодными побегами. Болотистые кустарники . . . 18. *A. macrogynum* Turcz. — Б. болотеносный.
- Листовки голые, в числе 3—5; цветоножки и стебель сверху голые . . . 19.
19. Доли листьев линейные, до 3 мм шир.; листовки 3; пластинка нектарника не вздутая, 2—3 мм толщ.; шпорец прямой, головчатый; семена с почти гладкими гранями. Амурская область . . . 19. *A. ambiguum* Rchb. — Б. сомнительный.
- Доли листьев 5—8 мм шир.; листовки 5; пластинка нектарника вздутая, около 5 мм толщ.; шпорец тонкий, крючковато согнутый; семена по граням с поперечными крыловидными складками . . . 20.
20. Шлем снаружи совершенно голый; кисть малоцветковая, с 5—6 цветками, рыхлая; цветоножки длинные, дуговидио вверх согнутые; листовки расходящиеся. Еврейская автономная область . . . 20. *A. birobidshanicum* Worosch. — Б. биروبидшанский.

- Шлем снаружи опушенный; цветоножки прямые или слегка изогнутые . . . 21.
21. Стебли с острыми линиями от низбегающих листовых черешков, наверху обычно дуговидио поникающие; колючая кисть малоцветковая, рыхлая, почти шитовидная; цветоножки длинные, с довольно крупными прицветничками; цветки сине-фиолетовые; шлем полусферический, 10—15 мм выс., с коротким, вниз направленным носиком; листовки расходящиеся. В лесах . . . 21. *A. lokii* Nakai — Б. Токи.

*A. pulcherrimum* Nakai — Б. изящный отличается прямым (не поникающим вверх), мощным, внизу узкокрылатым стеблем, коротко-кистевидным соцветием из ярко-фиолетовых (или белых) цветков и более поздним цветением.

- Стебли гладкие, прямые, высокие; колючая кисть многоцветковая, очень густая; цветоножки тонкие, короткие, не длиннее цветков, прижатые к оси соцветия; цветки грязновато-фиолетовые; шлем конусовидный, 7—10 мм выс., с длинным, вперед направленным носиком; листовки параллельные. Луга; в Амурской области и Прихайской провинции . . . 22. *A. kusnezoffii* Rchb. — Б. Кузнецова.

#### Род 14. ANEMONE L. — ВЕТРЕНИЦА

1. Стебель ветвистый или оканчивается соцветием из нескольких цветков . . . 2.
- Стебель простой, оканчивается 1, очень редко 2 цветками . . . 3.
- Стебель пальчатый; прикорневых листьев нет, стеблевые листья крупные, хорошо развитые. Луга . . . 1. *A. dichotoma* L. — В. вылистая.
- Стебель до соцветия простой, при основании стебля находится розетка листьев; на стебле имеется обертка из мутовчат расположенных листьев . . . 3.
3. Цветоножки не превышают по длине обертку; листья тройчатые. Голыши . . . 2. *A. brevipedunculata* Juz. — В. коротконожковая.
- Цветоножки в 2—4 раза длиннее обертки; листья часто почти шершавые. В горах; на севере области . . . 3. *A. sibirica* L. — В. сибирская.
- 4 (от 1). Листья обертки сидячие; прикорневых листьев 1—3; Стебель с 1—2 цветками . . . 5.
- Листья обертки на черешках . . . 5.
5. Плодики и завязи голые; листья снизу зеленые. Луга . . . 4. *A. glabrata* Juz. — В. голопочатая.
- Плодики и завязи волосистые; листья снизу белые. По ручьям . . . 5. *A. litoralis* Juz. — В. прибрежная.
- 6 (от 4). Раскраска во время цветения с розеткой прикорневых листьев; плодики густо покрыты войлочным опушением; цветки крупные. Луга; на Верхнем Амуре . . . 6. *A. sylvestris* L. — В. лесная.

- Прикорневых листьев нет или имеется всего 1 прикорневой лист . . . 7.
7. Околоцветник мелкий, отогнутый книзу; цветоножки короче листочков обертки. Леса . . . 7. *A. reflexa* Steph. — В. отогнутая.
8. Околоцветник крупнее, доли его горизонтальные . . . 8.
8. Листочки околоцветника 6 и больше . . . 9.
- Листочки околоцветника 5 . . . 10.
9. Листочки околоцветника 6—8; доли листочков обертки острые, перистораздельные или надразанные; доли околоцветника продолговатоовальные. Леса . . . 8. *A. amurensis* Kom. — В. амурская.
- Листочки околоцветника 10—16; доли листочков обертки тупые, слегка лопастные на конце, в остальном перистораздельные; доли околоцветника линейно-продолговатые. Леса . . . 9. *A. raddeana* Rgl. — В. Радде.
- 10 (от 8). Стебли с отстоящими волосками; доли листочков обертки зубчато-лопастные, широкие. Леса . . . 10. *A. udensis* Trautv. et Mey. — В. удская.
- Стебли голые или сверху с полуприжатыми волосками . . . 11.
11. Доли листочков обертки линейно-ланцетные или ланцетные, мелкозубчатые или с немногими крупными зубцами; цветки мелкие. Леса; в пихтовых Амура . . . 11. *A. debilis* Fisch. — В. слабая.
- Доли листочков обертки ромбические или ромбически-овальные, надразанные или зубчатые; цветки крупные. В лесах . . . 12. *A. umbrosa* C. A. Mey. — В. темная.

#### Род 15. HERATICA Mill. — ПЕЧЕНОЧНИЦА

Горные леса . . . 1. *H. asiatica* Nakai, *H. nobilis* auct., non Mill. — П. азиатская.

#### Род 16. PULSATILLA Adans. — ПРОСТРЕЛ

1. Пластинка листа без выраженного главного стержня (листья пальчатые), разрезана на узкие доли; цветки фиолетовые. Амурская область . . . 1. *P. multifida* Juz. — П. многораздельный.
- Пластинка листа с хорошо выраженным главным стержнем (листья перистые или тройчатые). . . 2.
2. Листья тройчатые, сегменты их более или менее глубоко (но не до основания) надразанные на широкие, до 2 см шир., доли; цветки прямостоящие, крупные, около 4 см дл., фиолетово- или темно-пурпурные. Сухие склоны . . . 2. *P. chinensis* (Bge.) Rgl. — П. китайский.
- Листья перистые перистые, с узкими долями; зацветает до появления листьев; . . . 3.
3. Листья трижды перистые, с узкими долями; зацветает до появления листьев; цветки более или менее прямостоящие. Верхний Амур; сухие склоны . . . 3. *P. turczaninowii* Kryl. et Serg. — П. Турчанинов.
- Листья дважды перистые, с более широкими долями; зацветает после появления листьев; цветки более или менее поникающие . . . 4.
4. Цветки бледно-фиолетовые, небольшие, около 2 см дл.; средняя доля листьев на конце пильная или с зубцами, из которых боковые много мельче конечного. Склоны, газончики . . . 4. *P. dahurica* (Fisch.) Spreng. — П. даурский.
- Цветки фиолетово-красные или малиновые, около 3 см дл.; средняя доля листьев (по крайней мере у большинства листьев) на конце с 3 более или менее одинаковыми зубцами. Сухие склоны . . . 5. *P. cerua* (Thunb.) Benth. et Opiz — П. поникающий.
- P. kissii* Mandl. — П. Кисса — гибрид между *P. chinensis* и *P. cerua*.
- Листья тройчатые, но более глубоко разрезанные и с более узкими долями, чем у *P. chinensis*. Цветки чаще пурпурно-фиолетовые.

#### Род 17. ATRAGENE L. — КНЯЖИК

1. Лепестки почти равны чашелистикам. Амурская область . . . *A. macrophala* Ldb. — К. крупнолепестковый.
- Лепестки много короче чашелистиков. Леса . . . 2. *A. ochotensis* Pall. — К. охотский.

#### Род 18. CLEMATIS L. — ЛОМОНОС

1. Цветки буро-фиолетовые; цветоножки густомохнатые, реже голые; летучки бурые; листья снизу с волосками или голые, листовые или чашелистичные, некоторые дважды надразанные. Леса и дуга . . . 1. *C. fusca* Turcz. — Л. бурый.



- Цветки белые или желтоватые . . . . . 2.
- 2. Листочки цельнокрайные или крупно дважды-трижды надрезанные, с цельнокрайними долями . . . . . 3.
- Листочки по краю зубчатые или трехраздельные, с выемчато-зубчатыми долями . . . . . 4.
- 3. Стебли простояющие, листочки дважды-трижды надрезанные или цельные, узкие, 3—9 мм шир.; чашелистики спарушки густо волосовидные. Сухие склоны . . . . . 2. *C. hexapetala* Pall. — Л. пестичнолистный.
- Стебли лазящие; листочки цельные, широкие, до 4—5 см шир.; чашелистики спарушки только по краю короткошерстистые, в остальном головатые. Сухие склоны, опушки лесов . . . . . 3. *C. mandshurica* Rupr. — Л. маньчжурский.
- 4 (от 2). Листочки трехраздельные или рассеченные, доли их надрезанные и зубчатые; цветки мелкие, узкоколокольчатые. Кустарничковые склоны; редко . . . . . 4. *C. aethusifolia* Turcz. — Л. кокорышелистный.
- Листочки цельные, по краю пылящие . . . . . 5.
- 5. Цветки белые, мелкие, в многоцветковом соцветии; тычинки голые; столбики при плодах короткие, около 1,5 см дл.; листочки широкие, до 3 см шир., по краю с редкими, крупными зубцами, снизу по средней жилке с волосками. Берега рек, кустарничковые заросли . . . . . 5. *C. brevicaulata* DC. — Л. короткостолбовый.
- Цветки светло-желтые, более крупные, расположены поодиночке на длинных цветоножках; тычинки опушенные; столбики при плодах длинные, 2,5—3 см дл.; листочки более узкие, по краю с более частыми, мелкими зубцами, снизу голые. Берега рек . . . . . 6. *C. serratifolia* Rehd. — Л. пильчатолистный.

#### Род 19. TRAUTVETTERIA Fisch. et Mey. — ТРАУТФЕТТЕРИЯ

- Леса в более северной части области . . . . . 1. *T. japonica* Sieb. et Zucc. — Т. японская.

#### Род 20. HALERPESTES Green — ПОЛЗУНОК

- Иловатые берега рек, солончхи . . . . . 1. *H. salsuginosa* (Pall.) Green — П. солончаковый.

#### Род 21. RANUNCULUS L. — ЛЮТИК

- 1. Цветки белые; ползовые растения с листьями, разделенными на волосовидные дольки; плодики с поперечными морщинами . . . . . 2.
- Цветки желтые; плоды гладкие . . . . . 3.
- 2. Листья небольшие; пластинки у верхних листьев около 1 см дл., у нижних до 2 см дл., едва трижды трехраздельные, во воды почти не спадающие; цветки 6—8 мм в поперечнике . . . . . 1. *R. eradicatus* (Fries) Nevski — Л. бескорнейший.
- Листья более крупные; пластинки 3—5 см дл., трехраздельно-триждыраздельные, вне воды сильно спадающие; цветки 8—12 мм в поперечнике . . . . . 2. *R. kauffmannii* Clerc — Л. Кауфмана.

Наше растение отличается от европейских более короткими листьями и мелкими цветками, приближаясь в этом отношении к *R. divaricatus* Schrank, и, возможно, представляет особый вид.

- 3 (от 1). Листья цельные, цельнокрайные . . . . . 4.
- Листья разнообразно разрезные . . . . . 5.
- 4. Стебли столбчатые, укореняющиеся в узлах; междоузлия дуговидные; цветки 6—9 мм в поперечнике. Берега водоемов . . . . . 3. *R. reptans* L. — Л. стелющийся.
- Стебли прямые или при основании восходящие; цветки около 2 см в поперечнике. Луга . . . . . 4. *R. amurensis* Kom. — Л. амурский.
- 5 (от 3). Растение обычно ползущее, с почти до основания разделенными листьями на узкие (1 мм шир.) доли; цветки маленькие, 5—8 мм в поперечнике; цветоножки после цветения почти не увеличиваются; плоды около 1,5 мм дл. (без носика); носик довольно длинный . . . . . 6. *R. guelinii* DC. — Л. Гельмина.
- Наземные растения . . . . . 6.
- 6. Однодетишки цветки мелкие, 6—8 мм в поперечнике; цветоножки после цветения сильно удлиняющиеся . . . . . 7.
- Многодетишки, если однодетишки, то цветки крупнее, а цветоножки не удлиняющиеся . . . . . 8.
- 7. Растение густо щетиисто-волосистое; цветки около 8 мм в поперечнике, светло-желтые плоды 2,5 мм дл. . . . . 6. *R. chinensis* Bge. — Л. китайский.
- Растение голое; цветки около 6 мм в поперечнике; плоды около 1 мм дл. с очень коротким носиком . . . . . 7. *R. scleratus* L. — Л. идонитый.

- 8 (от 6). Прикорневые листья рассеченные с черешковыми сегментами . . . . . 9.
- Прикорневые листья разделены не до основания, а если до основания, то с сидячими долями . . . . . 10.
- 9. Стебли простояющие, щетино-опушенные; цветки 10—12 мм в поперечнике, темно-желтые; плоды 4—5 мм дл.; луга; на юге (с Уссурийск, р. Личик, ст. Приморская) . . . . . 8. *R. tachiroi* Franch. et Sav. — Л. Тахиро.
- Стебли лежачие, в узлах иногда укореняющиеся; цветки 20 мм в поперечнике, желтые. Луга и сорные . . . . . 9. *R. repens* L. — Л. ползучий.
- 10. Прикорневой лист большой частью одиночный, округлый или округло-почковидный, по краю зубчатый . . . . . 10. *R. monophyllus* Ovcz. — Л. однолиственный.
- Прикорневые листья рассеченные или надрезанные . . . . . 11.
- 11. Растение со столбами, опушенное отстоящими волосками; листья надрезанные не до основания пластинки, зубцы их острые; цветки 20—25 мм в поперечнике; плоды 3,5—4 мм дл. Леса, луга . . . . . 11. *R. japonicus* Thunb. — Л. японский.

У растений из Приханкайской области отсутствуют столбы, опушенные прижатое (*R. propinquus* C. A. Mey.).

- Растения голые или почти голые; стеблевые листья рассеченные до основания; на конце округлые, тупые или остроконечные; цветки 15—20 мм в поперечнике; плоды до 2,5 мм дл. Эфемерид широколиственных лесов . . . . . 12. *R. ussuriensis* Kom. — Л. уссурийский.

#### Род 22. THALICTRUM L. — ВАШИЛНИК

- 1. Ребра плодов крылатые; при основании листьев развиты мозолистые ушки; крупное растение с чисто белыми цветками, реже слегка лиловатыми. Леса . . . . . 1. *Th. contortum* L. — В. скрученный.
- Ребра плодов не крылатые . . . . . 2.
- 2. Листья тройчатые сложные . . . . . 3.
- Листья перистосложные . . . . . 4.
- 3. Листья снизу и черешки голые опушенные, стеблевые супротивные, простые, корни не утолщенные или почти не утолщенные. Леса . . . . . 2. *Th. filamentosum* Maxim. — В. тычиночный.
- Листья снизу и черешки совершенно голые, стеблевые супротивные тройчатые или дважды тройчатые; корни веретенообразно утолщенные. Горные леса . . . . . 3. *Th. tuberiferum* Maxim. — В. клубнистый.
- 4 (от 2). Растение довольно густо покрыто мелкими железками. Листочки небольшие, 5—8 мм в поперечнике, снизу сизые. Небольшое растение скал и сухих горных склонов . . . . . 4. *Th. foetidum* L. — В. вонючий.
- Растения голые или почти голые . . . . . 5.
- 5. Нити тычинок расширенные, шире пыльников . . . . . 6.
- Нити тычинок тонкие пыльников, не расширенные . . . . . 8.
- 6. Плодики вздутые, почти шаровидные, 2,5 мм дл., 2 мм шир.; листочки крупные, зубчато-лопастные, тонкие. Леса . . . . . 5. *Th. baicalense* Turcz. — В. байкальский.
- Плодики 3,5—6 мм дл., 2—3 мм толщ. . . . . 7.
- 7. Плодики на ножках, повислые; цветки многочисленными, на верхушках ветвей по 1 лесе, луга . . . . . 6. *Th. sparsiflorum* Turcz. — В. редкочетковый.
- Плодики сидячие, простояющие; цветки белые. Амур . . . . . 7. *Th. petaloideum* L. — В. лепестковый.
- 8 (от 5). Плодики крупные, 5—7 мм дл., развиваются по 1—3 в каждом цветке. Амурская область . . . . . 8. *Th. squarrosum* Steph. — В. оттопыренный.
- Плодики мелкие, 2—4 мм дл., развиваются по 5—12 в каждом цветке . . . . . 9.
- 9. Стебли округлые или тупоугловатые, в верхней половине тонкоборозчатые; на более развитые листья черешки сложные; цветки повислые, чашелистики и пыльники буроватые, в верхней половине розоватые . . . . . 10.
- Стебли резко ребристые; листья не более чем трехлопастные . . . . . 11.
- 10. Листочки плотные, широкие (длина их обычно не превышает ширину), с округлыми или яйцевидными зубцами, снизу зеленые; чашелистики 3 мм дл. Леса, луга . . . . . 9. *Th. minus* L. — В. малый.

На протяжении всего ареала этот вид неоднороден и представляет, по-видимому, несколько видов. В узком смысле наши растения, вероятно, должны называться *Th. appendiculatum* C. A. Mey.

- Листочки тонкие, несколько удлиненные (длина их превышает ширину), с более узкими, острыми зубцами, снизу сизые; чашелистики 4 мм дл., на концах зазубенные. Луга и лесные поляны; в низовьях Амура . . . . . 10. *Th. thunbergii* DC. — В. Тунберга.
- 11 (от 9). Пыльники желтые, 1,5 мм дл.; цветоножки выходят по несколько из одного места; листья многочисленные, под соцветием очень уменьшенные; корень

мочковатый, иногда со столонами. Луга

- Пыльники 2—2,5 мм дл.; цветоножки выходят по 1—2 из одного места; корневище ползучее; соцветие выделяется от листовосной части стебля; листья более или менее прижаты к стеблю. Луга . . . . . 12. *Th. simplex* L. — В. простой.

Близок к нему *Th. strictum* Ldb. — В. прямой — более крупное растение с невыделяющимся от остальной части стебля соцветием, так как нижние ветви отходят из пазух крупных листьев; листья оттопыренные. Встречается в ряде районов Приморья.

Род 23. *ADONIS* L. — АДОНИС, ГОРИЦВЕТ

Леса . . . . . 1. *A. amurensis* Rgl. et Radde — А. амурский (табл. 77, 2).

## Сем. 56. *BERBERIDACEAE* Juss. — БАРБАРИСОВЫЕ

1. Кустарники с крупными трехраздельными колючками и красными, продолговатыми, кислыми ягодами . . . . . Род 1. *Berberis* L. — Барбарис.  
— Растения травянистые, без колючек . . . . . 2.  
2. Все листья прикорневые, цельные или двураздельные; цветки крупные, одиночные, сиреневые; плод раскрывается косой щелью . . . . . Род 2. *Jeffersonia* Barton — Джефферсония.  
— Листья тройчатые или перистораздельные, цветки по нескольку в небольших кистях или метелках . . . . . 3.  
3. Цветки мелкие, бледно-желтые, без шпорцев; плод сухой, синева-черный, ягодообразный; стебель до 1 м выс. листья тонкие, трижды тройчато раздельные . . . . . Род 4. *Caulophyllum* Michx. — Стеблелист.  
— Цветки красно-фиолетовые, с несколькими шпорцами; плод — двусторчатая коробочка; листья плотные, тройчатые . . . . . Род 3. *Epimedium* L. — Горянка.

Род 1. *BERBERIS* L. — БАРБАРИС

Кустарник с ярко-желтым лубом; листья остролишьчатые; цветки крупные, светло-желтые, в длинных кистях. Небольшими группами; в лесах по ручьям и на морском берегу . . . . . 1. *B. amurensis* Maxim. — В. амурский.

Род 2. *JEFFERSONIA* Barton — ДЖЕФФЕРСОНИЯ


Цветет рано весной (апрель—начало мая) одновременно с распусканием листьев; цветки на безлистных цветоносах, крупные, бледно-сиреневые, с 6 лепестками; все листья прикорневые, весной темноокрашенные, красноватые, позже зеленые, длинночерешковые, обрубленно-двулопастные. В лесах и кустарниковых зарослях . . . . . 1. *J. dubia* Benth. et Hook. — Д. сомнительная.

Род 3. *EPIMEDIUM* L. — ГОРЯНКА

Листья тройчатые, с густой, выдающейся снизу сетью жилок. Встречается в лесах (в основном дубовых) большими группами, но пока известна всего в нескольких пунктах (ст. Тигровая, село Преображение, Милоградово) . . . . . 1. *E. koreanum* Nakai — Г. корейская (табл. 80, 2).

Род 4. *CAULOPHYLLUM* Michx. — СТЕБЛЕЛИСТ

Крупное, около 1 м выс., растение; листья трижды тройчато раздельные, корневище массивное. Одиночно, редко по несколько экземпляров; довольно обычны на юге Приморья; в смешанных лесах . . . . . 1. *C. robustum* Maxim. — С. мощный (табл. 80, 1).



1 — *Caulophyllum robustum* Maxim. (Стеблелист мощный): а — лист и соцветие, б — плод на плодоножке; 2 — *Epimedium koreanum* Nakai (Горянка корейская): а — стебель с листьями и зеленым плодом, б — цветок.

## Сем. 57. *MENISPERMACEAE* Juss. — ЛУНОСЕЯННИКОВЫЕ

Род 1. *MENISPERMUM* L. — ЛУНОСЕЯННИК

Небольшая лиана с тонким стеблем, обычно обвивающая до корня, в отдельных районах юга Приморья встречаются экземпляры с зимующими многолетними стеблями; листья щитовидные; цветки очень мелкие, зеленовато-белые; плод черный, сочный, ягодовидный, с 1 крупным, лунообразным семенем и



с фиолетовым красящим соком; плоды ядовитые. Весьма обычен в приречных зарослях, по канавам, в подыльниках  
 . . . . . 1. *M. dahuricum* DC. — Л. даурский (табл. 81).

Таблица 81

Сем. 58. MAGNOLIACEAE Juss. — МАГНОЛИЕВЫЕ

Род 1. SCHIZANDRA Rich. — ЛИМОННИК

Деревянистая лиана, обычно около 1—1,5 см в диам. и до 10—15 м дл.; стебли и листья с характерным лимонным запахом; листья немногие мясистые (при сукке в гербарии обычно буревые), обратноовальные, пластичные, блестящие, белые, или чуть розоватые, с довольно сильным запахом, до 2 см в поперечнике, радиальнопильчатые; после опадения цветоложе сильно разрастается (в 25—30 раз) и из одного цветка образуется плотная кисть сочных, красных ягод с крупными семенами. В лесах, особенно на старых гаях и вырубках  
 . . . . . 1. *Sch. chinensis* (Turcz.) Baill. — Л. китайский.

Сем. 59. PAPAVERACEAE Juss. — МАКОВЫЕ

1. Растения с усиками; цветки одиночные, двусимметричные . . . . . Род 5. *Adlumia* Raf. — Адлумия.
- Усики нет . . . . . 2.
2. Цветки правильные, со многими тычинками; растения с млечным соком . . . . . 3.
- Цветки двусимметричные или неправильные; млечного сока нет . . . . . 5.
3. Цветки одиночные, конечные, крупные . . . . . 4.
- Цветки по несколько в колючей редкой кисти, желтые; листья с округлыми долями; млечный сок оранжевый; плод стручкообразный . . . . . Род 3. *Chelidonium* Tourm. — Чистотел.
4. Цветки золотисто-желтые; плодики длинные, стручкообразные; млечный сок оранжево-красный; стебель облиственный . . . . . Род 2. *Hyomecon* Maxim. — Лесной мак.
- Цветки белые, реже светло-желтые или оранжевые; плод — шаровидная коробочка с многочисленными отверстиями наверху; млечный сок белый; все листья прикорневые . . . . . Род 1. *Papaver* Tourm. — Мак.
- 5 (от 2). Цветки двусимметричные, розово-фиолетовые; прикорневые листья спазы, мелкозачатые . . . . . Род 6. *Dicentra* Benth. — Дикентра.
- Цветки неправильные, верхний лепесток со шпорцем; соцветие — кисть; плод стручковидный . . . . . Род 4. *Corydalis* Medic. — Хохлашка.

Род 1. PAPAVER Tourm. — МАК

Цветки белые, или, реже, желтые и оранжевые; листья прикорневые, перисто-крупнозубчатые или перистоглобозные. По пескам морского берега, на берегах оз. Халка и по рекам  
 . . . . . 1. *P. nudicaule* L. subsp. *amurense* N. Busch — М. амурский.


В садах и огородах встречаются в культуре *P. somniferum* L. с крупными белыми, фиолетовыми или красными цветками и стеблеобъемлющими листьями, однолетник, и *P. orientale* L. — многолетник с крупными красными цветками и щетинисто опушенными стеблями.

Род 2. HYOMECON Maxim. — ЛЕСНОЙ МАК

Стебель 20—40 см выс., прикорневые листья длинночерешковые (до 25 см дл.), перистые, стебельные — короткочерешковые, перистопятираздельные; чашечка опадающая при распускании цветков; цветок крупный, 2—4 см в поперечнике, яркий, золотисто-желтый; коробочка стручкообразная, длинная; цветет в мае  
 . . . . . 1. *H. vernalis* Maxim. — Л. весенний.

Род 3. CHELIDONIUM L. — ЧИСТОТЕЛ

Стебель высокий, до 100 см, ветвистый; листья глубоко перистораздельные, чаще всего с 5 парами сегментов, снизу сизоватые; цветки желтые, 16—20 мм в диам., в пазушных зонтиках; коробочка стручковидная, примосточная, 2—5 см дл. В лесах на вывалах у дорог и оврагов, часто как сорное у жилья  
 . . . . . 1. *Ch. majus* L. — Ч. большой.



*Menispermaceae* *dahuricum* DC. (Пупосемянник даурский): а — часть лианы с листьями и соцветиями, б — семя, в — плоды, г — корневище с корнями и нижней частью стебля.

1. Цветки желтые; клубней нет; растения однолетние или же двулетние . . . . . 2.
- Цветки различной окраски (белые, голубоватые, синие, розовые, красные, но не желтые); клубни есть или же у некоторых видов их нет . . . . . 4.
2. Двулетнее равновесное (цветет в апреле—мае) растение; стебли густо облиственные, прямые или лежачие; шпорды короткие, толстые; кисти многоцветковые; плоды с пережимами, чешуеобразные. По приречным пескам и галечникам, у скал, в лесу на ветровалах . . . . . 3. *C. pallida* Pers. — Х. бледная.
- Однолетнее или двулетнее растение; цветет летом (конец июня, июль, август); себеди ломкий, полупрозрачный, почти кристалл; кисти малоцветковые; плоды без пережимов, обратнопродолговатые. По лесным ручьям . . . . . 3.
3. Венчик 15—18 мм дл.; шпора чуть короче лепестка, тонкая, немного согнутая вна. По лесным ручьям . . . . . 9. *C. ochroleuca* Turcz. — Х. охотская.
- Венчик 7—9 мм дл.; шпора значительно короче лепестка, толстая, часто вверх направленная. На речных галечниках . . . . . 5.
10. *C. sibirica* (L. f.) Pers. — Х. сибирская.
- 4 (от 1). Растения очень крупные; стебли ломкие, 60—120 см выс.; листья при сушке чернеют; цветки крупные, грязно-красные; корневище мощное, сверху углубленное; цветет в конце мая—июне . . . . . 5.
- Более мелкие растения с клубнями или без них . . . . . 6.
5. Растение 60—80 см выс., цветки 35—45 мм дл. Амур . . . . . 6.
6. *C. macrantha* (Rgl.) M. Pop. — Х. крупноцветковая.
- Растение до 120 см выс.; цветки 15—25 мм в diam. Приморье и Приамурье . . . . . 7. *C. gigantea* Trautv. et Mey. — Х. гигантская.
- 6 (от 4). Цветки ярко-розовые; корневище углубленное, ползучее; листья тройчатые, почти четырехжды тройчатые; цветет в мае—июне. Группами на сырых участках, чаще в лесу . . . . . 5. *C. buschii* Nakai et K. Buza.
- Цветки от белых, голубоватых и беловато-розовых до темно-синих и фиолетовых; листья чешуйчатые или тройчатораздельные, реже чешуйчатые тройчатые; растения с клубнями . . . . . 7.
7. Цветки бледные, почти белые, голубоватые или чуть розовые, с характерным запахом; плодики небольшие, овальные, короче цветоножка; листовая пластинка широкая, дважды или тройчатая, со светлыми пятнами; клубень шаровидный, до 1,5 см в diam., очень близко расположен к поверхности. В смешанных лесах; на юге Приморья . . . . . 1. *C. repens* Mandl et Muehlb. — Х. ползучая.
- Цветки более интенсивно окрашенные, голубые, синие или фиолетово-лиловые; плодики линейные, длиннее цветоножки . . . . . 8.
8. Листья тройчатые или почти четырехжды тройчатые; дольки третьего порядка, очень короткие, линейные; кисть редкочетковатая; цветки розово-фиолетовые, с очень тупой шпорой. В лесах и кустарниковых зарослях . . . . . 3. *C. fumarifolia* Maxim. — Х. дымчиколистная.
- Листья дважды или тройчатые тройчатые или же с цельными долями . . . . . 9.
9. Приветиики клиновидные, сверху гребенчато надзеванные; листья слегка сизоватые, темные; листовые пластинки дважды тройчатые; цветки с сильным запахом, фиолетово-розовые или синеватые; клубень шаровидный, часто лежащий близко к поверхности почвы. Группами, на сухих склонах в дубниках и смешанных лесах . . . . . 4. *C. remota* Fisch. — Х. расставленная.
- Приветиики клиновидные, листовые пластинки дважды тройчатые; кисть малоцветковая, цветки фиолетово-лиловые, реже синие, без запаха или с очень слабым запахом; клубень небольшой, обычно находится глубоко в почве, нижний чешуйчатый лист на большом расстоянии от клубня. В лесах; в массе . . . . . 2. *C. ambigua* Cham. et Schlecht. — Х. обманчивая.

Этот вид представлен рядом разновидностей:

1. Доли листа линейные, 4—6 см дл. и 2—4 мм шир. . . . . 1. *C. a. var. lineariloba* Maxim. — Х. линейная.
- Доли листа не линейные . . . . . 2.
2. Доли листа линейно-продолговатые . . . . . 2. *C. a. var. amurensis* Maxim. — Х. амурская.
- Листовые дольки гребенчато надзеванные . . . . . 3. *C. a. var. pectinata* Kom. — Х. гребенчатая.

Виды *C. remota*, *C. ambigua*, *C. fumarifolia* и, по всей вероятности, *C. repens* образуют гибриды, что очень затрудняет их определение.

#### Род 5. ADLUMIA Raf. — АДЛУМИЯ

Лазящее травянистое растение, цепляющееся вьющимися черешками листьев; листья короткочерешковые, тройчатые тройчатые, повислые, 15—18 мм дл.;

цветки розово-фиолетовые; лепестки на  $\frac{2}{3}$  сросшиеся друг с другом; коробочка линейная. Очень редкое растение, пока собрано только на Амуре (в бассейнах рек Бурей, Селемджки и Урми) . . . . . *A. asiatica* Ohwi — *A. азиатская*.

#### Род 6. DICENTRA Bernh. — ДИЦЕНТРА

Небольшое растение с прикорневыми сизыми тройчатыми, почти перисторассеченными листьями; цветки (2—5) крупные, около 2 см дл. фиолетово-розовые, наружные лепестки образуют кувшиновидное основание. На гольцах; северный Сихотэ-Алинь и по Амуре . . . . . 1. *D. peregrina* (Rud.) Makino — *D. бродяжная*.

#### Сем. 60. CRUCIFERAE Juss. — КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

1. Листья цельные . . . . . 2.
- Листья перистые, тройчатые, перисторассеченные, перистонадрезанные, лопастные, видные или стружковидные . . . . . 19.
2. Плод — стручок . . . . . 19.
- Плод — стручочек . . . . . 3.
3. Листья и все растение совершенно голые . . . . . 11.
- Листья более или менее опушенные или же голые, но тогда стебель в нижней части опушенный . . . . . 4.
4. Стручок с длинным, клявообразным носиком; цветки желтые . . . . . 20. *Brassica* L. — *Капуста*.
- Стручки с коротким, не клявообразным носиком . . . . . 5.
5. Стручки широкие, на длинной, до 20 мм, толстой плодоноске; листья пальчатые; семена крылатые; цветки белые . . . . . 1. *Mastrorhiza* R. Br. — *Долгонос*.
- Стручки узкие, плоские или цилиндрические, сидие или на короткой ножке; цветки белые, желтые, розовые, пурпурные или фиолетовые . . . . . 6.
6. Стручки плоские; цветки белые, оранжево- или желтовато-белые, светло-пурпурные или розовые . . . . . 7.
- Стручки цилиндрические или четырехгранные; цветки желтые, розовые, пурпурные или фиолетовые (только у 1 вида голые) . . . . . 9.
7. Все растение сизое, верхняя часть стебля голая или почти голая; цветки оранжево-белые или желтовато-белые; стручки торчат вверх, семена в каждом гнезде расположены в 2 ряда . . . . . 1. *Turritis* (Tour.) L. — *Вансешник*.
- Растения зеленые или серые от густых ветвистых волосков; цветки белые, светло-пурпурные или розовые; стручки повислые, косо отклоненные или торчащие вверх, семена в каждом гнезде расположены в 1 ряд . . . . . 8.
8. Растения зеленые; цветки белые; стручки повислые или торчащие вверх, с плоской створкой . . . . . 12. *Arabis* L. — *Редуха*.
- Растения сероопушенные, с войлочными волосками; цветки беловато-пурпурные или розовые; стручки косо отклоненные, плоские, без срединной жилки . . . . . 13. *Stenalia* Adams et Fisch. — *Стевения*.
- 9 (от 6). Цветки розовые, пурпурные или фиолетовые (у 1 вида белые); у большинства видов в опушении есть и железистые волоски . . . . . 16. *Dontostemon* Andr. — *Донгостемон*.
- Цветки оранжевые или желтые . . . . . 10.
10. Цветки желтые, стручки голые, до 12 см дл., почти четырехгранные . . . . . 2. *Skymbria* (Tour.) L. — *Гуляшник*.
- Цветки оранжевые или желтые; стручки более короткие, цилиндрические или четырехгранные, с разветвленными или звездчатыми серыми волосками, реже почти голые . . . . . 5. *Erysimum* (Tour.) L. — *Жестушник*.
- 11 (от 2). Прикорневые листья цельные, очень крупные, 30—40 см дл., стеблевые перистораздельные; корень толстый, мясистый, с очень сильным резким запахом, вызывающим слезы; цветки белые. Растения культурные, иногда дичают . . . . . 8. *Armoracia* Boerh. — *Хрен*.
- Листья значительно меньших размеров; корень без резкого запаха . . . . . 12.
12. Все растение 40—50 (60) см выс., серое, опушеное на звездчатых волосках, кроме которых на стебле и листовых встречаются и простые волоски; цветки крупные, белые; стручки эллиптические, с торчащим столбиком . . . . . 18. *Berteroa* DC. — *Иютник*.
- Растения зеленые, серовато-зеленые или сизые . . . . . 13.
13. Стручки не раскрывающиеся . . . . . 14.
- Стручки раскрывающиеся . . . . . 16.
14. Листья ланцетные, сизые, цельнокрайные, стеблеобъемлющие; цветки бледно-желтые, многочисленные; стручки повислые. Растения морского берега . . . . . 14. *Isatis* L. — *Вайда*.



- Листья не цельные . . . . . 15.
15. Листья продолговатые или продолговатоланцетные, серовато-зеленые, неясно  
выемчато-зубчатые, реже почти цельнокрайние; цветки беловатые или желто-  
ватые; стручки прижатые вверх к стеблю; стебли растопыренные. Сорное;  
на улицах . . . . . Rod 17. *Eucledium* R. Br. — Кренколодинок.
- Листья продолговатые, стебельное со стреловидным основанием; цветки желтые;  
стручки сплюснuto-шаровидные, не прижатые к стеблю; все растение жестко-  
волосистое; стебли прямые, до 60—80 см выс. На полях . . . . .
- 16 (от 13). Стручки сплюснутые, ширококрылатые, с узким выемкой на верхнем;  
цветки белые . . . . . Rod 25. *Thlaspi* (Tourn.) L. — Грудник.
- Стручки шаровидные; грушевидные, эллиптические, продолговатые или пло-  
ские, без выемки на верхнем . . . . . 17.
17. Стручки грушевидные; цветки палевые; стебли до 80—110 см выс., однолет-  
ники . . . . . Rod 26. *Camelina* Crantz — Рыжик.
- Стручки иной формы, не грушевидные . . . . . 18.
18. Стручки вздутые, шаровидно-овальные или эллиптические; листья прикро-  
новые продолговатоовальные; стебельные овальные, самое верхнее стебельное  
лодные голые; цветки белые; растения 30—40 см выс. На морском берегу . . . . .
- Растения более или менее опушенные (волоски преимущественно звездчатые),  
с розетками прикорневых листьев и цветоносами до 20—30 см выс.; стручки  
плоские или продолговатые и эллиптические; цветки желтые или белые . . . . .
- 19 (от 1). Плод — стручок . . . . . 20.
- Плод — стручок . . . . . 28.
20. Листья тройчатые или с 5 листочками; цветки розовые или лиловые; корневища  
с нитевидными побегами, на которых есть мелкие, плоские клубеньки . . . . .
- Клубеньков на корнях нет; листья перистые, перистонадрезанные, струговидные  
или ланцетные; цветки белые, желтые или, реже, лилово-розовые . . . . . 21.
21. Листья струговидные, с крупной концевой стреловидной долей; стручки густо  
мелко опушенные, прижатые к ветвям соцветия; стебель растопыренный, вет-  
вистый; цветки мелкие, желтые . . . . . Rod 2. *Sisymbrium* L. — Гулявник.
- Листья перистые, перистонадрезанные или лировидные . . . . . 22.
22. Прикорневые листья перистонадрезанные или же округло-лировидные, стебельные  
цельные, цельнокрайние или крупнозубчатые; цветки белые . . . . .
- Листья перистые, лировидно перистонадрезанные или лировидные (цельных нет);  
цветки белые, фиолетово-розовые или желтые . . . . . Rod 12. *Arabis* L. — Реууха.
23. Цветки белые или фиолетово-розовые; листья перистые, голые или более или ме-  
нее опушенные . . . . . Rod 4. *Cardamine* L. — Серпучник.
- Цветки желтые или бледно-желтые, иногда с фиолетовыми жилками, реже белые;  
листья дважды или трижды перистораздельные, перисторассеченные, лиро-  
видно перистонадрезанные или же лировидные . . . . . 24.
24. Листья дважды или даже трижды перистораздельные; цветки бледно-желтые;  
все растение серое или серовато-зеленое . . . . .
- Листья иные — перисторассеченные или лировидно перистонадрезанные или же  
лировидные . . . . . 25.
25. Листья перисторассеченные, густо опушенные с обеих сторон; цветки белые . . . . .
- Листья лировидно перистонадрезанные или лировидные; цветки желтые или  
бледно-желтые . . . . . Rod 4. *Smelovskia* C. A. Mey. — СМЕЛОВСКИЙ.
26. Нижние листья лировидно перистонадрезанные, остальные яйцевидные; цветки  
желтые; стручок с клювообразным носиком . . . . . Rod 21. *Sinapis* L. — Горчица.
- Листья лировидные; стручки с более или менее прямым носиком . . . . . 27.
27. Растение голое; листья лировидные, с округлыми долями; цветки желтые; стручки  
прямостоящие, раскрывающиеся . . . . . Rod 6. *Barbarea* Beckm. — Суренка.
- Растение с жесткими волосками; листья лировидные, с продолговатоланцетными  
долями; цветки крупные, бледно-желтые, часто с фиолетовыми жилками; стручки  
пераскывающиеся, после созревания распадаются на отдельные членики . . . . .
- 28 (от 19). Стебельные листья перистораздельные, прикорневые цельные, очень круп-  
ные, до 30—40 см дл., голдрчатые; корень толстый, мясистый, с очень резким  
запахом, вызывающим слезы; цветки белые. На огородах, иногда дичает . . . . .
- Прикорневые листья более мелкие, непельные; корни небольшие и без специфич-  
еского резкого запаха . . . . . Rod 8. *Armoracia* Gaertn. — Хрен.
29. Листья перисторассеченные, с обеих сторон густо опушенные звездчатыми или

- раздельными волосками; цветки белые. В горах на каменистых россыпях и  
скалах . . . . . Rod 4. *Smelovskia* C. A. Mey. — СМЕЛОВСКИЙ.
30. Стручок пераскывающийся, неправильно яйцевидный, крупнобугорчатый;  
цветки желтые; прикорневые листья лировидно перистораздельные, стебельные  
выемчато-зубчатые . . . . . Rod 15. *Bunias* L. — Сербига.
- Стручки раскрываются; цветки желтые, белые или белесоватые; листья  
перисто-зубчатые, перисторассеченные, лировидно-перистые или лировид-  
ные . . . . . 31.
31. Стручки обратно-треугольные; цветки белые; листья в прикорневой розетке,  
перисто-зубчатые . . . . . Rod 28. *Capsella* Medic. — Пастушая сумка.
32. Цветки желтые; листья лировидные или лировидно-перистые; стручки шаро-  
видные или продолговатоэллиптические, многосемянные . . . . .
- Цветки белые, или же белесоватые; плоды сплюснутые, с переторкой  
на середине широкой стороны; гнезда плодов односторонние; листья перисто-  
рассеченные . . . . . Rod 23. *Lepidium* L. — Капожник, Перечник.

#### Род 1. MACROPODIUM R. Br. — ДОЛГОНОГ

Нижние листья длинночерешковые, округло-овальные, верхние овальные или  
эллиптические, на крылатых черешках; цветки белые; стручки 2—4 см дл.,  
на длинной (1.5—2 см) плодоножке; семена с широким крылом. Пока найден у нас  
только в бассейне р. Хора у верхней границы леса . . . . . 1. *M. pterosperrum* Fr. Schmidt — Д. крылатосемянный.

#### Род 2. SISYMBRIUM L. — ГУЛЯВНИК

1. Листья обычно цельные, нижние продолговатые, верхние овально-ланцетные,  
зубчатые; цветки крупные, желтые; стручки 8—12 (14) см дл., с небольшим по-  
носком. В зарослях кустарников на морском берегу, на берегах Приуралья . . . . .
- Листья перисторассеченные, лировидные и струговидно перисторассеченные . . . . . 2.
2. Стебли 15—60 см выс., обычно сильно растопыренно ветвистые; нижние листья  
перисторассеченные, верхние мелкие, сидячие, кофейные или стреловидные;  
цветки более мелкие, желтые; стручки 1—1.5 см дл. Сорняк; по улицам и вы-  
тонам . . . . . 3. *S. officinale* (L.) Scop. — Г. лекарственный.
- Стебли 20—100 см выс., прямые, очень редко ветвистые от основания; листья ли-  
ровидно и струговидно перисторассеченные; цветки желтые; стручки 25—  
30 (40) мм дл. На сухих лугах и среди кустарников по Амхуру, а также как сор-  
ное . . . . . 2. *S. koelschii* L. — Г. Гёзляя.

#### Род 3. DESCURAINIA Webb et Berth. — ДЕСКУРЕНИЯ

Все растение сероватое от опушения, с прямыми, 15—80 см выс., оттопыренно-  
ветвистыми стеблями; листья дважды или даже трижды перистораздельные,  
с линейными или продолговатыми долями; лепестки бледно-желтые или их  
нет вовсе; стручки линейные или ланцетные. Сорное; весьма обычна на многих  
населенных пунктах . . . . . 1. *D. sophia* (L.) Schur — Д. Софии.

#### Род 4. SMELOVSKIA C. A. Mey. — СМЕЛОВСКИЙ

1. Стебли 10—45 см выс.; листья перисторассеченные; стручки линейные, 8—14 мм дл.  
На скалах; по верхнему Амхуру . . . . . 1. *S. alba* (Pall.) Rod. — С. белая.
- Стебли 10—20 см выс., листья перисторассеченные; стручки овальные, 6—7 мм дл.;  
листья густо опушены, особенно снизу. На каменистых россыпях и на гольцах  
Сихота-Алиня . . . . . 2. *S. inopinata* Kom. — С. неожиданная.

#### Род 5. ERYSIMUM (Tourn.) L. — ЖЕЛТУШНИК

1. Волоски двурядные; цветки крупные, оранжевые; стручки в 10—12 раз длин-  
нее цветоножек, до 13 см дл. На сухих скалах под скалами и у россыпей . . . . .
- Опушение из различных волосок — многоклеточных и двурядных; цветки  
мелкие, желтые или светло-желтые; стручки более короткие, 4—7.5 см дл. . . . . 2.



2. Стебель покрыт двурядными волосками; листья с четырех-пятираздельными волосками; стручки с трех-четырёхраздельными волосками, вверх стоящие, 3—5 см дл.; дуэтник. Заносное; по сорным местам и дорогам . . . . . 1. *E. parschallianum* Andr. — Ж. Маршалла.
- Стебель с двурядными, а листья с трехраздельными редкими, прижатыми волосками; плодовые; цветы ярко-красные; стручки 1—4 см дл., косо вверх стоящие; однолетник. Сорное . . . . . 3. *E. cheiranthoides* L. — Ж. лесной.

#### Род 6. BARBAREA Beckm. — СУРЕПКА

Растение без опушения, двулетнее; стебель 10—100 см выс.; листья с ушками при основании, охватывающими стебель, лировидные с округлыми долями; цветы желтые, в густой кисти; стручки прямо вверх стоящие, до 5 см дл.; цветет с конца мая. На сырых местах . . . . . 1. *B. orthoceras* Ldb. — С. приморган.

#### Род 7. RORIPPA Scop. — ЖЕРУШНИК

1. Растения голые или почти голые . . . . . 2.
- Растение густоволосистое; стручки короткоэллиптические. На речных отмелях . . . . . 2. *R. hispida* (DC.) Britt. — Ж. щетиноволосый.
2. Плоды шаровидные. По речным отмелям и в вывяхх и тополевицах . . . . . 3. *R. globosa* (Turcz.) Vass. — Ж. шаровидный.
- Плоды эллиптические или продолговатые . . . . . 3.
3. Цветы почти сидячие; стручки на коротких, 1—3 мм, ножках. По речным отмелям и на сырых местах . . . . . 4. *R. microsperma* (DC.) Vass. — Ж. мелкосемянный.
- Стручки продолговатые, часто слегка изогнутые, на более длинных, 5—10 мм, ножках. Воду; на сырых местах, по берегам водоемов и как сорное на огородах . . . . . 1. *R. islandica* (Oeder) Borb. — Ж. islandский.

#### Род 8. ARMORACIA Gaertn., Mey. et Scherb. — ХРЕН БАН!

Прикорневые листья очень крупные, цельные, стеблевые перистые; цветы белые; стручки вздутые, продолговато-овальные. Культурное на огородах, иногда дичает . . . . . 1. *A. rusticana* (Lam.) Gaertn., Mey. et Scherb. — Х. обыкновенный.

#### Род 9. DENTARIA (Tourn.) L. — ЗУБИНКА

Растение с очень коротким корнем и многочисленными нитевидными побегам, на которых имеются маленькие клубеньки; цветы крупные, розовые или лиловые; цветет в мае . . . . . 3. *D. tenuifolia* Ldb., *Cardamine tenuifolia* Turcz. — З. тонколистная.

#### Род 10. CARDAMINE L. — СЕРДЕЧНИК

1. Растение образует длинные, ползучие побеги, листья на которых простые, сердцевидно-почковидные; стеблевые листья с 1—3 парами листочков; стебли прямые, до 40—80 см выс.; цветы белые, с крупными, 5—8 мм, лепестками; цветет в мае—июне. На долинных лугах . . . . . 7. *C. lyrata* Bge. — С. лировидный.
- Растения не дают наземных побегов-плетей . . . . . 2.
2. Растение часто погружено в воду; листья трехчленные, а верхние двучленные, с белыми волосками на верхней поверхности; цветы с крупными, белыми лепестками, до 8—14 мм дл. Образует заросли в руслах горных рек . . . . . 8. *C. prorepens* Fisch. — С. ползучий.
- Растения сухонутые, лесные, луговые или же растущие по берегам ручьев, временами в воде . . . . . 3.
3. Растение временами бывает частично погружено в воду; стебли толстые, чаще прямые или восходящие, 25—70 см выс.; листья черешковые, перистораздельные, немногие заостренные; цветы крупные, белые; стручки плоские, до 2 см дл. Большими группами; в тайге по берегам ключей . . . . . 3. *C. yezoensis* Maxim. — С. цесоний.
- Растения лесные, луговые, галечниковых отселов, с более тонкими стеблями; листья не мясистые . . . . . 4.
4. Маленькое растение с розеткой листьев и почти безлиственным (1—2 листа) стеблем, около 3.5 см выс.; прикорневые листья длиннорежковые, эллиптические или овальные, цельные, цельнокрайные или же немногие выемчатые; цветы не-

- большие, белые. У голцов; северный Сихотэ-Алинь . . . . . 10. *C. bellidifolia* L. — С. маргаритковый.
- Растения более крупные, с общими стеблями . . . . . 5.
5. Прикорневые листья при основании черешка с ушками, стеблевые тонкие, с 6—9 парами листочков; цветы мелкие, белые. На сырых скалах у моря и на речных галечниках; редко . . . . . 4. *C. impatiens* L. — С. недотрога.
- Ушек нет . . . . . 6.
6. Листочков 5—8 пар, цельнокрайных, режко трехлопастных; стебель обычно около 20 см выс.; цветы очень мелкие, с белыми лепестками; стручки 10—20 мм дл. По берегам рек, в вывяхх и ольшаниках . . . . . 6. *C. parviflora* L. — С. мелкоцветковый.
- Листочков не более 6 пар, цельнокрайных или более или менее зубчатых . . . . . 7.
7. Доли листьев цельнокрайные; цветы лилово-розовые, режко белые; стручки до 4 см дл.; все растение без опушения. На лугах; преимущественно по Амуре . . . . . 9. *C. pratensis* L. — С. луговой.
- Доли листьев зубчатые или пильчатые . . . . . 8.
8. Листовые доли городчато-лопастные, на черешочках; цветы мелкие, белые. Галечники горных рек . . . . . 5. *C. regeliana* Miq. — С. Регеля.
- Листовые доли более крупные, остро надрезанно-пильчатые или городчато-зубчатые . . . . . 9.
9. Стебель часто более или менее извилистый; все растение с бархатистым опушением (различной интенсивности от слабого до очень густого); цветы белые; стручки 18—25 мм дл.; листочки на верхушках длинно заостренные. Часто; в лесах; одиночно и группами . . . . . 2. *C. leucantha* (Tausch) O. E. Schulz. *C. daglabra* Turcz. — С. белый.
- Стебель прямой или чуть извилистый; цветы обычно лилово-розовые; стручки 25—40 мм длинны; листочки не длинно заостренные (туплые или острые). В сырых лесах у ручьев . . . . . 1. *C. macrophylla* Willd. — С. крупнолистный.

#### Род 11. TURRITIS (Tourn.) L. — БАШЕННИЦА

Сизоое растение, в верхней части голое, в нижней обычно сильно опушенное, с сидячими сердцевидно-стреловидными стеблеобъемлющими листьями; цветы желтовато-белые; стручки прямостоящие, 4—8 см дл. Заносное; на сорных местах . . . . . 1. *T. glabra* L. — Б. гладкая.

#### Род 12. ARABIS L. — РЕЗУХА

1. Стручки до 7—10 см дл., плоские, голые, повислые; цветы белые, мелкие; листья сильно шероховатые. По берегам рек, в вывяхх, ольшаниках и тополевицах, иногда как сорное . . . . . 1. *A. pendula* L. — Р. повислая.
- Стручки более короткие, до 6 (7.5) см, торчащие вверх . . . . . 2.
2. Стебель слабый, тонкий; простой или маловетвистый; прикорневые листья лировидные, иногда пильчатые; стеблевые крупнозубчатые; лепестки 5—6 мм дл. На сухих местах . . . . . 4. *A. maximowiczii* N. Busch — Р. Максимовича.
- Стебель прямой, более или менее мощный, простой или сильно ветвистый . . . . . 3.
3. Стручки прижатые к цветоносу; цветы в коротких, густых кистях; лепестки 9—10 мм дл.; стручки голые, до 7.5 (6) см дл. На сухих лугах; низкий Амур . . . . . 2. *A. stelleri* DC. — Р. Стеллера.
- Стручки не прижатые к цветоносу; более или менее отстоящие . . . . . 4.
4. Стебель и листья сильно шершавые; стебель прямой, до 80—90 см выс.; листья цельные, мелкозубчатые; стручки 2—5 см дл. На сухих скалах и лугах . . . . . 3. *A. hirsuta* Scop. — Р. перьяши.
- Стебли сильно ветвистые, высокие, почти голые; прикорневые листья лировидно-перистонадрезанные или выемчатые, обычно опушенные многораздельными волосками; стручки тонкие, голые. На скалах и песчаных участках . . . . . 5. *A. amurensis* N. Busch — Р. амурский.

#### Род 13. STEVENIA Adams et Fisch. — СТЕВЕНИЯ

Стебель более или менее ветвистый, все растение серошершавое; листья сидячие, линейно-продолговатые, прикорневые в розетке; лепестки 6—8 мм дл., чаще светло-пурпурные или розовые; стручки косо вверх направленные, до 30—35 мм дл. На отсыревших участках и каменистых склонах; в Амурской области . . . . . 1. *S. cheiranthoides* DC. — С. лесовоенная.



Род 14. ISATIS L. — ВАЙДА

Растение с сизыми, продолговатоланцетными нижними и линейными верхними листьями; цветки желтые; плоды повислые, не раскрывающиеся. На морском берегу . . . . . 1. *I. japonica* Miq. — В. японская.

Род 15. BUNIAS L. — СВЕРБИГА

Стебель до 50—100 (120) см выс., с волосками и черными бордавками; прикорневые листья крупные, лордовидно перистораздельные; стеблевые вьчмчатно-зубчатые; цветки ярко-желтые, стручки неравнобокие, на ножках. Запасное; на юге Приморья (Шкотовский район) . . . . . 1. *B. orientalis* L. — С. восточная.

Род 16. DONTOSTEMON Andr. — ДОНТОСТЕМОМ

1. Листья гребневидно-зубчатые; цветки белые; растение с железками. На сухих каменистых склонах; по Амуре . . . . . 5. *D. pectinatus* Ldb. — Д. гребенчатый.
- Листья цельнокрайние, почти цельнокрайние или же с отдельными неправильно расположенными зубцами; цветки розовые или лиловые (очень редко белые) . . . . . 2.
2. Цветки мелкие, лепестки до 3 мм дл., бледно-розовые или белые; растение с короткими, жесткими волосками. Запасное на Забайкалье; по ж.-д. насипам . . . . . 4. *D. micranthus* C. A. Mey. — Д. мелкоцветковый.
- Цветки крупные, с лепестками до 7 мм дл. . . . . 3.
3. Листья цельнокрайние, линейные; растение с железистым опушением или же без него; цветки бледно-лиловые, чашелистики лиловатые, с белой каймой. Сухие склоны и пески; по Амуре . . . . . 3. *D. integrifolius* (L.) C. A. Mey. — Д. цельнолистный.
- Листья зубчатые, продолговатоланцетные; цветки интенсивно розовые или лиловые . . . . . 4.
4. Все растение с длинными, белыми, оттопыренными, жесткими волосками, кроме которых есть и короткое железистое опушение; стручки линейно-зубчатые; цветки интенсивно розовые. На скалах, сухих каменистых склонах и песках морского берега . . . . . 1. *D. hispidus* Maxim. — Д. шершавый.
- Железистого опушения нет, волоски более короткие; стручки голые; цветки лиловые. На сухих участках . . . . . 2. *D. dentatus* Ldb. — Д. зубчатый.

Род 17. EUSLYDIUM R. Br. — КРЕПКОПЛОДНИК

Растение серовато-зеленое, с расстопыренным стеблем; листья продолговатые или продолговатоланцетные, от почти цельнокрайних до вьчмчатно-зубчатых, нижние глубоковыемчатые до почти лордовидно перистораздельных; цветки беловатые или желтоватые, мелкие; стручки не раскрывающиеся, густо покрытые волосками. Запасное; на улицах Владивостока . . . . . 1. *E. syriacum* (L.) R. Br. — К. сирийский.

Род 18. BERTEROA DC. — ИКОТНИК

Все растение серое, опушение из звездчатых волосков; листья ланцетные, цельнокрайние; цветки белые, крупные; стручки эллиптические, с длинным столбиком, опушенные. Запасное; в окрестностях Владивостока, на ст. Какагуз и в ряде других пунктов . . . . . 1. *B. incana* (L.) DC. — И. серый.

Род 19. DRABA L. — КРУПКА

1. Цветки желтые; стручки плоские, листья немногие зубчатые; зимующий в виде розетки однолетник. Часто; на полях и выгонах . . . . . 4. *D. nemorosa* L. — К. лесная.
- Цветки белые; листья цельные; многолетник . . . . . 2.
2. Корневые сильно ветвистые, с розетками отмерших прошлогодних листьев; лепестки крупные, до 7 мм дл.; стручки опушенные. На скалах у моря . . . . . 1. *D. sagittaliiflora* Kom. — К. сердечниколистная.
- Розетки с отмершими листьями нет; стебли тонкие; лепестки 3—6 мм; стручки голые, 6—8 мм дл. На скалах у моря . . . . . 2. *D. ussuriensis* Pohle — К. уссурийская.

В Тернейском районе отмечена *D. sachalinensis* (Fr. Schmidt) Trautv. — К. сахалинская.

Род 20. BRASSICA L. — КАПУСТА

1. Стеблевые листья стеблеобъемлющие . . . . . 2.
- Стеблевые листья не стеблеобъемлющие; стебель голый; нижние листья широколанцетные, иногда лордовидные, верхние цельные; цветки золотисто-желтые; стручок с носиком до 1/4 длины створки. Сорное . . . . . 3. *B. juncea* Czern. — «Горчица сарептская».
2. Нижние листья лордовидно перистонадрезанные, опушенные, стеблевые голые или слегка опушенные; стручок с длинным носиком (от 1/2 до 1/2 створки); цветки желтые. Сорное . . . . . 2. *B. campestris* L. — К. полевая.
- Нижние листья лордовидно перистонадрезанные, голые или почти голые; все растение сизое; стручки длинные; носики короче (от 1/4 до 1/2 створки). Сорное . . . . . 1. *B. napus* L. — Репс.

Род 21. SINAPIS L. — ГОРЧИЦА

Стебель с волосками; нижние листья лордовидно перистонадрезанные, верхние удлинненно-овальные; цветки желтые; стручки с носиком, на очень коротких, толстых ножках. Сорное . . . . . 1. *S. arvensis* L. — Г. полевая.

Род 22. RAPHANUS L. — РЕДЬКА

Стебель с жесткими волосками; нижние листья лордовидно перисторассеченные, с жесткими волосками; цветки желтые или, реже, лепестки белые, с фиолетовым оттенком; стручки до 8 см дл., после созревания распадаются на отдельные членики. Сорное . . . . . 1. *R. raphanistrum* L. — Р. полевая.

Род 23. LEPIDIUM L. — КЛОПОВНИК, ПЕРЕЧНИК

1. Цветки без лепестков или они rudimentарные и короче чашелистиков; стручки широкоовальные или эллиптические; стебель расстопыренно ветвистый, с короткими головчатыми волосками (аметными под лупой); нижние листья перистонадрезанные или перисторассеченные, верхние цельнокрайние линейные. Запасное; по сорным местам и у дорог . . . . . 1. *L. arduum* Willd. — К. бесцветной.
- Лепестки белые; стручки округлые или округло-овальные. Запасное; у дорог; редко . . . . . 2. *L. virginianum* L. — К. виргинский.

Род 24. COSCLEARIA L. — ЛОЖЕЧНИЦА

Прикорневые листья черешковые, продолговатоовальные, стеблевые сидячие, продолговатые или овальные, цельнокрайние или зубчатые, самые верхние стеблеобъемлющие; стебли до 30—40 см выс.; цветки белые; стручки вздутые, шаровидно-овальные. Морские берега близ устья Амура . . . . . 1. *C. oblongifolia* DC. — Л. продолговатолистная.

Род 25. THLASPI (Tournef.) L. — ЯРГУТКА

1. Растение зеленое; листья слегка мясистые, прикорневые черешковые, обратно-овально-продолговатые, стеблевые сидячие, продолговатоэллиптические, с остро-оттянутым основанием; цветки белые, мелкие; стручки с узкой, глубокой стреловидной выемкой на конце, округло-овальные, округлые или широкоовальные, крылья выемкой на конце, округло-овальные, округлые или широкоовальные, крылья широкие. На морском берегу и на сорных местах . . . . . 1. *Th. arvense* L. — Я. полевая.
- Растение сизоватое; листья цельнокрайние, реже зубчатые, стеблевые с глубоко-сердцевидным основанием; цветки белые; стручки обратоклиновидные, с маленькой выемкой на верхушке, крылья узкие. Сухие каменистые участки; на верхнем Амуре (с Черниве) . . . . . 2. *Th. cochleariforme* DC. — Я. ложечная.

Род 26. CAMELINA Crantz — РЫЖИК

1. Плоды 7—12 мм дл. и 4—6 мм шир., с сильно выпуклыми створками; цветки желто-голубые; стеблевые листья сидячие, стреловидно-овальные или стреловидно-продолговатые, реже ланцетные. Сорное; в посевах и у дорог . . . . . 2. *C. glabrata* (DC.) Fritsch — Р. гладкий.

- Плоды более мелкие, 4—6 мм дл. и 2,5—3 мм шир., створки более плоские; листья многочисленные, от продолговато-обратноовальных до ланцетных и линейно-ланцетных. Сорное . . . . . 1. *C. microcarpa* Andrz. — Р. мелкоплодный.

### ✓ Род 27. NESLIA Desv. — НЕСЛИЯ

Стебель 20—80 см выс.; все растение шершаво-волосистое; листья зубчатые или, редко, почти пильчато-зубчатые, стебельные сидячие, ланцетные со стреловидным основанием; цветки мелкие, желтые; стручочки сплюснuto-паровидные. Сорное . . . . . 1. *N. paniculata* (L.) Desv. — Н. метельчатая.

### Род 28. CAPSELLA Medic. — ПАСТУШЬЯ СУМКА

Стручки обратнотреугольные; листья перисто-зубчатые; цветки белые. Всюду; у дорог . . . . . 1. *C. bursa-pastoris* (L.) Medic. — П. с. обыкновенная.

## Сем. 61. DROSERACEAE Salisb. — РОСЯНКОВЫЕ

1. Растения подводные; листья мутноватые, с лопачьими пузырьками . . . . . Род 1. *Aldrovanda* Monti — Альдрованда.  
— Растения наземные, с розеткой черешковых листьев с красными железистыми волосками. На моховых и травяных болотах . . . Род 2. *Drosera* L. — Росника.

### Род 1. ALDROVANDA Monti — АЛЬДРОВАНДА

Листья мутноватые, по 6—9 в колечке, с клиновидно расширенными черешками и с 4—6 шпильчатыми щетинками; листовая пластинка округло-почковидная; цветки одиночные, зеленовато-белые; плод — коробочка. В озерах по старицам; в Приморье и на Амуре . . . . . 1. *A. vesiculosa* L. — А. пузырчатая.

### Род 2. DROSER L. — РОСЯНКА

1. Листья округлые, длинночерешковые. Часто, на моховых, реже травяных болотах . . . . . 1. *D. rotundifolia* L. — Р. круглолистная.  
— Листья длиннолинейные. Изредка, на моховых болотах . . . . . 2. *D. anglica* Huds. *D. longifolia* L. p. r. — Р. английская.

## Сем. 62. CRASSULACEAE DC. — ТОЛСТЯНКОВЫЕ

1. Однолетники . . . . . 2.  
— Многолетники . . . . . 3.  
2. Очень маленькие (до 5 см выс.) растения с супротивными листьями; тычинок столько, сколько лепестков . . . . . Род 1. *Tillaea* L. — Тиллея.  
— Крупные (до 50 см выс.) растения с очередными листьями; тычинок вдвое больше, чем лепестков . . . . . Род 5. *Penthorum* Gronov. — Пятизаченик.  
3 (от 1). Растения с прикорневыми розетками мясистых цельнокрайних листьев; цветочные стебли одиночные . . . Род 4. *Orostachys* Fisch. — Горноколосник.  
— Розеток листьев нет; листья более или менее зубчатые; цветочных стеблей по несколько . . . . . 4.  
4. Цветки раздельнополюсы, двудомные . . . . . Род 2. *Rhodiola* L. — Родиола.  
— Цветки обоеполюсы . . . . . Род 3. *Sedum* L. — Очиток.

### Род 1. TILLAEA L. — ТИЛЛЕЯ

Иловатые и песчаные берега рек; очень редко . . . . . 1. *T. aquatica* L. — Т. водная.

### Род 2. RHODIOLA L. — РОДИОЛА

Голыцы в горах . . . . . 1. *Rh. rosea* L. — Р. розовая.

### Род 3. SEDUM L. — ОЧИТОК

1. Цветки желтые, зеленовато-желтые, или оранжевые . . . . . 2.  
2. Цветки беловатые, лилово-розовые или красные . . . . . 9.  
3. Небольшое (до 10 см выс.) растение с линейными, почти вальковатыми, цельнокрайними или с 1—2 зубчатыми листочками, 1—2 см дл., 1—2 мм шир.; лепестки бледно-желтые. Влажные скалы; редко . . . . . 1. *S. polychaetoides* Hemsl., *Rhodiola komarovii* Boris. — О. многообразный.  
— Более крупные растения с более широкими, более или менее плоскими, зубчатыми листьями . . . . . 3.  
4. Листья, хотя бы единичные, супротивные или даже мутноватые, овальные, 2,5—4 см шир.; стебли одиночные, 30—40 см выс.; прямые; цветки золотисто-желтые. Песчаные берега моря . . . . . 2. *S. maximowiczii* Rgl., *S. litorale* Kom. — О. Максимовича.  
— Все листья очередные . . . . . 4.  
5. Растение более или менее густо опушенное; листья обратноланцетные, линейно-ланцетные или яйцевидно-ланцетные; цветки желтые. Каменные склоны . . . . . 3. *S. selkianum* Rgl. et Maack — О. Селкино.  
— Растения голые . . . . . 5.  
6. Корневище толстое, короткое; стебли прямые, крепкие; листья продолговатояйцевидные, по краям мелкопильчатые; цветки желтые. Леса, кустарники . . . . . 4. *S. aizoon* L., *S. hyperaizoon* Kom. — О. живучий.  
— Корневище ползучее, стебли более или менее приподнимающиеся . . . . . 6.  
7. Цветки оранжевые; листья продолговатые, по краям слегкапильчатые. В нашей области преимущественно по Амуре . . . . . 5. *S. kamischaticum* Fisch. — О. камчатский.  
— Цветки желтые или зеленовато-желтые . . . . . 7.  
8. Лепестки зеленовато-желтые, лишь немного превышают по длине чашелистики; пыльники черные; соцветие очень густое; цветки сидячие или на очень коротких цветоножках; листовики мелкие, до 3,5 мм дл. (без носика); листья линейно-или продолговатояйцевидные, до 1 см шир. Скалы и камни . . . . . 6. *S. sibiricum* Vukotsch. — О. сибирский.  
— Лепестки золотисто-желтые, вдвое длиннее чашелистиков; пыльники желтые или красные; цветки на цветоножках; листовики крупные . . . . . 8.  
9. Листья линейные, до 7 мм шир.; стебли весьма многочисленные. По Амуре . . . . . 7. *S. middendorffianum* Maxim. — О. Миддендорфа.  
— Листья яйцевидно-или продолговатояйцевидные, до 2 см шир.; стебли от основания маловетвистые. Скалы, на юге . . . . . 8. *S. elaeagnifolium* Traeger — О. Элягнова.  
9 (от 1). Цветки беловатые или слегка зеленоватые . . . . . 10.  
10. Цветки лиловые, розовые или пурпурные . . . . . 11.  
11. Листья, хотя бы некоторые, расположены мутновато; в пазухах листьев в конце цветения растения развиваются дуковички. Скалы в лесу . . . . . 9. *S. viviparum* Maxim. — О. живородящий.  
— Листья очередные, реже некоторые почти супротивные; дуковички в пазухах листьев нет. Луга, кустарники . . . . . 10. *S. rupestris* Frey et S. *supratroides* Kom. — О. бадяный.  
11 (от 9). Листья супротивные, округлые или почти округлые; цветки в густом соцветии, пурпурные. На скалах . . . . . 11. *S. ussuriense* Kom. — О. уссурийский.  
— Листья очередные, более узкие . . . . . 12.  
12. Мощное, до 50 см выс., растение с прямыми стеблями; листья яйцевидные или продолговатояйцевидные, около 1,5 см шир.; цветки пурпурные. Леса, кустарники . . . . . 12. *S. pyramicum* (L.) Schult. — О. пирамидный.  
— Невысокое, около 10 см выс., растение с многочисленными стеблями; листья почти линейные, 2—3 мм шир.; цветки лиловые. По Амуре . . . . . 13. *S. cyanum* J. Rudolph — О. синий.

### Род 4. OROSTACHYS Fisch. — ГОРНОКОЛОСНИК

1. Листья оканчиваются острием . . . . . 2.  
2. Листья на кончиках тупые или заостренные, но не колечные . . . . . 3.  
3. Цветки сидячие или почти сидячие; соцветие очень густое; лепестки 4 мм дл., короче тычинок; почечки на листьях около 5 мм дл. Каменные склоны, голые скалы . . . . . 1. *O. spinosa* (L.) G. A. Mey. — Г. колючий.  
— Цветки по несколько на одном цветоносе; соцветие рыхлоколосовидное; лепестки 6 мм дл., равны или почти равны тычинкам; почечки на листьях . . . . . 2. *O. cartilaginea* Boris. — Г. хрящеватый.  
3 (от 1). Облестненная часть стебля много короче соцветия (листья скучены у основания стебля почти розетками); листья остроязвые, до 5 см дл., 1 см шир., продолговато-или линейно-ланцетные; соцветие около 1,5 см шир. Скалы у моря; долголито-или линейно-ланцетные; соцветие около 1,5 см шир. Скалы у моря;



- на юге . . . . . 3. *O. Iwarenge* (Makino) Hara — Г. иваренге.  
— Облиственная часть стебля длиннее или равна соцветию; листья тупые, до 3 см дл.,  
2 см шир., овально- или округло-лопатчатые; соцветие около 1 см шир. Сухие  
склоны . . . . . 4. *O. malacophylla* (Pall.) Fisch. — Г. мягколистный.

Таблица 82

Род 5. *PENTHORUM* Gronov. — ПЯТИЧЛЕННИК

Иловатые берега рек, каналы

- . . . . . 1. *P. chinense* Pursh, *P. humile* Rgl. et Maack — П. китайский.

Сем. 63. *SAXIFRAGACEAE* Juss. — КАМНЕЛОМКОВЫЕ


1. Кустарники . . . . . 2.
- Растения травянистые . . . . . 5.
2. Листья очерченные; цветки мелкие, зеленоватые; плод — ягода . . . . . 3.
- Листья супротивные; цветки более или менее крупные, белые; плод — коро-  
бочка . . . . . 4.
3. Цветки одиночные; стебли всегда колючие . . . . . 4.
- Цветки в кистях; у большинства видов стебли гладкие и лишь у 1 колючие . . . . . 4.
- 4 (от 2). Листья цельнокрайные или же с немногими одиночными зубцами; цветки  
2—3 см в диам., в редких (5—7 цветков) конечных соцветиях; тычинок 20—  
40; опушение из простых волосков . . . . . 4.
- Листья остропильчатые; цветки до 1 см в диам., в многоцветковых щитковидных  
соцветиях; тычинок 10—15; опушение из звездчатых волосков или его нет  
вовсе . . . . . 4.
- 5 (от 1). Листья крупные, 8—10 (12) см дл. и 6—8 (10) см шир., кожистые, зимующие,  
почти цельнокрайные; цветки крупные, ярко-розовые . . . . . 5.
- Листья не кожистые . . . . . 6.
6. Листья двоякоперистонадрезанные, крупные, с блестящими долями; цветки  
очень мелкие, розово-фиолетовые, в большой сложной кисти . . . . . 6.
- Листья цельные (цельнокрайные, городчатые, зубчатые или пильчатые), реже  
трехлопастные или пальчато-трехраздельные, но тогда мелкие, всего 2—2.5  
(3) см дл. . . . . 7.
7. Цветки одиночные, крупные, белые, со стаминодиями; стебель с 1 сидячим листом;  
прикорневые листья сердцевидные, слегка мясистые . . . . . 7.
- Цветки в соцветиях, стаминодий нет . . . . . 8.
8. Листья почковидно-сердцевидные, с зубчатыми краями, редкими, крупными  
волосками; цветоносный стебель безлистный, с очень редкой кистью мелких  
зеленоватых цветков; семена черные; лепестки перистонадрезанные. Хвойные и  
смежные леса . . . . . 8.
- Листья различной формы; лепестки цельные или их нет . . . . . 9.
9. Листья почковидные, округлые, продолговатые или клиновидные, голые или  
с белыми или рыжими волосками; цветки мелкие, зеленоватые или желтые,  
реже красновато-бурые; лепестков нет; чашечка четырехлиственная . . . . . 9.
- Листья самой различной формы, голые или более или менее опушенные; чашечка  
пятилиственная; лепестки белые, реже розоватые или желтые . . . . . 9.

Род 1. *ASTILBE* Hamilt. — АСТИЛЬБА

Травянистый многолетник с деревянистым корневищем; стебли до 1 м выс.;  
прикорневые листья на длинных черешках, превышающих пластинку, двояко-  
перистонадрезанные, блестящие; соцветие колючее, кистевидное, с мелкими  
фиолетовыми или фиолетово-розовыми цветками. Леса и кустарниковые заросли,  
на сырых участках . . . 1. *A. chinensis* Franch. et Sav. — А. китайская.

Род 2. *BERGENIA* Moench — БАДАН

Корневище толстое, горизонтальное или косое (легко вырывается), листья  
черешковые, плотные, кожистые (осенью краснеют); цветонос до 40—45 см дл.,



1 — *Saxifraga cortusifolia* Sieb. et Zucc. (Камнеломка кортузолистная); а —  
цветок (над сверху), б — цветок (над сбоку); 2 — *Chrysosplenium flagelliferum*  
Fr. Schmidt (Сельзеночник побегоносный); а — цветок.

чаще безлистные или с 1 чешуйчатым листом; цветки ярко-розовые (при сухке становятся фиолетовыми). По окраинам каменистых россыпей, чаще в ельниках; только в Сихотэ-Алине . . . 1. *B. pacifica* Kom. — *Б. тихоокеанский*.

### Род 3. SAXIFRAGA L. — КАМНЕЛОМКА

1. Листья сидячие, мелкие, очень узкие, 1,5—2 мм шир. и 12—25 мм дл., обычно жесткие . . . . . 4.
- Листья более широкие . . . . . 4.
2. Стебли 5—10 см выс., с розетками листьев, скученных на концах побегов; цветки белые или желтовато-розовые; листья тонкоребристые, сильно изогнутые внутрь. Образует густые дерновники на скалах, преимущественно на морском берегу . . . . . 13. *S. cheerleioides* D. Don — *К. шердериовидная*.
- Стебли 5—6 см выс., облиственные (без розеток на концах); листья плоские или слабо изогнутые; цветки желтые, с шпуровидными точками . . . . . 3.
3. Листья снизу выемчатые, гребенчато-решчатые, линейно-ланцетные; цветоносы 10—35 см дл., голые, с редкими листьями; цветоножки железистые; цветки до 8 мм в поперечнике. На скалах и береговых обрывах; преимущественно на Амуре . . . . . 11. *S. bronchialis* L. — *К. гребенчато-решчатая*.
- Листья снизу слегка волнистые; цветоносы до 20 см дл.; цветки до 12 мм в поперечнике; листья с хорошо выраженным остроконечием. На галечниках и песчаных почвах (преимущественно в сосняках); в Амурской области . . . . . 12. *S. spinulosa* Adams — *К. колючая*.
- 4 (от 1). Листья округло-продолговатые, продолговато-овальные или овальные, выемчато-зубчатые, 3—7 см дл., 2—5 мм шир.; соцветие раскидисто-метельчатое. В трещинах скал, в ельниках; только на юге Приморья . . . . . 15. *S. oblongifolia* Nakai — *К. продолговато-лиственная*.
- Листья не выемчато-зубчатые . . . . . 5.
5. Стебли безлистные, заканчиваются соцветием . . . . . 6.
- Стебли облиственные . . . . . 12.
6. В соцветии развит только 1 верхушечный цветок, остальные цветки превращены в плотные листовые почки; листья в очертании продолговатые, пальчато-зубчатые 1—2 см дл. и 0,3—0,8 см шир. . . . . 8. *S. foliolosa* B. Br. — *К. листочковая*.
- Все или почти все цветки в соцветии развитые; листья обычно более крупные, не пальчато-зубчатые (городчатые, городчато-зубчатые или же зубчатые) . . . . . 7.
7. Листья почковидные или округло-почковидные . . . . . 8.
- Листья почковидно-клиновидные, часто несимметричные или же трех-пятираздельные . . . . . 11.
8. Листья плотные, кожистые или почти кожистые . . . . . 9.
- Листья мягкие, более или менее мясистые . . . . . 10.
9. Прикорневые листья округло-почковидные, кожистые, 2—8 см дл. и 3—12 см шир., девяти-одиннадцатилучные, тупо городчато-зубчатые; цветет в конце августа—сентябре; цветки резко неправильные, 3 верхних лепестка значительно короче (в 8—10 раз) 2 нижних. Только на самом юге Приморья; на сырых скалах у моря, реже в лесу . . . . . 14. *S. cortusifolia* Sieb. et Zucc. — *К. кортузолистная* (табл. 82, 1).
- Листья с глубокосердцевидным основанием, с крупными зубцами, на концах которых имеются железки, почти кожистые, 1—3 см дл. и 1—4 см шир.; цветки правильные. На скалах и галечниках; в северном Сихотэ-Алине . . . . . 4. *S. nelsoniana* D. Don — *К. Нельсона*.
- 10 (от 9). Листья почковидные, с крупными и широкими остроконечными зубцами; соцветие плотное, почти головчатое. По сырым местам у лесных ручьев; в более влажных районах . . . . . 5. *S. manshurienis* (Engl.) Kom. — *К. маньчжурская*.
- Листья округло-почковидные, с коротко заостренными зубцами; соцветие раскидистое. По сырым лесным ручьям, в Примурье и в северных районах Приморья . . . . . 3. *S. punctata* L. — *К. точечная*.
- 11 (от 7). Листья трех-пятираздельные, с трехлопастной средней долей, очень тонкие (почти прозрачные), снизу часто красноватые; соцветие рыхлое, малоцветковое (2—6 цветков). В моховом покрове сырых скал; пока известна только из Амурской области . . . . . 2. *S. korshinskyi* Kom. — *К. Коржинского*.
- Листья цельные, почковидно-клиновидные, с крупными овальными зубцами в верхней части. На осипках и скалах; в Сихотэ-Алине . . . . . 6. *S. astilboides* Losinsk. — *К. астильбовидный*.
- 12 (от 5). Маленькое, почти голое растение с многочисленными стеблями; листья почковидные, зубчатые (лопастные), до 2 см шир. и 1,5 дл.; у основания соцветия мелкие трехлопастные прицветные листочки. По берегам рек в горах; в Амурской области . . . . . 1. *S. nudicaulis* D. Don — *К. голоцветбельная*.
- Растения более или менее опушенные или железистые . . . . . 13.

13. В пазухах стеблевых листьев имеются живородящие почки (духончики); стебли слабо железисто опушенные, нижние стеблевые листья длинночерешковые, почковидные, верхние сидячие, трехлопастные; цветки обычно одиночные, крупные. Влажные скалы; в Амурской области . . . . . 9. *S. cernua* L. — *К. поникающая*.
- Живородящих почек нет; цветков несколько . . . . . 14.
14. Стебли густо железистые; листья плотные, округло-ромбические, до 2,5 см дл.; соцветие густое, ветвящееся. На камнях и галлах; в Примурье . . . . . 7. *S. redowskiana* Sternb. — *К. Режовского*.
- Стебли в верхней части пушистые; листья почковидные, 6—20 мм дл. и 8—25 мм шир., почти до половины надразрезаны; цветков 2—7, на длинных цветоножках. На скалах; в Амурской области . . . . . 10. *S. sibirica* L. — *К. сибирская*.

### Род 4. MITELLA Tourm. — МИТЕЛЛА

Листья черешковые, почковидно-сердцевидные, 10—30 мм дл. и 15—45 мм шир., с обеих сторон с длинными, редкими, дистинктными волосками, с неравномерно зазубренными краями; стебель одиночный, 8—20 см выс., заканчивается редкой кистью мелких цветков; коробочка почти шаровидная; семена блестящие, черные. Хвойные леса . . . . . 1. *M. nuda* L. — *М. голая*.

### Род 5. CHRYSOSPLENIUM L. — СЕЛЕЗЕНОЧНИК

1. Стеблевые листья очередные или их нет вовсе . . . . . 2.
  - Стеблевые листья супротивные . . . . . 3.
  2. Цветки одиночные, на цветоносах 1—1,5 мм дл., в пазухах прицветных листьев, всего по 1—2 на стебле; стебель 2—3 см выс., тонкий, голый, побег немногочисленные, короткие, с укореняющимися на концах розеткой почковидных крупнородчато-зубчатых листьев. У лесных ручьев; пока известен только с юга Приморья . . . . . 3. *Ch. komarovii* Losinsk. — *С. Комарова*.
  - Цветки в соцветиях; прицветные листья отличаются от стеблевых . . . . . 3.
  3. Растение без надземных бесплодных побегов; стебель 5—15 см выс., с 14 листьями, прицветные листья на длинных черешках, округло-почковидные; все растение голое или с белыми редкими волосками. В лесах по клочкам . . . . . 1. *Ch. alternifolium* L. — *С. очереднолистный*.
  - Надземные бесплодные побеги есть и заканчиваются розеткой листьев; стебель до 20 см выс., в верхней части ложно дихотомически ветвящийся; опушение из беловатых, красноватых и рыжеватых волосков. В лесах по клочкам . . . . . 2. *Ch. flagelliferum* Fr. Schmidt — *С. веероносный* (табл. 82, 2).
  - 4 (от 1). Растения совершенно голые (реже с отдельными ресничатыми волосками) . . . . . 3.
  - Растения более или менее опушенные . . . . . 6.
  5. Листья более или менее опушенные, с розетками крупных листьев; стеблевые листья более мелкие, округло-яйцевидные; цветки немногочисленные, в правильном округлом щитке; семена блестящие, с мелкими сосочками. В лесах, на сырых участках . . . . . 7. *Ch. trachyspermum* Maxim. — *С. шероховатосемянный*.
  - Бесплодные побеги короткие (короче стебля); эти листья также же размерами, как и на плодушках; листья мелкозубчато-пильчатые. В водных лесах . . . . . 6. *Ch. sinicum* Maxim. — *С. китайский*.
  - 6 (от 4). Цветки плоские, с красным, сильно выпуклым диском; стебель в нижней части ветвистый; прицветные листья зеленые, опушение слабое. В лесах по клочкам и рокам . . . . . 4. *Ch. ramosum* Maxim. — *С. ветвистый*.
  - Цветки бокальчатые, с зеленоватым, выпуклым диском; прицветные листья ярко-желтые, опушение хорошо развито. Воду; в лесах на сырых местах . . . . . 5. *Ch. pilosum* Maxim. — *С. волосистый*.
- Все селезеночники цветут весной (конец апреля—май).

### Род 6. PARNASSIA L. — БЕЛОГОБОР

Прикорневые листья овальные, длинночерешковые, плотные; стебли 10—60 см выс., слабо ребристые, всего с 1 сидячим листом, заканчиваются 1 крупным белым щитком со стаминодиями. Обычно на сырых дугах, но в Хасанском районе встречается также и в дубниках . . . . . 1. *P. palustris* L. — *Б. болотный*.

### Род 7. PHILADELPHUS L. — ЧУЗЫШНИК

1. Кустарник около 2 м выс.; листья тонкие, перепончатые; соцветие чаще с 5 цветками (от 3 до 14); цветки 2—3 см в диаметре; стовбик голый. В лесах, преимущественно по опушкам . . . . . 1. *Ph. tenuifolius* Rupr. et Maxim. — *Ч. тонколистный*.



- Кустарник до 3 м выс.; листья более плотные; соцветия чаще с 7 (реже с 5 или 9) цветками; цветки 3—4 см в diam.; столбик волосистый. В десах, чаще у скал и россыпей . . . . . 2. *Ph. schrenkii* Rupr. et Maxim. — Ч. Шренка.  
Чубушник часто неправильно называют жасмином.

#### Род 8. DEUTZIA Thunb. — ДЕЦИЯ


1. Кустарник до 1.5 м выс., с серой корой; листья овально-эллиптические, остро-пильчатые, снизу голые, сверху с рассеянными звездчатыми волосками; соцветие щитковидное; цветки около 1 см в diam.; чашечка серая от сплошных звездчатых волосков. В смешанных десах, главным образом у скал и россыпей . . . . . 1. *D. amurensis* (Rgl.) Ait.-Schow — Д. амурская.  
— Кустарник до 2—2.5 м выс.; кора красновато-коричневая, покрывается длинными волосами; цветки по 1.5 см в diam.; чашечка голая. В десах у скал; на самом юге Приморья, а также на Амуре близ пос. Биджанского . . . . . 2. *D. glabrata* Kom. — Д. гладкая.

#### Род 9. RIBES L. — СМОРОДИНА<sup>1</sup>

1. Побеги колючие . . . . . 2.  
2. Побеги не колючие . . . . . 3.  
3. Шипы в узлах по 7, 8 или 9; листья глубоко трех- или пятилопастные, коротко опушенные; цветки всегда одиночные; ягода колючая, грязно-зеленая . . . . . 4.  
4. Шипы многочисленные (до 20), расположены в 2—3 яруса, более короткие; листья обычно пятилопастные (реже трехлопастные), покрыты сверху мелкими шипиками; цветки в четырех-шести цветковых кистях, до 4 см дл. В хвойных десах Сихотэ-Алиня . . . . . 5. *R. hortum* Rupr. — С. оштенная (табл. 83, 2).  
3 (от 4). Листья без особого специфического запаха; ягоды красные . . . . . 4.  
— Листья со своеобразным специфическим запахом; ягоды черные, темно-синие или бурые . . . . . 9.  
4. Кора молодых побегов отделяется крупными листоватыми подосами; листья широкие, трех-пятилопастные, до 6.5 см дл. и 9 см шир., обычно голые, реже снизу опушенные; ягоды ярко-красные, 6—10 мм в diam. По рекам, обычно в зоне темнохвойных лесов; чаще на севере . . . . . 1. *R. triste* Pall. — С. печальная.  
— Кора гладкая или мелко шелушащаяся . . . . . 5.  
5. Растения двулопастные; листья сравнительно мелкие, до 4—4.5 (5) см в поперечнике; ягоды несъедобные . . . . . 6.  
— Растения однолопастные; листья более крупные; ягоды съедобные . . . . . 7.  
6. Листья матовые, сверху с железистыми щетинками, снизу голые или по жилкам с редкими железистыми волосками, трехлопастные; плодущие кисти обычно трехцветковые; небольшой, 1—1.2 м, кустарник с пригибающимися ветвями. Довольно обычен в смешанных кедрово-широколиственных десах . . . . . 10. *R. maximoviczianum* Kom. — С. Максимовича (табл. 83, 2).  
— Листья сверху блестящие, голые, более плотные; плодущие кисти пяти-трехлопастно-цветковые; кустарник с прижатыми ветвями, до 2—2.5 м выс. В смешанных десах; на юге Приморья . . . . . 11. *R. komarovii* Pojark. — С. Комарова (табл. 83, 3).  
7 (от 5). Листья со слабо развитыми тупыми лопастями (в очертании почти четырехугольные), сверху голые, снизу по жилкам или, реже, сплошь пушистые; цветочные кисти короткие, вверх торчащие, с 5—15 цветками; ягода чаще продолговатая, до 8 мм дл.; кустарник 1—1.5 м выс. В десах; по Амуре . . . . . 3. *R. palczewskii* Pojark. — С. Пальчевского.  
— Листья с резко выраженными заостренными лопастями . . . . . 8.  
8. Листья обычно трехлопастные, лопасти удлиненные и заостренные, листья сверху голые, снизу с редкими волосками, реже пушистые; в кистях до 40 зеленоватых цветков; ягода 7—9 мм в diam., кисло-сладкая; кустарник до 2 м выс. В широколиственных и смешанных десах по рекам . . . . . 2. *R. manschuricum* (Maxim.) Kom. — С. маньчжурская.  
— Листья обычно пятилопастные, лопасти их треугольные; в кистях 20—25 цветков; цветки бледные, желтоватые или слабо-розовые; ягода около 8 мм в diam., очень кислая; листья сверху красновато-волосистые, снизу густо (войлочной) опушенные или железистоопушенные; кустарник 1—2 м выс. В темнохвойных десах . . . . . 4. *R. pallidiflorum* Pojark. — С. бледноцветковая.

<sup>1</sup> Для удобства определения сюда включен также крыжовник буринский *Grossularia burejensis* (Fr. Schmidt) Berger.

Таблица 83



1 — *Ribes horridum* Rupr. (Смородина оштенная); 2 — *R. maximoviczianum* Kom. (С. Максимовича); 3 — *R. komarovii* Pojark. (С. Комарова); 4 — *Grossularia burejensis* (Fr. Schmidt) Berger (Крыжовник буринский).



- 9 (от 3). Листья кожистые, до 6 см шир., сверху темно-зеленые, голые, блестящие, снизу густо усаженные железками (молодые при гербаризации дают на бумаге отпечатки), трехлопастные; кисти шести-двенадцатичетковые; ягода черная (подозреваемая красновато-бурая), около 8 мм в diam.; небольшой кустарник, 50—70 см выс., с приподнимающимися ветвями. У скал и осыпей: по Амуре . . . . . 9. *R. fragrans* Pall. — С. душистый.
- Листья менее плотные, отпечатков при гербаризации не дают . . . . . 10.
10. Листья трех-пятилопастные, до 6 см дл. и 8 см шир.; побеги блестящие, золотистые, с глянцевыми железками; цветы плоские, пурпурные; ягода бурая, около 1 см в diam., очень ароматная; кустарник до 25 см выс. В лесах у ключей; преимущественно на севере . . . . . 8. *R. procumbens* Pall. — С. лежачая, «моховка».
- Кустарники до 1—1.5 м выс., с черными или черно-синими ягодами . . . . . 11.
11. Листья пятилопастные, 5—8 см в поперечнике, сверху голые, снизу по жилкам пушистые; цветы мелкие, желтоватые; ягода черная, 10—13 мм в diam., пахучая; кустарник до 1.5 м выс., с пушистыми побегами. В различных лесах, часто на горах; по Амуре . . . . . 6. *R. pauciflorum* Turcz. — С. малоцветковой.
- Листья трех-пятилопастные, до 13 см дл. и 10 мм шир., слегка сизо-зеленые; цветы белые; ягода сине-черная, с восковым налетом, без запаха. В лесах по берегам рек; по Амуре, в верховьях Имана и по Ботче (очевидно, будет найдена и в других местах по Сихотэ-Алиню) . . . . . 7. *R. dikuscha* Fisch. — С. дикущая, «даданский виноград».

Культивируемая в садах Дальнего Востока красная смородина в большинстве своем происходит от *R. vulgare* Lam., родом из южной Европы. Сорта культивируемой на Дальнем Востоке черной смородины происходят от *R. nigrum* L., дико произрастающей в Европе и Сибири. В Сихотэ-Алине найден новый вид — *R. fontaneum* Bock., отличающийся от *R. pauciflorum* и *R. dikuscha* строением цветков и плодов.

#### Род 10. GROSSULARIA Mill. — КРЫЖОВНИК

Небольшой кустарник с колючими побегами и колючими ягодами (см. в ключе рода *Ribes*). В лесах; по Амуре; изредка в Приморском крае . . . . . 1. *G. burejensis* (Fr. Schmidt) Berger — *R. бурейский* (табл. 83, 4).

В садах часто культивируется крыжовник, различные сорта которого происходят от *K. отклоненного* — *G. reclinata* (L.) Mill. родом из Европы и Северной Африки.

#### Сем. 64. ROSACEAE Juss. — РОЗОЦВЕТНЫЕ

1. Листья перистые, перистораздельные, тройчатые или пальчатораздельные . . . . . 2.
- Листья цельные или надразанные и в различной степени рассеченные . . . . . 2b.
2. Растения с шипами . . . . . 3.
- Шипов нет . . . . . 4.
3. Листья перистые, с 5—15 листочками; цветы крупные (3—3.5 см и больше), белые или розовые; «плод» ложный (разросшееся согнутое кувшинообразное сочное цветоложе, к стенкам которого прикреплены плодики, покрытые волосками) . . . . . 25. *Rosa* Tournef. — Роза (Шиповник).
- Листья тройчатые или с 5 листочками; цветы мелкие, около 1 см в diam.; плод — сложная костянка (много маленьких сочных костяночек, сидящих на общем бездном коническом цветоложе) . . . . . 11. *Rubus* Tournef. — Малина.
- 4 (от 2). Листья тройчатые, трехраздельные или же пальчатораздельные . . . . . 5.
- Листья перистые или тройкоперистые . . . . . 10.
5. Листья тройчатые, с крупными листочками, снизу густо покрыты шелковистыми волосками; цветы белые, цветоложе выпуклое, лобовоеобразное . . . . . 12. *Fragea* Tournef. — Земляника.
- Листочки различной величины, голые, бобовидные или с редким опушением; цветы белые, розовые или желтые . . . . . 18. *Waldsteinia* Willd. — Вальдштейния.
6. Листья трехраздельные, доли их ромбoidalно-обратнояйцевидные; цветоложки одноцветковые; цветы крупные, золотисто-желтые; цветет в мае . . . . . 18. *Waldsteinia* Willd. — Вальдштейния.
- Листья тройчатые или пальчатораздельные . . . . . 7.
7. Листья тройчатые или двоякотройчатые, с овально-округлыми листочками; цветы овальн. мелкие, белые, в многоцветковой колосовидной кисти (простой или с 2—5 веточками); растения дуговидные . . . . . 3. *Alnaceae* L. — Волжанка.
- Листья тройчатые или пальчатораздельные; цветы более крупные, белые, красные или желтые, одиночные или в малоцветковых соцветиях (чаще в щитках) . . . . . 11. *Rubus* Tournef. — Малина.
8. Листья тройчатые; цветы белые или красные; плод — сочная сложная костянка . . . . . 11. *Rubus* Tournef. — Малина.

- Цветки желтые; плод сухой . . . . . 9.
9. Листья длинночерешковые, тройчатые; листочки клиновидные, на черешках; листочки короче чашечки; тычинок и плодиков 5—10. На голых . . . . . 16. *Sibbaldia* L. — Сиббальдия.
- Листочки без черешков; листочки длинные чашечки; тычинок и плодиков пополю . . . . . 15. *Reboulia* L. — Лавчатка.
- 10 (от 4). Листья тройкоперистые, с крупными овально-ланцетными листочками; цветы мелкие, белые, в крупном метельчатом соцветии; растения дуговидные . . . . . 3. *Alnaceae* L. — Волжанка.
- Листья простоперистые или перистораздельные . . . . . 11.
11. Листья веристоперистые, с крупной колючей долей; цветы белые или розовые, в многоцветковой щитковидной метелке . . . . . 22. *Filipendula* Adams. — Лабазник.
- Листья перистые или перистораздельные; соцветия иные . . . . . 12.
12. Конечная доля листа значительно крупнее остальных, верхние стеблевые листья тройчатые; цветы крупные, одиночные, желтые; плодики многочисленные, с колючатыми крошечными столбиками (цепляются за одежду) . . . . . 20. *Geum* L. — Гравилат.
- Конечная доля листа лишь немногим больше боковых или же равна им . . . . . 13.
13. Доли листа узколинейные; листья мелкие; цветы мелкие, розовые, с широкой колокольчатой чашечкой, в метельчатом соцветии; растения дуговидные . . . . . 17. *Chamaerhodos* Bge. — Хамеродос.
- Листья и доли листа более крупные, не узколинейные . . . . . 14.
14. Листья перистораздельные; цветы крупные (2.5—3.5 см в поперечнике), одиночные, белые; столбики при плодах перистые . . . . . 19. *Sieversia* Willd. — Сиверсия.
- Листья перистые; цветы меньших размеров, в соцветиях, белые, желтые, розовые или красные; плоды без перистых столбиков . . . . . 15.
15. Деревья и кустарники . . . . . 16.
- Растения травянистые . . . . . 18.
16. Деревья или крупные кустарники; цветы белые, в ветвистых щитках; плоды сочные, красные или оранжевые, со спелым мякотью горьковатым привкусом . . . . . 8. *Sorbus* Tournef. — Рябина.
- Кустарники; плоды сухие . . . . . 17.
17. Листья мелкие (2.5—3 см дл.) с 5, очень редко 7 листочками; 3 конечных листочка часто бывают сближены как бы в 1 трехраздельный; цветы крупные (1.5—3 см в diam.), белые или желтые . . . . . 13. *Dasiphora* Raf. — Дазифора, «Курильский чай».
- Листья более крупные (5—7 см дл.), с 9—13 и более листочками, с резко выраженной сетью жилок; цветы более мелкие, обычно около 1 (реже до 1.5) см в diam., в многоцветковой метельчатой кисти . . . . . 4. *Sorbaria* A. Br. — Рябинник.
- 18 (от 15). Верхние листья тройчатые, остальные с 5—7 листочками, снизу серовато-ланцетными; цветы темно-красные, лепестки в 2—3 раза короче чашечки, малочисленные. На болотах . . . . . 14. *Comanthe* L. — Сабанька.
- Все листья перистые; цветы в многоцветковых соцветиях, желтые, белые, розовые или красные . . . . . 19.
19. Листья густо опушенные; цветы мелкие, желтые, в длинной, узкой, колосовидной кисти; семени находится в твердом, колосовидном, цепком цветоложе . . . . . 23. *Agrimonia* L. — Реньяник.
- Листья голые или с небольшим, частью железистым опушением; цветы белые, розовые, красные или темно-пурпурные; соцветия колосовидные, цилиндрические или головчатые . . . . . 24. *Sanguisorba* L. — Крохотка.
- 20 (от 4). Листья цельные, цельнокрайные, зубчатые, пальчатые, городчатые и т. д. . . . . 31.
- Листья надразанные, доистые или рассеченные . . . . . 31.
21. Листья продолговатоланцетные, цельнокрайные; ветви колючие; цветы желтые; кустарники . . . . . 29. *Prinsepia* Royle. — Пинсекия.
- Листья иной формы, не цельнокрайные, колючек нет; цветы белые или розовые . . . . . 22.
22. Листья густобородчатые, снизу сизовато-белые; стебли деревнистые, ползучие; цветы крупные, одиночные, белые; плодики в перистобородчатых длинных столбиках. На голых . . . . . 21. *Dryas* L. — Дриад.
- Деревья и кустарники, обычно с прямыми стеблями; цветы в соцветиях; плоды . . . . . 23.
- Листья более или менее сочные, белесые или сухие (листья) . . . . . 23.
23. Плоды сухие (листья); цветы белые или желтые, в пазухах, в щитках, зонтиках или в удлиненной, пазокой метелке; кустарники . . . . . 2. *Spiraea* L. — Таволга.
- Плоды более или менее сочные (костянка или яблоко); цветы белые или розовые, в кистях, зонтиках, щитках, одиночные или парные; деревья и кустарники . . . . . 24.



24. Листья цельнокрайние, плотные, темно-зеленые, снизу шерстистые, серые; цветки мелкие, розовые, в малоцветковых кистях; зрелые плоды черные, мясистые (недозрелые красные); кустарники . . . . . Род 5. *Coloneaster* Medic. — Кизильник.
- Листья не цельнокрайние . . . . . 25.
25. Листья мелко-остропильчатые, при сушке часто чернеющие; цветки крупные, белые, по 5—10 в пазухе, на длинных ножках; плоды крупные, близкие к шаровидным, зеленые или чуть бурющие, с деревянистыми включениями в мякоти; деревья . . . . . Род 6. *Pyrus* L. — Груша.
- Листья зубчатые, мелкозубчатые, пильчатые или двоякопильчатые, при сушке желтеют или буреют; деревянистых включений в мякоти плода нет . . . . . 26.
26. Плод — яблоко; листья мелкозубчатые или двояко-острозубчатые; цветки белые, в раскидистых зонтиках или в щитках; деревья . . . . . 27.
- Плод — костянка; листья двоякопильчатые, остропильчатые или же шероховато-пильчатые; цветки белые или розовые, одиночные, парные, в зонтиках, щитках или кистях; кустарники и деревья . . . . . 28.
27. Листья мелко-городчато-зубчатые, туповато городчато-пильчатые, иногда почти цельнокрайние; цветки белые, крупные, 2—5 см в диам.; плоды красные, мелкие, при полном созревании легко раздвигаются и мякоть мажется; семенные гнезда с твердыми оболочками . . . . . Род 7. *Malus* Mill. — Яблоня.
- Листья неравномерно зубчатые или двояко острозубчатые; цветки белые, около 1 см в диам., с характерным запахом кислого теста; плоды суховатые, с слабым налетом; семенные гнезда без твердых стенок . . . . . Род 9. *Micromele* Deene. — Мелкоплодик.
- 28 (от 26). Цветки белые, в длинных многоцветковых кистях; кора ветвей со специфическим характерным резким (миндальным) запахом . . . . . Род 28. *Padus* Mill. — Черешуха.
- Цветки одиночные, парные или в зонтиках, щитках и коротких кистях . . . . . 29.
29. Листья обратноовальные или обратнойцевидные, с клиновидным основанием, мелко-двоякозубчатые; небольшие деревья (2—3, реже 4 м выс.); плоды крупные, сочные, по 1—3; цветки белые; цветет до распускания листьев. Одиичавшие и в садах . . . . . Род 26. *Prunus* L. — Слива.
- Листья иной формы . . . . . 30.
30. Листья широкоовальные или округлые, остро- или неровногородчато-пильчатые; цветки крупные, розовые; молодые плоды густо опушенные; деревья или крупные кустарники с заметно опробковевшей корой . . . . . Род 30. *Armeniaca* Lam. — Абрикос.
- Листья различной формы, от овальных, эллиптических и обратнойцевидных до продолговатоэллиптических и ланцетных; цветки белые или розовые; плоды голые; деревья или кустарники . . . . . Род 27. *Cerasus* Juss. — Вишня.
- 31 (от 20). Кустарники, часто с обвивающими красными стеблями; листья и стебли с шипами; плод — крупная, сочная, красная сложная костянка . . . . . Род 11. *Rubus* L. — Малина.
- Травянистые или деревянистые растения без шипов или же с колючками . . . . . 32.
32. Деревья и кустарники . . . . . 33.
- Растения травянистые . . . . . 34.
33. Кустарники без колючек, с крупными пятилопастными листьями; цветки довольно крупные, белые; плод сухой — 5 воздушных листовок с крупными, блестящими семенами . . . . . Род 1. *Physocarpus* Maxim. — Пузыреплодник.
- Небольшие деревья или крупные кустарники; ветви с колючками; листья довольно зубчатые или же глубоко перистонадрезанные; цветки белые, с резким, неприятным запахом; плод более или менее мясистый, с очень твердыми косточками . . . . . Род 10. *Crataegus* L. — Бодринник.
- 34 (от 32). Листья крупные, семи-девятипальчатонадрезанные, с характерным специфическим запахом; цветки многочисленные, белые и розоватые, в крупных, щитовидных метелках; плодик — семянка . . . . . Род 22. *Filipendula* Adams. — Лабазник.
- Листья более мелкие, без особого запаха; цветки желтые, одиночные или в более или менее сложных щитках . . . . . 35.
35. Листья трехраздельные, длинночерешковые; цветки одиночные, довольно крупные, золотисто-желтые . . . . . Род 18. *Waldsteinia* Willd. — Вальдштейния.
- Листья пальчато-пятираздельные; цветки желтые, в щитках . . . . . Род 15. *Potentilla* L. — Лянчатка.

#### Род 1. *PHYSOCARPUS* Maxim. — ПУЗЫРЕПЛОДНИК

1. Листья снизу густо опушенные, войлочные, с сравнительно короткими, тупыми или острыми долями; кустарник до 1.5 (2) м выс., сильно ветвистый, с отделяющейся корой. На скалах среди леса, обычно на известняках . . . . . 1. *Ph. amurensis* Maxim. — П. амурский (табл. 84, 1).

Таблица 84



1 — *Physocarpus amurensis* Maxim. (Пузыреплодник амурский); 2 — *Ph. ribesifolia* Kom. (П. спородифидный); 3 — *Spiraea elegans* Poir. (Тавога пильчатая); 4 — *S. betulifolia* Pall. (Т. березолистная); а — цветок, б — плод, в — семя.

- Опушение только по жилкам, доли листьев острые; кустарник до 1—1.5 м выс., сильно ветвистый, с отделяющейся корой. У каменистых россыпей и известковых скал . . . 2. *Ph. ribesifolia* Kom. — П. смородиноподобный (табл. 84, 2).

## Род 2. SPIRAEA L. — ТАВОЛГА, СПИРЕЯ

1. Листья с немногими зубцами на вершине или цельнокрайние . . . . . 2.
- Листья зубчатые от основания или со середины . . . . . 6.
2. Молодые листья с обеих сторон опушенные, позднее на верхней стороне опушение редет и может исчезнуть; кустарник до 120—150 (180) см выс., с сильно шелушащейся корой; соцветие многоцветковое. Под скалами, на осипях и у опушек . . . . . 9. *S. sericea* Turcz. — Т. шелковистая (табл. 85, 3).
- Листья слабо опушенные или опушенные только снизу, иногда даже совсем голые . . . . . 3.
3. Листья мелкие, 1—3 см дл. и 0.5—1.5 см шир.; соцветие 1—3 см в диам.; маленький кустарник, 15—30 см выс. По окраинам каменистых россыпей и у скал; преимущественно в северной части Амурской области и в Хабаровском крае . . . . . 4. *S. beauverdiana* Schneid. — Т. Бовера.
- Листья 3.5—4 см и крупнее; более крупные кустарники, обычно от 50 см и выше . . . . . 4.
4. Листья обратнойцелидные (до продолговатояйцевидных), с резко выраженными жилками, иногда почти трехлопастные, снизу с сероватым мягковолочным опушением; кустарник 120—180 (200) см выс. По сухим склонам, чаще у скал; только на самом юге Приморья . . . 10. *S. pubescens* Turcz. — Т. пушистая.
- Листья от продолговатояйцевидных до продолговатоовальных и почти ланцетных . . . . . 5.
5. Листья остроколючные; побеги ребристые, иногда коленчатые изогнутые; кустарник до 1.5 м выс.; по краям каменистых россыпей и у скал . . . . . 5. *S. flexuosa* Fisch. — Т. извилистая.
- Листья на верхушке закругленные; побеги гладкие, мелкопелосатые; кустарник 1—2 м выс. В лесах, чаще в сухих; преимущественно в Амурской области . . . . . 8. *S. media* Schmidt — Т. средняя.
- 6 (от 1). Листья городчатозубчатые, эллиптические или обратноовальные, изредка широкояйцевидные, 2—7 см дл. и 1.5—3 см шир.; соцветие — густая, щитковидная метелка; кустарник 50—70 (80) см выс. В хвойных широколиственных и лиственных лесах . . . . . 3. *S. betulifolia* Pall. — Т. березолистная (табл. 84, 4).
- Листья пильчатые, острозубчатые или двоякозубчатые; соцветия зонтиковидные или метельчатые . . . . . 7.
7. Листья пильчатые; соцветия метельчатые; цветки розовые . . . . . 8.
- Листья зубчатые, двоякозубчатые или надрезанно пильчатые, иногда почти трехлопастные; соцветия зонтиковидные; цветки белые . . . . . 9.
8. Листья ланцетные, пильчатые почти от основания, голые или снизу по главной жилке опушенные; кустарник 1—2 м выс. Всюду: по берегам рек, сырым лугам, на лесных болотах . . . 11. *S. salicifolia* L. — Т. иволгиная (табл. 85, 1).
- Листья эллиптически-ланцетные, пильчатые, пильчатые со середины или выше, снизу по жилкам негусто шелковисто-волосистые; оси соцветий резко-полюсчатые; кустарник 50—60 см выс. В заболоченных лиственных лесах; по Амуру . . . . . 2. *S. humilis* Pojark. — Т. низкая.
- 9 (от 7). Листья обратнойцелидные (до продолговатояйцевидных), иногда почти трехлопастные, пильчатые от середины или, чаще, только у вершины, снизу с сероватым, мягковолочным опушением; кустарник до 1.5—2 м выс. Под сухими скалами на ярко освещенных местах; только на юге Приморья (реки Суифун, Сандугта) . . . 10. *S. pubescens* Turcz. — Т. опушенная (табл. 85, 4).
- Листья без опушения, снизу . . . . . 10.
10. Листья широкояйцевидные, двоякозубчатые, снизу по главной жилке волосистые, с бороздками в углубл.; кустарник около 1 м выс. В лесах, чаще по скалам и у россыпей . . . . . 6. *S. ussuriensis* Pojark. — Т. уссурийская (табл. 85, 2).
- Листья продолговатояйцевидные, зубчатые, частично двоякозубчатые, чаще голые . . . . . 11.
11. Листья от середины, иногда и ниже, неровно, частью двоякозубчатые, на стерильных побегах иногда надрезанно зубчатые; чашелистики при плодах примостоящие; кустарник около 1 м выс.; ветки с сильно шелушащейся корой. На каменистых склонах и по краям осипей в лесу . . . . . 7. *S. elegans* Pojark. — Т. изящная (табл. 84, 3).
- Листья от середины и выше с расставленными острыми зубцами, уменьшающимися к вершине; чашелистики при плодах отогнутые вниз . . . . . 5. *S. flexuosa* Fisch. — Т. извилистая (см. также ступень 5).

Таблица 85



1 — *Spiraea salicifolia* L. (Таволга иволгиная); 2 — *S. ussuriensis* Pojark. (Т. уссурийская); 3 — *S. sericea* Turcz. (Т. шелковистая); 4 — *S. pubescens* Turcz. — Т. опушенная.



1. Небольшое, до 25—30 см выс., растение с двукотырчатными или двойко тройчато перистыми листьями; соцветие из нескольких (иногда всего 1) коротких, до 3 см, густых кистей. В трещинах известковых скал; пока известна только с юга Приморья (гора Чандалаз близ г. Сучана и на известковых скалах вдоль нижнего течения р. Сучана) . . . . . 1. *A. parvulus* Kom. — В. малая.
- Более крупное растение, до 1—2 м выс., с двукотырчатыми или двойко тройчатыми; метелки 25—30 (35) см дл.; кисти до 10 см дл. В лиственных и смешанных лесах, преимущественно по опушкам и просекам; весьма обычна в Приморье и в Приамурье . . . . . 2. *A. asiaticus* Pojark. — В. азиатская.

## Род 4. SORBARIA A. Br. — РЯБИШНИК

1. Небольшой кустарник со стеблями и листьями более или менее густо опушенными короткими, простыми и длинными рыжими железистоцетинистыми волосками; пары листочков тесно облегают; цветки до 15 мм в diam. По краям каменистых россыпей и на гольцах; только в Сихотэ-Алине (г. Советская Гавань, реки Ботча, Светлая и др.) . . . . . 3. *S. rhoifolia* Kom. — Р. сумохлистный (табл. 86, 2).
- Железистого опушения нет или оно только в соцветиях . . . . . 2.
2. Крупный кустарник, обычно около 1—2 (3) м выс., с голыми или тонко опушенными побегам; листья голые или опушены снизу только по жилкам; метелки крупные, 10—25 (30) см дл., с многочисленными цветками; цветки 7—11 мм в diam. Всюду; по берегам рек, ручьев, по окраинам каменистых россыпей . . . . . 1. *S. sorbifolia* (L.) A. Br. — Р. обыкновенный, Р. рябинолистный.
- Небольшой, до 40 см выс., кустарник; листья голые или с одиночными волосками, реже с более или менее густым опушением из жестоватых кустистых волосков; соцветия 2—8 см дл.; цветки более крупные, 12—15 мм в diam. На гольцах . . . . . 2. *S. pallasi* (G. Don) Pojark., *S. alpina* Dipp. — Р. Палласа, Р. альпийский (табл. 86, 1).

## Род 5. COTONEASTER Medic. — КИЗИЛЬНИК

Кустарник 1—1.5, реже 2 м выс., с яйцевидными или эллиптическими, цельнокрайными, сверху темно-зелеными, снизу беловато- или сероватоволочными листьями; цветки мелкие, розовые, в коротких пазушных малоцветковых кистях; плоды черные, с низким налетом, 7—9 мм дл. Редко; по известковым скалам . . . . . 1. *C. melanocarpa* Lodd. — К. черноплодный (табл. 86, 4).

## Род 6. PYRUS L. — ГРУША


Дерево до 12—15 м выс. и 30—40 см в diam.; листья острояйцеватые, с острой оттянутой верхушкой (при сушке в гербарии часто чернеют); цветки 3—4 см в diam.; цветет в первой половине мая; плоды на коротких ножках, почти округлые. По долинам рек и на прилегающих склонах в поясе широколиственных и хвойно-широколиственных лесов . . . . . 1. *P. ussuriensis* Maxim. — Г. уссурийская.

## Род 7. MALUS Mill. — ЯБЛОНЯ

1. Листья и черешки голые или почти голые, городчато-пильчатые; цветки 2—2.5 (3) см в diam.; плоды мелкие, 0.7—1 см дл., почти шаровидные; небольшое дерево. Преимущественно по Амуру (до оз. Орель) и на севере Приморья . . . . . 1. *M. pallasi* Juz., *M. sibirica* (Maxim.) Kom. — Я. Палласа, Я. сибирская.
- Листья и черешки с опушением, хотя бы только снизу по жилкам, листья городчато-зубчатые или почти пельокрайные; цветки 3—4 см в diam.; плоды чаще продолговатые, 9—15 мм дл.; дерево до 20—25 (30) м выс. и 40 (50) см в diam.; цветет в середине и во второй половине мая. По долинам рек, реже на прилегающих склонах; обычна в южной половине Приморья . . . . . 2. *M. mandshurica* (Maxim.) Kom. — Я. маньчжурская.

## Род 8. SORBUS L. — РЯБИНА

1. Листья сверху темно-зеленые, блестящие, со сравнительно широкими листочками, овальными или овально-ланцетными; крупные кустарники . . . . . 2.
- Листья сверху мутовчатые, с более узкими, линейно- или широколанцетными листочками; деревья . . . . . 3.



1 — *Sorbaria pallasi* (G. Don) Pojark. (Рябишник Палласа); 2 — *S. rhoifolia* Kom. (Р. сумохлистный); 3 — *Micromela alnifolia* (Steud. et Zucc.) Koehne (Мел.-поясничник ольховидный); а — цветок, б — плод, в — семя; 4 — *Cotoneaster melanocarpa* Lodd. (Кизильник черноплодный); а — плод.

2. Листья четырех-пятипарные, лепестки сверху голые; листья с грубопильчатыми краями; кустарник 1—2 м выс. В ельниках и в зарослях кедрового стланика, а также в каменистых берегах; на севере Приморья . . . . . 1. *S. sambucifolia* Roem. — Р. бузинолистный.
- Листья пяти-шестипарные; лепестки с верхней стороны на середине с шерстистыми бороздками; листья в нижней части цельнокрайние, выше надрезано-пильчатые; кустарник до 2,5 м выс. В ельниках и каменистых берегах; Сихотэ-Алинь . . . . . 2. *S. schneideriana* Koehne — Р. Шнейдера.
- 3 (от 1). Листочки равномерно зубчатые, все прилистники опадающие; почки голые или с тонкими, рассеянными по поверхности волосками; плоды до 1,5 см в диам., дерево до 12—15 (17) м выс. В лесах; по Амуру, преимущественно в северо-западной части . . . . . 3. *S. sibirica* Hedl. — Р. сибирская.
- Листочки в нижней части обычно цельнокрайние, прилистники частично сохраняются; плоды шаровидные, ярко-красные; дерево 3—6 (8) м выс. В горных лесах и по речкам . . . . . 4. *S. amurensis* Koehne — Р. амурская.

На юге Приморья по окраинам каменистых россыпей встречается рябина с почти цельнокрайними плотными листочками, снизу светлыми, с ярко-желтыми плодами. Для решения вопроса о видовой принадлежности этой рябины необходим более обширный материал.

#### Род 9. MICROMELES Desne. — МЕЛКОПЛОДНИК

Дерево до 10—15 (20) м выс. и около 20—25 см в диам.; листья яйцевидные или овальные, с хорошо заметной сетью жилок, обычно голые или по жилкам слабо волосистые; цветки в зонтиковидных щитках, белые, около 1 см в диам., с характерным своеобразным запахом (кислого теста); плоды красные, обычно с кисло-сладким вкусом, округлые или пролопотоватые, 8—12 мм дл., кисловатые, вполне съедобные. В смешанных лесах; на юге Приморья . . . . . 1. *M. alnifolia* (Sieb. et Zucc.) Koehne — М. ольхинолистный (табл. 86, 3).


#### Род 10. CRATAEGUS L. — БОЯРЫШНИК

1. Листья сверху рассеянно волосистые, снизу обычно сильно опушенные (до бархатистых), глубоко-лопастные или слабо надрезанные, на ростовых побегах часто глубоко трехлопастные; цветки около 1 см в диам.; плоды красные, реже желтоватые, по созреванию очень мягкие (легко раздавливаются пальцами), муцистые, сладкие; небольшое, 3—4 м выс., дерево. По рекам и прилегающим склонам, весьма обычен . . . . . 3. *C. maximowiczii* C. K. Schn. — Б. Максимовича, Боярка (табл. 87, 1).
- Листья голые или с коротким, густым опушением . . . . . 2.
2. Листья глубоколопастные, перистонадрезанные или рассеченные, сверху блестящие, голые, иногда снизу по жилкам волосистые; плоды крупные, до 1,5 см в диам., темно-красные, с белыми бородавочками, по созреванию плотные, кисловатые; дерево до 5—7 м выс. По рекам и прилегающим склонам; широко распространен . . . . . 1. *C. pinnatifida* Bge. — Б. перистонадрезанный (табл. 87, 2).
- Листья с крупными зубцами или небольшими лопастями, голые или с коротким, густым опушением; плоды мелкие, 6—8 мм в диам.; дерево 4—5 (6) м выс. По долине Амура . . . . . 2. *C. dahurica* Koehne — Б. даурский (табл. 87, 3).

#### Род 11. RUBUS L. — МАЛИНА

1. Растения с травянистыми стеблями . . . . . 2.
- Стебли деревнистые (кустарники) . . . . . 3.
2. Листья цельные, лопастные; стебли 5—20 (30) см выс.; растение двудомное; цветки одиночные, верхушечные; зрелые плоды желтые или оранжевые. На моховых болотах; по Амуру и в северном Сихотэ-Алине . . . . . 1. *R. chamaemorus* L. — Морошка (табл. 88, 1).
- Листья тройчатые или цельные, трех-пятилопастные; растения однодомные; плоды красные . . . . . 3.
3. Листья тройчатые . . . . . 4.
- Листья цельные, трех-пятилопастные; растение пильчатогребенчатое; цветки одиночные или по 2—3. В лесах и на болотах; по Амуру . . . . . 4. *R. humilifolius* C. A. Mey. — Костяника хмелелистная.
4. Цветки крупные, одиночные, розовые; все растение голое или с редкими, прижатыми волосками. В лиственничниках и белоберезниках по кюлькам и на болотах . . . . . 2. *R. arcticus* L. — Кизякница (табл. 88, 4).

Таблица 87



1 — *Crataegus maximowiczii* C. K. Schn. (Боярышник Максимовича); а — плод; 2 — *C. pinnatifida* Bge. (Б. перистонадрезанный); а — плод; 3 — *C. dahurica* Koehne (Б. даурский).



- Цветки по 3—10 в зонтиковидных или кистевидных соцветиях, мелкие, белые; растение с тонкопильчатыми стеблями и черешками листьев. В лесах и на болотах; по Амтуру . . . 3. *R. sachalin* L. — Костяника обыкновенная.
- 5 (от 1). Листья тройчатые или непарноперистые . . . 6.
- Листья цельные, пятилопастные или надразанные; стебли 1—1,5 (2) м дл., красные или темно-пурпурные, часто обмерзающие, угловатые; все растение с крупными шипами; цветки крупные, около 2 см в диам.; плоды крупные, блестящие. По долинам рек; только в Приморском крае и у Благовещенска . . . 5. *R. crataegifolius* Bge. — М. боярышниковидная, Окина (табл. 88, 2).
6. Листья снизу беловолосные, с 3 или 5 листочками; стебли до 1—1,5 м длиной; шипы мелкие, с ясно заметным черепитчатым основанием. В лесах у скал и россыпей, по речным галечникам и по горам . . . 6. *R. sachalinensis* Lévl. — М. сахалинская (табл. 88, 3).
- Листья снизу зеленые, с 3 листочками; побеги обычно 30—40 см дл.; шипы очень многочисленные, тонкие, игольчатые. В горах по краям каменистых россыпей, откуда иногда спускается на галечники горных рек . . . 7. *R. komarovii* Nakai — М. Комарова (табл. 88, 3).

#### Род 12. FRAGARIA L. — ЗЕМЛЯНИКА

Листья с 3 яйцевидно-ромбическими листочками, сверху с оттопыренными волосками, снизу шелковистые; цветки крупные, белые; плоды различной формы, обычно округлые или конические; растение двулетнее. На открытых сухих участках . . . 1. *F. orientalis* Losinsk. — З. постоная.

#### Род 13. DASYPHORA Raf. — ДАЗИФОРА, «КУРЬЛЬСКИЙ ЧАЙ»

1. Цветки белые; листья голые или шелковисто-мохнатые . . . 2.
- Цветки желтые; листья сверху более или менее прижатоволосистые, снизу густо-волосистые; кустарник до 120—150 см выс., с характерной отслаивающейся корой. Чаще на склонах; особенно в Амурской области . . . 1. *D. fruticosa* (L.) Rydb. — Д. кустарниковая.
2. Листья голые; цветки крупные, 2—2,5 см в диам. На скалах и по берегам рек в Амурской области и на известковых скалах по Сучану . . . 2. *D. davurica* (Nestl.) Kom. et Aliss. — Д. даурская.
- Листья с обеих сторон густо шелковисто-мохнатые. На сухих скалах (особенно известковых) по Сихотэ-Алиню (гора Чандала, с. Екатериновка, бухта Ольга и др.) . . . 3. *D. manshurica* (Maxim.) Juz. — Д. маньчжурская.


#### Род 14. COMARUM L. — САБЕЛЬНИК

Полукустарник с подземными стеблями, наземные на зиму отмирают; нижние листья непарноперистые, верхние стеблевые тройчатые; цветки темно-пурпурные. На болотах, по берегам озер и рек, часто в воде . . . 1. *C. palustre* L. — С. болотный.

#### Род 15. POTENTILLA L. — ЛАПЧАТА

1. Листья тройчатые или пятирельные . . . 2.
- Листья перистые и перисто-надразанные . . . 17.
2. Листья тройчатые . . . 3.
- Листья пятирельные . . . 14.
3. Листья снизу густо-беловолосные . . . 4.
- Опушение иное (не беловолосное) или его нет вовсе . . . 5.
4. Листья опушенные с обеих сторон, листочки прикорневых листьев обратнояйцевидные, широкояйцевидные или яйцевидные; цветки до 1,5 см в диам. У голцов . . . 9. *P. nivea* L. — П. снежная.
- Листья опушены только снизу, сверху голые, достигаясь, плотные, колючие; цветки около 1 см в диам. На остепненных склонах в Амурской области (бассейн рек Белой и Громотухи) . . . 8. *P. leucophylla* Pall. — П. белолистная.
- 5 (от 3). Листья голые или почти голые . . . 6.
- Листья более или менее опушенные, хотя бы только снизу по жилкам . . . 7.
6. Растение с плетевидными ветвями; листочки снизу сизоватые, небольшие; цветки одиночные, пазушные. В лесах по ручьям и тропам . . . 17. *P. centrifuga* Maxim. var. *manshurica* Maxim. — П. столбовая маньчжурская (табл. 89, 1).
- Листочки очень крупные, до 10—12 см дл., плетевидных ветвей нет. На сухих лугах; в Биробиджане и в Хасанском районе . . . 31. *Potentilla* sp. — Лапчатка (не определенный вид).

Таблица 88



1 — *Rubus chamaemorus* L. (Морозика); 2 — *R. crataegifolius* Bge. (Малина боярышниковидная, Окина); 3 — *R. komarovii* Nakai (М. Комарова); 4 — *R. arcticus* L. (Кимкейника); 5 — *R. sachalinensis* Lévl. (Малина сахалинская).



- 7 (от 5). Стебли низкие, 1—5 см дл., не превышающие прикорневых листьев . . . 8.
8. Стебли более высокие, длиннее прикорневых листьев . . . 9.
9. Листья очень мелкие, 1—1,5 см дл., листочки 3—5 мм длины, широкообратнояйцевидные; образует подушкообразные дерновины. На гольцах; в Амурской области и на г. Тардоки-Ичи в северном Сихотэ-Алине . . . 20. *P. elegans* Cham. et Schlecht. — Л. изысканная.
- Листочки до 20 мм дл., широкообратнояйцевидно-клиновидные; растение с длинными, укореняющимися стеблевыми побегами. В степях, на сухих лугах и в основных лесах; в Амурской области . . . 21. *P. acaulis* L. — Л. бесстебельная.
- 9 (от 7). Стебли до 60 см выс., с оттопыренными волосками, хорошо облиственные; листья крупные, листочки 3—6—8 см дл. и около 2 см шир., остроильчатозубчатые, рассеяно волосистые; соцветие цитковидно-метельчатое. В кустарниковых зарослах; на сухих лугах юг Приморья . . . 16. *P. cryptotaenae* Maxim. — Л. криптотеневая (табл. 89, 4).
- Стебли меньших размеров, 10—30 (50) см выс., слабо облиственные; листочки различной величины, 2—6 (7) см дл. . . 10.
10. Листья мелкие, до 2 см дл., средний листочек прикорневых листьев глубоко трехнадрезанный или рассеченный, вследствие чего листья часто кажутся пилерными. По иловатым и песчаным берегам рек; на нижнем Амуре . . . 14. *P. amurensis* Maxim. — Л. амурская.
- Листья более крупные, все листочки цельные, равномерно зубчатые или пильчатые . . . 11.
11. Стебли часто укореняются, в узлах имеются цветевидные ветви; цветки одиночные . . . 17. *P. centigrana* Maxim.
- Листья крупные, листочки 3—6—8 см дл. и около 2 см шир., остроильчатозубчатые, рассеяно волосистые; соцветие цитковидно-метельчатое. В кустарниковых зарослах; на сухих лугах юг Приморья . . . 16. *P. cryptotaenae* Maxim. — Л. криптотеневая (табл. 89, 4).
- Стебли не укореняются; цветки в конечных соцветиях по 5—7 (9) . . . 12.
12. Листочки пильчатые, обычно с весьма острыми зубцами, ромбически-эллиптические или продолговатые, обратнояйцевидные, сверху рассеяно жестковолосистые, снизу беловатые, с прижатыми волосками. На разнотравных лугах . . . 27. *P. freyniana* Bornm. — Л. Фрейна.
- Листочки крупно и неравномерно пильчатые или всего с 3—5 закругленными зубцами . . . 13.
13. Стебли 15—40 (50) см выс.; нижние листья иногда бывают пилерные или даже (из-за рассеченного кончика листочка) перистые; листочки крупно и неравномерно пильчатые, с обеих сторон оттопыривоволосистые. По берегам рек, у дорог и жалам . . . 15. *P. norvegica* L. — Л. норвежская.
- Стебли 10—25 см выс.; все листья тройчатые, средний листочек более крупный, листочки у основания цельнокрайные, выше с 2—5 закругленными зубцами с каждой стороны, с обеих сторон мохнаты. На скалах и речных галечниках . . . 19. *P. fragiformis* Willd. — Л. земляничкообразная.
- 14 (от 2). Листья снизу густо-беловолосные, сверху более или менее опушенные, прикорневые и нижние стеблевые с 5, реже с 7 листочками, верхние стеблевые с 3—5 листочками. У дорог; заносное; ст. Кангауз, с. Монакино, г. Уссурийск . . . 10. *P. impolita* Wahlenb. — Л. небесная.
- Листья снизу голые или волосистые . . . 15.
15. Листья только нижние, иногда бывают пилерные или даже (из-за рассеченного верхнего листочка) перистые, остальные тройчатые . . . 13.
- Все листья пилерные или самые верхние тройчатые . . . 16.
16. Цветки одиночные, пазушные; стебли в виде длинных, укореняющихся плетей; листочки остроколючие. По берегам рек, у дорог и на ж.-д. насыпях . . . 28. *P. flagellaris* Willd. — Л. плетевидная (табл. 89, 3).
- Цветки в конечных соцветиях; плодущие стебли рано засыхают; прикорневые листья многочисленные, на длинных (10—20 см) черешках; вегетативные стебли лежащие, в узлах укореняются; листочки на конце закругленные. На злаково-разнотравных сыроватых и сухих лугах; на самом юге Приморья (с. Хасан, пос. Борисовка) . . . 18. *P. kleiniana* Wight et Arn. — Л. Клейна.
- 17 (от 1). Листья снизу более или менее густо-беловолосные или серовато или рыжеватого слабо войлочные . . . 18.
- Опушение простое или железистое, или же листья вовсе голые . . . 26.
18. Все растение густо-беловолосное; стебли 10—40 см выс., почти прямые; листья до 7 см длины, с 3—4 парами боковых листочков, стеблевые листья тройчатые, листочки продолговатые, продолговатоэллиптические или яйцевидные, 2—4 см дл. и 3—8 (10) мм шир. На сухих лугах; в Приморье . . . 6. *P. discolor* Bge. — Л. разноцветная.
- Войлочное опушение преимущественно на нижней стороне листьев, верхняя сторона листьев голая или с более или менее рассеянным опушением . . . 19.
19. Опушение нижней стороны листьев сильное бело- или серовато-войлочное . . . 20.




1 — *Potentilla centigrana* var. *manshurica* Maxim. (Лепчатка столбовая маньчжурская); 2 — *P. chinensis* Ser. (Л. китайская); лист; 3 — *P. flagellaris* Willd. (Л. плетевидная); 4 — *P. cryptotaenae* Maxim. (Л. криптотеневая); а — часть стебля с листьями, б — цветок; 5 — *P. bifurca* L. (Л. пильчатая).



- Войлочек не сплошной, грубый, сероватый или буроватый . . . . . 24.
20. Цветки одиночные, пазушные; растения с укореняющимися побегами; листья явно прерывисто перистые . . . . . 24.
- Соцветия многоцветковые; стебли более или менее высокие, 10—60 см; листья перистые или слегка прерывисто перистые . . . . . 22.
21. Листья сверху голые или прижатоволосистые, снизу более или менее густо шелковисто-войлочные; цветки 1—2 см в diam., светло-желтые. По дорогам, на пастбищах и у жилья; у нас, по-видимому, заносное . . . . . 23. *P. anserina* L. — *П. гусиная*.
- Листья сверху голые или слабо прижатоволосистые, снизу густоволосистые, но без шелковистого опушения или шелковистое опушение только по жилкам. На заболоченных заселенных участках морского берега . . . . . 30. *P. pacifica* Howell — *П. тихоокеанская*.
- 22 (от 20). Прикорневые и нижние стеблевые листья с немногими парами сближенных листочков . . . . . 23.
- Листья с многочисленными (7—15) парами листочков, сверху зеленые, снизу густо-беловолосистые; лепестки почти равны чашечистикам, желтые. На сухих лугах, каменистых склонах и песках морского берега . . . . . 7. *P. chinensis* Ser. — *П. китайская* (табл. 89, 2).
23. Листочки прикорневых листьев строго супротивные, их сегменты образуют ложную мутовку; стеблевых листьев 1—2, тройчатых или плоских; цветочные стебли 3—10 см выс.; цветки около 1 см в diam. На сухих каменистых склонах; в Амурской области (бассейн р. Белой между селами Новостепановка и Симоново) . . . . . 5. *P. verticillaris* Steph. ex Willd. — *П. мутовчатая*.
- Сегменты листочков не образуют мутовки, листочки неправильно глубоко перистораздельные; цветочные стебли 10—40 см выс.; цветки мелкие, многочисленые, лепестки беловатые, чуть длиннее чашечки. На сухих лугах и на выгонах; в Приморье; в Приморье, по-видимому, только как заносное . . . . . 4. *P. multifida* L. — *П. многонадрезанная*.
- 24 (от 19). Войлочек на нижней стороне листа выражен хорошо; верхние листочки прикорневых листьев с 6—10 острыми или туповатыми зубцами . . . . . 25.
- Войлочек выражен слабо; верхние листочки прикорневых листьев с 5—6 (10) острыми зубцами с каждой стороны; стебли и соцветия с короткими, мягкими волосками. На скалах у морского берега . . . . . 24. *P. tranzschellii* Juz. — *П. Транзшея*.
25. Стебли 15—25 см выс.; прикорневые листья с 5—6 парами листочков; листочки очень глубоко перистораздельные с туповатыми зубцами, сверху темно-зеленые, с редкими простыми прижатыми волосками, снизу светлые, со слабым грубоволосистым опушением. На скалах; в бассейне Уссури . . . . . 25. *P. ussuriensis* Juz. — *П. уссурийская*.
- Стебли 10—20 см выс.; прикорневые листья с 4—5 парами листочков; листочки острозубчатые, сверху темно-зеленые, голые или рассеянно прижатоволосистые, снизу сероватые, с довольно густым войлочком, с сильно выдающимися жилками. На известковых скалах; на юге Приморья . . . . . 26. *P. acutulus* Juz. — *П. подражающий*.
- 26 (от 17). Листочки узкие, почти линейные, цельнокрайние, на конце дву- или реже, трехлопастные, прикорневых листьев нет . . . . . 27.
- Листочки более широкие, с зубцами с обеих сторон; прикорневые листья у большинства видов есть . . . . . 28.
27. Опушение стебля оттопыренное или прямостояще-оттопыренное; листочки с рыхло прилегающими или почти прижатыми волосками; цветки 8—15 мм. На сухих участках по выгонам, у дорог и на ж.-д. насыпях; заносное . . . . . 1. *P. bifurca* L. — *П. вилчатая* (табл. 89, 5).
- Стебель только в верхней части прижатоволосистый, снизу голый; цветки около 20 мм. На речных галечниках, сухих лугах, в лиственничниках и сосновых лесах; в Амурской области; в Приморье, по-видимому, заносное . . . . . 2. *P. semiglabra* Juz. — *П. полугладкая*.
- 28 (от 26). Листья густо железистые, особенно внизу (молодые дают в гербарии отпечатки), по жилкам снизу имеются густые, простые волоски; прикорневые и нижние стеблевые листья с 2—3 парами листочков. На скалах и каменистых россыпях; в Сахот-Алине (р. Вогча) и в Амурской области (хр. Тукуринштра, с. Дзальдило) . . . . . 3. *P. ingulans* Tutcz. — *П. вачианная*.
- Листья без железок; с мелкими железками или более или менее густо железистые, клейкие, но тогда прерывистоперистые . . . . . 29.
29. Листья без железок; стебли тонкие, не превышают или лишь немного превышают прикорневые листья, часто к осени отмирают . . . . . 30.
- Листья с железками или без них; стебли более толстые, хорошо облиственные, сохраняются до конца вегетации . . . . . 31.
30. Листочки с обеих сторон жестковатоволосистые, часто слегка шелковистые; цветки небольшие, 8—12 мм в diam.; раннее весеннее растение, иногда осенью цветет

Таблица 90



1 — *Chamaerhodos erecta* (L.) Bge. (Хамеродос прямостоящий); 2 — *Waldsteinia ternata* (Steph.) Fritsch (Вальдштейния тройчатая, В. сибирская).

- вторично. В лесах, кустарниковых зарослях и на лугах . . . . . 22. *P. fragarioides* L. — Л. земляникоподобная.
- Опушение более грубое; листья более крупные; цветки 15—20 мм в diam. На скалах в лесу и у моря . . . . . 23. *P. sprengeliana* Lehm. — Л. Шпренгели.
- 31 (от 29). Опушение сильно развитое, железистое (железок); стебли 20—50 см выс., хорошо облиственные; прикорневые и нижние стеблевые листья с 3—5 парами листочков. На лугах и сухих каменистых склонах; преимущественно по Амуре . . . . . 12. *P. viscosa* J. Don — Л. класная.
- Опушение не железистое, железок нет вовсе или же они очень мелкие, точечные; растения не класные . . . . . 32.
32. Листья сверху голые или почти голые, снизу и по краю с длинными волосками; стебли прямостоячие, 10—50 см выс.; прикорневые листья многочисленные, довольно крупные, до 15—20 см, перисторассеченные с 3—9 парами листочков; цветки до 12 мм в diam. На сухих лугах и на галечниках . . . . . 41. *P. bipendula* Willd. — Л. табачникоподобная.
- Листья с обеих сторон с редкими, прижатыми волосками; стебли распростертые или приподнимающиеся (изредка прямые), часто многочисленные, 15—40 см выс.; листья с 2—5 парами листочков, верхние стеблевые чаще тройчатые, прикорневых листьев обычно нет. По берегам рек, у дорог, на выгонах . . . . . 13. *P. supina* L. — Л. низкая.

#### Род 16. *SIBBALDIA* L. — СИББАЛДИЯ

Небольшое растение с тройчатыми листьями и обратнотройчатыми, суженными к основанию листочками, на верхушке с 3, реже 5 зубцами; цветки небольшие, желтоватые, в щитковидных соцветиях. На гольцах; в Сихотэ-Алине (р. Богча), по-видимому, есть и в Амурской области . . . . . 1. *S. macrophylla* Turcz. — С. крупнолистная.

#### Род 17. *CHAMAERHODOS* Bge. — ХАМЕРОДОС

Двулетник с тонкими, деревенеющими корнями и розеткой прикорневых листьев, к моменту цветения обычно отмирающих; стебли 10—50 (60) см выс., обычно опушенные; стеблевые листья с трехраздельными прилистниками; соцветие ветвистое, железистое, многоцветковое; цветки белесо-розовые или белые, 7—8 (10) мм в diam. На сухих склонах; в Амурской области, на оз. Ханка, Суифуне . . . . . 1. *Ch. erecta* (L.) Bge. — Х. прямостоящий (табл. 90, 1).

#### Род 18. *WALDSTEINIA* Willd. — ВАЛЬДШТЕИНИЯ

Небольшое растение с ползучим корневищем и прикорневыми длинночерешковыми тройчатыми листьями; средний листочек широкообратнояйцевидный или округлый, боковые почти ромбические, скошенные; соцветие трех-семицветковое; цветки крупные, до 1,5 см в diam., желтые; цветет в мае. В хвойных и смешанных лесах; часто в большом количестве . . . . . 1. *W. lemata* (Steph.) Fritsch — В. тройчатая, В. сибирская (табл. 90, 2).


#### Род 19. *SIEVERSIA* Willd. — СИВЕРСИЯ

1. Небольшой полукустарник с перистыми листьями, листочки клиновидные или обратнояйцевидные; цветоносы 5—15 см дл., с 1 крупным, 15—25 мм в diam., белым цветком; столбик длинный (2—4 см), остается при плодах, перистый, с оттопыренными волосками. На гольцах; в северном Сихотэ-Алине . . . . . 1. *S. pentapetala* (L.) Greene — С. пятилепестная (табл. 91, 1).
- Растение меньших размеров, листочки глубоко трехлопастные; цветки 25—30 мм в diam. На гольцах; по Амуре . . . . . 2. *S. pusilla* (Gaertn.) Hult. — С. малая (табл. 91, 2).

#### Род 20. *GEUM* L. — ГРАВИЛАТ

Стебли до 70—80 см выс., с оттопыренными жесткими волосками, облиственные; листья двирядно перисторассеченные или прерывисто перистораздельные; цветки крупные, водотисто-желтые; плодики с длинными, жесткими волосками; столбик крючкообразно загнут; зрелые плодики цепляются к одежде и к животным. У дорог в лесах, на опушках и среди кустарников . . . . . 1. *G. aleppicum* Jacq. — Г. александрийский.

Таблица 91



1 — *Sieversia pentapetala* (L.) Greene (Сиверсия пятилепестная); 2 — *S. pusilla* (Gaertn.) Hult. (С. малая); 3 — *Dryas ajanensis* Juz. (Триада аянская). а — плод.



1. Листья эллиптические, 0,5—1,5 см дл. и 0,3—1 см шир., надрезанно городчато-зубчатые, морщинистые, снизу беловолочные; цветки белые, 1,5—2,5 см в диам.; волоски на стрелке более или менее железистые; семеники с остиями. На гольцах; в Сихотэ-Алине . . . . . 1. *D. alicensis* Juz. — *D. аликсий* (табл. 91, 3).
- Листья эллиптические или почти округлые, 0,6—1,7 см дл. и 0,5—1,5 см шир., зубцы их часто раздвоенные; волоски на стрелке вистые. На гольцах . . . . . 2. *D. tschonoskii* Juz. — *D. Чоноск*.

## Род 22. FILIPENDULA Adans. — ЛАБАЗНИК

1. Лопasti листочков очень узкие, линейные; плодики сидячие . . . . . 2.
- Лопasti листочков более широкие; плодики на ножках . . . . . 3.
2. Листья снизу зеленые; плодики голые. На лугах; у оз. Ханка и по Амуру . . . . . 3. *F. angustiloba* Maxim. — *Л. узколобный*.
- Листья снизу беловолочные; плодики по краю щетинисто-волосистые. Сухие луга и кустарниковые заросли; преимущественно в Амурской области и на западе Хабаровского края . . . . . 5. *F. intermedia* (Glehn) Juz. — *Л. средний*.
- 3 (от 1). Прикорневые и нижние стеблевые листья с несколькими хорошо развитыми боковыми листочками, часть из которых трехлопастные; листья снизу обычно беловолочные, реже зеленые, иногда на одном и том же растении часть листьев беловолочных, часть зеленых. По лесным лугам и кустарниковым зарослям . . . . . 3. *F. palmata* Maxim. — *Л. дланевидный*.
- Боковые листочки развиты слабо или их нет вовсе . . . . . 4.
4. Цветки розовые или красные; стебли 30—60 см выс.; конечный листочек крупный, 10—25 см в диам., пяти-семилопастной (у верхних листьев трехлопастной); все растение совершенно голое. По лесным ручьям, особенно в сыпняках . . . . . 1. *F. koreana* Nakai — *Л. корейский*.
- Цветки белые; стебли 100—120 см выс.; конечный листочек обычно пятилопастной (у самых верхних листьев трехлопастной); листья голые; реже снизу рассеяно коротковолосистые. По ручьям близ моря; бухта Ольга . . . . . 2. *F. glaberrima* Nakai — *Л. гладкий*.


## Род 23. AGRIMONIA L. — РЕПИШОК

1. Стебель 80—95 см выс., густожелезистый, простых волосков на нем нет; листья 9—17 см дл. и 7—10 см шир., на них есть простые длинные волоски; цветки мелкие, бледно-желтые. Среди кустарников; на юге Приморья (Сучан) . . . . . 1. *A. granulosa* Juz. — *Р. мелкозернистый*.
- Стебель более или менее волосистый, иногда с примесью коротких железок . . . . . 2.
2. Волоски на стебле длинные и короткие; листья снизу сероватые или беловатые, редко с обеих сторон зеленые . . . . . 3.
- Волоски на стебле только длинные, прямые; стебель 25—100 см выс.; листья 6—16 см дл. и 5—9 см шир., с обеих сторон зеленые, сверху голые или рассеяно волосистые, снизу с редкими волосками по жилкам и с очень мелкими железками. В лесах и в кустарниковых зарослях, у дорог . . . . . 2. *A. pilosa* Ldb. — *Р. волосистый*.
3. Листья снизу бархатисто-волосистые, сероватые или беловатые, без железок; стебли 30—50 см выс. В дубняках и кустарниковых зарослях; на юге Приморья . . . . . 4. *A. velutina* Juz. — *Р. бархатистый*.
- Листья с обеих сторон зеленые, снизу тонко опушенные; стебель 20—70 см выс., с длинными и короткими волосками. В лесах и кустарниковых зарослях . . . . . 5. *A. japonica* (Miq.) Koidz. — *Р. японский*.

## Род 24. SANGUISORBA L. — КРОВОХЛЕБКА

1. Стебли и цветоносы железистые; прикорневые листья до 40 см дл., листочки снизу коротко опушенные, по жилкам волосистые; соцветия многочисленные (10—20), шаровидные или эллиптические, 1—2 см дл., темно-пурпурные. В дубняках и порослево-кустарниковых зарослях; преимущественно на юге Приморья . . . . . 2. *S. glandulosa* Kom. — *К. железистая*.
- Растения голые, реже с простыми (не железистыми) опушением . . . . . 2.
2. Стебли 60—120 см выс.; все растение голое; прикорневые листья до 40—50 см дл., непарноперистые, с 7—15 парами листочков; листочки узкоэллиптические или линейные, обычно с прилистниками; соцветия длинные и узкие, цветки белые. Везде; на сырых лугах . . . . . 4. *S. parviflora* (Maxim.) Takeda — *К. мелкоцветковая*.

Таблица 92



1 — *Sanguisorba magnifica* 1. Schischk. et Kom. (Кровохлебка великоцветная); 2 — *S. sitchensis* C. A. Mey. (К. ситхинская); 3 — лист, 4 — соцветие, 5 — лист, 6 — соцветие.




- Листочки более широкие . . . . . 3.
- 3. Листочки с сердцевидным основанием . . . . . 4.
- Листочки с суженным, иногда перанюбиком основанием; цветки розовые. На сухих лугах и среди кустарниковых зарослей . . . . . 5. *S. tenuifolia* Fisch. — *К. тонколистная*.
- 4. Листочки продолговатоэллиптические или яйцевидные; цветки от темно-красных до черно-пурпурных, в малых или короткоцилиндрических головках. В дубняках, порослево-кустарниковых зарослях и на сухих лугах . . . . . 1. *S. officinalis* L. — *К. аптечная*.
- Листочки более крупные, округлые или округлопродолговатые; соцветия удлиненные, колосовидные; цветки зеленовато-белые или сиренево-розовые . . . . . 5.
- 5. Цветки зеленовато-белые, реже слегка красноватые; листочки коротко-пильчатые, светло-зеленые, тонкие. По берегам горных рек и у болот; в северном Сихотэ-Алине и на нижнем Амуре . . . . . 6. *S. sitchensis* C. A. Mey. — *К. сихотэ-Алинская* (табл. 92, 2).
- Цветки розовые или сиренево-розовые; листочки грубоузубчатые, сизоватые, плотные. В трещинах известковых скал; пока известна только с горы Чандадз на Сучане . . . . . 3. *S. magnifica* I. Schischk. et Kom. — *К. великоцветная* (табл. 92, 1)

Кровохлебки часто образуют гибриды; таких гибридов очень много на юге Приморья.

#### Род 25. *ROSA* L. — РОЗА, ШИПОВНИК

- 1. Листья сверху сильно морщинистые; побеги и шипы густо опушенные; цветки крупные, 8—10 (12) см в диам., красные или темно-розовые; плоды крупные, часто сплюснuto-шаровидные, с сочными, мясистыми стенками, обычно гладкие, изредка более или менее колючие (бухта Ольга); кустарник от 30—40 см до 1.5—2.5 м выс. На песках и галечниках морского берега, по долинам рек, выходящих в море, иногда заходит немного вверх по течению . . . . . 2. *R. rugosa* Thunb. — *Р. морщинистая* (табл. 93, 1).
- Листья сверху не морщинистые; побеги и шипы без опушения . . . . . 2.
- 2. Соцветие щитовидное или продолговато-метельчатое; цветки белые, иногда чуть кремовые, 3—5 см в диам.; плоды шаровидные, реже яйцевидные; кустарник с длинными, 3—5 (7) м, жесткими и лязгающими стеблями; листья 5—10 см дл., с 7—9 яйцевидными голыми листочками. По морскому берегу и прилегающим участкам; на самом юге Приморья . . . . . 1. *R. maximoviciana* Rgl. — *Р. Максимовича* (табл. 93, 2).
- Прямостоячие кустарники с одиночными цветками . . . . . 3.
- 3. Шипы крупные, многочисленные; цветки белые или кремовые; плоды шаровидные, суховатые, темно-пурпурно-красные, иногда почти черные; листья с 5—11 мелкими листочками; листочки 1—2 см дл. На сухих скалах . . . . . 4. *R. gracilipes* Clusian. — *Р. тонконожковая* (табл. 94, 2).
- Шипы менее крупные, игловидные или черепитчатые; цветки розовые или красные; плоды различной формы, чаще удлиненные, с более или менее сочными стенками, оранжевые или красные . . . . . 4.
- 4. Листочки мелкие, около 1 см дл., реже до 2 см, широкоэллиптические, в верхней части двоякозубчатые; цветки бледно-розовые; кустарник до 50—60 см, реже до 1 м выс. На каменистых россыпях и скалах в лесном поясе Сихотэ-Алины . . . . . 5. *R. ussuriensis* Juz. — *Р. уссурийская*.
- Листочки более крупные, 1.5 (2)—5 (6) см дл. . . . . 5.
- Шипы большей частью тонкие, игловидные, многочисленные . . . . . 5.
- Шипы более крупные, с черепитчатой, железистой, опушенными; побеги красновато-бурые или черно-пурпурные; листья 4—8 см дл., обычно с 7 продолговатыми или узкоэллиптическими листочками; цветки темно-розовые; плоды от шаровидных до яйцевидных и продолговатых, с грубой кожицей, красные; кустарник 1—1.5 (2) м выс. Весьма обычна на открытых местах в лесах по долинам рек, на разнотравных лугах и среди порослево-кустарниковых зарослей . . . . . 6. *R. davurica* Pall. — *Р. даурская* (табл. 94, 3).
- 6. Небольшой кустарник с ползучими стеблями; листочки в верхней части с редкими (3—7), игловидными зубцами; плоды яйцевидно-овальные или округлые до 1.5 см в диам. На россыпях у верхней границы леса; пока известна только из бассейна р. Туминя . . . . . 4. *R. sichotelinensis* Kolen. — *Р. сихотэ-Алинская*.
- Кустарник различной высоты, иногда до 2—2.5 м; листочки с многочисленными (9—29) зубцами с каждой стороны; плоды удлиненные, яйцевидные, реже грушевидные. В лесах, преимущественно темнохвойных, по берегам ключей; очень варьирует по своим признакам . . . . . 3. *R. acicularis* Lindl. — *Р. иглистая* (табл. 94, 1).

Таблица 93



1 — *Rosa rugosa* Thunb. (Роза морщинистая); 2 — *R. maximoviciana* Rgl. (Р. Максимовича).



Розы часто образуют естественные гибриды, что порой сильно затрудняет их определение. На юге Приморья встречаются гибриды *P. морщинистой* и *P. даурской* (*R. rugosa* Thunb. × *R. daurica* Pall.), а в Тетюхинском районе довольно обычные гибриды *P. иглистой* и *P. даурской* (*R. acicularis* Lindl. × *R. daurica* Pall.). В Сихотэ-Алино, по-видимому, есть гибриды *P. уссурийской* с *P. даурской*, описанные во «Флоре СССР» (т. X, стр. 451) С. В. Юзепчуком как ×*R. schischkini* Juz.

#### Род 26. PRUNUS L. — СЛИВА

1. Листья снизу более или менее опушенные; косточка гладкая. В культуре . . . . . 2. *P. ussuriensis* Koval. et Kost. — *C. уссурийская*.
- Листья с обеих сторон голые; косточка морщинистая . . . . . 1. *P. salicina* Lindl. — *C. китайская*.

#### Род 27. CERASUS Juss. — ВИШНЯ

1. Кустарник до 1,5—2 м выс.; цветки белые или бледно-розовые, по 1—2; листья продолговатоовальные или эллиптические, до 7 см дл., 3 см шир., на конце обычно с длинным, толким острием; цветет почти одновременно с распусканием листьев; плоды красные, шаровидные, вполне съедобные, около 1 см в диам. По склонам и долинам рек; в Приморском крае (г. Сучан, бухта Ольга, с. Чугуевка и др.); иногда культивируется . . . 3. *C. glandulosa* (Thunb.) Losinsk. — *B. железистая*.
- Деревья; цветки в кистях или малоцветковых зонтиках . . . . . 2.
2. Листья светло-зеленые, обычно, по крайней мере снизу, с короткими волосками, эллиптические или обратнойцевидные, 3,5—9 см дл. и 1,8—5 см шир.; кисти щитковидные, с крупными листоватыми прицветниками; цветки белые; цветет в общественном состоянии, в июне; зрелые плоды черные, горькие; дерево с темно-серой корой. В смешанных лесах; Приморье и Приамурье . . . . . 1. *C. maximowiczii* (Rupr.) Kom. — *B. Максимовича*.
- Листья сверху темно-зеленые, снизу светлые, голые, яйцевидные, обратнойцевидные или эллиптические, с острыми зубцами, до 12 см дл. и 6—7 см шир.; цветки крупные, до 3—3,5 см в диам., розовые, в очень коротких кистях; цветет одновременно с распусканием листьев, в мае; плоды черные, блестящие, горькие; дерево с буровато-серой корой. В лесах; на самом юге Приморья . . . . . 2. *C. sachalinensis* (Fr. Schmidt) Kom. — *B. сахалинская*.

#### Род 28. RADUS Mill. — ЧЕРЕМУХА

1. Листья снизу со смолистыми железками (молодые дают отпечатки при гербаризации); молодые ветви тонкие, голые; цветки 7—10 мм в диам.; плоды мелкие, черные, с фиолетово-синей красной мякотью, горькие; кора блестящая, шелушащаяся (как у березы), коричневая или медно-коричневая; дерево до 12—15 м выс. и 40 см в диам.; плоды усиленно поедаются медведями, обламываемыми верхними деревьями. По горным рекам и склонам . . . . . 2. *P. maackii* (Rupr.) Kom. — *Ч. Маака*, *Ч. медвежья*.
- Листья без смолистых железок; цветки более крупные, до 15 мм в диам.; плоды более крупные, черные, с зеленовато-желтой мякотью, съедобные; кора темно-бурая или серая; молодые ветви тонкие, бархатисто опушенные. Всюду, по рекам в их нижнем и среднем течении . . . . . 1. *P. asiatica* Kom. — *Ч. азиатская*, *Ч. обыкновенная*.

#### Род 29. PRINCEPIA Royle — ПРИНЦЕПИЯ

Кустарник до 1,5—2 м выс., с изогнутыми ветвями, в лесу иногда ветви поднимаются вверх по деревьям до 3—3,5 м выс., с прямыми или слегка крючкообразно изогнутыми колючками; листья очередные или в пучках, обычно цельнокрайние, иногда с немного загнутыми краями, реже волнистые или даже слегка городчатые; цветки желтые, пахучие, в пучках; плод сочный, кислотоватый, красный, 1,5—2 см в диам.; косточка плоская, крупнобородчатая. В лесах по рекам; только на юге Приморья (реки Майхе, Супутинка, Сучан) . . . . . 1. *P. sinensis* (Oliv.) Kom. — *П. китайская*, *Плоскосемянник*, *Колючая вишня* (табл. 95).

#### Род 30. ARMENIACA Mill. — АБРИКОС

1. Листья грубо двоякоостропиличатые; цветки светло-розовые, крупные, до 2,5 см в диам., на ясно выраженных, до 1 см дл., цветоножках; плоды опушенные, желтоватые, вполне съедобные; дерево до 10—12 (15) м выс. и 20—30 (40) см

Таблица 94



1 — *Rosa acicularis* Lindl. (Роза иглистая); 2 — *R. gracilipes* Chrsan. (Р. тонкожильчатая); 3 — *R. daurica* Pall. (Р. даурская); 4 — плод.

- в диам., с серой пробковой корой. На скалах и крутых склонах в дубяках; на юге Приморья (в бассейнах рек Лёфу, Шуфана, Сулутинки, Цимухе, Сучана, у оз. Хашка и др.) . . . 2. *A. manshurica* (Maxim.) Skvortz. — *A. маньчжурская*.
- Листья мелко зубчатые, с округлыми зубчиками; цветки до 2 см в диам., почти сидячие; плоды почти сухие, с очень тонким околоплодником; крупный куст или небольшое дерево. На сухих склонах; только по рекам Суйфуну и в Шуфану . . . . . 1. *A. sibirica* Lam. — *A. сибирский*.

# Сем. 65. LEGUMINOSAE Juss. — БОБОВЫЕ

1. Листья тройчатые или пятерные . . . . . 2.
- Листья непарно- или парно-перистые . . . . . 12.
2. Растения вьющиеся . . . . . 3.
- Стебли прямые, лежащие или приподнимающиеся . . . . . 5.
3. Крупные лавы с деревянистыми стеблями; листочки очень крупные, до 15 (17) см дл. . . . . Род 21. *Pueraria* DC. — *Пуэрария*.
- Однолетние травянистые растения; листочки более мелкие, до 4—5 см дл. . . . 4.
4. Листочки ромбовидно-овальные; цветки крупные, 1—1.5 см; цветоносы 1—4 см дл.; венчик белый или фиолетовый; бобы плоские, трехсемянные, с волосками только по шву; в паузах нижних листьев и на подземных побегах есть клейтогамные цветки, бобы которых более крупные, односемянные . . . . . Род 19. *Falcata* J. F. Gmel. — *Фальката*.
- Листочки овальные или эллиптические; цветки очень мелкие, 1—2 мм дл., фиолетовые; бобы с 3—7 семенами, заметно волосистые; подземных побегов с клейтогамными цветками нет . . . . . Род 20. *Glycine* L. — *Соя*.
- 5 (от 2). Цветки в скупенных головчатых соцветиях, белые, розовые, красные или желтые . . . . . Род 7. *Trifolium* L. — *Клевер*.
- Цветки в различных кистях, иногда укороченных . . . . . 6.
6. Листья пятерные с цельнокрайними листочками; цветки светло-желтые или желтовато-зеленые с оранжевым флагом и с клювовидно заостренной лодочкой . . . . . Род 8. *Lotus* L. — *Ляденец*.
- Листья тройчатые . . . . . 7.
7. Листья и стебли с сильным характерным запахом; цветки в длинных и узких кистях, мелкие, белые или желтые; бобы очень короткие, вздутые . . . . . Род 6. *Mellilotus* Adams. — *Донник*.
- Листья без особого резкого запаха . . . . . 8.
8. Цветки крупные, желтые, в крупной конической кисти; все тычинки свободные; листья длинночерешковые, листочки широкоэллиптические . . . . . Род 3. *Thermopsis* R. Br. — *Термопсис*.
- Цветки более мелкие, различной окраски, тычинки срощены нитями в трубку или же одна из них свободная . . . . . 9.
9. Боб плоский, одно- или двучленный, прилипает к одежде; цветки пурпурные или бледно-розовые, в редкой конечной кисти . . . . . Род 15. *Desmodium* Desv. — *Десмодиум*.
- Цветочные кисти укороченные; боб одно- или многосемянный, не клейкий . . . . 10.
10. Боб всегда односемянный, овальный или широкоовальный; цветки розовые, фиолетовые или белые с окрашенными жилками; однолетние или многолетние травы или кустарники . . . . . Род 16. *Lepedeza* Rich. — *Лепедеза*.
- Бобы обычно многосемянные, прямые или более или менее изогнутые, реже односемянные, но тогда почковидно свернутые; цветки синие, желтые, у гибридов зеленовато-желтые; однолетние и многолетние травы . . . . . 11.
11. Бобы прямые или немного изогнутые, с коротким носиком; цветки желтые или розовые; соцветие без общего цветоноса . . . . . Род 4. *Trigonella* L. — *Византизм*.
- Бобы сильно изогнутые (серповидные) или спирально закрученные, без носика; цветки синие, желтые или зеленовато-желтые; соцветие на общем цветоносе . . . . . Род 5. *Medicago* L. — *Люцерна*.
- 12 (от 1). Листья точечнорезчатые; соцветия пазушные, почти головчатые, цветки бледно-фиолетовые; бобы плоские, с крупными колотыми щетинками; крупные многолетники . . . . . Род 13. *Glycyrrhiza* L. — *Солодка*.
- Листья без точечных железок; бобы без щетинок . . . . . 13.
13. Все листья непарноперистые (каждый лист заканчивается листочком) . . . . 14.
- Листья парноперистые (заканчиваются усиком или лишником) или на том же растении часть листьев непарноперистая . . . . . 19.
14. Деревя; молодые листья и веточки с густыми серебристыми волосками, позднее исчезающими; листья с 3—4 парами листочков; верхние листочки супротивные или почти супротивные, нижние явно очерченные; цветки белые; все тычинки свободные . . . . . Род 2. *Maackia* Rupr. et Maxim. — *Маакия*.
- Растения травянистые . . . . . 15.

15. Травы с очень мощным корневищем; листочки узкие, плотные, цветки бледно-желтые, в кистях; боб с перстяками и острым конком, все тычинки свободные . . . . . Род 1. *Sophora* L. — *Содора*.
- Листочки менее плотные; корневище не такая мощная; тычинки срощены нитями в трубку . . . . . 16.
16. Растения с облиственными, более или менее прямыми стеблями . . . . . 17.

Таблица 95



*Princepia sinensis* (Oliv.) Kom. (Принсеция китайская, Плоскосемянник); а — кисточка.

- Растения без стеблей или же с очень короткими (1—5 см), наполовину погруженными в почву стеблями и несколькими безлистными цветоносами . . . . . 18.
17. Боб плоский, четковидный, с 2—3 чанками; листочки мелкие, яйцевидные или овальные; цветки розово-фиолетовые или же светло-желтые . . . . . Род 14. *Hedysarum* L. — *Копеечник*.
- Бобы без перстячек, цилиндрические, вздутые, деревянистые, кожистые или перепончатые, желобчатые на стороне, обращенной к лодочке; лодочка тупая, без носика; цветки белые, желтые, красные или синие . . . . . Род 11. *Astragalus* L. — *Астрагал*.



- 18 (от 16). Цветочные стрелки всего с 2—3 фиолетовыми цветками; чашечки густо-волосистые; боб линейно-цилиндрический, пушистый . . . . .  
 — Цветочные стрелки со многими цветками; цветки синие, фиолетовые, пурпурно-фиолетовые или желтые; боб желобчатый на стороне, обращенной к флагу фиолетовые . . . . . Род 12. *Oxytropis* DC. — Остролозючник.  
 19 (от 13). Кустарники; цветки желтые, одиночные, парные или скученные по 2—3; бобы прямые, висющие . . . . . Род 9. *Saragana* Lam. — Карагана.  
 — Травы; листья заканчиваются усиком или шишком . . . . . 20.  
 20. Цветки мелкие, синие, фиолетовые (изредка белые), в кистях понемногу, или же одиночные, пазушные; столбик шпигельный, с пучком волосков на конце . . . . . Род 17. *Vicia* L. — Вика.  
 — Цветки более крупные, охристо-желтые, пурпурные или сине-фиолетовые (очень редко белые), всегда в кистях понемногу; столбик плоский, с волосками только на нижней поверхности . . . . . Род 18. *Lathyrus* L. — Чина.

Род 1. *SOPHORA* L. — СОФОРА

Растение до 1 м выс.; листочки сверху темно-зеленые, снизу светлые, голые, до 5 см дл.; цветки желтовато-белые, бобы с перекатами, остроконечные. На сухих участках среди лугов и на песках по рекам . . . . .  
 . . . . . 1. *S. flavescens* Ait. — С. желтеющая (табл. 96, 2).

Род 2. *MAACKIA* Rupr. et Maxim. — МААКИЯ, АКАТНИК

Дерево со светло-коричневой закручивающейся корой; при распускании листья густо покрыты белыми шелковистыми волосками, взрослые листья голые, до 25—30 см дл., обычно с 3 парами листочков. По сырým участкам в лесах . . . . .  
 . . . . . 2. *M. amurensis* Rupr. et Maxim. — М. амурская (табл. 96, 1).

Род 3. *THERMOPSIS* R. Br. — ТЕРМОПСИС

Стебли до 40—80 см выс.; листья длинночерешковые, тройчатые, листочки крупные, широкоэллиптические, 3,7—7 см дл., 1,2—3,2 см шир.; соцветие конечное, кисть с желтыми цветками. На морских берегах . . . . .  
 1. *Th. lupinoides* (L.) Link, *Th. fabacea* (Pall.) DC., — Т. люпиновый, Т. бобовый.

Род 4. *TRIGONELLA* L. — ПАЖИТНИК

1. Цветки розовые, одиночные или в пазушных двух-трехцветковых кистях; боб двусемянный, с коротким, сильно загнутым носиком; верхние листочки широко-эллиптические или обратноовальные; стебли приподнимающиеся. Пока известен только на галечниках р. Сандуги (одни из самых нижних правых притоков р. Суйфуна) . . . . .  
 1. *T. gordelievii* (Kom.) Grossh., *Medicago gordelievii* Grossh. — П. Гордеева.  
 — Цветки желтые, в кистях по 3—12 (15); бобы дву-шестисемянные; стебли прямые, более или менее ветвистые . . . . . 2.  
 2. Цветки желтые, венчик с фиолетовыми жилками; кисти плотные, трех-четырёх-цветковые; боб дву-четырёхсемянный, плоский; листочки обратноййцевидные или обратноширокоййцевидные. На сухих каменистых склонах по Амуре . . . . .  
 Grossh., *Medicago ruthenica* Kosh. et Alish., p. p., под L. — П. Коржвинского.  
 — Цветки бледно-желтые, кисти с 5—12 (15) цветками; боб четырех-шестисемянный, плоский; листочки от округло-обратноййцевидных до продолговатоятромбических. В сухих лесах, у скал и россыпей . . . . .  
 . . . . . 3. *T. platycarpus* L., *Medicago platycarpus* Ldb. — П. плосколодный.

Род 5. *MEDICAGO* L. — ЛЮЦЕРНА

1. Маленький однолетник; стебли 40—50 см выс.; цветки желтые, очень мелкие; боб односемянный, почти сферичный. На сухих участках с обильной почвой, по грунтовым и железным дорогам, местами на выгонах . . . . .  
 — Многолетник; стебли до 60—80 (90) см выс.; цветки желтые или синие, более крупные; боб многосемянный . . . . . 2.  
 2. Цветки синие, темно-фиолетовые, реже голубые или почти белые; боб спирально закрученный. В посевах, культурное, часто дичает и встречается у дорог и по ж.-д. насыпям . . . . . 1. *M. sativa* L. — Л. посевная.



1 — *Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. (Маакия амурская, Акатник); а — боб;  
 2 — *Sophora flavescens* Ait. (Софора желтеющая), часть стебля с листом и плодами;  
 3 — *Lespedeza cyrtobotra* Michx. (Леспедеца плотная), лист; 4 — *L. bicolor* Turcz.  
 (Л. двухцветная), часть стебля с листьями.



- Цветки желтые, боб полулунный, серповидный. Заносное; по дорогам . . . . . 2. *M. falcata* L. — Л. серповидная.

В окрестностях Владивостока и в ряде других пунктов иногда встречается гибриды *M. sativa* L. × *M. falcata* L. с цветками от желтых, зеленовато-желтых и зеленых до темно-фиолетовых на одном растении и даже в одном соцветии.

#### Род 6. MELILOTUS Adans. — ДОННИК

1. Цветки бледно-желтые, в многоцветковых, рыхлых, длинных кистях; листья с резким своеобразным запахом. По рекам в их средней и нижней течении, преимущественно на песчано-галечниковых и иловато-песчаных отложениях и у до-  
рог . . . . . 1. *M. suaveolens* Ldb. — Д. ароматный.  
— Цветки белые, в более коротких кистях; листья с очень слабым запахом, без рас-  
пирания даже не пахнут. Заносное; у жилья и по рекам . . . . . 2. *M. albus* (L.) Desr. — Д. белый.

#### Род 7. TRIFOLIUM L. — КЛЕВЕР

1. Листья пятирелье . . . . . 2.  
— Листья тройчатые . . . . . 3.  
2. Листочки наиболее широкие в верхней трети или четверти. На скалах и обрывах  
у моря; на юге Приморья . . . . . 2. *T. pacificum* Bobr. — К. тихоокеанский (табл. 97, 1).  
— Листочки наиболее широкие в средней или нижней их части. В кустарниковых  
зарослях и на лесных лужайках . . . . . 1. *T. lupinaster* L. — К. люпиновидный (табл. 97, 2).  
3 (от 1). Небольшие однолетники с прямыми стеблями . . . . . 4.  
— Многолетники с прямыми или ползучими стеблями . . . . . 5.  
4. Цветки желтые, с голей чашечкой, в шаровидных, слегка удлиненных головках.  
Заносное; по дорогам и выгонам . . . . . 5. *T. campestre* Schreb. — К. полевой.  
— Цветки бледно-розовые; чашечки мохнато-волосистые, с длинными зубцами, пре-  
вышающими венчик. Заносное; у дорог и на выгонах; особенно под Владивос-  
током . . . . . 7. *T. arvense* L. — К. папешный.  
5 (от 3). Стебли ползучие, часто укореняющиеся; листья длинночерепковидные, голые;  
цветки белые. На лугах и выгонах, у дорог и на ж.-д. насыпях; заносное . . . . . 3. *T. repens* L. — К. ползучий, К. белый.  
— Стебли прямые или более или менее приподнимающиеся; цветки розовые или крас-  
ные, реже белые . . . . . 6.  
6. Цветки розоватые или почти белые; листочки обычно голые. В посевах и как оди-  
чающее на лугах, выгонах и у дорог . . . . . 4. *T. hybridum* L. — К. гибридный, К. розовый.  
— Цветки розовые, красные или лиловато-пурпурные (иногда встречаются единич-  
ные экземпляры с чисто белыми цветками); листочки более или менее опушен-  
ные. В посевах и как одичавший; представлен многими формами . . . . . 6. *T. pratense* L. — К. луговой, К. красный.


#### Род 8. LOTUS L. — ЛЯДВЕНЕЦ

Стебли лежащие или приподнимающиеся, 10—30 (40) см выс.; листья непарно-перистые, с 5 листочками; цветки крупные, венчик желтый, с оранжевым фла-гом; бобы цилиндрические, линейные, до 25—30 мм дл. Заносное; вблизи ле-  
систой дороги (станции Кангауз, Океанская) . . . . . 1. *L. corniculatus* L. — Л. рогатый.

#### Род 9. SARAGANA Lam. — КАРАГАНА

1. Листья с 4—7 парами листочков . . . . . 2.  
— Листья всего с 2 парами сильно сближенных листочков (из-за чего листья часто  
кажутся пальчато-сложными); листочки продолговато-обратноклиновидные,  
сверху блястящие, темно-зеленые; небольшой, около 1 м выс., кустарник.  
В лесах у скал, реже в долинах . . . . . 1. *C. ussuriensis* Pojark. — К. уссурийский (табл. 97, 3).  
2. Листочки с клиновидным основанием, от 4 до 8 пар; боб 20—45 мм дл.; кустарник  
1—1,5 м выс. В вистенных и смешанных лесах, на сухих склонах, у россыпей  
и скал, иногда в сырых ясеневниках на кочках . . . . . 2. *C. fruticosa* (Pall.) Bess. — К. кустарниковая (табл. 97, 4).

Таблица 97



1 — *Trifolium pacificum* Bobr. (Клевер тихоокеанский), часть стебля с листьями; 2 —  
*Lupinaster* L. (К. люпиновидный); 3 — *Saragana ussuriensis* Pojark. (Карагана ус-  
сурийская), часть облиственного стебля; 4 — *C. fruticosa* (Pall.) Bess. (К. кустари-  
ковая), часть стебля с листьями и плодами.



- Листочки с округлым основанием, от 4 до 6 пар; боб 35—60 (65) мм дл.; крупный куст или дерево до 4—5 м выс. В культуре во многих городах и населенных пунктах . . . . . 3. *C. arborescens* Lam. — К. древовидная, желтая акация.

# Род 10. GUELDESTAEDTIA Fisch. — ГЮЛЬДЕНШТЕДИЯ

Листья непарноперистые, с 5—9 парами продолговатых или ланцетных листочков; листочки 0.5—2.5 см дл. и до 7 мм шир., обычно волосистые; цветносов несколько, каждый с 2—4 пурпурными или фиолетовыми, крупными, 10—12 мм дл., цветками; боб пушистый. На сухих участках; пока известна только по Суйфу . . . . . 1. *G. pauciflora* Fisch. — Г. малоцветковая.


# Род 11. ASTRAGALUS L. — АСТРАГАЛ

- Однолетние, двулетние или многолетние травянистые растения . . . . . 2.
- Кустарничек или полукустарник до 50—60 см выс.; листья с 6—8 парами листочков; кисти головчато-зонтиковидные, пяти-восемьцветковые; венчик красно-лиловый; боб мохнатый. В сосисках и ливневичниках; в Амурской области . . . . . 10. *A. fruticosus* Pall. — А. кустарниковый.
- Однолетнее или двулетнее растение; стебли прямостоячие, до 50—65 см выс.; все растение более или менее опушенное; листочки пяти-девятипарные, 10—15 мм дл. и 3—6 мм шир.; цветки лилово-пурпурные; бобы торчат вверх, серповидно изогнутые. По речным галечникам; на юге Приморья (Хасанский район) . . . . . 5. *A. dahuricus* (Pall.) DC. — А. даурский.
- Растения многолетние . . . . . 3.
- Листочков 5—7 пар, голых или снизу по жилкам с волосками; стебли до 60 см выс.; цветки желтовато-белые; бобы поникающие, вздутые, перепончатые. В кустарниковых зарослях и по приречным дугам; в Амурской области . . . . . 2. *A. secundus* DC. — А. однобокий.
- Листочков 6—16 пар . . . . . 4.
- Стебли лежащие или приподнимающиеся; цветки пурпурные или синие; листочки 10—12 пар, сверху голые, снизу с редкими волосками; бобы прямостоячие, прямые, перепончатые. На сухих открытых склонах . . . . . 7. *A. adsurgens* Pall. — А. приподнимающийся.
- Стебли прямые, реже немного изогнуты лишь у основания; цветки белые или желтые . . . . . 5.
- Цветки белые; бобы продолговатые или продолговатояйцевидные; листочков 7—13 пар . . . . . 6.
- Цветки желтые; бобы короткие, плоские с боков или вздутые . . . . . 7.
- Завязь и бобы толые, продолговатояйцевидные; листочков 10—13 пар; длина листочка 20—40, ширина 5—15 мм. По берегам рек на песчаных и иловато-песчаных отложениях . . . . . 6. *A. schelichovii* Turcz. — А. Шелихова.
- Завязь и бобы прижатоловостные, продолговатые; листочков 7—10 пар, длина листочка 10—30 мм, шир. 5—12 мм. На скалах и песках морского берега . . . . . 9. *A. maritimus* Boriss. — А. приморский.
- (от 5). Бобы голые, с толстыми деревянистыми стенками, морщинистыми поперек, вздутые, 10—14 мм дл. и 4—5 мм шир.; листочков 8—13 пар. По берегам рек, в зарослях кустарников; по Амуру и на Сучане . . . . . 1. *A. chinensis* L. f. — А. китайский (табл. 98, 2).
- Бобы с прижатыми волосками или голые, плоские, перепончатые, или яйцевидные, без поперечных морщин . . . . . 8.
- Бобы почти сидячие, яйцевидные, 8—9 мм дл. и около 3 мм шир.; с изогнутым на верхушке носиком, обычно черноволосистые; листочков 6—16 пар. На сухих участках; по Амуру . . . . . 8. *A. inopinatus* Boriss. — А. неожиданный.
- Бобы плоские, перепончатые, на ножках, полуокруглые или полуовальные, 15—30 мм дл. и до 12 мм шир. . . . . 9.
- Чашечка с короткими зубцами, почти голая, волоски только на зубцах; цветки бледно-желтые. По сухим речным террасам и подножам склонов среди порослевых кустарников зарослей . . . . . 3. *A. membranaceus* Fisch. — А. перепончатый (Хуанчун (табл. 98, 1).
- Чашечка черноволосистая, с более длинными ланцетно-ланцетными зубцами; цветки желтые. В кустарниковых зарослях близ морского берега (бухта Дингити) и у верхней границы леса (гора Облачная), изредка по Амуру . . . . . 4. *A. propinquus* Schischk. — А. соседний.

# Род 12. OXYTROPIS DC. — ОСТРОЛОДОЧНИК

- Листочки в мутовках по 4; все растение опушено белыми волосками; цветки в плотной головке, пурпурно-фиолетовые; бобы вздутые, тонкоперепончатые. На песках; на берегу оз. Ханка . . . . . 5. *O. chankaensis* Jurtz., *O. oxyphylla* auct., non DC. — О. ханкайский.

Таблица 98



1 — *Astragalus membranaceus* Fisch. (Астрагал перепончатый): часть стебля с листьями и плодами, а — плод, вид со спинки; 2 — *A. chinensis* L. f. (А. китайский), часть стебля с листьями и плодами.

- Листочки парные или очередные . . . . . 2.
- Цветки бледно-желтые; бобы продолговатояйцевидные, вздутые; листочков 8—12 пар; все растение более или менее опушено. Скалы морского берега . . . . . 4. *O. sordida* (Willd.) Pers., *O. campestris* (L.) DC., p. p. — О. гимнонатый.
- Цветки синие или фиолетовые; листочков до 16 пар . . . . . 3.



3. Зрелые бобы голые (молодые мелко- и прижатоволосистые), 12—18 мм дл. и 4—5 мм шир.; листочки десяти-пятнадцатипарные, до 8 мм дл. и около 3 мм шир. На скалах и галечниках морского берега . . . . . 1. *O. mandshurica* Bge. — *O. маньчжурская*.
- Бобы более или менее опушенные; листочки восьми-пятнадцатипарные, до 15—30 мм дл. . . . . 4.
4. Взрослые растения слабо волосистые; листочков 9—12 пар, 7—15 (20) мм дл. и 2—3 (7) мм шир.; венчик фиолетово-пурпурный. На каменистых склонах и на песках; по Амуру . . . . . 2. *O. strobilacea* Bge. — *O. шишковидный*.
- Взрослые растения опушенные; листочков 8—15 пар, 15—30 мм дл. и 8—15 мм шир. По морскому побережью, на склонах . . . . . 3. *O. ruthenica* Vass. — *O. русский*.

#### Род 13. GLYCYRRHIZA L. — СОЛОДКА

Стебли мощные, до 100—120 см выс.; листья с 4—6 парами листочков; листочки 3—5 см дл. и 1—2 см шир., с мелкими точечными железками; цветки бледно-фиолетовые, в густых соцветиях; бобы скучены в почти шаровидные головки, с тонкими и длинными щипками. Пока известна только на оз. Ханка и под Хабаровском . . . . . 1. *G. pallidiflora* Maxim. — *C. бледноцветковая* (табл. 99, 1).

#### Род 14. HEDYSARUM L. — КОПЕЕЧНИК

1. Цветки светло-желтые . . . . . 2.
- Цветки фиолетово-розовые или розовые . . . . . 3.
2. Листья с 15—25 яйцевидными листочками; листочки 7—15 мм дл.; бобы двухтрехдольные. На известковых скалах; по р. Сучану . . . . . 2. *H. ussuriense* I. Schischk. et Kom. — *К. уссурийский* (табл. 99, 2).
- Листья с меньшим числом листочков, четырех-семипарные, листочки 20—25 мм дл.; бобы трех-семидольные. На сухих склонах; в Амурской области . . . . . 3. *H. dahuricum* Turcz. — *К. даурский* (табл. 99, 3).
- 3 (от 1). Стебли высокие, до 100—120 см выс.; листья с 5—9 парами листочков; бобы с 2—3 членниками, голые или прижатоволосистые, без окантовки или с очень узкой окантовкой. В горных лесах и по лугам; в Амурской области . . . . . 4. *H. affine* L. — *К. аляскинский*.
- Стебли более низкие, 15—25 см выс.; листья с 4—6 парами листочков; бобы с 3—5 членниками, на членниках, кроме волосков, есть короткие щипки. На сухих и каменистых участках; на Амуре . . . . . 4. *H. setigerum* Turcz. — *К. щетинистый*.

#### Род 15. DESMODIUM Desv. — ДЕСМОДИУМ

1. Листья тройчатые, листочки 7—9 см дл., 2—5 см шир.; цветки розовые; бобы однодольные. В хвойно-широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 1. *D. mandshuricum* (Maxim.) Nakai — *Д. маньчжурский* (табл. 100, 1).
- Листья непарноперистые, с 7 более крупными листочками, 6—14 см дл. и 2.5—5.5 см шир.; бобы однодольные. В широколиственных лесах; на самом юге Приморья; большая редкость; пока известно только из окрестностей Уссурийска и Владивостока (и-ов Песчаный) . . . . . 2. *D. oldhamii* Oliv. — *Д. Ольдэма* (табл. 100, 2).

#### Род 16. LESPEDEZA Rich. — ЛЕСПЕДЕЦА

1. Кустарники до 1.5—1.8 (3) м выс. . . . . 2.
- Однолетние и многолетние травянистые растения . . . . . 3.
2. Листочки на концах обычно закругленные, с очень тонким, коротким щипком (продольные главной жилки); соцветие раскидистое, негустое, венчик в 3 раза длиннее чашечки. Везде в дубниках и их производных . . . . . 1. *L. bicolor* Turcz. — *Л. двухцветная* (табл. 96, 4).
- Листочки на концах обычно более или менее выемчатые; соцветие плотное, пазушное; венчик только в 2 раза длиннее чашечки. В дубниках и порослено-кустарниковых зарослях; в Хасанском районе Приморского края . . . . . 2. *L. cytobotrya* Miq. — *Л. плотная* (табл. 96, 3).
- 3 (от 1). Однолетники с пазушными бледно-розовыми или фиолетово-розовыми цветками . . . . . 4.
- Многолетники с белыми или чуть желтоватыми цветками, часто с фиолетовыми полосками . . . . . 5.
4. Стебли часто с распростертыми ветвями, ветви с направленными вверх щетинистыми волосками; прилистники мелкореснитчатые; чашечка значительно меньше (в 3—4 раза) зрелого боба. По рекам, на песках и галечниках, по выгонам и

дорогам . . . . . 6. *L. stipulacea* Maxim. — *Куммеровия stipulacea* (Maxim.) Makino — *Л. прилистниковая* (табл. 101, 5).

— Стебли чаще прямостоячие, ветвистые, волоски на веточках направлены вниз; чашечка всего в 2 раза меньше боба или даже равна ему; прилистники крупно-

Таблица 99




1 — *Glycyrrhiza pallidiflora* Maxim. (Солодка бледноцветковая), часть стебля с листом и плодами; 2 — *Hedysarum ussuriense* I. Schischk. et Kom. (Копеечник уссурийский), то же; 3 — *H. dahuricum* Turcz. (К. даурский), то же.


реснитчатые. По берегам рек и выгонам; часто вместе с *L. прилистниковой* . . . . . 7. *L. striata* (Thunb.) Hook. et Arn. — *Куммеровия striata* (Thunb.) Schindl. — *Л. полосатая* (табл. 101, 4).

5 (от 3). Листочки узкие, ланцетно- или линейно-продолговатые. По речным галечникам и на сухих участках . . . . . 3. *L. hedysaroides* (Pall.) Kitag. — *Л. juncea* auct., non Pers. — *Л. копеечниковая* (табл. 101, 1).





1 — *Desmodium mandshuricum* (Maxim.) Nakai (Десмодиум маньчжурский), часть стебли с листьями и плодами; 2 — *D. oldhamii* Oliv. (Д. Ольдгема), часть стебли с листом.



1 — *Lespedeza hedysaroides* (Pall.) Kitag. (Деспедеза колючичкован); 2 — *L. dahurica* (Laxm.) Schindl. (Л. даурская); 3 — *L. tomentosa* (Thunb.) Sieb. ex Maxim. (Л. мохнатая); 4 — *L. striata* (Thunb.) Hook. et Arn. (Л. полосатая); 5 — *L. stipulacea* Maxim. (Л. прилистникован).

- Листочки более широкие, 1—2,5 см шир. . . . . 6.  
 6. Листья сверху гладкие, листочки продолговатые, 1,5—3 см дл. и 0,8—1,5 см шир.  
 На сухих склонах; по Амуре и на юге Приморья  
 4. *L. dahurica* (Lam.) Schindl., *L. trichocarpa* Pers. — Л. даурская (табл. 101, 2).  
 — Листья сверху коротковолосистые, немного блестящие, снизу сильно опушенные;  
 листочки более крупные, 3—5 см дл. и до 2—2,5 см шир. На сухих уча-  
 стках среди порослево-кустарниковых зарослей и по рекам на галечниковых  
 отложениях; только на юге Приморья (Хасанский район и в долинах рек Суд-  
 аухе, Суифуна и Сучана)  
 . . . . . 5. *L. tomentosa* (Thunb.) Sieb. ex Maxim. — Л. мохнатая (табл. 101, 3).

# Род 17. VICIA L. — ВИКА

1. Листья всего с 1 парой крупных листочков, почти сидячие; ось листа заканчи-  
 вается коротким шишком. В лиственных и смешанных лесах и кустарниковых  
 зарослях и иногда на разнотравных лугах; часто  
 . . . . . 1. *V. unijuga* A. Br. — В. однопарная.

Этот вид сильно варьирует, у нас пока найдены 2 разновидности: var. *ty-  
 rica* (Trautv.) Nakai с несколькими длинными, значительно превышающими  
 листья цветочными (Амурская область, Хабаровский край и большая часть  
 Приморского края) и var. *aroda* Maxim. с только верхушечными или же несколь-  
 кими и пауциными, очень короткими цветоносами и почти сидячими цветками  
 (юг Приморского края).


- Листья с несколькими парами листочков . . . . . 2.  
 2. Листья заканчиваются усиком . . . . . 3.  
 — Листья заканчиваются шишком . . . . . 13.  
 3. Цветки пауциные, одиночные или парные. Однолетники или двулетники . . . . . 4.  
 — Цветки в кистях. Многолетники, реже однолетники . . . . . 5.  
 4. Листочки трех-восьмипарные, 10—25 мм дл., 5—8 мм шир.; цветки одиночные  
 или парные, 20—26 мм дл., венчик розово-лиловый; бобы бурые, с нескручен-  
 ными створками. Заносное; в посевах и у дорог . . . . . 2. *V. sativa* L. — В. посевная.  
 — Листочки четырех-шестипарные, 15—20 мм дл. и 1,5—2,5 мм шир.; цветки оди-  
 ночные или парные, пурпурно-фиолетовые, 16—18 мм дл., бобы черные, створки  
 их скручиваются. Заносное; в посевах и у дорог . . . . . 3. *V. angustifolia* L. — В. узколистная.  
 5 (от 3). Листочки нижних и средних листьев заметно крупнее, чем верхних; со-  
 цветия верхушечные, близкие к сложной метелке. На сухих лугах среди кустар-  
 ников . . . . . 4. *V. pseudorobus* Fisch. et Mey. — В. ложночичиновая (табл. 102, 1).  
 — Листочки всех листьев более или менее одинаковые; соцветие чаще пауциное  
 (кисть) . . . . . 6.  
 6. Многолетники . . . . . 7.  
 — Однолетники; листочки четырех-восьмипарные, чаще линейные; цветоносы равны  
 листьям или чуть длиннее их; цветки мелкие, 3—4 (5) мм дл., в малочетковом  
 кистях; бобы плоские. Заносное; у дорог . . . . . 5. *V. hirsuta* (L.) S. F. Gray — В. волосистая.  
 7. Цветки по 2—4 в короткой пауциной кисти, почти сидячие, красно-фиолетовые  
 (реже грязно-голубые); листочки четырех-восьмипарные продолговатоэллипти-  
 ческие или продолговатоланцетные; бобы черные. Заносное; у дорог . . . . . 6. *V. sepium* L. — В. заборная.  
 — Цветки по 7—40 в более или менее длинных кистях . . . . . 8.  
 8. Стебли прямые, приподнимающиеся, обычно многочисленные, 20—45 см выс;  
 усики не ветвистые; листочки четырех-восьмипарные; цветки фиолетовые.  
 На сухих склонах; в Амурской области . . . . . 7. *V. multicaulis* Ldb. — В. многостебельная (табл. 102, 2).  
 — Стебли длинные, цепляющиеся; часть усиков или же все они ветвистые . . . . . 9.  
 9. Все прилистники зубчатые, крупные, листочки пяти-семипарные, с острием на  
 верхушке (иногда немного выемчатые); цветковые кисти с 10—20 цветками,  
 обычно густые; цветки ярко-красные или темно-фиолетовые, крупные, 12—  
 15 мм дл. На лугах и в кустарниковых зарослях; часто . . . . . 8. *V. amoena* Fisch. — В. приятная (табл. 102, 4).

Этот вид сильно варьирует.

- Прилистники верхних листьев тонкие, без зубчиков или же все прилистники  
 цельные . . . . . 10.  
 10. Листочки ланцетные, линейно-ланцетные или продолговатоэллиптические; при-  
 листники цельные; цветки лиловые, лиловато-фиолетовые или фиолетовые  
 (иногда белые) . . . . . 11.  
 — Листочки овально-эллиптические или яйцевидно-продолговатые; прилистники  
 двухраздельные, трехраздельные или ланцетные, у основания чаще с зубчи-

- ками; цветки бледно-фиолетовые или сине-фиолетовые, иногда чуть зеленоватые  
 (очень редко белые) . . . . . 12.  
 11. Все растение прижатое к земле; стебли до 100—120 см выс., сильно ребристые;  
 листочки продолговатоэллиптические. На лугах и среди кустарников по до-

Таблица 102



1 — *Vicia pseudorobus* Fisch. et Mey. (Вика ложночичиновая), часть стебля с листом и  
 соцветием; 2 — *V. multicaulis* Ldb. (В. многостебельная); 3 — *V. amoena* Fisch. (В. приятная), часть  
 стебля с листом; 4 — *V. japonica* A. Gray (В. японская), часть стебля с листом; 5 — *V. japonica* A. Gray (В. японская), часть стебля с листом; 6 — соцветие с незрелыми плодами и цветком; 7 — *V. amoena* Fisch. (В. приятная), часть  
 стебля с листом; 8 — *V. amoena* Fisch. (В. приятная), часть стебля с листом; 9 — *V. japonica* A. Gray (В. японская), часть стебля с листом; 10 — *V. japonica* A. Gray (В. японская), часть стебля с листом; 11 — *V. japonica* A. Gray (В. японская), часть стебля с листом; 12 — *V. japonica* A. Gray (В. японская), часть стебля с листом.


- ликам рек . . . . . 9. *V. macrophylla* (Maxim.) B. Fedtsch. — В. крупнолистная.  
 — Растение голое или слегка опушенное; стебли 30—150 см выс., обычно ветвистые,  
 ребристые; листочки линейно-ланцетные или продолговатоланцетные. На лу-  
 гах и среди кустарников, а местами в кустарниках и лиственных лесах; преимуще-  
 ственно в Амурской области . . . . . 10. *V. cracca* L. — В. мышиная, мышиный горошек.



- 12 (от 10). Листочки перепончатые или кожистые, с резко выделяющейся сетью жилок; цветочные кисти плотные, очень длинные, цветки мелкие, сине-фиолетовые или даже иногда чуть зеленоватые (очень редко чисто белые). Очень часто; в кустарниковых зарослях, по каменистым россыпям, на береговых обрывах и галечниках . . . . . 11. *V. amurensis* Oettl., *V. ussuriensis* Kom., non Oettl. — В. амурская (табл. 102, 3).
- Листочки тонкие; соцветие рыхлое, цветки более крупные, бледно-фиолетовые. В живых, на лесных полянках и у скал в лесу . . . . . 12. *V. japonica* A. Gray — В. японская (табл. 102, 5).
- 13 (от 2). Цветки охристо-желтые; часть листьев непарноперистые, заканчиваются листочком, остальные (на этом же растении) заканчиваются шишком; прилистники шиловидные, опадающие, листочки обратнояйцевидные. В дубовых и кедрово-широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 13. *V. subrotunda* (Maxim.) Czefl., *Lathyrus subrotundus* Maxim. — В. круглобачат.
- Цветки голубые или фиолетовые, изредка беловатые, все листья парноперистые, заканчиваются шишком; прилистники полустреловидные или яйцевидно-полустреловидные, не опадающие . . . . . 14.
14. Листочки линейные, ланцетно-линейные или ланцетно-эллиптические; прилистники цельнокрайные, полустреловидные . . . . . 15.
- Листочки яйцевидно-эллиптические; прилистники при основании зубчатые, яйцевидно-полустреловидные; стебли 50—100 см выс., многочисленные; цветки 11—13 мм дл., голубые или фиолетовые, изредка беловатые. В изреженных лесах и среди кустарников . . . . . 14. *V. ramuliflora* (Maxim.) Ohwi — В. разветвленная.
15. Листочки узкие, линейные или линейно-ланцетные. В лесах и на опушках; единично и небольшими группами . . . . . 15. *V. venosa* (Willd.) Maxim. — В. жилковатая.
- Листочки более широкие, ланцетно-эллиптические. В лесах; довольно часто . . . . . 16. *V. baicalensis* (Turcz.) B. Fedtsch. — В. байкальская.

## Род 18. LATHYRUS L. — ЧИНА

1. Листья заканчиваются усиком . . . . . 2.
- Листья заканчиваются шишком; прилистники полустреловидные; стебли крылатые; цветки пурпурно-фиолетовые. В смешанных и лиственных лесах; часто . . . . . 1. *L. komarovii* Ohwi, *L. alatus* (Maxim.) Kom., non Tenore — Ч. Комарова (табл. 103, 4).
2. Стебли более или менее крылатые . . . . . 3.
- Стебли не крылатые, округлые или острогранчатые . . . . . 5.
3. Стебли прямые, короткие, 25—45 см выс.; усики короткие, простые; листья с 1—3 парами почти голых листочков с ясно выделяющейся сетью жилок; цветки крупные, пурпурно-фиолетовые. На сухих лугах, ж.-д. насыпях и у дорог среди кустарников . . . . . 2. *L. quinqueveneris* (Miq.) Litv. — Ч. пятиверная (табл. 103, 1).
- Стебли приподнимающиеся, обычно более длинные, 35—60 см выс.; усики разветвленные; листья с 3—5 парами листочков . . . . . 4.
4. Все растение более или менее волосистое. На болотистых лугах и среди кустарниковых зарослей; часто . . . . . 3. *L. pilosus* Cham. — Ч. волосистая (табл. 103, 2).
- Все растение голое, более крупное. Заносное; у дорог; Владивосток, Уссурийск . . . . . 4. *L. palustris* L. — Ч. болотная.
- 5 (от 2). Листочки очень крупные, до 8 см дл. и 4.5—5 см шир.; прилистники большие, полустреловидные или полустреловидные; цветки до 2 см дл. желтые; бобы до 10 см дл., многосемянные; все растение очень крупное, до 1.5 м выс. В дубняках и кустарниковых зарослях; на юге Приморья и в Виробиджане . . . . . 5. *L. davidii* Hance — Ч. Давида.
- Листочки не длиннее 4.5 см; цветки иной окраски (не желтые); бобы не длиннее 3.5—4 см . . . . . 6.
6. Листья с 4 парой листочков; цветки пурпурно-красные; стебли острогранчатые. Заносное; на лугах и у дорог; в Судзхунском заповеднике (по р. Сяохэ) и в окрестностях Владивостока . . . . . 6. *L. tuberosus* L. — Ч. клубящая.
- Листочков (2) 3—5 пар . . . . . 7.
7. Прилистники очень крупные, до 2.5 см дл., похожие на листочки; стебли лежачие. На песках и галечниках морского берега и по ж.-д. насыпям . . . . . 7. *L. japonicus* Willd., *L. maritimus* auct., non Bigel. — Ч. японская, Ч. морская.
- Прилистники меньших размеров, всего 6—12 мм дл., стебли прямостоячие. В смешанных и лиственных лесах, в кустарниковых зарослях; часто . . . . . 8. *L. humilis* Fisch. — Ч. приземистая (табл. 103, 3).



1 — *Lathyrus quinqueveneris* (Miq.) Litv. (Чина пятиверная); 2 — *L. pilosus* Cham. (Ч. волосистая); 3 — *L. humilis* Fisch. (Ч. приземистая); 4 — *L. komarovii* Ohwi (Ч. Комарова).

Стебли вьющиеся, тонкие, с нитевидными подземными побегами у основания; листочки овальные или почти ромбовидные; клейстогамные цветки на подземных побегах, обычные в небольших трех-пятицветковых кистях; венчик крупный, до 10—12 мм дл., белый или бледно-фиолетовый; бобы плоские, обычно с 3 семенами. В лесах по долинам рек . . . . . 1. *F. japonica* (Oliv.) Kom. — Ф. японская (табл. 104, 1).

Род 20. *GLYCINE* L. — СОЯ

Стебли вьющиеся, тонкие; цветки мелкие, фиолетово-белые, около 5—7 мм дл.; бобы волосистые, с 3—7 семенами. Среди кустарников и по дугам . . . . . 1. *G. ussuriensis* Rgl. et Maack — С. уссурийская (табл. 104, 2).

На полях Приморья и Приамурья в массе возделывается культурная соя *G. hispida* (Moench) Maxim.

Род 21. *PUERARIA* DC. — ПУЕРАРИЯ

Деревянистая лиана до 5—7 м дл., с очень крупными тройчатыми листьями; листовые черешки 16—17 см дл.; доли листа 15—17 см дл. и 7—14 см шир.; растение с крупными розово-красными цветками и длинными, сильно волосистыми бобами. Пока найдена только на самом юге Хасанского района . . . . . 1. *P. hirsuta* (Thunb.) Schneid. — П. волосистая (табл. 105).

Сем. 66. *GERANIACEAE* Juss. — ГЕРАНИЕВЫЕ

1. Листья лопастные, трех-семираздельные, с зубчатыми или рассеченными долями; цветки по 1—2 на общем цветоносе; все 10 тычинок с пыльниками; при созревании придатки створок плодиков дугообразно изгибаются кверху . . . . . Род 1. *Geranium* L. — ГЕРАНЬ.

— Листья перистые; 5 тычинок с пыльниками, 5 без них; цветки собраны на общем пазушном цветоносе зонтиком; придатки створок плодиков при созревании закручиваются в спираль . . . . . Род 2. *Erodium* L'Hér. — Журавельник.

Род 1. *GERANIUM* L. — ГЕРАНЬ

1. Все листья трехраздельные или трехнадрезанные; стебли 30—60 см выс., лежачие или более или менее прямые; цветоносы двухцветковые, лепестки бледно-розовые, около 7 мм дл., едва превышают чашечку. В долинных лесах по берегам рек . . . . . 8. *G. wilfordii* Maxim. — Г. Вильфорта.

— Нижние стеблевые листья пяти-семираздельные . . . . . 2. Листья округло-почковидные, длинночерешковые, стеблевые до 5 см шир., пятираздельные; цветоносы двухцветковые; лепестки 5—7 мм дл., почти вдвое длиннее чашелистиков, розовые или бледно-лиловые. Заносное; во Владивостоке . . . . . 9. *G. rotundifolium* L. — Г. круглолистная.

— Нижние стеблевые листья иной формы — пятиугольные или пятиугольно-округлые . . . . . 3. Цветоносы обычно одноцветковые (очень редко двухцветковые), лепестки почти равны чашелистикам, 4—7 мм дл. и 2—3 мм шир., белые, чуть розоватые; нижние стеблевые листья пятилопастные, верхние трехлопастные. Заносное; по дорогам, выгонам и пашням . . . . . 10. *G. sibiricum* L. — Г. сибирская.


— Цветоносы двухцветковые; лепестки более крупные и всегда длиннее чашечки; нижние стеблевые листья пяти- или семидольные . . . . . 4.

— Нижние стеблевые листья пятираздельные, остальные трехраздельные . . . . . 5. — Нижние стеблевые листья семи-, частично пятираздельные, верхние пяти- или трехраздельные . . . . . 7.

5. Стебли и листовые черешки с длинными, отстоящими щетинистыми волосками, без бархатистого опушения; цветки около 3 см в диам., пурпурно-фиолетовые. В смешанных и дубовых лесах . . . . . 7. *G. maximoviczii* Rgl. et Maack — Г. Максимовича.


— Опушение бархатистое или из коротких, оттопренных волосков . . . . . 6.

6. Цветоножки в период цветения короче чашечки или равны ей, железистые; цветки до 4 см в диам., красновато- или голубовато-фиолетовые; цветет в мае—июне; листья надрезаны до половины, лопасти крупнозубчатые. В лесах, на опушках, прогалинах и среди кустарниковых зарослей . . . . . 4. *G. eriostemon* Fisch. — Г. волосистотычиниковая.



1 — *Falcata japonica* (Oliv.) Kom. (Фальката японская), верхняя часть стебля с листьями; 2 — *Glycine ussuriensis* Rgl. et Maack (Соя уссурийская), часть стебля с листьями и плодами; а — цветок.





*Pueraria hirsuta* (Thunb.) Schneid. (Пуерария волосистая), часть стебля с листом и незрелыми плодами.



1 — *Geranium vlassovianum* Fisch. ex Link (Герань Власова); 2 — *G. dahuricum* DC. (Г. даурская); 3 — *G. sieboldii* Maxim. (Г. Зибольда); 4 — *G. soboliferum* Kom. (Г. побегоносная); а — корневище с корнями.

- Цветопложки в период цветения длиннее чашечки или даже всего цветка, отклоненно-волосистые; цветки 3,5—4 см в diam., пурпурно-фиолетовые; цветет в июне—июле. На сырых лугах и в кустарниковых зарослях . . . . . 6. *G. Massovianum* Fisch. ex Link — Г. Власова (табл. 106, 4).
- 7 (от 4). Цветопложки в период цветения короче чашечки или равны ей, цветы покрыты простыми волосками (иногда примешиваются и железистые); цветки розовые или фиолетовые; цветет в мае—июне; нижние стеблевые листья пяти-семираздельные, надрезаны почти до основания, верхние трехраздельные; стебли и черешки почти голые. В лесах и на лугах; по Амуре и на севере Приморья . . . . . 5. *G. erianthum* DC. — Г. волосистоцветковая.
- Цветопложки в период цветения длиннее чашечки или всего цветка; нижние стеблевые листья семирассдельные, реже пятираздельные, большинство остальных пятираздельные . . . . . 8.
- 8. Нижние стеблевые листья чаще пятираздельные, рассеченные до основания; растение с подземными побегами; цветки фиолетово-красные. На сырых лугах и болотах; в Приморье . . . . . 2. *G. soboliferum* Kom. — Г. побегоносная (табл. 106, 4).
- Нижние стеблевые листья чаще семирассдельные; подземных побегов нет; цветки розовые, светло-лиловые или пурпурные . . . . . 9.
- 9. Листовые дольки узкие, трижды или двояко трижды рассеченные; цветки до 2 см в diam., пурпурные или розовые; чашелистики с 3 жилками. На сухих лугах . . . . . 1. *G. dahuricum* DC. — Г. даурская (табл. 106, 2).
- Листовые доли обратнойцелино-клиновидные, надрезанные; цветки 2,5—3 см в diam., светло-лиловые, чашелистики с 5 жилками. На сухих лугах и среди кустарников; преимущественно по Амуре . . . . . 3. *G. sieboldii* Maxim. — Г. Зибольда (табл. 106, 3).

#### Род 2. *ERODIUM* L'Hér. — ЖУРАВЕЛЬНИК

Листья двоякоперисторассдельные; все растение прижато пушистое, до 40—60 см выс.; цветки мелкие, фиолетово-лиловые или пурпурные. Заносное; по сырым местам и у дорог . . . . . 1. *E. cicutarium* (L.) L'Hér. — Ж. обыкновенный.

В Амурской области в 1964 г. был найден второй вид — *E. stephanianum* Willd., заносное.

#### Сем. 67. *OXALIDACEAE* Lindl. — КИСЛИЧКОВЫЕ

##### Род 1. *OXALIS* L. — КИСЛИЦА

- 1. Растения с надземными облиственными стеблями; цветки желтые . . . . . 2.
- Надземного облиственного стебля нет; цветки белые или белые с розово-фиолетовыми жилками, редко розовые . . . . . 3.
- 2. Растение одно- или двулетнее; листья с маленькими прилистниками; цветочные стрелки большей частью двуветвистые; коробочка прямо вверх стоящая, на опорочной ножке; стебли со стелющимися побегами. Заносное; в окрестностях Владивостока . . . . . 1. *O. corniculata* L. — К. розовая.
- Прилистников нет; растение многолетнее; коробочка на косе вверх стоящей ножке. Заносное; в окрестностях Владивостока и в некоторых пунктах Приморья . . . . . 2. *O. stricta* L. — К. торная.
- 3. Листочки крупные, обратнодельтовидные; прилистнички близ основания чашечки; цветки крупные, белые; коробочки длинно заостренные, цилиндрические. В смешанных черничных и кедрово-широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 4. *O. obtusifolia* Maxim. — К. обратнодельтовидная.
- Все растение меньших размеров; листочки обратносердцевидные; прилистнички несколько выше середины цветочной стрелки; цветки белые, с фиолетовыми жилками или розоватые; коробочки яйцевидные. Всюду; в хвойных и смешанных лесах . . . . . 3. *O. acetosella* L. — К. обыкновенная.

#### Сем. 68. *LINACEAE* Dumort. — ЛЬНОВЫЕ

##### Род 1. *LINUM* L. — ЛЕН

- 1. Растение многолетнее, с более или менее равномерно облиственными стеблями и крупными, ярко-лазоревыми цветками; коробочка почти шаровидная. На песках морского берега, на речных галечниках и сухих лугах помногу; местами в период цветения дает аспект . . . . . 1. *L. amurense* Alef. — Л. амурский.

- Растение однолетнее, с прутьевидными торчащими ветвями соцветия; цветки бледно-фиолетовые; коробочка шаровидная. На сухих щебнистых склонах, большей частью среди изреженных кустарниковых зарослей; одиночно или небольшими группами . . . . . 2. *L. stelleroides* Planch. — Л. прутьевидный.

#### Сем. 69. *RUTACEAE* Juss. — РУТОВЫЕ

- 1. Деревья с пробковой корой и непарноперистыми листьями . . . . . Род 1. *Phellodendron* Rupr. — Бархат.
- Травянистые многолетники с непарноперистыми листьями . . . . . Род 2. *Dictamnus* L. — Ясенец.

##### Род 1. *PHELLODENDRON* Rupr. — БАРХАТ

Двукомное дерево; листья со своеобразным сильным запахом, с 3—6 парами листочков; зуб ярко-желтый; цветки в метельчатых соцветиях, асеноватые, мужские с зачаточной завязью, женские со стаминаторами; плоды сочные, черные, шаровидные, ягодовидные (костянка с 5 косточками), несъедобные, с резким запахом. В долинах рек и на прилегающих частях склонов; пробковый, медонос и лекарственное растение . . . . . 1. *Ph. amurense* Rupr. — Б. амурский.

##### Род 2. *DICTAMNUS* L. — ЯСЕНЕЦ

Стебель прямой; листья с резким запахом, листочки с точечными железками; листовые черешки прижатые, проточная жилка крупная, до 20 см дл.; 7—9 ярко-розовыми или сиреневыми с пурпурными жилками цветками; цветки 2—2,5 (3) см в поперечнике, с сильным запахом, завязь пятичленная. Среди кустарниковых зарослей и в дубняках на склонах; ядовитое растение, может вызывать ожоги кожи . . . . . 1. *D. dasycarpus* Turcz. — Я. пушистолидный.

#### Сем. 70. *POLYGALACEAE* R. Br. — ИСТОДОВЫЕ

##### Род 1. *POLYGALA* L. — ИСТОД

- 1. Растение однолетнее; листовые черешки хорошо выражены; соцветие конечное; плодники наверху без выемки; развивается во второй половине лета. На сухих склонах среди кустарников; пока найден только близ устья р. Сидеи на юге Приморья . . . . . 1. *P. tatarinowii* Rgl. — И. Татарникова (табл. 107, 1).
- Растения многолетние; листья сидячие или почти сидячие; соцветия боковые, паузунные; плодники наверху с хорошо заметной выемкой . . . . . 2.
- 2. Стебли голые или почти голые, 25—30 (35) см выс.; листья узколанцетные, 2—3 см дл. и 0,5—1 мм шир. На остепненных склонах и сухих лугах . . . . . 2. *P. tenuifolia* Willd. — И. тонколистный (табл. 107, 2).
- Стебли коротко опушенные; листья более широкие, овальные, эллиптические или ланцетные . . . . . 3.
- 3. Листья эллиптические, овально-ланцетные или ланцетные, до 10 мм шир. сверху матовые; цветочные кисти длинные эллиптических веточек. На сухих лугах и среди кустарников . . . . . 3. *P. sibirica* L. — И. сибирский (табл. 107, 3).
- Листья эллиптические, яйцевидные или эллиптически-ланцетные, до 15 мм шир. сверху блестящие. На каменистых склонах; на юге Приморья . . . . . 4. *P. japonica* Houtt. — И. японский (табл. 107, 4).

#### Сем. 71. *EUPHORBIAEAE* Juss. — МОЛОЧАЙНЫЕ

- 1. Полукустарники с небольшими цветками, собранными в клубочки; плод трехгранный, трехгнездный; листья эллиптические, с мало заметными жилками . . . . . Род 1. *Securifera* Comp. — Секурифера.
- Травы . . . . . 2.
- 2. Растения с млечным соком; цветки однополые, однодомные, без околоцветника; окружены оберткой из широких зеленых листьев; вместо чашечки мясистые железки . . . . . Род 4. *Euphorbia* L. — Молочай.
- Растения без млечного сока; цветки с чашечкой . . . . . 3.
- 3. Листья черешковые; пластинка до 7 см дл., 3 см шир., по краям зубчатая; жесткие цветки в паузах крупных листовых веточек . . . . . Род 3. *Acalypha* L. — Акалифа.
- Листья сидячие, до 1 см дл., 0,5 см шир., цельнокрайные; цветки сидят в их пазухах . . . . . Род 2. *Phyllanthus* L. — Цистанет.



Сухие склоны

1. *S. suffruticosa* (Pall.) Rehd. — С. полустарая (табл. 108, 7).

## Род 2. PHYLLANTHUS L. — ЛИСТОЦВЕТ

Пески, береговые обнажения

1. *Ph. ussuriensis* Rupr. et Maxim. — Л. уссурийский (табл. 108, 2).

## Род 3. ACALYPHA L. — АКАЛИФА

Сорное . . . . . 1. *A. australis* L. — А. южная (табл. 108, 3).

## Род 4. EUPHORBIA L. — МОЛОЧАЙ

1. Приземистый однолетник с супротивными, мелкими, до 1 см дл., листьями. Пески, отмели, сорное . . . . . 1. *E. humifusa* Willd. — М. приземистый.  
Как заносное по дорогам указывался еще *E. maculata* L., отличающийся от предыдущего опушенными плодами. В последнее время не находится.
2. Многолетники с очередными или мутовчатыми листьями . . . . . 2.
2. На бесплодных побегах листья очередные, на плодущих мутовчатые; растение с очень мощным, толстым корневищем. Сухие леса, склоны . . . . . 2. *E. komaroviana* Prokh. — М. Комарова.
3. Все листья (кроме оберток) очередные . . . . . 3.
3. Листья оберточки треугольные, крупные, до 2,5 см шир., 2 см дл.; стеблевые листья небольшие, малочисленные; придатки железок удлинненно-шиловидные. Леса . . . . . 3. *E. savargyi* Kiss — М. Савари.
4. Листья оберточки овальные или почковидные, более мелкие; придатки железок короткие . . . . . 4.
4. Корневище утолщенное, значительно толще стебля; листочки оберточки овальные; растение волосистое, реже голое. Леса . . . . . 4. *E. lucorum* Rupr. — М. рошечный.
5. Корневище тонкое, ползучее, почти такой же толщины, как и стебель; листочки оберточек шире, более или менее почковидные . . . . . 5.
5. Листья к основанию более или менее закругляющиеся, плотные, блестящие; коробочка шаровидная. Пески . . . . . 5. *E. mandshurica* Maxim. — М. маньчжурский.
6. Листья к основанию длинно клиновидно суженные, не столь плотные; коробочка овальная. Леса, склоны . . . . . 6. *E. discolor* Ldb. — М. двухцветный.


На песках у оз. Хапка растёт *E. chankaana* Worosch., отличающийся от близкого *E. discolor* более широкими и плотными, многочисленными листьями и шаровидными семенами с мраморным рисунком (а не яйцевидными, одноцветными, как у *E. discolor*).

На сухих склонах по Гуйфунгу встречается растение, похожее на *E. cyarissias* L., с узколинейными, почти нитевидными листьями.


## Сем. 72. CALLITRICHACEAE Link. — ВОДЯНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ, БОЛОТНИКОВЫЕ

## Род 1. CALLITRICHES L. — ВОДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА, БОЛОТНИК

1. Листья прозрачные, темно-зеленые, линейные, однонервные, к основанию слегка расширяющиеся; плоды до 5,5 мм в диам., по краю широко окрылены; растения всегда погруженные в воду. В озерах и старицах . . . . . 1. *C. autumnalis* L. — В. з. осенняя.
2. Листья не прозрачные, светло-зеленые или зеленые, часто погруженные в воду, частью в виде плавающих надводных розеток, чаще с 3 нервами, обычно лопатчатые, реже линейные, почти однонервные, суженные к основанию; плоды узкокрылатые или даже совершенно бескрылые . . . . . 2.
2. Растение с совершенно бескрылыми плодами, подводное, с вытянутыми междоузлиями или с плавающей розеткой, или плазменое, с укороченными стеблями. На мочажинах и сырых местах . . . . . 3. *C. subanceps* V. Petr. — В. з. неясная.
3. Плоды крылатые, хотя бы только на верхушке; растения, погруженные в воду, плавающие, или плазменные . . . . . 3.
3. Плоды окрыленные по всему краю; рыльца до 3 мм дл. и равны плодам . . . . . 1. *C. elegans* V. Petr. — В. з. изящная.




1 — *Polygala tatarinowii* Rgl. (Исход Татарникова); 2 — *P. tenuifolia* Willd. (И. тонколистный); 3 — *P. sibirica* L. (И. сибирский); 4 — *P. japonica* Houtt. (И. японский).



1 — *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. (Секуринег полукустарная);  
a — плод (семя); 2 — *Phyllanthus ussuriensis* Rupr. et Maxim. (Листоцвет уссурийский); 3 — *Acalypha australis* L. (Акалифа южная), часть стебля с листьями и цветками.

— Плоды окрылены, главным образом в верхней части; рыльца очень короткие, до 1 мм дл. По берегам рек и в мочажинах на лугах; Тернейский район . . . . . 2. *C. fallax* V. Petr. — В. з. сомнительная.



1 — *Empetrum nigrum* L., s. l. [Шикша (Водяника) черная]; 2 — *Ilex rugosa* Fr. Schmidt (Остролист морщинистый).

### Сем. 73. EMPETRACEAE S. Gray — ШИКШЕВЫЕ

#### Род 1. EMPETRUM L. — ШИКША, ВОДЯНИКА

Небольшой вечнозеленый кустарничек с длинными, ползучими, очень тонкими деревянистыми ветвями; листья линейные, в сухом состоянии с тонким, приятным запахом; цветки невзрачные, розоватые или темно-красные, раздельно-



полые или обоополые, плод ягодовидный, сочный, водянистый, съедобный, черный. На гольцах, а на севере также на болотах и обрывах морского берега . . . . . 1. *E. nigrum* L., s. l. — III. черная (табл. 109, 1).

## Сем. 74. AQUIFOLIACEAE DC. — ОСТРОЛИСТОВЫЕ

### Род 1. ILEX L. — ОСТРОЛИСТ

Небольшой ползучий кустарник с вечнозелеными морщинистыми широко-ланцетными листьями; цветки мелкие, белые, пауциные, одиночные или по 2—3; плод сочный, ягодообразный, с 4 косточками, красный или красновато-бурый. В темнохвойных елово-шиповых лесах, у нас пока известен только в бассейне р. Хора (весьма обичен на о. Сахалине и Южных Курилах) . . . . . 1. *I. rugosa* Fr. Schmidt — О. морщинистый (табл. 109, 2).

## Сем. 75. CELASTRACEAE R. Br. — БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

1. Листья супротивные; кустарники или небольшие деревья . . . . . Род 1. *Euonymus* L. — Бересклет.  
— Листья очередные; лианы с выходящими или лазающими стеблями . . . . . Род 2. *Celastrus* L. — Краснопустырник.


### Род 1. EUONYMUS L. — БЕРЕСКЛЕТ

1. Стебли с крыльями или без них; кустарник 1—1.5 м выс.; цветки четырехмерные, мелкие, зеленоватые или зеленовато-белые; коробочка развешена до основания, обычно только с 1, реже с 2 почти свободными, раскрывшимися одногнездными долями; семена сплошь покрыты ярко-красной кроветвой. По долинам рек, ручьев, в дубняках и кустарниковых зарослях, особенно под скалами и по краям россыпей в зоне кедрово-широколиственных лесов . . . . . 2. *E. sacrosanctus* Koidz., *E. alata* Kom., по Thunb. — Б. священный, Б. крылатый (табл. 110, 4).  
— Стебли всегда без крыльев; кустарники и небольшие деревья; цветки четырех- или пятимерные; коробочки из 4 или 5 сросшихся долек . . . . . 2.  
2. Ветви с бородавками; цветки темно-пурпурные; 5—8 мм в diam.; коробочка грушевидная, 3—10 мм дл., глубокочетырёхлопастная; семена черные, до половины покрыты оранжевой кроветвой. В широколиственных, кедрово- и елово-широколиственных лесах . . . . . 3. *E. pauciflorus* Maxim. — Б. малоцветковый (табл. 110, 3).  
— Ветви без бородавок; листья голые или с редкими волосками; цветки четырех- или пятимерные, зеленовато-белые или чуть желтоватые; семена светлые, более или менее желтоватые, сплошь покрыты окрашенной кроветвой . . . . . 3.  
3. Листья заметно кожистые; цветки четырехмерные, беловатые, с темно-пурпурными пыльниками; коробочка шаровидно-грушевидная, слегка лопастная; крупный куст, около 2 м выс., редкое небольшое дерево до 4—4.5 м выс. и 15 см в diam. По долинам рек и на прилегающих чистых склонах, особенно на островах по большим рекам (Амур, Уссури и др.), по берегам озер и по морскому побережью . . . . . 1. *E. maackii* Rupr. — Б. Маака (табл. 110, 2).  
— Листья более или менее плотные, но не кожистые; цветки четырех- или пятимерные; коробочка с хорошо выраженными крыльями . . . . . 4.  
4. Листья неравномерно бахромчато-пильчатые с вырезанно-зубчатыми зубцами, наиболее широкие в нижней части листа; коробочка обычно пятигнездная, с короткими (не превышающими половины гнезда), слегка опушенными крыльями; крупный кустарник или дерево до 3—3.5 м выс. и 5 см в diam. В лесу, преимущественно у морского берега . . . . . 4. *E. maximowiczianus* Prokh., *E. sachalinensis* Kom., по Maxim. — Б. Максимовича (табл. 110, 1).  
— Листья равномерно пильчатые, с прижатymi зубцами, наиболее широкие в верхней части листа; коробочка четырехлопастная, с длинными, слегка приподнятыми крыльями; небольшое дерево, до 3—3.5 м выс. и 4—10 (12) см в diam. В смешанных хвойно-широколиственных лесах, чаще у скал, россыпей и у ключей . . . . . 5. *E. macropterus* Rupr. — Б. большерукий.

### Род 2. CELASTRUS L. — КРАСНОПУСТЫРНИК

1. Листья зубчатые, светло-зеленые, тонкие; прилистники в виде крючкообразных колючек, с помощью которых растение плотно прикрепляется к коре дерева; лазающая лиана, до 10—12 м дл. и 3—5 см в diam. По долинам рек, в уреме, реже под скалами . . . . . 2. *C. flagellaris* Rupr. — К. плетевидный (табл. 111, 2).

Таблица 110



1 — *Euonymus maximowiczianus* Prokh. (Бересклет Максимовича); 2 — *E. maackii* Rupr. (Б. Маака); 3 — *E. pauciflorus* Maxim. (Б. малоцветковый); 4 — *E. sachalinensis* Koidz. (Б. священный, Б. крылатый); а — побег с листьями, б — отрезок побега с листом и частью плода.

- Листья крупнородчато-пильчатые, кожистые, желто-оливковые, прилистники реснитчатые; стекопая или выходящая длина до 10—15 м дл. и до 10—15 см в диам. По морскому берегу у скал и россыпей и по рекам, впадающим в море (Сучан, Сухае, и др.); только на юге Приморья . . . . . 1. *C. orbiculata* Thunb. — К. круглолистный (табл. 111, 1).

По листьям и стеблям с первого взгляда начинающими может быть ошибочно принят за активию.

## Горобуе — неаритос

Сем. 76. ACERACEAE Lindl. — КЛЕНОВЫЕ

### Род 1. ACER L. — КЛЕН


1. Листья сложные, из 3—5 листочков . . . . . 2.
- Листья простые, более или менее лопастные . . . . . 3.
2. Листья из 3 более или менее одинаковых листочков, осенью краснеют; цветки обоевые, цветет в общественном состоянии; крупное дерево, до 20—25 м выс. и 50—60 см в диам. По рекам; в южной половине Приморского края . . . . . 8. *A. manshuricum* Maxim. — К. маньчжурский (табл. 112, 4).
- Листья из 3—5 листочков, средний из которых заметно крупнее, осенью желтеют; двудомное дерево, цветет до распускания листьев. Широко распространен в культуре (родина Северная Америка) . . . . . *A. negundo* L. — К. ясенелистный, К. американский.
- 3 (от 1). Листья крупные, 10—15 (17) см дл. и 7—17 см шир., обычно с 3 (очень редко 5) слабо развитыми, вытянутыми в узкое остроконечие лопастями; кора зеленая или (у старых деревьев) зеленовато-серая, гладкая; дерево (10—12 (15) м выс. и до 30 (35) см в диам., часто образует поросль. В смешанных лесах . . . . . 6. *A. tegmentosum* Maxim. — К. зеленокорый, К. «каппа» (табл. 112, 1).
- Листья иной формы, с хорошо развитыми лопастями (3—11), обычно не длиннее 9 см; кора серая, желтоватая, трещиноватая или шелушащаяся, или же на молодых побегах гладкая, красноватая или зеленая . . . . . 4.
- Листья трехлопастные, сверху темно-зеленые, лоснящиеся; крупный куст или же небольшое дерево. По долинам рек в их нижнем и среднем течении . . . . . 3. *A. ginnala* Maxim. — К. приречный (табл. 113, 3).
- Листья пяти- или более лопастные . . . . . 5.
- Листья округлые, обычно девяти-, реже семи-одинадцатичастичатолопастные; цветки пурпурные, в небольших стебельчатых малоцветковых щитках; небольшое дерево, до 6—8 (10) м выс. и 20—30 (40) см в диам. В смешанных и широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 5. *A. pseudosibaldianum* (Pax) Kom. — К. ложносибирский (табл. 112, 3).
- Листья обычно пяти-, реже семиллопастные; цветки желтые или желто-зеленые . . . . . 6.
- Лопастни листьев обычно цельнокрайние, реже с отдельными крупными, негравильными зубцами . . . . . 7.
- Лопастни листьев более или менее равномерно зубчатые . . . . . 8.
- Лопастни листа короткие, более или менее резко переходящие в острие; дерево. Пока найден только на южном Амуре (обычен на Сахалине и Южных Курилах) . . . . . 1. *A. pictum* Thunb. — К. красный.
- Листовые лопастни более длинные и постепенно переходят в остроконечие; дерево до 15—16 (24) м выс. и 40—50 (70) см в диам. В широколиственных и смешанных лесах; часто . . . . . 2. *A. mono* Maxim. — К. мелколистный, К. моно (табл. 112, 2).

На юге Приморья представлен несколькими разновидностями, на что следует обратить внимание при сборах.

- 8 (от 6). Листья снизу бархатисто опушенные; цветки мелкие, в узкой, густой, коло-совидной метелке, во время цветения торчащей вверх; кора старых деревьев шелушащаяся, почему местное население и называет этот вид клен-береза; дерево до 5—7 (14) м выс., иногда крупный куст. В ельниках у ручьев и рек и по краям россыпей и у скал, изредка по горным рекам спускается в зону широко-широколиственных лесов . . . . . 4. *A. ukurundense* Trautv. et Mey. — К. желтый, К. укундский (табл. 114).
- Листья голые или опушенные только по жилкам; цветки в малоцветковых щитках или в простых редких кистях. Двудомные деревья или кустарники . . . . . 9.
- Листья светло-зеленые, обычно пятилопастные, почти одноцветные; молодые побеги зеленые, реже красноватые; цветки в малоцветковых щитках; крылатки крупные, до 3,5 см дл., с ребристо-ячеистыми орешками; крупный куст, до 4—5 м выс. В широколиственных и смешанных лесах; часто . . . . . 9. *A. belyiense* Maxim. — К. борейский (табл. 113, 1).
- Листья сверху ярко-зеленые, снизу светлые, обычно семиллопастные, на красноватых черешках; крылатки 2—2,5 см, орешки с тонкими жилками; небольшое

дерево, 4—5 (7) м выс. и 15—20 (25) см в диам. В горных смешанных лесах; только на самом юге Приморья . . . . . 7. *A. komarovii* Rojark. — К. Комарова (табл. 113, 2).

Таблица 111




1 — *Celastrus orbiculata* Thunb. (Краснопольный круглолистный); а — побег с листьями и цветками, б — цветок. 2 — *C. flagellaris* Rupr. (К. плетистый).

Сем. 77. BALSAMINACEAE A. Rich. — БАЛЬЗАМИНОВЫЕ


### Род 1. IMPATIENS L. — НЕДОТРОГА, БАЛЬЗАМИН

1. Крупное, до 1,5—2 м выс., растение с мутовчатыми или супротивными листьями до 6—12 см дл. и 2—4 см шир., листьями остролиственными, со стебельчатыми железками при основании; цветки лилово-розовые, с очень коротким шпорцем. Одинаково в больших количествах в окрестностях Владивостока . . . . . 6. *I. roylei* Walp. — П. Ройля.





1 — *Acer tegmentosum* Maxim. (Клен зеленокорый, Клен-елица); 2 — *A. mono* Maxim. (К. мелколистный); лист; 3 — *A. pseudoboldianum* (Rox) Kom. (К. ложноабольдов); 4 — *A. mandshuricum* Maxim. (К. маньчжурский); а — лист, б — плод.



1 — *Acer barbinerve* Maxim. (Клен бородачатый); а — плод, б — лист, вид сверху, в — часть листа, вид с нижней стороны; 2 — *A. komarovii* Rojark. (К. Комарова); а — лист, вид сверху, б — часть листа, вид с нижней стороны; 3 — *A. ginnala* Maxim. (К. приречный); а — плод, б — лист.

- Растения меньших размеров, с очередными листьями и желтыми, лиловыми или только клейстогаммными зелеными цветками . . . . . 2.
- 2. Листья мелкие, 7—10 мм дл. и 6—8 мм шир., с крупными, редкими зубцами; самые верхние с более частыми зубцами; цветки мелкие, зеленые, пока известны только клейстогаммные; коробочки маленькие, 2—3 мм дл. В лесах по берегам доручья; пока известны всего из одного местонахождения на юге Приморья (долина р. Таха, на перевале) . . . . . 5. *I. komarovii* Robed. — Н. Комарова.
- Листья более крупные, обычно 2—10 (13) см дл.; цветки крупные, желтые или лиловые . . . . . 3.
- 3. Листья тупозубчатые; цветки желтые, шпорец прямой или согнутый вниз крючком . . . . . 4.
- Листья крупные, неровнопильчатые или зубчато-зубчатые; цветки лиловые или бледно-лиловые, со спирально закрученным или загнутым вниз шпорцем . . . . . 5.
- 4. Листья 5—10 см дл., снизу зеленые, крупно туповато-зубчатые; цветки крупные, 2,5—3 см дл., повислые, лимонно-желтые, с оранжевыми или красноватыми пятнами в аэре; шпорец загнутый крючком вниз. Всюду; в лесах по оврагам, ручьям и рекам . . . . . 1. *I. poliflorum* L. — Н. обыкновенная.
- Листья 2—3,5 см дл., снизу синие, крупнозубчатые; цветки более мелкие и без пятен в аэре; шпорец почти прямой. По берегам рек и ручьев . . . . . 2. *I. maackii* Hook. — Н. Маака.
- 5 (от 3). Цветки 1—2 см дл., с длинным, тонким улиткообразно свернутым шпорцем. По рекам и лесным ручьям; на юге Приморья; часто . . . . . 3. *I. furcillata* Hemsl. — Н. вильчатая.
- Цветки более крупные, 3—4 см дл.; шпорец толстый, загнутый вверх или же улиткообразно свернутый. По лесным ручьям; на самом юге Приморья; редко . . . . . 4. *I. textori* Miq. — Н. Текстора.

## Сем. 78. RHAMNACEAE Juss. — КРУШИНОВЫЕ

## Род 1. RHAMNUS L. — КРУШИНА, ЖОСТЕР


- 1. Листья широкоовально-ромбические, реже обратноййцевидные; мякоть плодов фиолетово-черная; крупный, до 2—2,5 м выс., раскидистый куст с колючими ветвями. На сухих участках речных долин, в дубняках и порослево-кустарниковых зарослях . . . . . 3. *Rh. diamantifera* Nakai — К. диамантская.
- Листья продолговато-овальные, овальные, эллиптические или ланцетные; мякоть плодов желто-зеленая . . . . . 2.
- 2. Листья плотные, сверху темные, глянцевитые; ветки заканчиваются колючкой; крупный куст, реже небольшое дерево. По долинам больших рек . . . . . 2. *Rh. ussuriensis* J. Vassil. — К. уссурийский.
- Листья сверху матовые, менее плотные; ветви заканчиваются крупной почкой; небольшое дерево, 6—10 (12) м выс. и 10—12 (20—25) см в диам. По речным долинам и прилегающим скалам . . . . . 1. *Rh. dahurica* Pall. — К. даурская.

## Сем. 79. VITACEAE Juss. — ВИНОГРАДОВЫЕ

- 1. Соцветие удлиненно-метельчатое; сердцевина двулетних побегов коричневая; цветки обычно раздельнополюе; кора отслаивается длинными полосами, у старых растений почти черная; ягода крупная, черно-синяя . . . . . Род 1. *Vitis* Tournef. — Виноград.
- Соцветие цитковидно-метельчатое; сердцевина двулетних побегов белая; цветки обоеполюе; кора не отслаивается, серая или светло-коричневая; ягода более мелкая, белая, зеленоватая, голубая или фиолетовая . . . . . 2.
- 2. Усики короткие, на конце с дисковидно-расширенными присосками; лазящие по скалам морского берега и деревьям лианы; ствол до 5 см в диам.; кора сильно борозчатая, опробковевшая. Только в Хасанском районе . . . . . Род 3. *Parthenocissus* Planch. — Девичий виноград.
- Усики длинные, на конце прямые, без присосок; ствол всего 1—1,5 см в диам.; с более или менее гладкой корой . . . . . Род 2. *Ampelopsis* Michx. — Виноградопник.

## Род 1. VITIS Tournef. — ВИНОГРАД

Листья самой различной формы, большей частью округлые, сердцевидные или широко-сердцевидные, трех-пятилопастные, иногда почти без долей или же, наоборот, рассеченные почти до основания или с очень глубокими выемками различной формы; листья сверху темные, морщинистые, иногда слегка досыхающиеся, снизу более светлые, голые или с рассеянным опушением; крупная



*Acer ukurundense* Trautv. et Mey. (Клен желтый, К. укурунденский).



лиана, поднимающаяся по стволам деревьев до 20—23 м. По долинам рек, ключам, окраинам каменистых россыпей в широколиственных и смешанных лесах; часто . . . . . 1. *V. amurensis* Rupr. — В. амурский (табл. 115, 1).

Таблица 115

Род 2. *AMPELOPSIS* Michx. — ВИНОГРАДОВНИК

1. Листья чаще дланевидные, с более или менее перистонадрезанными верхушечными листочками и общим прерывисто-окрашенным черешком или же частью очень глубоко трех-пятилопастные; небольшая лиана, до 2—3 м, с очень оригинальными клубневидными корнями; стебли часто обматывают почти до основания, на сухих речных террасах, а также у скал и каменистых россыпей; только на юге Приморья (по Суйфуну и в Ханкайском районе) . . . . . 1. *A. japonica* (Thunb.) Makino — В. японский (табл. 115, 3).
- Листья иной формы (без окрыленной оси) . . . . . 2.
2. Листья различной формы, часть из них неглубоко трехлопастные, часть же глубоко трех-пятилопастные, выемки между лопастями округлые или почти округлые; молодые побеги пурпурно-опушенные или голые; небольшая лиана, до 1 см в диам. У скал и каменистых россыпей, близ моря; только на юге Приморья . . . . . 2. *A. heterophylla* (Thunb.) Sieb. et Zucc. — В. разнолиственный (табл. 115, 4).
- Листья с 3, реже 5 лопастями, выемки между которыми острые, реже листья цельные; побеги более или менее опушенные (жестковолосистые), более молодые желто-красные, позднее темно-серые; небольшая лиана. У скал и на каменистых россыпях; только в Приморском крае . . . . . 3. *A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. — В. короткопесточковый (табл. 115, 2).


Род 3. *PARTHENOCESSUS* Planch., *Quinaria* Raf. — ДЕВУШНИЙ ВИНОГРАД

Листья бесплодных побегов различной формы, от округлояйцевидных до трехлопастных или почти трехлопастных; у плодущих побегов листья сердцевидно-треугольные, плотные, блестящие; плоды синева-черные, с восковым налетом. По скалам морского берега; только на юге Хасанского района . . . . . 1. *P. tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. — Д. в. триостенный.

Сем. 80. *TILIACEAE* Juss. — ЛИПОВЫЕ

Род 1. *TILIA* L. — ЛИПА

1. Листья крупные, 8—10 см шир., округлояйцевидные, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу белые, густо опушенные звездчатыми волосками; молодые побеги покрыты густым белым войлоком; цветки всегда со стаминодиями; плоды крупные, 8—10 (12) мм дл. . . . . 2.
- Листья меньших размеров, 4—7 см шир., снизу голые или с рыжеватым опушением, главным образом по жилкам; молодые побеги голые или с мохнатым рыжим войлоком; стаминодии чаще отсутствуют; плоды меньших размеров . . . . . 3.
2. Листья одношершневые, прицветный лист сидячий, доходит до основания цветоноса; плоды шаровидные; дерево до 15—18 (20) м выс. и до 60—70 (80) см в диам.; цветет в конце июля, местами цветение заканчивается в августе. В смешанных лесах . . . . . 1. *T. mandshurica* Rupr. et Maxim. — Л. маньчжурская (табл. 116, 2).
- Листья двух-трехшершневые, прицветный лист на черешке, не достигает основания цветоноса; плоды эллипсоидальные или обратнояйцевидные; дерево до 15 м выс. В смешанных лесах на более сухих участках и в Приморье . . . . . 4.
3. Листья с 10—25 цветками с широко расставленными цветоножками; цветоносы под небольшим углом . . . . . 5.
4. Листья с 10—25 цветками; плоды слабо продолговатые; листья яйцевидные, 5—7 см дл., неглубоко сердцевидные; дерево до 20 м выс., молодые веточки с восковым блестящим налетом. В лесах; Приморье и Приамурье . . . . . 3. *T. divaricata* Ig. Vassil. — Л. раскидистая.
- Листья с 10—25 цветками; плоды почти шаровидные или шаровидно-яйцевидные; листья широкояйцевидные, 5—6 см дл.; небольшое дерево. Пока найдена только в Приморье (Ляпичев и Шамакова) . . . . . 4. *T. mongolica* Maxim. var. *austrorussiensis* Ig. Vassil. — Л. монгольская (южнорусская).
5. Листья с 10—25 цветками; плоды продолговатые, прицветный лист продолговатый, прикрепленный на 3 см выше основания цветоноса; листья яйцевидные, 6—9 см дл. и 5—8 см шир., снизу голые или с очень редкими, единичными звездчатыми волосками; в углах жилок бороздки простых и звездчатых рыжих волосков; плоды почти грушевидные; цветет во второй и третьей декаде июля;



1 — *Vitis amurensis* Rupr. (Виноград амурский); а — лист, б — соцветие, в — кисть плодов; 2 — *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. (Виноградовник короткопесточковый); а — лист, б — соцветие, в — кисть плодов, г — семя; 3 — *Vitis japonica* (Thunb.) Makino (В. японский), лист; 4 — *Vitis heterophylla* (Thunb.) Sieb. et Zucc. (В. разнолиственный), лист.

- крупное дерево. В широколиственных и смешанных лесах . . . . . 5. *T. komarovii* Ig. Vassil. — Л. Комарова.
- Станиндовиден нет . . . . . 6.
6. Листья снизу с хорошо выраженным опушением из рыжих звездчатых волосков; молодые веточки с густым рыжим опушением; позднее опушение сохраняется в углах жилок, соцветие трех- или пятичленное; плоды шаровидные; цветет в конце июля — начале июля; крупное дерево. В смешанных кедрово-широколиственных и елово-широколиственных лесах, чаще по склонам . . . . . 8. *T. taquetii* Schneid. — Л. Таке.
- Листья снизу толстые или только с бороздками волосков в углах жилок; веточки толстые (лишь самые молодые с шелковистым белым опушением, вскоре исчезающим) . . . . . 7.
7. Соцветие рыхлое, плоды шаровидные, гладкие; листья округлые или широко-эллиптические, 4,5—7 см дл. и почти такой же ширины; цветет в июле; крупное дерево. В широколиственных и смешанных лесах, в долинах и на прилегающих склонах . . . . . 7. *T. amurensis* Rupr. — Л. Амурская (табл. 116, 1).
- Соцветия и соплодия компактные; плоды грушевидные, гладкие или слегка ребристые; цветет в июле; дерево, в бесплодном состоянии почти не отличающееся от Л. амурской. Пока найдена только на юге Приморья (Хасанский район) . . . . . 8. *T. koreana* Nakai — Л. корейская (табл. 116, 3).

Дальневосточные липы часто образуют гибриды, что еще более затрудняет их правильное определение. Липы — лучшие и исключительно ценные медоносы, и точное определение их особенно важно при решении вопроса о выборе видов для культуры и определения для различных районов сроков вывоза пчел. Весьма желательно липы собирать в гербарий в фазе цветения и с тех же экземпляров вторично с плодами. Здесь липы даны нами в трактовке И. В. Васильева. Большинство лесоводов и пчеловодов различают пока только три липы: маньчжурскую (позднюю) — *T. mandshurica* Rupr. et Maxim., s. l., амурскую (раннюю) — *T. amurensis* Rupr., s. l. и Таке (среднюю) — *T. taquetii* Schneid.

#### Сем. 81. MALVACEAE Juss. — МАЛЫВОВЫЕ


1. Листья до основания трехраздельные, с перистораздельными долями; цветки крупные, бледно-желтые, с темно-фиолетовыми пятнами; плод — коробочка с многосемянными гнездами . . . . . Род 3. *Hibiscus* L. — Гибискус.
- Листья цельные или более или менее лопастные (но не разрезанные); плод — сложная листовка или же он дробный, распадающийся на 8—16 односемянных плодиков . . . . . 2.
2. Листья сердцевидно-округлоовальные, остроколючие, бархатистые; цветки желтые; плод — сложная листовка . . . . . Род 2. *Abutilon* Adams. — Канатник.
- Листья с 5 лопастями, толстые или слабо опушенные; цветки белые, розовые или пурпурные; плод дробный, распадающийся на односемянные плодики . . . . . Род 1. *Malva* L. — Просвирник.

#### Род 1. MALVA L. — ПРОСВИРНИК

1. Лепестки крупные, в 3—4 (5) раз длиннее чашечки, пурпурные или светло-фиолетовые (при сушке часто темнеющие); стебли высокие, 1—1,5 (2) м выс., прямые, одиночные; листья с 5 тупыми лопастями. Запасное; у населенных пунктов; редко . . . . . 1. *M. mauritiana* L. — П. мауританский.
- Лепестки мелкие и не более чем в 2 раза превышают чашелистики; стебли чаще многочисленными, обычно ветвистые; листья с дельтовидными или слабо выраженными лопастями . . . . . 2.
2. Растение 35—100 (150) см выс., с прямыми или приподнимающимися стеблями; листья длинночерешковые, почти округлые, с дельтовидными или широко-треугольными лопастями; лепестки бледно-пурпурные или краснопатые, в 1,5—2 раза превышающие чашечку. Запасное; в населенных пунктах . . . . . 3. *M. mobilensis* Downar — П. мобилевский.
- Растение 15—40 (50) см выс., с тонкими, прямыми, приподнимающимися или стелющимися стеблями; листья почковидные, со слабо выраженными или круглыми лопастями; лепестки белые (при сушке немного синееющие). По уламкам сел; часто . . . . . 2. *M. pusilla* Smith — П. низкий.

#### Род 2. ABUTILON Adams. — КАНАТНИК

Стебель прямой, чаще не ветвящийся или ветвящийся лишь в верхней части, 20—120 (150) см выс.; цветки одиночные или в кистевидно-метельчатом соцветии, светло-желтые; плодики мохнатые, односемянные, с 3—9 семенами, вверх заостренные. Изредка культивируется; встречается по сорным местам и у дорог . . . . . 1. *A. theophrasti* Medic. — Р. Теофраста.



1 — *Tilia amurensis* Rupr. (Липа амурская): а — цветок, б — плод; 2 — *T. mandshurica* Rupr. et Maxim. (Л. маньчжурская): а — лист, б — соцветие с прицветным листом, а — плод; 3 — *T. koreana* Nakai (Л. корейская); 4 — *T. pekinensis* Rupr. (Л. пекинская): а — плоды с прицветным листом, б — лист.



Растение 5—60 (75) см выс.; стебли чаще ветвистые; листья сверху голые, реже с отдельными простыми щетинками, снизу более бледные, с 2—3 колючими щетинками и звездчатыми волосками. Сорное по улицам населенных пунктов . . . 1. *H. trionum* L. — Г. тройчатый.

Сем. 82. *ACTINIDIACEAE* Hutch. — АКТИНИДИЕВЫЕРод 1. *ACTINIDIA* Lindl. — АКТИНИДИЯ

1. Побеги темные, красновато-коричневые; почки совершенно скрыты под корой; листья тонкие, матовые, немного неравнобокие, к началу цветения концы их становятся ярко-белыми, позднее розовеют; зрелые плоды зеленые, сладкие, с толстыми продольными полосами и сухой, остающейся при плодах чашечкой; лиана около 2 см в диам., реже до 4—5 см, возвышающаяся вверх по деревьям до 12—15 м или стелющаяся по камням, или у верхней границы в горах в виде небольшого, до 1 м выс., почти прямо стоящего, сильно ветвистого куста; цветет в июне. В лесах у скал . . . 1. *A. kolomikta* Maxim. — А. коломикта, «кишмиш», «изюм» (табл. 117, 3).
- Побеги светло-серые или буровато-коричневого-серые; почки более или менее заметные . . . 2.
2. Побеги буровато- или коричневатого-серые, верхняя часть почки выдается наружу; листья толстые, рабобные, по в живом виде с сильным отливом, в период цветения частично с белыми концами; зрелые плоды ярко-оранжевые, с носиком и зеленой чашечкой, часто горько-жгучие; чашечка при плодах зеленая; небольшая лиана до 2—3 см в диам. и до 4—6 м дл.; цветет в июле. Только на самом юге Приморья . . . 4. *A. polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim. — А. полигамная, «перчик», «перек», «горький кишмиш» (табл. 117, 2).
- Побеги светло-серые; почки не выдаются наружу; листья плотные, кожистые или даже более толстые, всегда зеленые (без белых концов); зрелые плоды темно-зеленые, сладкие, без продольных полос; чашечка при плодах не сохраняется . . . 3.
3. Листья плотные, голые или с редкими щетинистыми волосками, сверху темные, зеленые, блестящие, снизу светлые; плоды крупные, разноточной формы; самая крупная в СССР лиана, 10—15 (18) см в диам., поднимающаяся по стволам до 20—25 м. В смешанных лесах; на юге Приморья . . . 2. *A. arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. — А. аргута, А. острая, «кишмиш» (табл. 117, 1).
- Листья тонкие, обычно с густыми щетинистыми волосками по жилкам; плоды одиночные, эллипсоидальные, 3—4 см дл. и 1.9—2.3 см шир.; крупная лиана, очень похожая на *A. arguta*. Только в Приморье . . . 3. *A. giraldii* Diels — А. Джардальди.

Сем. 83. *GUTTIFERAE* Juss. — ЗВЕРОБОЙНЫЕ

1. Лепестки розовые, тычинок 9 (в 3 пучках), столбиков 3 . . . Род 1. *Triadenum* Raf. — ТРИДЕЗЕНИИ.
- Лепестки желтые, тычинки многочисленные (в 5 или 3 пучках), столбиков 3—5 . . . Род 2. *Nyctegium* L. — ЗВЕРОБОЙ.


Род 1. *TRIADENUM* Raf. — ТРИДЕЗЕНИИ

Болота . . . 1. *T. japonicum* (Blume) Makino — Т. японский (табл. 118, 3).

Род 2. *NYCTEGIUM* L. — ЗВЕРОБОЙ

1. Цветки очень крупные, 4—8 см в поперечнике, в малоцветковых соцветиях; столбиков 3; тычинки в 5 пучках; стебли четырехгранные . . . 2.
- Цветки средних размеров, ров, не более 2 см в поперечнике, в многоцветковых соцветиях; столбиков 3; тычинки в 3 пучках; стебли круглые, с 2 возвышенными линиями или без них . . . 3.
2. Цветки 6—8 см в поперечнике; чашелистики округло-яйцевидные, на конце тупые или . . . 1. *N. ascyron* L. — 3. большой (табл. 118, 1).
- Цветки 4—5 см в поперечнике; чашелистики уже, на конце слегка остроятые; столбики равны завязи. Луга . . . 2. *N. goberi* Ldb. — 3. Геллера.

Зацветает на месяц раньше *N. ascyron*.



1 — *Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. (Актинидия аргута, А. острая, «кишмиш»); а — лист, б — плоды разной формы; 2 — *A. polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim. (А. полигамная, «перчик», «горький кишмиш»); а — лист, б — плоды разноточной формы; 3 — *A. giraldii* Diels (А. коломикта, «кишмиш», «изюм»); а — лист, б — плод.

- 3 (от 1). Стебли с 2 возвышенными линиями и с черными ясласками. Кустарники, склоны . . . 3. *H. attenuatum* Choisy — 3. оттянутый (табл. 118, 2).  
 — Стебель гладкий, без возвышенных линий и без черных точек . . . 4. *H. kamschaticum* Ldb. — 3. камчатский.  
 Имеющиеся указания на его нахождения в Приморском крае сомнительны, по-видимому, они должны быть отнесены к *H. attenuatum*.

Таблица 118

Сем. 84. ELATINACEAE Dum. — ПОВОЙНИЧКОВЫЕ, ЕЛАТИНОВЫЕ


Род 1. ELATINE L. — ПОВОЙНИЧЕК

1. Лепестков и тычинок по 3, чашелистиков 2; семена дугообразно согнутые; стебли сильно ветвистые. Илстые берега водоемов . . . 1. *E. triandra* Schult. — П. трехтычиночный.  
 — Чашелистиков и лепестков по 4, тычинок 8; семена прямые; стебель ползучий, маловетвистый. Иловатое дно водоемов; редко . . . 2. *E. orthosperma* Dweben — П. прямосемянный.

Сем. 85. VIOLACEAE Batsch. — ФИАЛКОВЫЕ

Род 1. VIOLA L. — ФИАЛКА


1. Листья глубоко надрезанные до выемчато-перистонадрезанных или же разделены на узкие доли . . . 2.  
 — Листья обычно цельнокрайние, горччатые или зубчатые . . . 5.  
 2. Листья перистораздельные; цветки сине-фиолетовые, цветоножки с линейно-ланцетными прилистниками, расположенными посредине или немного выше середины. На сухих участках; редкости; пока собрана только в окрестностях г. Уссурийска и в Амурской области . . . 24. *V. incisa* Turcz. — Ф. надрезанная.  
 — Листья глубоко пальчаторассеченные или разделенные . . . 3.  
 3. Листовых долей 5, цельных, неправильно зубчатых, с короткими черешочками; цветки крупные, 1,5—2 см дл., синие, с бородками в нижней части лепестков. На сухих скалистых склонах в дубняках, кедровниках, сосновых и лиственничных лесах . . . 27. *V. dactyloides* Roem. et Schult. — Ф. пальчатая (табл. 119, 1).  
 — Листовые доли большей частью рассеченные . . . 4.  
 4. Листья трехраздельные, с двурассеченными боковыми долями, дольки зубчатые, глубоко надрезанные или рассеченные; цветки крупные, фиолетовые или беловатые. На сухих каменистых склонах; пока известна только на юге Приморья (р. Сидим, г. Уссурийск, Ханкайский район) . . . 26. *V. saevophylla* (Rgl.) W. Beck. — Ф. бутеневидная.  
 — Листья глубоко перистораздельные на 8—9 долей; цветки светло-фиолетовые, а также на скалах и оштетненных участках по Амгуну . . . 30. *V. dissecta* Ldb. — Ф. рассеченная.  
 5 (от 1). Растения с облиственным стеблем; цветоножки выходят из пазух листьев . . . 6.  
 — Облиственных стеблей нет; цветоножки выходят из верхушки корневища . . . 19.  
 6. Листья продолговато-узкотреугольные, со слабо сердцевидным или почти стреловидным основанием; черешки в верхней части слабо окрыленные; цветки мелкие (9—16 мм), бледно-фиолетовые, с темно-фиолетовыми полосками на низшем лепестке. На сырых лугах и в низинах по берегам рек . . . 29. *V. raddeana* Rgl. — Ф. Радде.  
 — Листья иной формы, чаще сердцевидные или почковидные (основание не стреловидное) . . . 7.  
 7. Стебли лежачие или приподнимающиеся . . . 8.  
 — Стебли прямые, 5—40 (45) см выс. . . 10.  
 8. Растение с облиственными плетевидными побегами, образующимися летом; стебли прилистниками; прикорневые листья на длинных черешках, сердцевидно-округлые, неглубокогорччатые; цветки в пазухах прикорневых листьев, беловатые, по-видимому, клейстогамные цветки . . . 25. *V. U. Beck.* — Ф. амурская (см. также ступень 31).  
 — Растение с настоящими облиственными стеблями; цветки на концах стеблей или же в пазухах стеблевых листьев . . . 9.  
 9. Стебли тонкие, слабые, чаще восходящие, по 1, реже по несколько, до 15—20 см выс., обычно с 2—3 междоузлиями; прикорневые листья (2—3) на длин-



1 — *Hypericum ascyron* L. (Зверобой большой); а — верхняя часть стебля с листьями и цветком, б — плод; 2 — *H. attenuatum* Choisy (3. оттянутый); 3 — *Triadenum japonicum* (Blume) Makino (Трихелезия японская); а — плод, б — цветок в разрезе.




- них, тонких черешках, широкопочковидные или округлые, стеблевые широко-яйцевидные; цветки бледно-желтые или лимонно-желтые, по 1—2; шпорец очень короткий. Тулара, альпийские дуга и кустарники, а также в хвойных и лиственных горных лесах . . . . . 31. *V. biflora* L. — Ф. двухцветковая.
- Стебли ложные или приподнимающиеся; прикорневые листья округлые, с неглубоко сердцевидным основанием, на длинных черешках; стеблевые близки к треугольно-сердцевидным, на более коротких черешках; цветки на длинных цветоножках, мелкие, белые, с коротким шпорцем. В долинных лесах рек и ручьев и на сырых лугах . . . . . 28. *V. verzeunda* A. Gray — Ф. скромная, Ф. дуговая (табл. 120, 6).
- 10 (от 7). Стебли более или менее равномерно облиственные . . . . . 11.
- Стеблевые листья мало и они находятся у верхушки стебля (часто как бы мутовчатые) . . . . . 16.
11. Стебли в период цветения почти не превышают листьев прикорневой розетки . 12.
- Стебли значительно превышают листья прикорневой розетки, чаще же прикорневой розетки нет вовсе . . . . . 13.
12. Прилистники 3—5 мм дл., широкие, зубчатые, листья округлые, широкосердцевидные, по краю городчатые; прицветников 2, шпильчатых (несколько выше средин цветоножки); цветки синева-лиловые или фиолетово-лиловые, 12—17 мм дл. На сухих склонах; по Амуре . . . . . 4. *V. rupestris* F. W. Schmidt — Ф. скальная.
- Прилистники яйцевидно-ланцетные или эллиптические, до 1 см дл., длиннобромчатозубчатые; цветки бледно-фиолетовые, до 2 см дл. В лесах на склонах . . . . . 2. *V. sachsianensis* Boissieu — Ф. сахалинская.
- 13 (от 11). Прилистники крупные, листовидные, равные или почти равные по длине листовому черешку, крупные и остроиззубчатые или же несколько короче листового черешка, глубоко перистонадрезанные . . . . . 14.
- Прилистники не превышают половины длины черешка, реже несколько длиннее половины, почти цельнокрайные или же с несколькими зубцами различной величины; цветки 1.5—2.5 см дл., голубые или фиолетовые, реже беловатые. По Амуре; в лесах, среди кустарников и на лугах . . . . . 8. *V. montana* L. — Ф. горная.
14. Прилистники равны или почти равны по длине листовому черешку, крупно- и остроиззубчатые; листья яйцевидные, с сердцевидным основанием, городчатозубчатые, верхние обычно более или менее жестковолосистые; цветки крупные, 1.3—2.5 см шир.; прицветники в верхней части цветоножек. В лесах и на лугах, на морских и речных берегах; на юге Приморья . . . . . 7. *V. austro-ussuriensis* Kom. — Ф. южноуссурийская.
- Прилистники глубоко перистонадрезанные, по длине короче листового черешка . . . . . 15.
15. Листья яйцевидные или широкояйцевидные, на верхушке несильно приостренные, неглубоко городчатые или городчатозубчатые, прилистники средних листьев по длине около  $\frac{1}{2}$  листового черешка; цветки 1—1.5 см дл., бледно-голубые, реже беловатые. В долинных лесах, особенно по берегам рек; часто . . . . . 5. *V. acuminata* Ldb. — Ф. приостренная (табл. 119, 4).
- Листья яйцевидные или продолговатояйцевидные, на верхушке длинно приостренные, городчатозубчатые или почти пильчатые; прилистники средних листьев всего около  $\frac{1}{3}$  длины листового черешка; цветки 0.8—1.3 см дл. По берегам рек; на юге Приморья . . . . . 6. *V. turczaninowii* Juz. — Ф. Турчаннинова.
- 16 (от 10). Цветки светло-фиолетовые, крупные, до 2—2.5 см дл., первые появляются в паузах прикорневых листьев на длинных цветоножках; стебли до 20—30 см выс., с 1—2 цветками в паузах верхних листьев, эти цветки на очень коротких цветоножках; прикорневые листья длинночерешковые, крупные, почковидные или широкопочковидные. В лиственных и смешанных лесах на склонах . . . . . 2. *V. brachysepalis* Maxim. — Ф. короткочашелистниковая.
- Цветки желтые, все в паузах верхних стеблевых листьев . . . . . 17.
17. Стеблевые листья с короткими черешочками или почти сидячие . . . . . 18.
- Стеблевые листья на длинных черешках, прикорневые листья (1—3) крупные, зубчатогородчатые; листья и стебли опушенные; цветки крупные, одиночные или по 2, до 2—2.5 см дл. и 3—3.5 см шир., золотисто-желтые, с темными жилками. В лесах по ручьям; на юге Приморья . . . . . 34. *V. muchlodtii* Kiss — Ф. Мюхльдорфа.
18. Все стеблевые листья сближенные (как бы мутовчатые), от неглубоко городчатозубчатых до почти цельнокрайных; цветки желтые, с бурными жилками, до 2—3 см дл., по 1—2. По сухим лесным склонам; в массе; на юге Приморья . . . . . 33. *V. orientalis* (Maxim.) W. Bckr. — Ф. восточная (табл. 120, 1).
- Нижний стеблевой лист отставлен от верхних на хорошо развитом черешке; края всех листьев крупно и мелкозубчатые; цветки чаще по 1, реже по 2, крупные, до 3 см, желтые. В смешанных и лиственных лесах и кустарниковых зарослях,



1 — *Viola dactyloides* Roem. et Schult. (Фиалка пальчатая); 2 — *V. variegata* Fisch. (Ф. нестран); лист; 3 — *V. collina* Bess. (Ф. холмовая); 4 — *V. acuminata* Ldb. (Ф. приостренная).

- а также на лугах и по берегам рек и ручьев; в Амурской области . . . . . 35. *V. uniflora* L. — Ф. одностебельная.
- 19 (от 5). Листовые черешки, хотя бы в верхней части, крылатые . . . . . 20.
- Листовые черешки бескрылые . . . . . 21.
20. Листья с очень короткими черешками, лопатовидные или продолговатоэллиптические, к основанию суженные, почти цельнокрайние или малозаметно мелкогородчатые; цветки темно-фиолетовые, 0,8—1,2 см дл.; прицветники длинные, посредине волосистых цветоножек. В сухих смешанных и лиственных лесах, на сухих лугах и дюнах; по Амуру и у оз. Ханка . . . . . 23. *V. gmeliniana* Roem. et Schult. — Ф. Гмелина.
- Листовые черешки более длинные и пластинки листа шире всего близ основания . . . . . 21.
21. Листья с обрубленным или же слабосердцевидным основанием, веясно городчатые или почти цельнокрайние; цветки белые, 0,8—1,5 см дл. На сырых болотистых лугах и среди кустарников по долинам рек . . . . . 21. *V. patrinii* Ging. — Ф. Патрина (табл. 120, 5).
- Основания листьев клиновидные, сердцевидные или стреловидные; цветки обычно фиолетовые, синие, розовые, редко беловатые . . . . . 22.
22. Край листьев явно городчатые; цветки темно-фиолетовые, реже белые, с фиолетовым шпорцем, 1,2—2 см дл. На сухих лугах, а также по морским и речным берегам . . . . . 19. *V. prionantha* Bge. — Ф. зубчаточетковая.
- Край листьев слабо и неясно городчатые в их нижней части или же почти цельнокрайние . . . . . 23.
23. Основания листьев явно сердцевидные . . . . . 24.
- Основания листьев округленные или усеченные, или же листья сужены в черешок . . . . . 26.
24. Маленькое, до 6 см выс., растение; у цветущих растений обычно 2 листа на длинных слабокрылатых черешках, позднее число листьев увеличивается до 5—6; цветки мелкие, около 8 мм, беловатые; шпорец очень короткий; коробочка сравнительно крупная, до 6 мм дл. В лиственных лесах и на скалах по берегам рек; по Амуру . . . . . 10. *V. brachyeras* Turcz. — Ф. короткошпорецкая.
- Растения более крупные, до 10 (12) см выс., с красно-фиолетовыми, реже беловатыми цветками 1—2,2 см дл., с более или менее длинным шпорцем . . . . . 25.
25. Листья на длинных, узко окрыленных черешках; цветки 1—1,7 см дл., беловатые, чашелистики совершенно толстые, шпорец изогнут вверх, боковые лепестки без бороздок. На скалах и горных склонах; на юге Приморья . . . . . 15. *V. pacifica* Juz. — Ф. тихоокеанская.
- Листовые черешки широко окрыленные, чашелистики по краю реснитчато-волосистые; цветки темно-красно-фиолетовые, 1,2—2,2 см дл.; боковые лепестки с бороздками; шпорец до 8(9) мм дл., тонкий. На сухих каменистых склонах . . . . . 14. *V. rhaissensis* Maxim. — Ф. льскоподный.
- 26 (от 23). Листья на окрыленных или в верхней части широко окрыленных, длинных черешках, яйцевидно-ланцетные, с наибольшей шириной в нижней части, при основании закругленные, усеченные или высвистно резко суженные в черешок, опушенные; цветки крупные, 1,5—2,3 см дл., на очень длинных, превышающих длину листьев цветоножках, фиолетовые, с темными полосками; боковые лепестки с бороздками; шпорец толстый, бледный; коробочка на конце заостренная. На сухих лугах, в кустарниковых зарослях и на горных склонах . . . . . 22. *V. mandshurica* V. Bkr. — Ф. маньчжурская (табл. 120, 4).
- Листья на узко окрыленных черешках, треугольно-яйцевидные, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, с усеченным и внезапно клиновидным основанием; цветки более мелкие, 1,4—1,8 см дл., синево-фиолетовые или фиолетовые, изредка белые; боковые лепестки почти без бороздок; шпорец тонкий, темноокрашенный; коробочка с крючковатым носиком. Сухие луга и пески по берегам рек . . . . . 20. *V. alisoviana* Kiss — Ф. Алисовой.
- 27 (от 19). Черешки листьев с густыми оттопыренными белыми волосками; листья продолговато-яйцевидные, неглубоко или же глубокосердцевидные; листья городчатые; цветки крупные, 2—2,5 (3) см дл., розовые или красно-розово-фиолетовые. На сухих лугах и среди кустарников; только на самом юге Приморья . . . . . 16. *V. hirtipes* S. Moore — Ф. волосисточерешковая.
- Черешки листьев голые, коротковолосистые или бархатистые . . . . . 28.
28. Листья с белыми полосками по жилкам, округленные, с сердцевидным основанием, сверху темно-зеленые, снизу часто фиолетовые или красноватые; цветки 1,2—2,2 см дл., красно-розово-фиолетовые; шпорец бледный, 5—7 мм дл. На склонах под скалами . . . . . 17. *V. variegata* Fisch. — Ф. пестрая (табл. 119, 2).
- Белых полосок нет . . . . . 29.
29. Цветки белые, крупные, до 2 см дл.; листья в период цветения полусердцевидные, позднее крупные, 7—10 см дл. и до 8 (9) см шир., широкосердцевидные, с резко выраженным остроконечием, городчатозубчатые, на длинных черешках до 13—15 (17) см. На каменистых склонах в лиственных лесах; только на самом



1 — *Viola orientalis* (Maxim.) W. Bkr. (Финляндия); 2 — *V. selkirkii* Pursh (Ф. Селкирка); 3 — *V. rosea* Hemsl. (Ф. Росса); 4 — *V. mandshurica* W. Bkr. (Ф. маньчжурская); 5 — *V. patrinii* Ging. (Ф. Патрина); 6 — *V. vercunda* A. Gray (Ф. веркунда).



- юге Приморья (Хасанский район) . . . . . 13. *V. rossii* Hemsl. — Ф. Росса (табл. 120, 3).
- Цветки иной окраски (фиолетовые, бледно-фиолетовые, желтые или беловатые); листья меньших размеров и различной формы . . . . . 30.
30. Цветки желтые или беловатые; листья почковидные или сердцевидно-округлые . . . . . 31.
- Цветки иной окраски, чаще светло-фиолетовые или фиолетовые; листья различной формы . . . . . 32.
31. Листья длинночерешковые, широкоэллиптические, широколанцетно-городчатые, с глубокосердцевидным основанием; цветки 8—10 мм дл., желтоватые; нижний лепесток узкоовальный, почти лодочкообразный; шпорец очень короткий. В хвойных лесах, в горах; по Амуру . . . . . 11. *V. kusnezowiana* W. Bckr. — Ф. Кузнецова.
- Листья длинночерешковые, сердцевидно-округлые, неглубокогородчатые или же (стебельные) широко округленные; цветки беловатые или желтоватые, 7—9 мм дл.; нижний лепесток с фиолетовыми полосками; шпорец очень короткий. Образует обильные плетевидные побеги, в паузах стеблевых листьев образует цветки (клейстогамные?). На сырых лугах и сфагновых болотах; по Амуру и в Приморье . . . . . 29. *V. amurica* W. Bckr. — Ф. амурская.
32. Цветки светло-фиолетовые, крупные, до 2—2,5 см дл.; листья почковидные или округло-почковидные, на трехгранных черешках, позднее появляются облиственные стебли, в паузах листьев которых тоже есть цветки . . . . . 2. *V. brachyspala* Maxim. — Ф. короткокачелистиконная (см. ступень 16).
- Растения весь вегетационный период бесстебельные . . . . . 33.
33. Листья голые, безволосые, близки к почковидным; корневище тонкое, горизонтальное, ползучее, развивающее длинные, тонкие надземные побеги; цветки светло-фиолетовые, 1—1,5 см дл.; нижний лепесток с фиолетовыми жилками. На болотистых лугах и в горах, по берегам ключиков . . . . . 9. *V. repens* Turcz. — Ф. ползучая.
- Листья более или менее опушенные (опушение от рассеянного до густого) . . . . . 34.
34. Листья сильно опушенные, особенно с нижней стороны, иногда бархатистые, от широкоэллиптических до округлых, неравномерно городчатые; цветки светло-фиолетовые или бледно-синие, с беловатым коротким шпорцем. Часто: в лесах и среди кустарников . . . . . 1. *V. collina* Bess. — Ф. холмовая (табл. 119, 3).
- Листья с рассеянными волосками или же с волосками по краям . . . . . 35.
35. Цветки бледно-фиолетовые, 1—1,8 см, шпорец длинный, 5—7 мм, боковые лепестки без боронок; листья сверху с рассеянными белыми волосками, сердцевидные или сердцевидно-яйцевидные. В смешанных лесах; часто . . . . . 12. *V. selkirkii* Pursh — Ф. Селькирка (табл. 120, 2).
- Цветки фиолетовые, листья яйцевидные, округленные при основании или же неглубокосердцевидные, мелкогородчатые, по краям реснитчатые, жестковатые, волосистые или частью голые. В лесах и на лесных лужайках . . . . . 18. *V. trichosepala* (W. Bckr.) Juz. — Ф. реснитчаточащелистиконная.

## Сем. 86. THYMELAEACEAE Juss. — ВОЛЧНИКОВЫЕ


1. Небольшие кустарнички . . . . . Род 1. *Daphne* Tourn. — Волчник.
- Многолетние и однолетние травы . . . . . 2.
2. Однолетники с тонким стеблем . . . . . Род 2. *Diarthron* Turcz. — Диартрон.
- Многолетник с деревянистым корнем . . . . . Род 3. *Stellera* L. — Стеллера.

Род 1. *DAPHNE* Tourn. — ВОЛЧНИК

Небольшой, 30—40 (50) см выс., кустарник со светло-серой корой, слабо ветвистый; листья цельнокрайные, продолговатоланцетные или ланцетные, тонкие, скучены к концам ветвей; цветки почти сидячие, мелкие, по 2—5, бледно-желтые; цветет в апреле—мае; плоды ягодообразные, сочные, красные; ядовитый. Единично; в хвойных лесах с каменистой почвой; у нас редкость (на Курилах, Сахалине и на Камчатке чаще) . . . . . 1. *D. kamtschatica* Maxim. — В. камчатский (табл. 121, 1).

Род 2. *DIARTHRON* Turcz. — ДИАРТРОН

Стебель тонкий, 30—40 (50) см выс., с несколькими веточками; листья линейно-продолговатые; цветки мелкие; плоды — односемянные орешки. На сухих склонах . . . . . 1. *D. linifolium* Turcz. — Д. линейный (табл. 121, 2).



1 — *Daphne kamtschatica* Maxim. (Волчник камчатский), часть стебля с листьями; а — часть стебля с цветками, б — плоды; 2 — *Diarthron linifolium* Turcz. (Диартрон линейный), верхняя часть стебля с листьями и плодами; 3 — (*Stellera chamaejasme* L. (Стеллера карликовая): а — верхняя часть стебля с цветками, б — нижняя часть стебля с корневищем.

Род 3. STELLERA L. — СТЕЛЛЕРА

Стебли не ветвящиеся, 20—40 см выс., с деревянеющим основанием; листья продолговатоэллиптические, 1,7—3 см дл.; цветки в верхушечных головчатых соцветиях, окруженных листьями, по 20—25; листья очередные, цельнокрайние. В сухих остепненных участках; в Амурской области (сева: Казимович, Ново-Воскресенка) . . . 1. *S. chamaejasme* L. — С. карликовая (табл. 121, 3).

Таблица 122

Сем. 87. LYTHRACEAE Lindl. — ДЕРБЕННИКОВЫЕ

Род 1. LYTHRUM L. — ДЕРБЕННИК

1. Прицветники, хотя бы на нижней поверхности, и чашечка более или менее опушенные, иногда и все растение более или менее опушенное. По берегам водоемов и на сырых местах (на дугах, в вьюнках и ольшаниках); редко . . . . . 1. *L. salicaria* L. — Д. нильский.
- Прицветники и листья по краю короткореснитчатые, все же растение совершенно голое. Преимущественно по берегам рек и ручьев; часто . . . . . 2. *L. intermedium* Ldb. — Д. промежуточный.

Сем. 88. ONAGRACEAE Juss. — КИПРЕЙНЫЕ

1. Плод грушевидный или шаровидный, не раскрывающийся, одно-двусемянный, усеченный крыжовидными щепками; лепестков и тычинок по 2 . . . . . Род 5. *Cistacea* L. — Двулепестник.
- Плод — многосемянная длинная коробочка без щепки; цветки четырехщептичковые . . . . . 2.
2. Цветки с прицветниками; цветоножка не превышает завязи; коробочка четырехгранная, раскрывающаяся путем разрушения стенок . . . . . Род 1. *Ludwigia* L. — Людвигия.
- Цветки без прицветников; цветоножка выше завязи; коробочка раскрывается по гнездам . . . . . 3.
3. Семена без хохолка; цветки желтые, крупные. Род 4. *Onagra* Adans. — Ослинник.
- Семена с хохолком . . . . . 4.
4. Цветки двусимметричные; тычинки изогнутые, при основании расширенные; столбик при основании волосистый . . . . . Род 3. *Chamaenerium* Adans. — Хаманерий, Иван-чай.
- Цветки правильные; тычинки прямые; столбик голый . . . . . Род 2. *Epilobium* L. — Кипрей.

Род 1. LUDWIGIA L. — ЛЮДВИГИЯ


Берега водоемов . . . . . 1. *L. prostrata* Roxb. — Л. распростертая.

Род 2. EPILOBIUM L. — КИПРЕЙ

1. Небольшое однолетнее растение с тонким, почти неразветвленным корешком и пельмокрайными, короткочерешковыми листьями; цветки 3,5—4 мм дл.; завязи опушенные; коробочка до 7 см дл. Юг Приморья; редко . . . . . 1. *E. tenue* Kom. — К. тонкий.

По внешнему виду напоминает *E. palustre* и особенно *E. davuricum*, от которых отличается в первую очередь черешковыми листьями и стеблем с 2 листовыми линиями.

- Многолетник со столонами, отпрысками или розетками листьев . . . . . 2.
2. Совершенно голое во всех частях растение; стебель с заметными возвышающимися линиями; листья тонкие, светло-зеленые, черешковые, по краям мелкопильчатые; цветки 5 мм дл., розовые. Вдоль Владивостока; в делях у ручьев; очень редко . . . . . 2. *E. angulatum* Kom. — К. угловатый.
- Растения более или менее опушенные . . . . . 3.
3. Стебель без листовых линий, вокруг равномерно опушенный; листья сидячие, цельнокрайние; завязи и молодые коробочки густо опушенные . . . . . 4.
- Стебель с листовыми линиями, вдоль них или сплошь опушенный; завязи и молодые плоды, как правило, не столь густо опушенные . . . . . 5.
4. Листья узкие, около 4 мм шир.; стебель внизу без побегов. Болота; преимущественно по Амуру . . . . . 3. *E. davuricum* Fisch. — К. даурский.
- Листья шире, до 1,5 см шир.; стебель внизу со столонами. Болота, берега рек . . . . . 4. *E. palustre* L. — К. болотный.



1 — *Ludwigia incisa* Sieb. et Zucc. (Вольной орех вырезной), общий вид растения; а — плод; 2 — *Epilobium manshurica* Fler. (В. о. маньчжурский); а — плод, б — лист.



- 5 (от 3). Плоды и завязи голые; стебель опушен только по линиям; листья черешковые, довольно плотные, слегка достигшие; цветки 5 мм дл. Галечники ручьев; повисло. 5. *E. subcynum* Hausskn., *E. nudicarpum* Kom. — К. чашечный.
- Плоды и завязи опушенные; стебли более опушенные. . . . . 6.
6. Листья яйцевидно-ланцетные (длина их не более 2 раз превышает ширину), снизу по жилкам волосистые. По горным ручьям. 6. *E. amurense* Hausskn. — К. амурский.
- Листья уже, снизу голые (иногда, кроме самых верхних). 7.
7. Листья короткочерешковые, зубчатые, рыльце головачато-цилиндрическое. Болота, леса; в южной половине Приморья. 7. *E. cylindrostigma* Kom. — К. цилиндро-рыльцевый.
- Листья совсем сидячие, зубчики по краям листа в виде красноватых железок; рыльце булавовидное. Лесные ручьи, дороги; Амур и на севере Приморья. 8. *E. glandulosum* Lehm. — К. железистый.

## Род 3. CHAMAENERIUM Adans. — ХАМЕНЕРИУМ, ПИАН-ЧАЙ

1. Растение до 30 см выс.; соцветие двух-пятицветковое, облиственное; лепестки 2—2,5 см дл. Галечники; по Амуру. 1. *Ch. latifolium* (L.) Th. Fries et Lange — X. широколистный.
- Растение 1—1,5 м выс.; соцветие многоцветковое, сверху безлистное; лепестки 1,5—1,7 см дл. Луга, кустарники, склоны; очень часто. 2. *Ch. angustifolium* (L.) Scop. — X. узколистный.

## Род 4. ONAGRA Adans. — ОСТРИННИК

1. Бутоны белые от густого прижатого шелковистого опушения. Сорное; часто. 1. *O. muricata* (L.) Moench — О. короткокрылый.
- Бутоны зеленые, с довольно редким, извилисто-полустоящим опушением. Сорное; г. Сучан, Русский остров, с. Галенки. 2. *O. biennis* (L.) Scop. — О. двулетний.


## Род 5. CIRCAEA L. — ДВУЛЕПЕСТНИК

1. Плод одногнездный; небольшое, нежное растение с сильно удлиняющимися к концу цветения кистями. Леса. 1. *C. alpina* L. — Д. альпийский.
- На юге преобладает *C. caulescens* (Kom.) Nakai — Д. стебельчатый, отличающийся от Д. альпийского стеблями с густым, коротким опушением, более плотными, опушенными листьями и красноватыми цветками.
- Плод двугнездный. 2.
2. Плод грушевидный; цветоножка почти в 2 раза длиннее его; листья в основании притупленные. Влажные леса. 2. *C. quadrisulcata* Maxim. — Д. четырехбороздчатый.
- Плод шаровидный; цветоножка более или менее равна ему; листья в основании сердцевидные; стебель простой или почти простой. Сухие лесные склоны. 3. *C. cordata* Hoyle — Д. сердцевидный.

## Сем. 89. HYDROCARYACEAE Raimann — ВОДЯНЫЕ ОРЕХИ

## Род 1. TRAPA L. — ВОДЯНОЙ ОРЕХ

1. Плоды мелкие, 1,2—1,5 см выс., около 2,5 см шир. между концами рогов, с мало заметной скульптурой и тонкими, игловидными, к основанию мало расширенными рогами; шейка тонкая, без коронки. 2.
- Плоды значительно крупнее, обыкновенно с хорошо выраженной скульптурой и толстыми, расширенными в основании рогами. 3.
2. Листья узкоребристые (длина их превышает ширину), с клиновидным основанием, мелко, 15—25 см дл., 12—20 мм шир., по краю выемчато-зубчатые или надраззанные, тонкие, почти голые; черешки с сильно издутыми плавательными пузырями. Старичи рек; на юге. 1. *T. incisa* Sieb. et Zucc. — В. о. вырезанной (табл. 122, 1).
- Листья широкоотреугольные (ширина их превышает длину), с более или менее усеченным основанием, по краю неглубоко зубчатые, около 20 мм дл., 30 мм шир., довольно плотные; черешки почти без издутости. Озера, старичи. 2. *T. maximowiczii* Korsh. — В. о. Максимовича.
- 3 (от 1). Плоды двурогие, иногда, кроме того, с 2 тупыми выростами. . . . . 4.



1 — *Myriophyllum ussuriense* Maxim. (Уруть уссурийская); а — плоды, б — отдельный плод; 2 — *M. verticillatum* L. (X. мутовчатая); а — подводная часть растения, б — подводный лист; 3 — *Hippuris tetraphylla* L. f. (Хвостик четырехлиственный); а — часть стебля с листьями, б — корешки с корнями; 4 — *H. vulgaris* L. (X. обыкновенный); а — часть стебля с листьями, б — корешки с корнями.

- Плоды четырехрентные . . . . . 5.  
4. Плоды сравнительно небольшие (без шейки 10—12 см выс., 3,5 см между концами рогов), с ширококонусовидным основанием (плоды низкие); шейка тонкая, без коронки; листья обычно тонковатые, в основании чаще более или менее усеченные, реже ширококлиновидные; плавательные пузыри более или менее развитые. Озера, старицы . . . . . 3. *T. pseudoincisa* Nakai, *T. komarovii* V. Vassil. — В. о. ложновырезной.

Около оз. Ханка встречается *T. potaninii* V. Vassil., *T. chinensis* Fler., non Lour., — В. о. Потанина, отличающийся от предыдущего вида плодами более высокими (в основании довольно длинноконусовидными) и 2 виза направленными выростами на месте второй пары рогов.

- Плоды крупные, массивные, 2 см выс., 5 см между концами рогов, в основании ширококонусовидные (плоды низкие); рога очень толстые; шейка толстая, с хорошо выраженной коронкой; листья крупные, толстые, треугольные (основание их плоское или почти плоское); плавательные пузыри большей частью хорошо развитые. Озера, старицы . . . . . 4. *T. japonica* Fler., *T. korshinskii* V. Vassil., *T. tuberculifera* V. Vassil. — В. о. японский.  
5 (от 3). Плоды очень крупные, 2 см выс. (без шейки), 5 см между концами рогов, в основании довольно широко конусовидные (плоды довольно низкие); рога очень толстые; шейка толстая, с хорошо выраженной коронкой; листья крупные, толстоватые, в основании ширококлиновидные (листья широкоромбические, их ширина превышает длину); плавательные пузыри хорошо выражены. Озера, старицы . . . . . 5. *T. manshurica* Fler., *T. tranchellii* V. Vassil. — В. о. маньчжурский (табл. 122, 2).

Иногда встречается другая форма (*T. litwinowii* V. Vassil., p. p.).

- Плоды мелкие, 1,5 см выс. (без шейки), 4 см шир. между концами рогов, в основании довольно узкоконусовидные (плоды высокие); рога довольно тонкие; шейка с хорошо выраженной коронкой; листья мелкие, чем у предыдущего вида, и тоньше, в основании более клиновидные (листья ромбические, ширина их почти не превышает длину); черешки почти без вздутий. Озера, старицы . . . . . 6. *T. amurensis* Fler. — В. о. амурский.

Имеется другая форма (*T. litwinowii* V. Vassil., p. p.).

## Сем. 90. HALORRHAGIDACEAE Lindl. — СЛАНЯГОДНИКОВЫЕ

### Род 1. MYRIOPHYLLUM L. — УРЪТЪ

1. Растение двудомное, до 20 см выс.; тычинок 6; цветки по 2—4 в мутовках верхних листьев, реже в верхушечных прерывистых колосках; плодник остробородчатый. На иловатых береговых отмелях по озерам и старицам . . . . . 1. *M. ussuriense* Maxim. — У. уссурийская (табл. 123, 1).  
— Растения однодомные; стебли более длинные, 30—150 см; тычинок 8; плоды гладкие . . . . . 2.  
2. Листья по 5—6 в мутовке, у каждого цветка по 1 перистонадрезанному прицветнику; вытасненные из воды дольки листьев не спадают. В озерах и в старицах . . . . . 2. *M. verticillatum* L. — У. мутовчатая (табл. 123, 2).  
— Листья по 4 в мутовке, у каждого цветка по 3 прицветника (цельнокрайних, пальчатых или зубчато надрезанных); вытасненные из воды дольки листьев спадают . . . . . 3. *M. spicatum* L. — У. колосовидная.

## Сем. 91. HIPURIDACEAE Link — ХВОСТНИКОВЫЕ, ВОДЯНЫЕ СОСЕНКИ


### Род 1. HIPURIS L. — ХВОСТНИК

1. Листья линейные или линейно-ланцетные, 1—4 см дл. и 1—2 (3—5) мм шир., в мутовках по 8—16; подводные листья более длинные, до 8 см. В мелких водах . . . . . 1. *H. vulgaris* L. — Х. обыкновенный (табл. 123, 4).  
— Листья обратноовальные, продолговатые или обратноклиновидные, более короткие (0,4—1 см дл.), в мутовках по 4—6; подводные листья более короткие, 0,3—0,5 см дл. В мелких солоноватых водах у моря . . . . . 2. *H. tetraphylla* L. f. — Х. четырехлистый (табл. 123, 3).

## Сем. 92. ARA LIACEAE Juss. — АРАЛИЕВЫЕ

1. Листья пальчато- или перистосложные . . . . . 2.  
2. Листья лопатные или пальчатолопастные . . . . . 3.  
3. Листья сложные, дважды перистые . . . . . Род 5. *Aralia* L. — Аралия.

Таблица 124



*Echinopanax elatum* Nakai (Эхинопанакс высокий, Заманиха): а — нижняя часть стебля с корнями и неразвернувшимся листом; б — лист и соцветие.

- Листья пальчато- или перистосложные . . . . . 3.  
3. Растения травянистые; листья собраны в одну мутовку (от 2 до 5—7); плоды ярко-красные . . . . . Род 6. *Panax* L. — Женьшень.  
— Кустарники; листья очередные, с 3—5 листочками; плоды черные . . . . . 4.  
4. Шипы редкие, разбросанные, все с черешчататым основанием; верхние листья часто с 3 листочками; цветки на очень коротких цветоножках; плоды эллипсоидно-яйцевидные, с 2 косточками . Род 2. *Acanthopanax* Seem. — Акантопанакс.



- Шипы обычно многочисленные, тонкие, иглообразные; все листья с 5 листочками; цветки на длинных цветоножках; плоды шаровидные, с 5 косточками . . . . . Род 3. *Euleutherococcus* Maxim. — ЭЛЕУТЕРОКОК; СВОБОДНОГОДНИК.
- 5 (от 1). Кустарники, стебли и листья густо покрыты многочисленными иглообразными шипами; плоды красные, с 2 косточками; соцветие из махровых зонтиков, собранных в виде кисти . . . . . Род 4. *Echinoranax* Desne. et Planch. — ЭХИНОПАНАКС; ЗАМАНИХА.
- Деревья; шипы крупные, черешчатые; листья без шипиков, обычно с 7, реже с 5—11 долями; плоды черные, мелкие, с 2 косточками; соцветие многоцветковое, почти шаровидное, зонтиковидное или щитковидное . . . . . Род 4. *Kaloranax* Miq. — КАЛОПАНАКС.

Род 4. *ECHINORANAX* Desne. et Planch. — ЭХИНОПАНАКС, ЗАМАНИХА

Небольшой кустарник, почти без ветвей, густо усеянный тонкими шипами; листья длинночерешковые, крупные, до 30—35 см в диам., неглубоко пяти-семилопастные, собраны у вершины стебля; соцветия (5) 7—15 (22) см дл.; плоды красные, созревают в августе—сентябре. В горах, преимущественно еловых лесах; Приморье; группами; лекарственное . . . . . 1. *E. elatum* Nakai — Э. высокий, Заманиха (табл. 124).

Род 2. *ACANTHORANAX* Seem. — АКАНТОПАНАКС

Кустарник 2—3,5 (4) м выс. и до 6—(8) см в диам. у основания стволов; листья длинночерешковые, из 3—5 плотных листочков (особенно плотные листья у экземпляров, выросших на открытых местах); цветки собраны в плотные, почти головчатые соцветия; цветет в августе, плоды в сентябре—октябре. По берегам рек и ручьев в их низком и среднем течении; в Приморье и в южной части Хабаровского края . . . . . 1. *A. sessiliflorum* (Rupr. et Maxim.) Seem. — А. сидячцветковый (табл. 125, 2).

Род 3. *EULEUTHEROCOCCUS* Maxim. — ЭЛЕУТЕРОКОК, СВОБОДНОГОДНИК


Кустарник обычно около 2 м выс., реже до 3,5—4 м и до 4—5 (6) см в диам. у основания стволов; листья длинночерешковые (черешки до 10 см), всегда с 5 листочками, причем верхние заметно крупнее нижних; зонтики почти шаровидные; цветки на длинных цветоножках; плоды почти шаровидные; цветет в июле—начале августа, зрелые плоды в сентябре—октябре. Один из обычных кустарников подлеска в хвойных (ельных и кедрово-широколиственных) и смешанных лесах или их дериватах; лекарственное . . . . . 1. *E. senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. — Э. колючий, «дикий перец» (табл. 125, 1).

Род 4. *KALORANAX* Miq. — КАЛОПАНАКС


Дерево до 20—23 м выс. и 50—60 см в диам.; листья длинночерешковые, плотные, почти кожистые, крупные, 8—30 (37) см дл., 10—30 (40) см шир., обычно с 7 долями (от слабо лопастных до глубокораздельных); молодые стебли с крупными черешчатыми шипами, на старых деревьях шипы на стволе постепенно опадают и имеются только на ветках. В смешанных и широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 1. *K. septemlobum* (Thunb.) Koiz. — *K. ricinifolium* Miq. — К. семилопастный, Даморфант, «Белый орех» (табл. 126).

Род 5. *ARALIA* L. — АРАЛИЯ


1. Небольшое дерево, до 3—4 (7) м выс. и до 10—15 (20) см в диам.; ствол густо покрыт шипами; листья очень крупные, до 100—120 см дл., дважды-трижды перистосложные, часто с длинными шипами; соцветие верхушечное, из нескольких длинных (40—45 см) метелок, собранных зонтиком или щитковидным зонтиком; плоды черные, 3—5 мм в диам., с 5 косточками; цветет в августе, плоды в сентябре. В смешанных и лиственных лесах на вырубках и гарях, у скал и каменистых россыпей; в Приморье и на юге Приамурья . . . . . 1. *A. mandshurica* Rupr. et Maxim. — А. маньчжурская, «чертово дерево», «япон-дерево» (табл. 127, 1).
- Травянистый многолетник; стебель до 100—120 см выс.; листья 40—60 см дл., без шипов; плоды 4—6 мм в диам.; цветет в августе, плоды в сентябре. В лиственных и смешанных лесах; только на юге Приморья . . . . . 2. *A. continentalis* Kitag. — А. материковая (табл. 127, 2).



1 — *Euleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. (Элеутерококк колючий, «дикий перец»); а — верхняя часть побега с соцветиями и листом, б — часть стебля, в — плод; 2 — *Acanthoranax sessiliflorum* (Rupr. et Maxim.) Seem. (Акантопанакс сидячцветковый); а — верхняя часть побега с листьями и нераспустившимися соцветиями, б — соцветие, в — плод.



*Kalopanax verticillatum* (Thunb.) Koidz. (Кадопанак семипалостный, Диморфанг, «Белый орех»): а — цветок, б — часть соцветия, в — лист, г — лист сеянца.



1 — *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim. (Аралия маньчжурская): а — часть стебля с листом, б — часть побега, в — плод; 2 — *A. continentalis* Kitag. (А. материковая), часть листа.



Травянистый многолетник с 4, очень редко 2—3 стеблями; стебли до 20—70 (75) см выс., с мутовкой из 2—5 (7) пальчатых листьев, в центре которой находится цетозис с 4 зонтиком и с 1 или несколькими нижними одиночными цветками (иногда зонтиками); цветки зеленовато-белые; плоды крупные, ярко-красные, сверху сплюснутые, с 1 белым семенем в гнезде; плоды созревают в августе—сентябре. В смешанных кедрово-широколиственных лесах, на север до бассейна р. Хора; из-за многовековой успешной заготовки корень женьшень стал большой редкостью . . . . . I. P. Ginseng C. A. Mey. — Ж. настоящий.

Сем. 93. UMBELLIFERAE Juss. — ЗОНТИЧНЫЕ<sup>1</sup>

1. Листья простые, цельнокрайные или остро-зубчатые; цветки желтые или синие . . . . .
- Листья сложные: тройчатые, дважды тройчатые, перистые цельнокрайные или зубчатые, простые, рассеченные; цветки белые, зеленоватые, желтые, розоватые, красные, фиолетовые . . . . .
2. Листья цельнокрайные, ланцетные или линейно-ланцетные; цветки желтые . . . . .
- Листья овальные, с острыми зубчатыми краями; цветки синие; соцветие зонтичатое; оберточка колечком . . . . .
- 3 (от 1). Соцветие — голый или простой зонтик; цветки белые или розовые; листовая пластинка трехраздельная; завязи и плоды на наружной стороне покрыты крошечными шипиками . . . . .
- Соцветие — сложный зонтик . . . . .
4. В центральном зонтике лучей 5, в боковых по 3—5, длинных (соцветие раскидистое); листья дважды перистые; завязи и плоды узколинейные, 1,2—2,5 см дл., четинистые; все растения с прижатыми волосками . . . . .
- В центральном зонтике различное количество лучей, но больше 5 (иногда у слабых экземпляров по 3—6); плоды менее 1,2 см дл. . . . .
5. Листья тройчато- или дважды тройчато-ланцетные . . . . .
- Листья иного строения . . . . .
6. Обертка и оберточек есть, цветки белые, розоватые или пурпурные, зонтичек несколько; ребра на плодах имеются . . . . .
- Оберток и оберточек нет, цветки всегда белые, зонтик чаще 1 или имеется, кроме крупного центрального, 2—3 боковых, более мелких; ребра на плодах отсутствуют . . . . .
- 7 (от 5). Завязи и плоды покрыты шипиками или четинками (хорошо заметными невооруженным глазом); стебли слабо борозчатые; листья перистые, с обеих сторон прижатые к стеблю или четинистые . . . . .
- Завязи и плоды голые или мягко пушистые; стебли и листья иного строения . . . . .
8. Стебли сплошные; все надземные части растения покрыты вишя направленными белыми четинками; обертка и оберточка прижаты к цетозису и сохраняются до созревания плодов; лепестки по всех цветках одинаковые . . . . .
- Стебли внутри с полостью, снаружи пушистые или голые, в улах и на влагалищах густо опушенные; оберточка отсутствует или состоит из 1—2 неодинаковых, рано опадающих листочков; оберточка обычно из открытых виш листочков; лепестки наружных цветков в зонтичках, расположенных по краю зонтика, увеличенные . . . . .
- 9 (от 7). Плоды округлые или длинные, немного превышают ширину, ребра на плодах ясно заметны; стебли гладкие или ребристые . . . . .
- Длина плодов в 2,5—3 раза превышает ширину, плоды голые, спичные и крепкие ребра отсутствуют; стебли всегда гладкие . . . . .
- Цветки желтые; оберток и оберточек нет; листья простоперистые; стебли крупно-ребристые, толстоватые, полые; плоды плоские, с едва заметными ребрами . . . . .
- Цветки белые, розоватые, зеленоватые или фиолетовые, обертки или оберточка имеются или отсутствуют; листья, стебли и плоды иного строения . . . . .
11. Все растение, кроме верхней стороны листа, покрыто густым беловатым опушением; стебли низкие (10—30 см выс.); цветки фиолетовые. Встречается только на песках морского берега . . . . .

<sup>1</sup> Более подробно семейство рассматривается в работе П. Г. Горюнова «Зонтичные Приморья и Приамурья (1946, М.—Л.)», где приводятся рисунки всех видов зонтичных, произрастающих на юге Дальнего Востока.

- Растения голые, четинистые или слабо пушистые . . . . .
12. Стебли в нижней части лежащие и укореняющиеся, извилистые; оберток нет; хохлистые стеблями. Только у берегов водоемов или в местах с повышенным увлажнением . . . . .
- Стебли от основания простояющие . . . . .
13. Оберточка отсутствует . . . . .
- Оберточка имеется . . . . .
14. Лучи зонтиков, особенно по краям, различной длины; листочки последнего порядка (конечные дольки) линейные; стебель в верхней части крупно-ребристый или зачаточный; листочки последнего порядка (конечные) овальные или ланцетные; стебель гладкий или тонкоборозчатый . . . . .
- Листья зонтиков одинаковой длины; листочки последнего порядка (конечные) овальные или ланцетные; стебель с редкими горизонтальными корневидными, легко разрывающимися при выкапывании, стебель с полостью, толстоватый; прикорневые и стеблевые листья дважды перистые, снизу обычно сизоватые . . . . .
- Растения густо покрыты короткими волосками; корневидные отсутствуют; стеблевые листочки овальные, крупнозубчатые, у верхних линейно-ланцетные, цельнокрайные . . . . .
- 16 (от 13). Стебли с красноватыми четинками часто с сильным пахотом; листочки оберточек односторонние, сросшиеся своими основаниями . . . . .
- Стебли зеленые или фиолетовые, без четин; листочки оберточек свободные . . . . .
17. Листочки оберток и оберточек перисто-раздельные; стебли 1—3 см в поперечнике, внутри полые; зрелые плоды с зубчиками по ребрам . . . . .
- Листочки оберток и оберточек цельные; ребра зрелых плодов без зубчиков . . . . .
18. Листья простоперистые, с ланцетными или линейными, по краям млечными, сидячими листочками. Берега водоемов . . . . .
- Листья дважды-четырежды перистые . . . . .
19. Зонтики шаровидные; стебель в нижней части (корневидный) с камерами; листья перистые. Берега водоемов и болот . . . . .
- Зонтики не шаровидные, а больше похожи на зонтичные соцветия, т. е. все цветки расположены почти на одном уровне (горизонтально). Растения сухолюбивые . . . . .
20. Завязи и плоды пушистые или перистые, овальные; листья трижды перистые, с ланцетными или линейно-ланцетными долями . . . . .
- Завязи и плоды голые или редко опушенные . . . . .
21. Главные стебли выказываются, растения от основания сильно ветвистые; листочки оберточек по длине не превышают половины цетозиса и плотно прижаты к ним; завязи с поперечными выростами, исчезающими при созревании плодов . . . . .
- Растения с хорошо выраженным главным стеблем и центральным зонтиком; листочки оберточек немного короче, равны или превышают цетозиса; завязи без выростов . . . . .
22. Наружные лепестки зонтичков, расположенных по периферии зонтика, увеличенные, двудольные, с вершиной, не загнутой внутрь; плоды с немными ребрами . . . . .
- Лепестки всех цветков зонтика одинаковые; вершины лепестков загнуты внутрь; плоды с выдающимися ребрами . . . . .
23. Листья тройчатые или перистые, с широкими по краям крупнозубчатыми листочками; плоды сплюснутые со спинки; растения крупные, 1,5 м и выше . . . . .
- Листья дважды-трижды перистые (перисто-рассеченные), с ланцетно-линейными; линейными или ланцетными листочками; плоды не сплюснутые со спинки; растения до 1,5 м выс. . . . .
24. Оберточка односторонняя, из узколинейных, с волосовидным окаймлением листочков; плоды шаровидные, не распадающиеся на мерикарии . . . . .
- Оберточка неодносторонняя, из широкоовальных, снаружи паутинистых листочков; плоды продолговатые, распадающиеся на мерикарии; листочковые чашечки . . . . .
- 25 (от 22). Плоды со вздутыми спинными и треугольными боковыми ребрами; оберток нет . . . . .



- Плоды с тонкими крылатыми ребрами (иногда только краевыми); оберточка овально-ланцетные, без длинного остроконечия, по краям пленчатые, обычно короче цветоносов или равны им . . . . . Род 23. *Cochlospermum* Ldb. — Цветокрышник.
26. Листочки последнего порядка широкояйцевидные или овальные, с верхней стороны глянцевые, по краю остро пильчатоноздревные; растения мошпные, 1—1,8 м выс. . . . . Род 23. *Cochlospermum* Ldb. — Цветокрышник.
- Листочки последнего порядка линейные, цельнокрайные; растения 30—60 см выс., с разросшимся основанием стебля (каузюком) . . . . . Род 25. *Phlajodictyon* Turcz. — Вудтопидиум.
- 27 (от 23). Спильные ребра плодов равны краевым по ширине, а если более узкие, то не более чем в 1,5—2 раза . . . . . Род 28.
- Спильные ребра плодов едва заметные (почти нитевидные), резко отличающиеся от широких краевых . . . . . Род 29.
28. Все ребра плодов одинаковой ширины; плоды короткие, т. е. длина их мало превышает ширину . . . . . Род 19. *Cnidium* Cuss. — Итун-корень.
- Краевые ребра плодов в 2 раза шире спильных, плоды удлиненные, к вершине заостренные. Растет вдоль морских побережий; севернее бухты Терней . . . . . Род 21. *Conioselinum* Fisch. — Гирчионик.
- 29 (от 27). Растения с полыми толстостенными стеблями, ребристыми или гладкими, до 1,5—3,5 м выс. . . . . Род 22. *Angelica* L. — Дудник.
- Растения со сплошными стеблями, до 1,2—1,5 м выс. . . . . Род 30.
30. Стебли ребристые; листочки нисбегающие на черешок, широкие; плоды с вычурными спильными ребрами . . . . . Род 22.
- Стебли гладкие или слабо ребристые; нисбегающих на черешок листочков нет; спильные ребра на плодах едва выдающиеся . . . . . Род 27. *Peucedanum* L. — Горичник.

#### Род 1. *SANICULA* L. — ПОДЛЕСНИК

1. Цветки темно-красные; оберточка листообразная; стебель только под соцветием имеет 2 сидячих листа; корень горизонтальный; многолетник; цветет в мае—июне. В Приморском крае и на юге Хабаровского края . . . . . 1. *S. rubriflora* Fr. Schmidt — П. красноцветковый (табл. 128).
- Цветки зеленовато-белые; листочки оберточка мелкие, едва заметные; стебель ветвистый, облиственный; корень стержневой, вертикальный, короткий; двулетник или многолетник; цветет в июле. На юге Приморского края; часто у населенных пунктов . . . . . 2. *S. chinensis* Bge., *S. elata* auct., non Hamilt. — П. китайский.

#### Род 2. *ERYNGIUM* L. — СИНЕГОЛОВНИК

Цветки ярко-синие, собранные в яйцевидные головки (около 1,5 см дл.); листья овальные или трехлопастные, с острыми шипами; листочки оберточка по краю острито-зубчатые, в числе 3—8, не более чем вдвое длиннее головки; многолетник. Приморский край (у развезда Лефя, окрестности г. Уссурийска) . . . . . 1. *E. planum* L. — С. плосколистный.

#### Род 3. *SPHALLEROCARPUS* Bess. — ОБМАПЧИВПОЛДНИК


Корень тонкий, стержневой, короткий, деревянистый; стебель до 150 см выс., слабо бороздчатый, в узлах опушенный пушистыми жестковатыми волосками; листья дважды-четырежды перистые, листочки последнего порядка рассечены на линейно-ланцетные острые доли, по жилкам иногда рассеяно волосистые; оберточка из 5 овальных, по краям широкопленчатых, длинных, мягковолосистых, вниз отогнутых листочков; плоды с хорошо заметными, светлыми, почти нитевидными ребрами; цветет с конца июня до августа. В огородах, у дорог, на сорных местах; в Приморье и Приамурье . . . . . 1. *S. gracilis* (Bess.) K.-Pol. — О. тонкий.

#### Род 4. *ANTHRISCUS* (Pers.) Hoffm. — КУШЫРЬ

1. Корень утолщенный, мясистый, морщинистый; стебель бороздчатый, внутри полый, голый или редко коротко опушенный, 40—150 см выс.; листья дважды-трижды перистые, с крупнозубчатыми листочками последнего порядка; оберточка из 5 яйцевидных или ланцетных мягковолосистых листочков, после цве-

тения вниз отогнутых; листочки с выемкой, загнутая внутрь вершина отсутствует; плоды продолговатые, к вершине суженные и переходящие в носик, гладкие, ребра отсутствуют; замещающий двулетник; цветет в мае—июне. В Приморье


Таблица 128




*Sanicula rubriflora* Fr. Schmidt (Подлесник красноцветковый): а — плод, вид со спинной стороны, б — плод, вид с брюшной стороны, в — цветок.

- и на юге Хабаровского края . . . . . 1. *A. aemula* (Woron.) Schischk., *A. nemorosa* auct., non Spreng. — К. похожий. — Завая и плоды покрыты бугорками и сиднями на них вверх направленными щетинками. Преобладает вдоль морского побережья . . . . . 1. *A. aemula* var. *hirtifructus* (Ohwi) Kitag., *A. silvestris* auct., non Hoffm. — К. похожий щетинистоплодный (табл. 129).





*Anthriscus aemula* var. *hirtifructus* (Ohwi) Kitag. (Кумарь похожий щетинистоплодный): а — часть листа, б — верхняя часть растения, в — мерикарий («полуплодик»), вид со спинной стороны, г — мерикарий, вид с брюшной стороны, д — зонтичек, е — цветок, ж — листочек оберточки, з — завязь.



*Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe (Осморица остистая): а — цветок, б — мерикарий («полуплодик»), вид со спинной стороны, в — мерикарий, вид с брюшной стороны.

Стебель прямой, в нижней части рассеивно опушенный; листья в общем очертании треугольные с обеих сторон, особенно по жилкам прижатоволосистые; обертка из ланцетных, вниз отвернутых листочков; зонтики раскидистые, из 5 неодинаковых по длине (4—10 см дл.) лучей; плоды до 2,5 см дл., с хвостовидными придатками, хорошо заметными острыми ребрами и прижатыми белыми щетинками; многократный; цветет в июне. В смешанных горных лесах; в Приморском крае и на юге Хабаровского края; часто группами . . . . . 1. *O. aristata* (Thunb.) Makino et Yabe — *O. острейшая* (табл. 130).

## Род 6. TORILIS Adans. — ПУПЫРНИК, ТОРИЛИС

Корень короткий, стержневой, деревянистый; все растение покрыто плотно прижатыми белыми волосками; завязи и плоды с оттопыренными щетинками, по длине равными поперечнику мерикария; дуэтник цветет в июле. В кустарниках, у дорог, на выгонах, по обочинам полей, часто как сорное; пока только в Приморье . . . . . 1. *T. japonica* (Houtt.) DC. — *T. японский*.

## Род 7. CORIANDRUM L. — КОРИАНДР, КИШНЕЦ

Корень тонкий, веретеновидный; средние и верхние стеблевые листья линейные или почти нитевидные; оберточки односторонние, обычно из 3 нитевидных с волосовидным окончанием листочков; лепестки наружные, у краевых зонтичков увеличенные; плод шаровидный. Только около г. Уссурийска . . . . . 1. *C. sativum* L. — *C. посевной*.

## Род 8. CONIUM L. — БОЛИГОЛОВ, ОМЕТ

Двулетник, корень стержневой, мясистый; стебель 50—280 см выс., неодинаково мелко ребристый; листья широкотреугольные, трижды перистые; обертка малодоступная, из яйцевидно-ланцетных, слегка зазубренных листочков; плоды почти округлые, мерикарии с 5 хрящеватыми извиллистыми ребрами; цветет в июле. На огородах, у жилья, у дорог и заборов; иногда образует заросли; в с. Випшевка Спасского района и вдоль шоссе Лесозаводск—Иман; все растение, особенно плоды и корни, очень ядовиты; имеет запах мышей . . . . . 1. *C. maculatum* L. — *C. пятнистый*.

## Род 9. PLEUROSPERMUM Hoffm. — РЕБРОПЛОДНИК

Корень стержневой, мясистый; стебель 70—200 см выс., под соцветием шероховатый; черенки полустеблеобъемлющие; влагалища отсутствуют; обертка из перистонадрезанных листочков; оберточки линейно-ланцетные или перистые; лепестки белые, отдаленные в шпоре цветках; завязи и плоды голые, ребра плодов тонкостенные, по ребро зубчатые; многократный; цветет в первой половине июля. В смешанных лесах и среди кустарников. Приморский и Хабаровский края . . . . . 1. *P. santschaticum* Hoffm. — *P. камчатский*.

## Род 10. BUPLEURUM L. — ВОЛОДУШКА

1. Листочки оберточек широкие, почти округлые, превышающие цветоносы; растения до 30 см выс., высокорослые . . . . . 2.
- Листочки оберточек узкие, линейные или ланцетно-овальные, острые; растения более крупные, не высокорослые . . . . . 3.
2. Молокарик, прикорневые листья рано увядающие, малочисленные; стебли одиночные, сильно ветвистые; лучей зонтика 7—17. На гольцах; Сихотэ-Алинь . . . . . 3. *B. euphorioides* Nakai, *B. multinerve* auct., non DC. — *B. молочайная* (табл. 131).
- Поликарпик, прикорневые листья многочисленные; стебли в числе нескольких, слабо ветвистые; лучей зонтика 3—4 (иногда 5—6). На гольцах высокорослые; в Амурской области и Хабаровском крае . . . . . 4. *B. tridactylum* Adams — *B. трехлучевая*.
- 3 (от 1). Стебловые листья в основании с ушками . . . . . 4.
- Стебловые листья без ушек . . . . . 5.
4. Центральный зонтик крупнее боковых; листочки оберточки и обертки широколанцетные; стебель ребристый. В юго-восточной части Приморского края . . . . . 2. *B. sachalinense* Fr. Schmidt — *B. сахалинская*.



*Bupleurum euphorioides* Nakai (Володушка молочайная): а — мерикарий (эпоуплодик) со спинной стороны, б — мерикарий с брюшной стороны, в — цветок.



- Центрального зонтика выделить нельзя; листочки обвертки и обверточки ланцетные или узкоэллиптические; стебель только с едва заметными бороздками . . . . . 1. *B. longiradiatum* Turcz. — *B. длинноручая* (табл. 132).
- 5 (от 3). Стеблевые листья ланцетные, часто серповидно изогнутые; обверточки не превышают цветоносов. В Приморском крае . . . . . 5. *B. komarovianum* Ljncz., *B. breviradiatum* auct., non Rgl., *B. falcatum* auct., non L. — *B. Комарова*.
- Стеблевые листья линейные, не изогнутые; обверточки по длине равны дугам зонтика или превышают их. На сухих дугах и в кустарниках; Приморье и Приамурье . . . . . 6. *B. scorzonifolium* Willd. — *B. козленцелистная*.

На юге Приморья было собрано 2 экземпляра *B. rotundifolium* L. — *B. круглолистная*. Однолетник; стеблевые листья округлые, провисшие; обвертки нет; листочки обверточки между собой сильно неравные.

Род 11. *CICUTA* L. — ВЕХ

1. Корневище весной и поздней осенью плотное и почти округлое, летом продолговатое, внутри полое, с поперечными перегородками (камерами); все растение голое; стебель округлый, внутри полый, тонкоборозчатый; листья дважды перистые, с ланцетными крупно- и острозубчатыми листочками последнего порядка; соцветие шаровидное; плоды мелкие, почти шаровидные, с толстоватыми ребрами; замещающий двулетник; цветет в августе. На болотах, по берегам водоемов, обычно в воде; все растение, особенно корневище, очень ядовито . . . . . 1. *C. virosa* L. — *В. ядовитый* (табл. 133).
- Листочки последнего порядка 1—3,5 мм шир. и 2,4 см дл., мелкозубчатые; растение более низкое, до 1,5 м выс. Часто; на Приханкайской равнине . . . . . 1a. *C. virosa* var. *tenuifolia* (Froehl.) Koch — *В. ядовитый узколистный*.

Род 12. *CARUM* L. — ТМИН

Корень веретенообразный или цилиндрический, мясистый; листья дважды-трижды перистые, с линейно-остроконечными листочками последнего порядка; обвертка отсутствует или из 1—2 раз охватывающих листочков, обверточка отсутствует; дуги зонтика, особенно при плодах, неодинаковой длины; цветки белые, розоватые или красноватые; двулетник, реже многолетник; цветет в июне. Заносное; около населенных пунктов; в Приморском крае . . . . . 1. *C. carvi* L. — *Т. обыкновенный*.

Род 13. *PIMPINELLA* L. — БЕДРЕНЕЦ


Корни шнуровидные; стебли в числе нескольких, 25—90 см выс., опушенные короткими, вниз направленными волосками; прикорневые листья простоперистые, с широкоэллиптическими листочками; стеблевые дважды перистые, с ланцетными или линейными цельнокрайными листочками последнего порядка; обвертки и обверточки отсутствуют; многолетник; цветет в июне—июле. Заносное; около населенных пунктов на дачах, в парках, на насыпях ж.-д. линий . . . . . 1. *P. thellungiana* Wolff — *Б. Теллунга*.

Род 14. *SPURIOPIMPINELLA* Kitag. — ЛОЖНОБЕДРЕНЕЦ

Корневище деревянистое, со следами стеблей прошлых лет; стебли 0,6—1,3 м выс., голые; листья дважды тройчатые; обвертки и обверточки отсутствуют; плоды эллиптические, ребра отсутствуют, иногда плоды вздутые и изогнутые вследствие развития в них галлов; многолетник; цветет в августе. В смешанных лесах (с корейским кедром); только на юге Приморского края . . . 1. *S. caelyna* (Maxim.) Kitag., *Pimpinella brachycarpa* (Kom.) Nakai — *Л. чашечный*.

Род 15. *AEGOPODIUM* L. — СПЫТЬ

1. Листья дважды-трижды перистые, с яйцевидными мелкими листочками (1—2 см дл. и 0,5—1,5 см шир.), мелкозубчатые; дуги зонтика голые; растение 15—50 см выс.; многолетник; цветет с конца мая по июль. По горным склонам и кедровым лесам, субальпийским и альпийским дугам; по всей территории Приморья и Приамурья . . . . . 1. *Ae. alpestre* Ldb. — *С. горная*.
- Листья трижды перистые, доли третьего порядка рассечены почти до основания на узкие, линейно-защепленные дольки. Только на севере Хабаровского края и в Амурской области . . . . . 1a. *Ae. alpestre* var. *dancifolium* Gorovoi — *С. горная морковелистная*.



*Bupleurum longiradiatum* Turcz. (Володушка длинноручая): а — нижняя часть стебля с корнем и листьями, б — верхняя часть стебля с соцветиями, в — мерикарий (полу-плодик), г — цветок.

- Листья только дважды перистые, листочки крупные, яйцевидные, до 3—5 см дл. и 2—4 см шир., крупнозубчатые; лучи зонтиков чаще слабо шероховатые; растение 50—100 см выс.; цветет в июне. На опушках и у берегов ручьев; только на юге Приморского края . . . . . 2. *A. henryi* Diels — *C. Генри*.

#### Род 16. STUM L. — ПОРУЧЕПНИК

1. Стебель сильно ребристый; листья все перистые, пальчатые, дольки ланцетные, до 2 см шир. и 6—9 см дл.; корни без утолщения; многолетник; цветет во второй половине августа. По берегам водоемов и в воде . . . . . 1. *S. suave* Walt., *S. cicutaeifolium* Gmel. — *П. прикочечастый*.  
Дольки листьев линейные, узкие, до 3 мм шир. . . . . 1a. *S. suave*  
var. *angustifolium* Kom. — *П. прикочечастый узколистный*.  
— Стебель слабо бороздчатый, до 3—2,5 мм в diam., у основания более тонкий, чем в средней части; корни из 3—8 веретенообразных утолщенных образований; листья перистые (из 2—3 пар листочков), у вершины стебля тройчатые; прикорневые листья и листья бесплодных побегов тройчатые или цельные; многолетник; цветет в августе. На приречных лугах и увлажненных склонах холмов; только в средней и южной части Приморья . . . . . 2. *S. tenue* Kom. — *П. тонкий*.

#### Род 17. LIBANOTIS (Haller) Zinn. — ПОРЕЗНИК

1. Стебель без полости, сильно ребристый, опушенный; столбики при плодах не превышают  $1\frac{1}{2}$  длины плода; ребра при плодах одинаковые . . . . . 2.  
— Стебли с полостью, тонкобороздчатые, опушение только в узлах; столбики по длине равны плодам или превышают их. Поймы горных рек, горные луговины; в Амурской области и Хабаровском крае . . . . . 3. *L. condensata* (L.) Crantz — *П. густоцветковый*.  
2. Листья трижды перистые, конечные листочки линейно-ланцетные, облиственные, 5—10 мм дл. и 1—2 мм шир., сверху зеленые, снизу более бледные; растение до 1,2 м выс. . . . . 2. *L. seseloides* (Fisch. et Mey.) Turcz. — *П. жабрищенский*.  
— Листья дважды, редко трижды перистые, конечные листочки 15—25 мм дл. и 3—5 мм шир., широко расставленные, сверху темно-зеленые, снизу сизые; растение 1—1,7 м выс. На сухих лугах и залежах; в долине Амура . . . . . 1. *L. amurensis* Schischk., *L. vulgaris* DC. var. *rieviana* Ldb. — *П. амурский*.

#### Род 18. OENANTHE L. — ОМЕЖНИК

Все растение голое; стебли в нижней части укореняющиеся и дающие ползучие побеги, выше ветвистые, извилистые, ребристые; листья в общем очертании треугольные, дважды перисторассеченные, с ланцетовидными или яйцевидными вершинозубчатыми дольками; зонтики обычно супротивными листьям; обертовка из 5 линейно-ланцетных, с длинными (до 3 мм дл.) столбиками; цветет в конце августа—сентябре. В озерах, канавах, мелких протоках; только на юге Приморья . . . . . 1. *Oe. decumbens* (Thunb.) K.-Pol., *Oe. stolonifera* DC. — *О. лежачий*.


#### Род 19. CNIDIUM Cuss. — ЖГУН-КОРЕНЬ

1. Растения двулетние или многолетние, монокарпные, произрастающие в долинах рек . . . . . 2.  
— Растение многолетник, поликарпный, высокогорное, с многочисленными линейно-ланцетными листочками обертовки . . . . . 3. *C. ajacense* (Rgl. et Til.) Drude — *Ж.-к. азиатский*.  
2. Листочки оберток и обертовок шиловидные; стебли коротко (шероховато) опушенные, полые. На залежах, по межам полей, у дорог . . . . . 2. *C. pliosperum* (L.) Cuss. — *Ж.-к. Монье*.  
— Листочки обертовок овальные или ланцетные, почти целиком плоскостные; стебли голые, сплошные или с узкой полостью. На возвышенных участках среди пойменных лугов; на юго-западе Приморья . . . . . 1. *C. dahuricum* (Jacq.) Turcz. — *Ж.-к. даурский*.

#### Род 20. LIGUSTICUM L. — ЛИГУСТИКУМ

1. Растение кустистое; листья дважды тройчатые, листочки широкоовальные (5—6 см дл. и 3,5—4 см шир.), округленно-зубчатые, сверху глянцевые; все растение голое; цветки белые или розоватые; плоды узкие, до 2,5 см дл.; цветет в июле. Вблизи морского берега . . . . . 1. *L. hultenii* Fern. — *Л. Хультена*.

Таблица 133



*Cicutula virosa* L. (Box жаловитый): а — часть листа, б — корневище (в разрезе) с корнями, в — верхняя часть стебля с соцветиями, г — цветок, д — мерикарпий (с «полуплодик»), вид со спинной стороны, е — мерикарпий, вид с брюшной стороны.



- Листья тройчатые, по жилкам с 2 сторон редкочетинистые; листочки широко-овальные, по краю с крупными округленными зубцами; стебли ребристые; цветки пурпурные; плоды с узокрылатыми ребрами; цветет в конце августа и в сентябре. В дубниках у вершин южных склонов сопков; пока только в Хасанском районе . . . . . 2. *L. purpureopetalum* Kom. — Л. пурпуровоцветный (табл. 134).


# Род 21. CONIOSELINUM Fisch. — ГИРЧОВНИК

Корень мощный, до 3—5 см толщ.; стебли одиночные или в числе нескольких; полые, в узлах несколько изогнутые, 50—150 см выс; листья в общем очертании треугольные, дважды перистые; зонтики и зонтики многолучевые; обертка из 7—12 линейных или линейно-ланцетных, по краям узкозубчатых листочков, немного длиннее цветоносов; спинные ребра плодов уже краевых; цветет в июле. У морских побережий северной части Приморья, на побережье Татарского пролива и Охотского моря . . . . . 1. *C. kamtschaticum* Rupr. — Г. камчатский.

# Род 22. ANGELICA L. — ДУДНИК

1. Конечные дольки листа (листочки) линейно-ланцетные, цельнокрайние; имеются горизонтальные корни . . . . . 5. *A. maximowiczii* (Fr. Schmidt) Benth. — Д. Максимовича (табл. 135).
- Конечные доли листа (листочки последнего порядка) яйцевидные или ланцетовидные, по краям зубчатые; корни отсутствуют . . . . . 2.
2. Влагалища верхних листьев не вздутые, прижатые к стеблю, продолговатоцилиндрические, снаружи коротко опушенные; многолетник, монокарпик; цветет в августе. На юге Приморья . . . . . 2. *A. japonica* Nakai, *A. anomala* auct., non Avé-Lall., p. 13 — Д. японский.
- Влагалища верхних листьев слегка вздутые, отстоящие от стебля, снаружи всегда голые . . . . . 3.
3. Стебли внутри без полости; дольки листьев изгибающиеся на черешок, с мелкопильчатыми краями; цветки белые или пурпурно-красные; спинные ребра плодов выступающие; поликарпик; цветет в августе. На лугах; юг Приморья . . . . . 9. *A. decursiva* (Miq.) Franch. et Sav. — Д. изгибающийся.
- Стебли внутри полые; дольки листьев не спускаются на черешок; спинные ребра плодов не выступающие . . . . . 4.
4. Листочки последнего порядка ланцетные, по краю беловатые (хриповатые); влагалища трубчатые; мерикарии при созревании изгибаются. Среди кустарников и на лугах . . . . . 8. *A. czernaevia* (Fisch. et Mey.) Kitag., *A. laevigata* Benth. et Hook. — Д. Черняева.
- Листочки последнего порядка яйцевидные, по краю зубчатые; мерикарии при созревании не изгибаются . . . . . 5.
5. Цветки зеленоватые; боковые зонтики превышают центральный; стебли остроресчатые. На сырых лугах . . . . . 3. *A. viridiflora* (Turcz.) Benth. — Д. зеленоцвetoный.
- Цветки белые, стебли гладкие или слабо ребристые . . . . . 6.
6. Листья тонкие, с верхней стороны блестящие; корни без утолщения, деревянистые; краевые ребра плодов тонкие, крылатые . . . . . 7.
- Листья толстые; корни мясистые, морщинистые, утолщенные; краевые ребра плодов толстые . . . . . 8.
7. Стебли 70—120 см выс., 3—5 мм толщ., тонкобороздчатые или почти гладкие; конечные листочки 2,5—3 см дл. и 2—2,5 см шир.; листочки оберточки яйцевидные. Только на юге Приморья (Хасанский район) . . . . . 4. *A. koreana* Maxim. — Д. корейский.
- Стебли 80—160 см выс. и 5—8 см толщ., глубокобороздчатые, внизу иногда густо опушенные; конечные листочки 3—6 см дл. и 2—4 см шир.; листочки обертки продолговато-яйцевидные, по краю широколанцетные; многолетник, монокарпик; цветет в сентябре. В поймах рек; на юге Приморья . . . . . 6. *A. miqueliana* Maxim. — Д. Микеля (табл. 136).
- 8 (от 6). Влагалища сильно вздутые, стебель мягкий, гладкий, тонкостенный; плоды с толстыми спинными и краевыми ребрами, канальцы не просвечивают наружу . . . . . 7. *A. dahurica* (Fisch.) Benth. — Д. даурский (табл. 137).
- Влагалища трубчатые вздутые, сильно вниз отогнутые; стебли толстостенные, жесткие, слегка ребристые; листья снизу сизые; плоды с резко заметными черными дольбиками (просвечивающими смолистыми ходами) . . . . . 1. *A. amurensis* Schischk., *A. anomala* auct., non Avé-Lall. — Д. амурский.

Таблица 134



*Ligusticum purpureopetalum* Kom. (Лигустикум пурпуровоцветный): а — общий вид растения, б — цветок, вид сверху, в — цветок, вид сбоку, д — завязь, е — мерикарий (плодушка), вид со спинной стороны, ж — мерикарий, вид сбоку, з — мерикарий, вид с брюшной стороны.

1. Листочки последнего порядка яйцевидные, на верхушке закругленные; листочки обвертки с шиловидным острием; плоды 7—12 мм дл., ребра вадутые; многолетник; цветет в июле. Только у берега моря . . . . . 1. *C. gmelinii* (DC.) Ldb. — П. Грешина.
- Листочки последнего порядка широколанцетные, на верхушке заостренные; листочки обвертки без шиловидного острия; плоды 4—7 мм дл., ребра крылатые, не вадутые; многолетник; цветет в июле. По поймам рек; в Амурской области и Хабаровском крае . . . . . 2. *C. saxatile* (Turcz.) Drude — П. скальный.

## Род 24. GLENNIA Fr. Schmidt — ГЛЕНИЯ

Растение низкое (10—30 см выс.), все густо войлочно-пушистое, беловатое или рыжеватое; корень длинный, стержневой, почти не ветвящийся, вертикальный; листья тройчатоперистые; листья обверток многочисленные, остроколючие; плоды крупные, яйцевидные, 7—9 мм дл., ребра сильно выдающиеся, крылатые; многолетник; цветет в июле. На морском песке . . . . . 1. *G. littoralis* Fr. Schmidt, *Phellopterus littoralis* Benth. et Hook. — Г. прибрежная (табл. 138).

## Род 25. PHLOJODICARPUS Turcz. — ВЗДУТОПЛОДНИК

1. Листья четырехжды перистые, с линейными листочками последнего порядка; плоды опушенные; столбики по длине равны или превышают половину плода; цветет в июле. В верхних горных рек; пока только в Амурской области (реки Гилуй, Зей) и в Хабаровском крае (бассейн р. Тырмы) . . . . . 1. *Ph. komarovii* Gogovoi — В. Комарова.
- Листья дважды-трижды перистые, с ланцетно-линейными жесткими листочками последнего порядка; плоды голые или слабо опушенные; столбики по длине не превышают  $\frac{1}{2}$  часть плода; цветет в августе. На дугах; в северо-западной части Амурской области (с. Давлида); найдено всего 1 раз . . . . . 2. *Ph. sibiricus* (Steph.) K.-Pol. — В. сибирский.


## Род 26. SAROSHNIKOVIA Schischk. — САПОЖНИКОВИЯ

Стебель от основания сильно ветвистый (растение кустистое); корень вертикальный, длинный; главный зонтик на растении выделять нельзя; листья дважды перистые, с клиновидными дольками; завязь покрыта поперечными выростами, почти полностью исчезающими на зрелых плодах; все растение бледно-зеленое; многолетник; цветет в июле—августе. По сухим приречным лугам; в Приморье и Приамурье . . . . . 1. *S. divaricata* (Turcz.) Schischk., *Siler divaricatum* Benth. et Hook. — С. расстопырнная (табл. 139).


## Род 27. PEUCEDANUM L. — ГОРЧНИК

1. Конечные дольки листа с игловидными остроколючими или беловатыми острыми шипиками . . . . . 2.
- Конечные дольки без беловатых шипиков или остроколючей . . . . . 3.
2. Дольки и дольки листьев овальные; остроколючия игловидные, длинные, более 2 мм дл.; обвертка многостная; плодики с узкими, утолщенными ребрами; многолетник; цветет в июле—августе. Только на каменистых россыпях высокогорий Сихотэ-Алиня . . . . . 1. *P. eryngiifolium* Kom. — Г. синеголовинколистный.
- Дольки листьев узкие, линейные, на верхушке с коротким прозрачным шипиком до 2 мм дл.; листья трижды перистые; обверточка из линейных хвостовидно-остроколючих листочков; цветки белые или розовые; плоды ширококрылатые; цветет в августе. На каменистых россыпях высокогорий, на галечниках горных рек и ручьев или среди скал и на скалистых склонах в редких хвойных и смешанных лесах, только в Приморском крае . . . . . 6. *P. elegans* Kom. — Г. изящный.
- 3 (от 1). Листочки второго порядка надрезаны на узкие, длинные дольки до 3—5 мм шир., иногда они по краям (у вершины) узкозубчатые . . . . . 4.
- Листочки второго порядка надрезаны на широкие дольки (5—13 мм шир.), с широкими зубцами, переходящими в короткое (до 0,5 мм дл.) острие . . . . . 5.
4. Конечные дольки листа линейные или линейно-ланцетные, конечный зубец на вершине долек значительно превышает боковые. На Приханкайской равнине . . . . . 4. *P. patshanense* Nakai, *P. terebinthaceum* Fisch., p. p. — Г. пайшанский.

Таблица 135.

*Angelica maximowiczii* (Fr. Schmidt) Benth. (Дудник Максимовича).







*Angelica miqueliana* Maxim. (Дудник Мискаля): а — верхняя часть стебля с соцветиями, б — лист, в — цветок, г — мерикарий («полуплодик»), вид со спинной стороны, д — мерикарий, вид с брюшной стороны.



*Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. (Дудник даурский): а — лист, б — цветок, в — верхняя часть стебля с соцветиями, г — мерикарий («полуплодик»), вид со спинной стороны, д — мерикарий, вид с брюшной стороны.



*Glehnia littoralis* Fr. Schmidt (Гления прибрежная): а — цветок, б — мерикарий (полуплодик), вид со спинной стороны, в — мерикарий, вид с брюшной стороны.



*Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. (Сапожниковия растопыренная): а — цветок, б — лист, в — мерикарий (полуплодик), вид со спинной стороны, г — мерикарий, вид с брюшной стороны.



- Конечные дольки листьев овальные, средний зубец на вершине лишь незначительно превышает боковые; многолетник; цветет в августе. В Амурской области и Западнее . . . . . 2. *P. terebinthaceum* Fisch. — Г. герпентиновидный.
- 5 (от 3). Листовые влагалища плотно прилегают к стеблю и облегают его, по краям пленчатые, фиолетовые; листья в общем очертании овальные, снизу сизые; листочки оберточкой длиннее цветоносов. В Хасанском районе . . . . . 6.
- Листовые влагалища переходят в отстоящий от стебля черешок; листья в общем очертании широкотреугольные, снизу зеленые; листочки оберточкой не превышают цветоносы . . . . . 7.
6. Листья дельтовидные, тонкие, дольки на вершине не закругленные, с коротким, толстым пупком; плоды широкоэллиптические; цветет в августе. На скалах; в Приморском крае . . . . . 8.
- Листья кожистые, толстые, крупно округленно-зубчатые; цветет в сентябре — октябре. На скалах морского берега; в Хасанском районе . . . . . 7. *P. litorale* Worosch. et Gorovoi, *Apium graveolens* auct., non L. — Г. прибрежный (табл. 140).

#### Род 28. PASTINACA L. — ПАСТЕРНАК

Корень деревянистый, веретеновидный; стебель прямой, угловато- и остро-ребристый, 1—2 м выс.; листья простоперистые, по жилкам коротко опушенные; листочки продолговатояйцевидные; оберточка и оберточки отсутствуют; цветки желтые; плоды плоские, каналцы просвечивающие, тонкие, не доходят до основания плода; двулетник; цветет в августе. Заносное; около дорог, на полях, в огородах, садах; в Приморье и Приамурье . . . . . 1. *P. silvestris* Garsault — П. лесной.

#### Род 29. HERACLEUM L. — БОРЩЕВИК

1. Листья тройчатые, каналцы на мерикарии доходят до половины их длины. На материке на побережье Татарского пролива, обычно на Камчатке и на Сахалине . . . . . 1. *H. dulce* Fisch. — Б. сладкий.
- Листья перистые, каналцы на плодах по длине превышают половину плода . . . . . 2.
2. Нижняя сторона листа голая или слабо опушенная. По всей территории Приморья и Приамурья . . . . . 2. *H. moellendorffii* Hance, *H. dissectum* auct., non Ldb. — Б. Меллендорфа (табл. 141).
- Нижняя сторона листа густо опушенная, серебристо-белая. У берега Японского моря севернее мыса Поворотного . . . . . 3. *H. voroschilovii* Gorovoi — Б. Ворошилова.

#### Род CAUCALIS L. — ПРИЦЕПНИК<sup>1</sup>

Однолетник; корень тонкий, веретеновидный; стебель прямой, ветвистый, 10—30 см выс.; листья дважды-трижды перистые, листочки последнего порядка перистопальчатые; листочки супротивными листьями; оберточка нет; оберточка из 3—5 слегка реснитчатых листочков; плоды с шипиками, равными поперечнику плодика. В Амурской области, в окрестностях г. Климучи; заносное . . . . . 1. *C. lappula* (Web.) Grande — П. липучковый.

#### Сем. 94. CORNACEAE Dum. — КИЗИЛОВЫЕ


1. Небольшие растения с деревянистыми подземными ползучими стеблями и травянистыми четырехгранными однолетними стеблями; соцветие головчатое, с оберточкой из крупных, белых, лепестковидных листочков . . . . . Род 1. *Chamaepericlymenum* Graebn. — Дерен.
- Крупные кустарники с красными ветвями; соцветие зонтикообразное . . . . . Род 2. *Thelycrania* (Dum.) Fourg. — Свидина.

#### Род 1. CHAMAEPERICLYMENUM Graebn. — ДЕРЕН

1. Стебель равномерно облиственный; цветки черно-пурпурные; плоды яйцевидно-паровидные или шаровидные, красные, 7—10 мм в diam. В лесах и на болотах вдоль морского побережья . . . . . 1. *Ch. suecicum* (L.) Graebn., *Cornus suecica* L. — Д. шведский (табл. 142, 1).

<sup>1</sup> Род *Caucalis* L. не включен в таблицу для определения родов, так как растение этого рода было собрано всего один раз.

Таблица 140



*Peucedanum litorale* Worosch. et Gorovoi (Горичник прибрежный): слева — общий вид растения, справа — нижняя часть растения с корнем; а — цветок, б — мерикарий (плодоуплодик), вид со спинной стороны, в — мерикарий, вид сбоку.

- Листья (их обычно 6) сосредоточены на верхушке стебля как бы в мутовке; цветки желтовато-белые; плоды шаровидные; ярко-красные, 5—7 мм в диам. В хвойных и смешанных лесах . . . . . 2. *Сп. канадский* (L.) Graebn., *Cornus canadensis* L. — Д. канадский (табл. 142, 2).

Таблица 141

Род 2. *THELYCRANIA* (Dum.) Fourg. — СВИДНА

Кустарник до 2—3 м выс.; молодые ветви красные; листья супротивные, эллиптические или яйцевидно-эллиптические; цветки белые, мелкие; плоды сочные, белые или с синевагим оттенком, с сильно сплюснутой косой косточкой. По рекам, ручьям и по окраинам болот . . . . . 1. *Th. alba* (L.) Pojark., *Cornus alba* L., *Cornus tatarica* Mill. — С. белая (табл. 142, 3).

Сем. 95. *PYROLACEAE* Lindl. — ГРУШАНКОВЫЕ


1. Цветки в однобокой асеновой кисти, подпестичный диск десятираздельный, столбик длиннее тычинок; все листья стебельные . . . . . Род 3. *Ramischia* Opiz — Рамишия.
- Цветки одиночные, в щитках, зонтиках или в неодобочной кисти . . . . . 2.
2. Цветки в неодобочной кисти; коробочка пощипающая; листья обычно все прикорневые . . . . . Род 1. *Pyrola* L. — Грушанка.
- Цветки в щитках, зонтиках или одиночные; коробочка прямостоячая; листья стебельные . . . . . 3.
3. Цветок кисти одиночный, на верхушке стебля, крупный, белый; столбик длиннее тычинок; листья округло-яйцевидные или почти округлые . . . . . Род 2. *Moneses* Salisb. — Одноцветка.
- Цветки в щитках, зонтиковидных кистях или по 1—2; столбик очень короткий; листья продолговатые, обратноклиновидные или ланцетные . . . . . Род 4. *Chimaphila* Pursh — Замолубка.

Род 1. *PYROLA* L. — ГРУШАНКА

1. Зеленых листьев всего 1—2, широкоэллиптических, остальные чешуевидные. В смешанных лесах . . . . . 3. *P. subaphylla* Maxim. — Г. почти безлистная.
- Зеленых листьев много, если же их 1—2, то они почковидные . . . . . 2.
2. Листья небольшие, плоско-почковидные, с сердцевидным основанием, длинно-черешковые; цветки зеленовато-белые. На сухих склонах в смешанных лесах . . . . . 1. *P. renifolia* Maxim. — Г. почколистная.
- Листья не почковидные . . . . . 3.
3. Цветки красные или фиолетово-красные; стебли до 35—40 см выс.; листья крупные, округлые или округло-почковидные, тупо или почти тупо заостренные. В хвойных или смешанных лесах, иногда в болотистых, по Амуру и на севере Приморья . . . . . 2. *P. incarnata* Fisch. — Г. мясокрасная.
- Цветки белые, кремовые, зеленоватые или чуть розоватые; стебли до 30 см выс. . . . . 4.
4. Цветки мелкие, до 5 (6) мм шир.; столбик короткий и не выдается из почти шаровидного венчика; листья округлые или обратноовальные, тупо закругленные, едва заметно тупо городчатые-пильчатые. В лесах, чаще в подольдовой полосе . . . . . 4. *P. minor* L. — Г. малая.
- Цветки более крупные, 1—1,5 см шир., с раскрытым венчиком и удлиненным столбиком. . . . . 5.
5. Листья заостренные; цветки более 1 см шир.; цветочная стрелка без чешуй или же с 1—2 небольшими перепончатыми чешуями. В смешанных лесах; на юге Приморья . . . . . 5. *P. japonica* Sieb. — Г. японская.
- Листья тупо закругленные; цветки около 1 см шир.; цветочная стрелка с 2, реже 1 хорошо развитой перепончатой чешуей. В лиственных и лиственничных лесах на сухих склонах; чаще в Амурской области и на севере Хабаровского края . . . . . 6. *P. dahurica* (Anders) Kom. — Г. даурская.

Род 2. *MONESSES* Salisb. — ОДНОЦВЕТКА

Листья короткочерешковые, пластинка 8—22 мм дл. и почти такой же ширины, при основании клиновидно-суженная; цветочный стебель 1, 3—17 (20) см выс.; коробочка шаровидная, 6—8 мм в диам. В влажных темнохвойных лесах . . . . . 1. *M. uniflora* (L.) A. Gray — О. крупноцветковая.



*Heracleum moellendorffii* Hance (Борщевик Моеллендорфа): а — мерикарий (полоплодик), вид со спинной стороны, б — мерикарий, вид с брюшной стороны, г — лист, д — верхняя часть стебля с цветком.



1. Цветочная кисть более густая, с 10—15 цветками; все растение до 20 (25) см выс.; листья овальные или продолговатойцевидные, 15—35 см шир., острые. В смешанных лесах . . . . . 1. *R. secunda* (L.) Garcke — Р. одноклоновая.  
— Цветочная кисть с 4—10 цветками; все растение до 15 см выс.; листья тупо закругленные, 5—15 мм шир. В хвойных лесах, на сухих склонах; в Амурской области в бассейне р. Амура . . . 2. *R. obtusa* (Turcz.) Frey — Р. тузлая.

## Род 4. CHIMAPHILA Pursh — ЗИМОЛЮБИКА

1. Цветки одиночные, реже по 2; листья овальные, остроколючные или ланцетные, плоскостные, 1,5—2 (3) см дл. и 0,5—1,3 (1,5) см шир. В хвойно-широколиственных лесах; на юге Приморья . . . 2. *Ch. japonica* Miq. — 3. японская.  
— Цветки собраны в густые, полугустые щитки или зонтиковидную кисть; листья продолговато-обратнояйцевидные или ланцетные, до 6—7 см дл. и 1,5—2 (2,5) см шир. В хвойных лесах; нижний Амур и северный Сихотэ-Алинь . . . 1. *Ch. umbellata* (L.) Nutt. — 3. зонтичная.

Сем. 96. MONOTROPACEAE Nutt. — ВЕРТЛЯНИЩЕВЫЕ<sup>1</sup>

1. Цветок 1, крупный, на верхушке стебля . . Род 1. *Monotropa* Nutt. — Вертляница.  
— Цветков несколько, 3—8 (10), в кисти на конце стебля . . . . . 1. *Hypopitys* Adans. — Подбельник.

## Род 1. MONOTROPA Nutt. — ВЕРТЛЯНИЦА

Цветок одиночный, крупный; стебель 10—20 см выс. В хвойных и хвойно-широколиственных лесах; на юге Приморья . . . . . 1. *M. uniflora* L. — В. однокветковая (табл. 143, 1).


## Род 2. HYPOPITYS Adans. — ПОДБЕЛЬНИК

Цветков 3—6, реже 8 (10), в кочечной кисти; стебель 10—25 см выс. В хвойных лесах . . . . . 1. *H. monotropa* Grantz, *Monotropa hypopitys* L. — П. обыкновенный (табл. 143, 2).

## Сем. 97. ERICACEAE Juss. — ВЕРЕСКОВЫЕ

1. Листья мелкие, чешуевидные, черепитчато налегающие и плотно прижатые к стеблю яйцевидно-треугольные, вечнозеленые; цветки одиночные, колокольчатые, белые . . . . . Род 5. *Cassiope* D. Don — Кассиопа.  
— Листья различной величины, плоские или с сильно завороченными краями, вечнозеленые или опадающие на зиму . . . . . 2.  
2. Плоды мясистые, сочные или мучнистые, с 4—5 косточками; листья с хорошо выраженным сетчатым жилкованием . . . . . 3.  
— Плоды сухие — коробочки с очень мелкими многочисленными семенами; листья без резко выдающегося сетчатого жилкования . . . . . 4.  
3. Листья опадающие на зиму, обратнояйцевидные или обратноланцетные, осенью обычно сильно краснеющие; плод — сочная ложная костянка с 4—5 косточками . . . . . Род 9. *Arctostaphylos* (A. Gray) Nied. — Арктофилос.  
— Листья кожистые, вечнозеленые, продолговато-обратнояйцевидные, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу более светлые, полнокрайние, короткочерешчатые; плод — мучнистая красная гладкая костянка . . . . . 4.  
4 (от 2). Листочки свободные от основания, белые, цветки в зонтиковидных или щитковидных соцветиях; коробочка раскрывается от основания; листья вечнозеленые, кожистые с сильным запахом . . . . . Род 1. *Ledum* L. — Багульник.  
— Цветки стреловидные, различной окраски; розовые, фиолетовые, золотисто-желтые, зеленоватые или белые; коробочка раскрывается с вершины или распадается на отдельные доли; листья вечнозеленые или опадающие на зиму . . . 3.  
5. Листья линейные, до 15 мм дл., узкие, 1—2 мм шир., вечнозеленые; венчики колокольчатые, в зонтиковидных кистях . . Род 4. *Phyllodoce* Salisb. — Филлодоце.  
— Листья иже, не линейные и более широкие, вечнозеленые или опадающие . . 6.

<sup>1</sup> Безхлорофильные сапротитные сочные растения с чешуевидными, белыми или чуть желтоватыми листьями, при сушке в гербарии сильно чернеют.



1 — *Chamaeperitymum succinum* (L.) Graebn. (Дорен шведский); 2 — *Ch. canadense* (L.) Graebn. (Д. канадский); 3 — *Thelycrania alba* (L.) Pajark. (Слидидна белая); 4 — цветок.

6. Листья снизу с плотным синеваато-белым восковым налетом; цветки розовые, в верхушечных зонтиковидных кистях; коробочка почти шаровидная . . . . . Род 6. *Andromeda* L. — Подбел.
7. Листья снизу без белого воскового налета . . . . . Род 7. *Chamaedaphne* Moench — Хамедифне.
8. Соцветие изредка чешуйчат на нижней стороне листьев нет . . . . . Род 3. *Loiseleuria* Desv. — Луизелерия.
8. Небольшие распростертые кустарнички с мелкими, 3—8 мм дл., эллиптическими, вечнозелеными листьями; цветки в зонтиковидной кисти, розовые или белые, колокольчатые; коробочка шаровидная . . . . . Род 3. *Loiseleuria* Desv. — Луизелерия.
- Кустарнички различной величины с вечнозелеными или опадающими листьями; цветки немного неправильные, часто крупные, коробочка с 5 створками . . . . . Род 2. *Rhododendron* L. — Рододендрон.


#### Род 1. *LEDUM* L. — БАГУЛЬНИК

1. Листья широкие, 1—2 см, продолговатые или продолговатоланцетные . . . . . 2.
- Листья узкие, 5—7 (12) мм шир., линейные или линейно-ланцетные, с сильно заворачиваемыми краями . . . . . 3.
2. Листья снизу белые; кустарничек около 1 м выс. Образует заросли в листовничниках и по краям осыпей . . . . . 4. *L. hypoleucum* Kom. — Б. подбел.
- Листья снизу без белого налета, с более или менее густым рыжим опушением. На моховых болотах и по краям осыпей в горах . . . . . 3. *L. macrophyllum* Tolm. — Б. крупнолистный.
- 3 (от 1). Листья очень узкие, не шире 2 мм, с сильно заворачиваемыми краями; небольшой кустарничек с приподнимающимися ветвями. На голых, в северной части и на болотах . . . . . 2. *L. descurvenum* (Ait.) Small — Б. приземистый.
- Листья более широкие, до 5—7 (12) мм, с менее заворачиваемыми краями; постоянный кустарничек. На моховых болотах и в листовничниках . . . . . 1. *L. palustre* L. — Б. болотный.

#### Род 2. *RHODODENDRON* L. — РОДОДЕНДРОН

1. Листья с обеих сторон или же только снизу с круглыми, сидячими, чешуевидными ароматическими железками . . . . . 2.
- Сидячих чешуевидных железок нет . . . . . 5.
2. Листья мелкие, 10—20 мм дл. и 4—8 мм шир., продолговато-обратнояйцевидные или эллиптические, с обеих сторон железистые, короткочерешковые, со слабо завернутым краем; цветки собраны в густое соцветие, фиолетово-розовые (изредка белые) до 15—20 мм в диам.; кустарник 50—100 (120) см выс. На голых и на моховых болотах; в северной части . . . . . 3. *Rh. parvifolium* Adams — Р. мелколистный.
- Листья обычно более крупные, (1.7) 2.5—5 (8) см дл. и до 1.5—2 (3) см шир., край листа не завернутый; более крупные кустарнички, до 1.5—3 (4) м выс. . . . . 3.
3. Листья 2—8 см дл. и до 2.5 (3) см шир., эллиптические или продолговатоэллиптические, обычно более или менее к обоим концам заостренные, снизу бледно-зеленые, на зиму почти все опадают (остается обычно 1—2 верхушечных листа); цветки крупные, до 4—5 см в диам.; коробочка крупная, до 1.5—2 см дл.; круглый кустарник, цветет до распускания листьев. На сухих каменистых склонах, по скалам, обрывам и россыпям; на юге Приморья; часто . . . . . 4. *Rh. mucronulatum* Turcz. — Р. остроколючный.
- Листья . . . . . 4. *Rh. mucronulatum* Turcz. — Р. остроколючный.
- Листья . . . . . 4. *Rh. mucronulatum* Turcz. — Р. остроколючный.
4. Листья до 3.5 см дл. и 2 см шир., обычно почти все заворачивающиеся, с обеих сторон железистые; цветет в облиственном состоянии, цветки до 3—4.5 см в диам.; коробочка на сравнительно длинной ножке, 9—15 мм дл. По скалам морского побережья; от бухты Ольги до Советской Гавани . . . . . 6. *Rh. sichotense* Pojark. — Р. сихотадзинский.
- Листья до 2.5—3.5 (5) см дл. и до 2 см шир., почти все на зиму опадающие, сверху темно-зеленые, снизу рыжие или красно-бурые; цветет без листьев; цветки до 2.5—3 (4) см в диам.; коробочка на более короткой ножке, 3.5—7 мм дл. На сухих склонах в сосновых и листовничных лесах и на болотах; особенно в Амурской области . . . . . 1. *Rh. dahuricum* L. — Р. даурский.
- 5 (от 1). Листья плотные голые кожистые, вечнозеленые . . . . . 6.
- Листья опадающие, с ресничками по краю . . . . . 7.

Таблица 143



1 — *Monotropa uniflora* L. (Вертикальная одноцветковая); 2 — *Hypopitys monotropa* Grantz (Ползучий обыкновенный).







Род 1. DIAPENSLA L. — ДИАПЕНСИЯ

Таблица 144


Небольшой кустарничек, часто образующий подушки; листья вечнозеленые, сидячие, лопатчатые, с завороченными краями, 3—8 мм дл.; цветки одиночные, крупные (около 10 мм в diam.), венчик белый, цветоножки 1.5—3 (5) см дл.; коробочка почти шаровидная. На гольцах и на скалах у моря . . . . . 1. *D. obovata* (Fr. Schmidt) Nakai — Д. обратнотупцевидная.

Сем. 100. PRIMULACEAE Vent. — ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1. Все листья прикорневые; цветонос безлистный или облиственный, но тогда растения образуют дернины . . . . . 2.
- Цветущий стебель облиственный; цветки одиночные или соцветия иного характера . . . . . 4.
2. Лепестки белые, цветки мелкие; трубка венчика очень короткая, горловидно суживающаяся под отгибом; небольшие травки с различными листьями . . . . . Род 2. *Androsace* L. — Прозоминия.
- Лепестки розовые, лиловые или пурпурные; цветки до 1 см шир. . . . . 3.
3. Венчик колокольчатый, с 5 острыми лопастями; нити тычинок свободные в колосе; листья длинночерешковые; пластинка в общем очертанности почти округлая. На скалах . . . . . Род 3. *Cortusa* L. — Кортуса.
- Венчик с длинной, прямой трубкой и плоским отгибом; лепестки тупые; нити тычинок свободные, очень короткие . . . . . Род 1. *Primula* L. — Первоцвет.
- 4 (от 1). Венчика нет; чашечка розовая венчиковидная; цветки сидячие, в пазухах мелких супротивных мясистых листьев. Мелкие растения солончаков и морских побережий . . . . . Род 7. *Glaux* L. — Глаукс, Млечник.
- Венчик развитый, белый, желтый, или розоватый; чашечка зеленая . . . . . 5.
5. Цветки одиночные, снежно-белые; венчик с 7 лопастями; листья под соцветием обильные почти в мутовку, крупные, в средней части стебля расположены по спирали (1—5), мелкие . . . . . Род 6. *Trientalis* L. — Седмичник.
- Цветки желтые или белые, собраны в кисти или метелки . . . . . 6.
6. Цветки мелкие, в густых кистях, находящихся в пазухах супротивных листьев; кисти значительно короче листьев; венчик шести-семилопастный, между долями венчика есть стаминодии в виде зубчиков . . . . . Род 5. *Naumburgia* Moench — Кизляк.
- Цветки в верхушечных метелках или кистях; венчик пятилопастный . . . . . Род 4. *Lysimachia* L. — Верейник.

Род 1. PRIMULA L. — ПЕРВОЦВЕТ

1. Листья всегда голые, без черешков или черешковые . . . . . 2.
- Листья, черешки и цветоносы густо опушены; листья длинночерешковые; пластинка яйцевидная, с сердцевидным основанием; цветонос до 25 см выс.; коробочка почти шаровидная; цветет весной. На лугах, среди кустарников в поймах рек . . . . . 1. *P. patens* Turcz. — П. отклоненный (табл. 144, 1).
2. Растение с белым, муцистым налетом (на нижней стороне листа, под соцветием или на цветоножках); листья без черешков, ланцетные или черешок ширококрылатый, в 2 раза длиннее пластинки . . . . . 3.
- Растения без муцистого налета; листья на тонких черешках, клиновидные, в верхней части зубчатые. На высокогорных лужайках; на северо-востоке Амурской области . . . . . 5. *P. siveifolia* Ldb. — П. клинолистный (табл. 144, 2).
3. Листья снизу с белым или густым серо-желтым муцистым налетом . . . . . 4.
- Листья снизу зеленые; цветонос полый, дудчатый, светлая робинизий; зонтики шаровидные, плотные, с восковым налетом в основании; цветет ранней весной. На сырых лугах и в поймах рек . . . . . 4. *P. fistulosa* Turcz. — П. дудчатый (табл. 144, 3).
4. Листья продолговатоланцетные, клиновидно суженные в короткий черешок, по краю мелко и густо зубчатые, снизу с белым или слегка желтоватым муцистым налетом; коробочка почти равна чашечке; цветет в мае—июне. В горах; Приамурье . . . . . 2. *P. laginova* L. — П. муцистый.
- Листья с длинным, ширококрылатым черешком, снизу с густым муцистым налетом; коробочка в 2—3 раза превышает чашечку; растение более крупное (30—40 см выс.); цветет в июне—августе. На лесистых скалах; вдоль морского побережья . . . . . 3. *P. sachalinensis* Nakai — П. сахалинский.



1 — *Primula patens* Turcz. (Первоцвет отклоненный); а — цветок; 2 — *P. siveifolia* Ldb. (П. клинолистный); 3 — *P. fistulosa* Turcz. (П. дудчатый).



1. Растения многолетние, обычно многостебельные, часто образующие плотные дернины; листья линейно-ланцетные, серебристо-белые от густого опушения. По утесам и сухим расклинам; в северо-западной части Приамурья . . . . . 1. *A. insana* Lam. — П. седой.
- Растения однолетние или двулетние, с 1 прикорневой розеткой листьев . . . . . 2.
2. Листья на черешках, эллиптические, округлые или почковидные, не жесткие . . . . . 3.
- Листья сидячие или почти сидячие, ланцетные, или продолговатые, жесткие . . . . . 5.
3. Листья продолговатоэллиптические, по краям редкозубчатые, с крылатым черешком, по длине почти равным пластинке; обверточка из многочисленных линейно-ланцетных (1—4 мм дл.) листочков. На пойменных сырых лугах, по сырым дорогам, по песчано-галечным берегам рек и озер; по всей территории Приморья и Приамурья . . . . . 5. *A. filiformis* Retz. — П. литевидный (табл. 145, 2).
- Листья почковидные или округлые . . . . . 4.
4. Листья почковидные, с выемчатым основанием; венчик едва превышает чашечку. На влажных лугах, по берегам рек и ручьев; в долине Амура . . . . . 3. *A. gracilini* (Gaertn.) Roem. et Schult. — П. Гмелина.
- Листья округлые, без сердцевидного основания; венчик в 2 раза превышает чашечку. Долина р. Суйфуна . . . . . 2. *A. umbellata* (Lour.) Merr. — П. зонтичный.
- 5 (от 2). Листья к вершине суживающиеся, острые; венчик в 2 раза длиннее чашечки. На щебнистых склонах, лесных опушках и береговых обрывах; в Амурской области . . . . . 4. *A. lactiflora* Pall. — П. молочнокветковый.
- Листья к вершине расширяющиеся и здесь зубчатые; венчик почти равен чашечке. На сухих лугах, полях и песчаных местах; в Приморском крае, веретно, запосное . . . . . 6. *A. septentrionalis* L. — П. северный (табл. 145, 3).

## Род 3. CORTUSA L. — КОРТУЗА

1. Листовая пластинка с надрезаннозубчатыми лопастями (глубоколопастная), по краям волосистая; все растение длинно-густо-железисто-волосистое. На влажных скалах в лесном поясе гор; в Приморье и в Хабаровском крае (Де-Кастри) . . . . . 1. *C. pekinensis* (A. Richt.) Kom. et Alliss. — К. пекинская (табл. 145, 1).
- Листовая пластинка с тупозубчатыми лопастями; все растение с редкими, мелкими волосками. На мшистых камнях у ручьев в лесном поясе гор Амурская область (хр. Тукурингра, пос. Экимчан) . . . . . 2. *C. amurensis* Fed. — К. амурская.

## Род 4. LYSIMACHIA L. — ВЕРБЕЙНИК


1. Цветки белые или розоватые, собраны в плотные кисти; листья на черешках . . . . . 2.
- Цветки желтые; соцветие — пирамидальная метелка; листья сидячие, ланцетные, супротивные или мутовками, с верхней стороны покрыты черными точками; стебель в нижней части с зачаточными листьями, голый, в верхней коротко густо опушенный; в основании стебля имеются столоны. На лугах, в кустарных зарослях и дубяках . . . . . 3. *L. davurica* Ldb. — В. даурский.
2. Листья широколанцетные, с черными точками, сужены в черешок; стебель голый или слабо опушенный, извилистый; опушение по всему растению слабо заметное. В лесах, среди кустарников, на сухих лугах; в Приморье . . . . . 2. *L. clethroides* Duby — В. лавдинский.
- Листья узколанцетные (не шире 1.5—1.8 см), без черных точек, в основании клиновидные, сидячие, с обеих сторон опушенные; стебель прямой, покрыт отстоящими волосками, особенно густо в верхней части и в соцветии. На лугах и среди кустарников; в Приморье и Приамурье . . . . . 3. *L. barystachys* Ege. — В. густоцветковый.

## Род 5. NAUMBURGIA Moench — КИЗЛЯК

Стебель 25—60 см выс., с морщинистым, выпускающим подземные побеги; нижние листья чешуевидные, верхние ланцетные, длинно заостренные, супротивные, снизу покрытые длинными, спутанными волосками; цветки желтые, в кистях, находящихся в пазухах верхних листьев. На болотах и в неглубоких водах различных водоемов (рек, стариц, озер, луз) . . . . . 1. *N. thyrsiflora* (L.) Rehb. — К. кистецветный.

## Род 6. TRIENTALIS L. — СЕДМИЧНИК

Стебель 7—20 см выс., в нижней части с чешуйчатыми листьями, в верхней с ланцетными или овальными (1—5 см дл.), сближенными подобно мутовке, цветков одиночный или в числе 2—3, голый или редко железисто опушенный.



1 — *Cortusa pekinensis* (A. Richt.) Kom. et Alliss. (Кортуза пекинская); 2 — *Androsace filiformis* Retz. (Проломник литевидный); 3 — *A. septentrionalis* L. (П. северный).



В лесах, особенно часто в горных хвойно-широколиственных или хвойных  
1. *T. europaе* L. — С. европейский.

Вид *T. arctica* Fisch. ex Hook. имеет очень нечеткие отличия от *T. europaе* L. (количество стеблевых листьев и опушенность цветоноса). Среди просмотренных гербарных экземпляров рода *Trientalis* L. с Дальнего Востока нам не удалось обнаружить растений, которые бы отличались от *T. europaе* L.

Род 7. *G. LAUX* L. — ГЛАУКС, МЛЕЧНИК

Небольшое, 4—25 см выс., сизовато-зеленое растение с супротивными мясистыми ланцетными листьями (4—1,5 см дл.) и цветками в пазухах листьев. По берегам, болотам, на песчаных откосах и сырых лугах  
1. *G. maritima* L. — Г. приморский.

## Сем. 101. PLUMBAGINACEAE Juss. — СВИНЧАТКОВЫЕ

Род 1. *ARMERIA* Willd. — АРМЕРИЯ

Листья скучены на верхушке стеблевых побегов, многочисленные, узколинейные, 2—8 см дл. и 0,5—1,5 мм шир.; цветонос до 30 см дл.; цветки в шаровидной головке, пурпурно-розовые или фиолетово-пурпурные, с переполчатыми прицветниками. На голых  
1. *A. arctica* (Cham.) Wallr. — А. арктическая.

## Сем. 102. OLEACEAE Hoffm. et Link — МАСЛИНОВЫЕ


1. Листья сложные, перистые, плод — односемянная летучка; двудомные деревья  
Род 1. *Fraxinus* L. — ЯСЕНЬ.  
— Листья простые, цельнокрайные; плод — коробочка; небольшие деревья или крупные кустарники с обоеполюми цветками  
Род 2. *Syringa* L. — СИРЕНЬ.

Род 1. *FRAXINUS* L. — ЯСЕНЬ

1. Листья с 7—11 листочками, листочки продолговато-ййцевидные, косоваловые или ланцетно-ланцетные и широколанцетные, кромка зазубренная, с тонким остроконечием; цветки без околоцветника; плоды до 3,5 см дл. и до 8—9 мм шир., на конце закругленные или выпябленные; крупные, до 30—35 м выс. и до 1—1,5 м в диам., деревья с одноцветной корой. По долинам рек и ручьев  
1. *F. mandshurica* Rupr. — Я. маньчжурский (табл. 146, 2).  
— Листья с 5—7 листочками, листочки на бесплодных веточках округло- или обратноовальные, с резко выделяющимся, иногда слегка загнутым остроконечием, листочки плодущих ветвей продолговатоэллиптические или обратноййцевидные; цветки только с чашечкой; плоды 3—4 см дл. и около 5 мм шир., кверху распрямленные и закругленные; кора молодых деревьев с белыми белыми пятнами; деревья до 8—10, очень редко до 20 м выс. По горным склонам в дубниках и смешанных лесах; только на юге Приморья  
2. *F. rhynchophylla* Hance — Я. носолетный, Я. горный (табл. 146, 1).

Род 2. *SYRINGA* L. — СИРЕНЬ

1. Листья овальные, округло-овальные или эллиптические, длинно заостренные, голые; цветки белые или кремовые, мелкие, с короткой трубкой, в крупных, густых, многоцветковых кистях; коробочки крупные, двухгнездные, тупые, с белыми точками; небольшое дерево, 5—7 (10) м выс., или крупный куст с характерным ложнодихотомическим ветвлением. По рекам и ручьям в лесу  
2. *S. amurensis* Rupr., *Ligustrina amurensis* Rupr. — С. амурская, «трескуха».  
— Листья продолговатые, крупные, более или менее опушенные, реже голые; соцветие обильное, метельчатое, перьястое, цветки пурпурные или светлолиловые, с длинной трубкой; коробочки узкие, острые, без белых точек; крупный куст, до 3—4 (5) м выс. По окраинам каменистых россыпей в горах или по берегам горных рек и ручьев; на юге Приморья  
1. *S. wolffii* C. K. Schneid., *S. robusta* Nakai — С. Вольфа (табл. 147).



1 — *Fraxinus rhynchophylla* Hance (Ясень носолетный, Я. горный); 2 — *F. mandshurica* Rupr. (Я. маньчжурский); а — лист, б — плод.




1. Венчик с 4 шпорцами, цветки бледно-желтые или зеленовато-белые; однолетники . . . . . 2.
- Шпорец нет, цветки различной окраски; однолетники и многолетники . . . . . 3.
2. Стебель вьющийся; однолетники . . . . . 1. *Crawfordia* Wall. — Крауфурдия.
3. Стебель не вьющийся; однолетники или многолетники . . . . . 3.
3. Венчик трубчато-колокольчатый или воронковидный, голубой, синий или сине-фиолетовый; однолетники или многолетники . . . . . 2. *Gentiana* L. — Горечавка.
- Венчик с очень короткой трубкой, часто почти плоский . . . . . 4.
4. Многолетники; стебли толстые, 20—120 см выс.; цветки пятнистые, желтовато-белые или желтовато-зеленые, с черно-фиолетовыми точками или же венчик грязно-фиолетовый . . . . . 5. *Swerfia* L. — Сверфия.
- Однолетники; стебли тонкие, 10—40 (50) см выс.; цветки четырех- или пятичленные, бледно-голубые, синие, грязно-фиолетовые или золотисто-желтые . . . . . 5.
5. Венчик колесовидный, обычно хорошо развит; стебли тонкие, цветки бывают четырехчленные; рыльца сидячие; цветки одиночные, на длинных цветоножках . . . . . 3. *Lomatogonium* A. Br. — Ломатогониум.
- Венчик четырех- или пятичленный; рыльца развиты; цветки в пучках, на неравных цветоносах . . . . . 4. *Ophelia* D. Don — Офелия.

Род 1. CRAWFURDIA Wall. — КРАУФУРДИЯ

Стебель вьющийся, тонкий, до 1 м дл.; листья супротивные, ланцетные или овально-ланцетные, короткочерешковые; цветки одиночные, реже по 2—3, четырехчленные; отгиб венчика небесно-голубой; чашечка крылатая; цветет в сентябре. Нередка; в широколиственных лесах и среди кустарников . . . . . 1. *C. volubilis* (Maxim.) Makino — К. вьющаяся (табл. 148, 1)

Род 2. GENTIANA L. — ГОРЕЧАВКА

1. Маленькие, 2—5 (10) см выс., растения, цветущие весной (май или начало июня) . . . . . 2.
- Растения различных размеров, обычно более крупные, цветущие в сентябре, реже в конце августа . . . . . 3.
2. Прикорневые розетки обычно хорошо развиты; стебли мелко и густо железисто-пушистые, ветвистые; листья с узкой, белой, хрящевой каймой; цветки мелкие, светло-синие или лазоревые. На открытых местах . . . . . 6. *G. squarrosa* Ldb. — Г. распуширенная (табл. 148, 3).
- Прикорневой розетки нет или имеется всего 1—2 листа; стебли голые, чаще простые, реже наверху слегка ветвистые; листья с белой, узкой каймой; цветки голубые или ярко-синие. В лиственных и смешанных лесах . . . . . 7. *G. zollingeri* Fawcett — Г. Золлингера (табл. 148, 2).
- 3 (от 1). Листья очень крупные, 15—40 см дл. и 15—30 (45) см шир., прикорневые образуют на боковых ветвях корневых розеток; стебли толстые, прямые или немного приподнимающиеся, цветки интенсивно сине-фиолетовые, 15—20 мм дл. На сухих лугах; по морскому побережью (бухта Тетюхе и севернее) и в Амурской области . . . . . 4. *G. macrophylla* Pall. — Г. крупнолистная.
- Листья гораздо меньших размеров (обычно 5—7, реже 10—15 см дл.) . . . . . 4.
4. Стебли остро- и мелкошероховатые; листья яйцевидные или овальные, 2,5—7 см дл. и 0,7—3 см шир.; венчик темно-синий; многолетник с довольно мощной корневой системой. Часто; на сырых колючих лугах и среди кустарников . . . . . 1. *G. scabra* Ege. — Г. шероховатая (табл. 148, 4).
- Стебли голые . . . . . 5.
5. Многолетники . . . . . 6.
- Однолетники или двулетники . . . . . 7.
6. Растение с прикорневыми листьями, продолговато- или линейно-ланцетными 7—15 см дл. и 4—8 (10) мм шир.; стебли прямые, (10) 20—25 (35) см выс.; цветки по 2—5, редко одиночные, окруженные верхушечными листьями; венчик беловато-зеленовато-золотистый. Горная тундра в бассейне р. Хора (гора Ко) . . . . . 3. *G. alga* Pall. — Г. холмовая.
- Прикорневых листьев ко времени цветения нет; стебли прямые, 40—80 см выс.; листья ланцетно-линейные, 5—8 (13) см дл. и 4—8 мм шир.; цветки в пучках по 3—5, на вершине стебля, темно-синие (очень редко белые). Часто; на лугах, среди кустарников и в лесу, в горах, на опушках . . . . . 2. *G. triflora* Pall. — Г. трехцветковая.
- 7 (от 5). Край листьев слегка заворочен; листья 0,5—1,5 (2) см дл. и 2—5 (6) мм шир.; стебли 5—10 см выс.; цветки относительно крупные, 2—2,5 (3) см дл., фиолетово-



*Syringa wolffii* C. K. Schneid. (Сирень Вольфа).

- светло-голубые. На морском берегу; севернее бухты Ольги . . . . . 10. *G. auriculata* Pall. — Г. ушконосная.
- Зубцы чашечки узко остроконечные, цветки всегда четырехчленные . . . . . 9.
9. Стебли сильно ветвистые (пучками); цветков много, 10—20 (40) на одном растении; венчик с голубым отгибом, узкоколокольчато-трубчатый; стеблевые листья ланцетные . . . . . 8.

Таблица 147

- цетнолинейные, заостренные. На сухих лугах и среди кустарников . . . . . 9. *G. Komarovii* Grossh. — Г. Комарова.  
 — Стебли простые или слабо ветвистые; цветки немногочисленные, на концах стебля и ветвей, на очень длинных цветоножках; венчик с синим отгибом, узковорончато-трубчатый. На лесных лугах и в горах; по Амуру . . . . . 8. *G. barbata* Froel. — Г. бородастая.

### Род 3. LOMATOGONIUM A. Br. — ЛОМАТОГОНИУМ

Стебли прямые или более или менее ветвистые, 5—15 (30) см выс., голые; стеблевые листья узколинейные, острые, 10—15 (25) мм дл. и 2—3 мм шир.; венчик голубой или светло-синий, 8—15 мм дл. На сырых лугах, на болотах и в горах . . . . . 1. *L. rotatum* (L.) Fries — Л. колесовидный.

### Род 4. ORNELIA D. Don — ОФЕЛИЯ

1. Цветки золотисто-желтые, обычно пятичленные; стебель 6—10 (15) см выс. На сухих лугах; на юге Приморья (Хасанский район) . . . . . 2. *O. tscherskii* (Kom.) Grossh. — О. Черского.  
 — Цветки синие или грязно-фиолетовые . . . . . 2.  
 2. Цветки обычно пятичленные, грязно-фиолетовые; стебли обычно ветвистые, реже простые, 10—25 (30) см выс. На сухих склонах . . . . . 1. *O. chinensis* Bge. — О. китайская (табл. 149, 1).  
 — Цветки четырехчленные, темно-синие . . . . . 3.  
 3. Листья линейные или продолговатые. В лесах, на лугах и среди кустарников; преимущественно в более северных районах . . . . . 3. *O. tetrapetala* (Pall.) Grossh. — О. четырехлепестная.  
 — Листья яйцевидно-треугольные. В дубняках, сосняках и среди кустарников; преимущественно на юге Приморья . . . . . 4. *O. wilfordii* Kerner — О. Вильфорда.

### Род 5. SWERTIA L. — СВЕРЦИЯ

1. Стеблевые листья супротивные; стебли 60—120 (150) см выс.; венчик светлый, желтовато-белый, с черно-фиолетовыми точками. Редко; по травянистым склонам; на Амуре и в Приморье (Русский остров) . . . . . 2. *S. veratroides* Maxim. — С. чемерицевая.  
 — Стеблевые листья очередные; стебли 20—35 (50) см выс.; венчик грязно-фиолетовый. На лугах; редко; только в северо-западной части Амурской области . . . . . 1. *S. obtusa* Ldb. — С. тупая (табл. 149, 2).

### Род 6. HALENIA Borkh. — ГАЛЕНИЯ

Однолетник; стебли четырехгранные, обычно ветвистые, до 40—50 см выс.; листья супротивные, стеблевые продолговатоэллиптические, с 3 жилками; цветки 8—11 мм дл., зеленовато-бледно-желтые, со шпорцами. Очень часто; на разнотравных лугах и по лесным опушкам . . . . . 1. *H. corniculata* (L.) Cornaz — Г. рогатая (табл. 149, 3).

## Сем. 104. MENYANTHACEAE Duth. — ВАХТОВЫЕ

1. Листья цельные, округло-эллиптические, плавающие на поверхности воды . . . . . Род 2. *Nymphaoides* Hill — Болотоцветник.  
 — Листья трехраздельные, не плавающие . . . . . Род 1. *Menyanthes* L. — Вахта.


### Род 1. MENYANTHES L. — ВАХТА

Листья длинночерешковые с глубоко трехраздельной пластинкой (как бы тройчатые); цветоносный стебель без листьев, с густой кистью белых, реже бледно-розовых цветков, лепестки которых с внутренней стороны густо- и длиннобахромчатые. На моховых болотах и по краям зарастающих водоемов, обычно в воде . . . . . 1. *M. trifoliata* L. — В. трехлистная, «трифоль».

### Род 2. NYMPHOIDES Hill — БОЛОТОЦВЕТНИК

1. Венчик ярко-желтый, 15—22 мм дл., цветки в зонтиковидном пушке; коробочка яйцевидная, 18—20 (25) мм дл., с плоскими, широко окаймленными реснитчатыми семенами. В озерах и старицах . . . . . 1. *N. peltatum* (S. G. Gmel.) Kuntze — В. щитовидный.

Таблица 148



1 — *Craufurdia volubilis* (Maxim.) Makino (Крауфурдия вьющаяся), часть травянистой лопы с листьями и цветками; 2 — *Gentiana solitaria* Fawcett (Горечавка Полантера); 3 — *G. squarrosa* Ldb. (Г. расстолпленная); 4 — *G. scabra* Bge. (Г. широковетвистая).



- Венчик белый, 4,5 мм дл.; цветки в пучках по 3—7; коробочка яйцевидно-эллиптическая, до 4—5 мм дл.; семена гладкие, блестящие. В озерах; только на самом юге Хасанского района. . . . . 2. *N. koreanum* (Lévl.) Naga — Б. корейский.

Таблица 149

Сем. 105. ASCLEPIADACEAE R. Br. — ВАТОЧНИКОВЫЕ,  
ЛАСТОВНЕВЫЕ

1. Стебли выходящие; выемка сердцевидных листьев имеет наименьшую ширину у места прикрепления черешка, листья с хорошо заметными, перисто расположенными жилками; цветки грязно-розовые, внутренняя поверхность лепестков бордюрная (с многочисленными длинными отстоящими волосками); коронка вокруг тычинок простая (не имеет лопасти), в виде низкого кольца; плоды (листья) веретеновидные, со спинной и брюшной стороны приплюснутые, на вершине заостренные и крючковидно загнутые. . . . . Род 2. *Metaplexis* R. Br. — **Метаплексис**.
- Стебли не выходящие (если выходящие, то листья лишь слегка сердцевидные или с очень глубокой сердцевидной выемкой, наиболее широкой у места прикрепления черешка); жилки на листьях мало заметные, а если заметные, то сетчато расположенные; цветки не бывают грязно-розовыми, лепестки изнутри коротко опушенные (не бывают бордюрными); коронка с 5 выдающимися лопастями. . . . . 2.
2. Коронка с 5 разделенными полулунными мясистыми лопастями, сросшимися с гинеоцием и с пыльниками; листья линейно-ланцетные, толстые, лишь по краям реснитчатые; стебли, цветоносы и черешки листьев голые; стебель отпочков. прямой, поникающий; соцветия в почти шпиковидных кистях, в пазухах верхних листьев; цветки зеленовато-желтые; плоды продолговато-остроконечные, тупые; корневище короткое, в свежем виде с приятным запахом. . . . . Род 1. *Pycnostelma* Bge. — **Пикностельма**.
- Коронка чашевидная, складчатая или пленчатая, лопасти ее не срастаются с пыльниками; листья эллиптические, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные (если ланцетные, то всегда густо или рассеяно опушенные); стебли почти всегда в числе нескольких, прямые (не поникающие) или выходящие; цветки белые, желтовато-белые или розовые (если цветки желтовато-бурые, то стебли выходящие). . . . . Род 3. *Cynanchum* L. — **Ластовень, Цинанхум**.

Род 1. PYCNOSTELMA Bge. — ПИКНОСТЕЛМА

Остепненные районы Приморья и Приамурья; среди лишай и дубняка, на каменистых склонах и песчаных гнизах; довольно редко.

- . . . . . 1. *P. paniculata* (Bge.) Schumann — П. метельчатая (табл. 150, 1).


Род 2. METAPLEXIS R. Br. — МЕТАПЛЕКСИС

Довольно обычны в Приморье и в среднем течении Амура; в долинах среди кустарников, тростника и полных зарослей, реже на склонах среди лесоплоскы и лишай.

- . . . . . 1. *M. japonica* (Thunb.) Makino — М. японский (табл. 150, 2).

Род 3. CYNANCHUM L. — ЛАСТОВЕНЬ, ЦИНАНХУМ

1. Стебли не выходящие. . . . . 2.
- Стебли выходящие хотя бы в верхней части. . . . . 7.
2. Нижние стеблевые листья яйцевидные или эллиптические. . . . . 7.
- Нижние стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные. . . . . 3.
3. Листья и стебли густо бархатисто опушенные; листья толстые, при основании округлые, широкояйцевидные или почти округлые, с черешками 0,5—1 см дл.; цветки 20—22 мм в диам., черно-пурпурные; венчик снаружи густо опушенный, внутри голый. Заросли кустарников по луговым склонам и в долинах, реже в дубяках; по среднему течению Амура, в южной и западной части Приморья. . . . . 1. *C. atratum* Bge., *Antiozium atratum* (Bge.) Pobed. — П. чернотылый (табл. 151, 1).
- Листья и стебли без густого бархатистого опушения; листья тонкие, мягкие (или жесткие, кожистые); цветки не крупнее 13 мм в диам., желтовато-бурые или белые (не бывают черно-пурпурными); лопасти венчика снаружи голые или слабо опушенные. . . . . 4.
4. Все растение голое; листья сидячие, стеблеобъемлющие, жесткокожистые, под углом вверх торчащие, эллиптические, при основании сердцевидные; цветки желтые, 10—15 мм в диам.; лопасти венчика внутри белоопушенные; плоды



1 — *Ophelia chinensis* Bge. (Офелия китайская); 2 — *Swertia obtusa* Ldb. (Свертия тупая), верхняя часть стебля с листьями и цветками; 3 — *Halenia corniculata* (L.) Comar (Галения рогатая); а — верхняя часть стебля с листьями и цветками, б — цветок.

- лапчатые, длинно оттянутые, 5—8 см дл., голые. Сухие луга и луговые склоны Приханкайской низменности, а также по долинам Суйфуна, Хесури и некоторых других рек равнинного пояса и предгорий . . . . . 5. *C. amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. — *А. амplexикаульный* (табл. 151, 2).
- Листья и стебли имеют хотя бы редкое и рассеянное опушение; листья на черешках не менее 0,5 см дл.; при основании клиновидные или округлые; цветки белые или желтовато-бурые, 7—8 мм в diam.; лопасти венчика внутри голые. Лесные растения . . . . . 5.
5. Стебли в числе нескольких, 30—50 см выс., в нижней части несущие 2 ряда волосков; листья 7—8 см дл., опушенные лишь по краям и по жилкам; цветки желтовато-бурые, около 7 мм в diam.; зонтички почти сидячие; цветоножки лишь немного превышают цветки в дубовых и надрубных вырубкой смешанных лесах; на юге Приморья (на север до зал. Олги) . . . . . 3. *C. inamoenum* (Maxim.) Loes. — *А. инамоевум* (Максим.) Побед. — *А. инприятный*.
- Стебли большей частью одиночные, 30—100 см выс., с голыми нижними междоузлиями; листья 11—15 см дл., снизу по всей поверхности опушенные; цветки ярко-белые, 15—18 мм в diam.; зонтички на длинных (4—5 см) цветоносах; цветоножки в 3—4 раза превышают цветки. В Приморье и в западном Приамурье в дубовых и смешанных лесах; часто . . . . . 4. *C. acuminatifolium* Hemsl. — *А. остролистный* (табл. 151, 3).
- 6 (от 2). Стебли и листья рассеянно опушенные длинными волосками, черешки листьев 3—5 мм дл.; цветки 10—12 мм в diam., розовые; цветоножки в 4—6 раз длиннее цветков; коронка тычинок пятилопастная, трубчатая, складчатая, вдвое превышающая гинотегий. Сухие каменистые склоны, опушки дубняков, заросли лишай и прибрежные галечники; по среднему течению Амура и Суйфуна . . . . . 5. *C. purpureum* (Pall.) Schumann. — *С. пурпуровый*.
- Стебли и листья довольно густо опушены короткими волосками; черешки 1—2 мм дл.; цветки 7—8 мм в diam., желтовато-белые; цветоножки в 2—3 раза длиннее цветков; лопасти коронки плечатые, в нижней части и в промежутках мясистые; плечатый придаток пыльника вдвое превышает пыльник. Каменистые и щебнистые оспенные склоны; по среднему течению Амура и Суйфуна . . . . . 6. *C. thesioides* Schumann. — *А. тесиевидный*.
- 7 (от 1). Стебли тонкие (не толще 3 мм), цилиндрические, односторонне опушенные; листья 1—4 см шир., линейно- или яйцевидно-ланцетные, почти сидячие; основание пластинки листа тупое или слегка сердцевидное; соцветие с 2—6 цветками; цветки белые, менее 10 мм в diam. Влажные луга, берега болот и водоемов; Приморский край, а также по долине Амура от Буринского хребта до устья р. Горня . . . . . 7. *C. volubile* (Maxim.) Hemsl. — *А. вьющийся*.
- Стебли более 4 мм в diam., ребристые, голые; листья 4—9 см шир., яйцевидные, с глубоко сердцевидным основанием (сердцевидная выемка имеет наибольшую ширину у основания черешка листа); соцветие имеет более 6 цветков; цветки желтые; цветоножки и цветоносы густо опушенные. Редкое растение; в самой южной части Приморья; на каменистых склонах, среди кустарников и редких деревьев, чаще недалеко от воды . . . . . 8. *C. wilfordii* (Franch. et Sav.) Hook. f. — *С. вильфорди* (Франш. и Сав.) Побед. — *А. вильфорди*.

## Сем. 106. CONVULVACEAE Juss. — ВЬЮНКОВЫЕ

1. Однолетние растения; стебли нитевидный, с 1 годоватым рыльцем; цветоножки при плодах вверх заметно утолщенные; стебли 30—70 см дл., вьющиеся; листья яйцевидные, с постепенно и длинно оттянутым остроконечием и сердцевидным основанием; венчик воронковидно-колокольчатый, розовый или белый, около 15 мм дл.; плод — конически-шаровидная, двухгнездная, четырехсемянная коробочка . . . . . Род 3. *Ipomoea* L. — *Ипомея*.
- Многолетние растения; стебли с 2 линейными или эллиптическими рыльцами; цветоножки при плодах не утолщенные . . . . . 2.
2. Листочка при основании с крупными, охватывающими ее прицветниками; рыльца эллиптические или продолговатозаэллиптические . . . . . Род 2. *Calystegia* R. Br. — *Поней*.
- Листочка при основании лишены прицветников, рыльца линейно-цилиндрические; стебли вьющиеся или лежачие; листья от яйцевидно-эллиптических до треугольных и линейно-продолговатых; венчик 15—30 мм дл., розовый (реже белый); плод — шаровидно-яйцевидная коробочка 6—7 мм дл. . . . . Род 1. *Convolvulus* L. — *Вьюнок*.



1 — *Ipomoea paniculata* (Bge.) Schumann (Пикностельма метельчатая);  
2 — *Ipomoea japonica* (Thunb.) Makino (Метелоксия японская); а — часть  
стебля с листьями и плодами, б — семя с летучкой.



Род 1. CONVULVULUS L. — ВЬЮНОК

Пустыри, ж.-д. насыпи, глинистые склоны . . 1. *C. arvensis* L. — В. полевой.

У нас типичная форма встречается лишь как заносное. Чаще встречается *C. agnata* var. *sagittifolius* (Fisch.) Turcz. (табл. 152, 1), имеющий ланцетные или лопатчато-ланцетные листья, часто с дугообразно вниз отогнутыми боковыми лопастями.

Род 2. CALYSTEGIA R. Br. — ПОВОЙ

1. Стебли лежащие, не бывают вьющимися; листья округло-почковидные, немного мясистые; нити тычинок в нижней части голые, без сосочковидных волосков; цветки розовато-фиолетовые, 3—3,5 см дл.; коробочка эллиптическая. Очень редко; в Хасанском районе Приморского края; на песчаном побережье моря . . . 1. *C. soldanella* (L.) R. Br. — П. солданолюбий.
- Листья не бывают округло-почковидными и мясистыми; нити тычинок в нижней части усажены сосочками или сосочковидными волосками; цветки розовые . . 2.
2. Все растение голое; стебли лежащие, у низкорослых экземпляров прямостоячие (редко вьющиеся); цветки 20—30 (35) мм дл. Довольно редко; в Приханкайской низменности и по долине Амура; на залежах, межах и сорных местах, реже по берегам рек и по незадерненным склонам . . . 2. *C. hederacea* Wall. — П. плющевидный.
- Стебли вьющиеся, хотя бы в верхней части; цветки 40—60 мм дл.; прицветники 15—20 (30) мм дл. . . . 3.
3. Стебли 40—80 (100) см выс., крепкие (при основании прямостоячие или приподнимающиеся); листья продолговатые или широколанцетные, более или менее волосистые, при основании усеченные или чуть сердцевидные; черешки листьев короткие (5—6 мм дл.); цветоносы короче листьев или равны им, цветки 40—60 мм дл. Равнинные и низкогорные районы Приморья и Приамурья; сухие травянистые склоны, суходольные луга, заросли кустарников . . 3. *C. dahurica* (Herbich) Choisy, *C. pellita* (Ldb.) G. Don — П. даурский (табл. 152, 2).

Легко скрещивается с повоем заборным, образуя целую серию гибридов с признаками обоих видов. Часть этих гибридов без достаточных оснований отнеслась некоторыми авторами к особому виду — *Calystegia subvolubilis* Ldb.

- Стебли до 2—3 м дл., слабые, почти от самого основания вьющиеся или ползучие; листья треугольные или треугольно-яйцевидные, совершенно голые, при основании глубокосердцевидные или сердцевидно-стреловидные; черешки листьев длиннее 10 мм; цветоносы длиннее листьев; венчик розовый, 40—60 мм дл. Часто; в равнинных и низкогорных районах Приморья и Приамурья; долинные леса, заросли кустарников, высокотрава и тростника . . . 4.
- 4. *C. sepium* (L.) R. Br. — П. заборный.

У нас лишь *C. sepium* subsp. *rosea* (Choisy) A. Schroeter, *C. americana* (Greene) Daniel. (табл. 152, 3).


Род 3. PROMOEIA L. — ППОМЕЯ

Редко; на залежах и лугах; по Суйфуну и близ оз. Ханка . . . 1. *P. sibirica* (L.) Pers. — П. сибирская.


Сем. 107. CUSCUTACEAE Dum. — ПОВИЛИКОВЫЕ

Род 1. CUSCUTA L. — ПОВИЛИКА

1. Завязь и коробочка с 1 толстым столбиком . . . 2.
- Завязь и коробочка с 2 тонкими (нитевидными) столбиками . . . 3.
2. Стебли около 2 мм толщ.; цветки сидячие (или почти сидячие), собранные в кистевидное соцветие; венчик розоватый; рыльце шаровидное; коробочка эллиптическая или яйцевидно-эллиптическая. Часто; в Приморье и Приамурье; на долинных лугах и в пойменных лесах; паразитирует на кустарниках и многолетних травах . . . 1. *C. japonica* Choisy — П. японская.
- Стебли 1—1,5 мм толщ.; цветки на ясно выраженных цветоножках (не бывают сидячими), собраны в метелчатое соцветие; венчик в высушенном состоянии белый; рыльце эллиптическое; коробочка шаровидная. Найдено только в Амурской области; паразитирует на кустарниках и дикорастущих многолетних травах . . . 2. *C. colorata* Maxim. — П. окрашенная.
- 3 (от 1). Столбики равны по длине друг другу; рыльце удлинненное; коробочка раскрывается правильным кольцом . . . 4.



1 — *Cynanchum atratum* Brc. (Пастовень черноватый), часть стебля с листьями и плодами; 2 — *Calystegia soldanella* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. (П. стеблеобъемлющий), часть стебля с листьями; 3 — *C. acuminatifolium* Hemsl. (П. заостреннолистный), лист.



1 — *Convolvulus arvensis* L. var. *sagittifolius* (Fisch.) Turcz. (Вьюнок полевой), часть стебля с листьями, цветком и бутонем; 2 — *Calystegia dahurica* (Herbich) Choisy (Повой даурский), часть стебля с листьями и цветками; 3 — *C. sepium* (L.) R. Br. subsp. *rosea* (Choisy) A. Schreoter (П. лаборный), часть стебля с листьями.

- Столбик неравно по длине; рыльце головчатое или булавовидное; коробочка открывается неровной поперечной линией, неправильно разламывается на части или отпадает целиком от своего основания . . . . . 3.
- 4. Стебли 1—2,5 мм толщ., красные или красноватые; цветки розовые или розовато-белые (в гербарии коричневатые); столбики с рыльцами чуть короче завязи; венчик почти вдвое длиннее чашечки, его доли туповатые, отогнутые наружу; почти равны верховной трубки; чешуйки короче (реже немного длиннее) середины трубки венчика, с многочисленными короткими бахромками. В Приморье и Приамурье; паразитирует на дикорастущих и культивируемых травянистых растениях, а также на кустарниках и молодых деревьях . . . . . 3. *C. eurasica* L. — П. европейская.
- Стебли 0,5—0,8 мм толщ., зеленовато-желтые; цветки желтовато-белые; столбики вместе с утолщенными рыльцами значительно короче завязи; венчик равен чашечке или лишь немного длиннее ее; доли венчика острые, отогнуты ко внутри, вдвое короче кувшинообразно вздутой трубки; чешуйки почти равны по длине трубке венчика, с многочисленными длинными бахромками. Редкий сорняк; Приморье; паразитирует на яблоне . . . . . 4. *C. epilinum* Weihe — П. лышная.
- 5 (от 3). Доли чашечки остроклиеватые; кили низбегающие, благодаря чему чашечка кажется угловатой; стебли светло-желтые; цветки около 4 мм дл.; венчик лишь немного превышает чашечку; чешуйки достигают оснований штей тычинок, длиннореснитчатые; рыльце булавовидное; коробочка открывается в основании неровной поперечной линией; семена около 1,5 мм дл. Часто; в Приморье и Приамурье; паразитирует на сорнях и культивируемых растениях . . . . . 5. *C. chinensis* Lam. — П. китайская.
- Доли чашечки по спинке без резко выступающих килей; стебли оранжево-желтые; цветки около 2 мм дл.; венчик вдвое превышает чашечку; чешуйки маленькие (никогда не достигают штей тычинок), с короткими бахромками; рыльце головчатое; коробочка в верхней части мясистая (ягодоборазная), открывается неправильно, разламываясь на части, или отпадает целиком от основания; семена около 4 мм дл. Указаны для Приморья и среднего течения Амура; паразитирует на травянистых растениях — культурных и сорнях . . . . . 6. *C. australis* R. Br. — П. южная.

# Сем. 108. POLEMONIACEAE Juss. — СПИНОХОВЫЕ

## Род 1. POLEMONIUM L. — СПИНОХА

- 1. Листья с обеих сторон голые; венчик в 3—4 раза длиннее чашечки, во время цветения тычинки выставляются из венчика; коробочка широкояйцевидная. Часто; в лесах и по опушкам среди кустарниковых зарослей . . . . . 2.
- Листочки по краям короткореснитчатые; венчик в 2—2,5 (3) раза длиннее чашечки, тычинки в период цветения не выставляются из венчика; коробочка округлая. На лугах и среди кустарников . . . . . 2. *P. villosum* J. Rudolph ex Georgi — С. опушенная.

# Сем. 109. BORAGINACEAE G. Don — БУРАЧНИКОВЫЕ

- 1. Листья мясистые, сизые, овальные; венчики бледно-голубые; орешки гладкие, плоские. Растения морского берега . . . . . Род 4. *Mertensia* Roth — Мертензия.
- Листья не мясистые, без сизого налета, обычно более или менее опушенные . . . . . 2.
- 2. Стебли крошковато-шиповатые; лежащие; орешки гладкие, голые, сжатые с боков; однолетники . . . . . Род 13. *Asperugo* L. — Асперуго.
- Крошковатых шипов на стеблях нет . . . . . 3.
- 3. Плод по созреванию распадается на 2 дуговидных костянки, окружен кожистой оболочкой; цветки белые, с широкой трубкой; стебли и листья жестковолосистые. Скалы морского берега и как заносное на ж.-д. насыпях (ст. Кангута) . . . . . Род 1. *Tournefortia* L. — Турнефортия.
- Плод из 4 орешков; цветки голубые, сизые, фиолетовые или белые . . . . . 4.
- 4. Верхние листья собраны почти в мутовку, крупные, 10—15 см дл. и 4—7 см шир.; венчик с очень короткой, немасштабной трубкой, темно-фиолетовый (как нектароносный, белый) . . . . . Род 5. *Brachyotrys* Maxim. — Короткостебельный.
- Мувток нет, все листья ясно очерченные и обычно меньших размеров; трубка венчика ясно заметна . . . . . 5.
- 5. Растения с 1, чаще несколькими розетками, часто образующими дерновины, серые или серебристо-серые; цветки светло-голубые . . . . . Род 12. *Eritrichium* Schrad. — Незабудочник.



- Растения, не образующие дерновинок . . . . . 6.
6. Все растение серое, прижато- и мелкопушистое; венчик фиолетовый, с трубкой около 1 мм дл.; орешки густо и коротко якорно-шиповатые . . . . . Род 14. *Cynoglossum* L. — Чернокорень.
- Сплошного серого опушения нет; растения зеленые, реже сероватые, от голий до жестковолосистых . . . . . 7.
7. Стебли тонкие, лежащие, иногда укореняющиеся или прямостоячие, но не высокие . . . . . 8.
8. Стебли толстые, прямостоячие, более высокие, (10) 20—80 (100) см . . . . . 10.
8. Стебель очень тонкий, почти шпигидный, ветвистый; венчик мелкий (два превышающих чашечку), голубой, реже почти белый; орешки мелкие, буторчатые, однолетник . . . . . Род 3. *Bothriospermum* Bge. — Кистесемияник.
- Стебли не такие тонкие (не нитевидные) лежащие или прямые; венчик заметно превышает чашечку, обычно голубой или светло-голубой, реже почти белый; орешки небольшие, гладкие, иногда пушистые; однолетники и многолетники . . . . . 9.
9. Лепестки в бутоне скрученные, цветочные завитки безлистные, плотные . . . . . Род 9. *Myosotis* L. — Незабудка.
- Лепестки в бутоне черепитчато сложенные, цветочные завитки обильные или безлистные, не плотные . . . . . Род 6. *Trigonotis* Stev. — Тригонотис.
- 10 (от 7). Венчик черно-красный, в 2 раза длиннее чашечки (10—12 мм дл.); орешки почти шаровидные, пушистые, сетчато морщинистые; стебли 25—50 см выс., мелко железисто-пушистые . . . . . Род 8. *Nocca* Medic. — Ночия.
- Венчик синий, голубой, белый или сине-фиолетовый (при цветении розово-красный) . . . . . 11.
11. Стебли оттопыренно щетинисто волосистые; под щетинистым опушением имеется мелкий, серовато-белый пушок; цветки при распускании розово-красные, позднее сине-фиолетовые или почти синие, неправильные (с несколько изогнутым книзу венчиком, нижние лопасти которого вдвое короче верхних) . . . . . 7. *Echium* L. — Синик.
- Стебли пушистые или прижатоволосистые (волоски направлены вверх), с отстоящими волосками или голые; цветки белые, чуть желтоватые или голубые . . . . . 12.
12. Цветки белые или чуть желтоватые; плоды гладкие, белые, блестящие или серые, крушобугорчато-складчатые и мелкобороздчатые . . . . . Род 2. *Lithospermum* L. — Воробейник.
- Цветки голубые . . . . . 13.
13. Листья ланцетные или линейно-ланцетные; плоды с шипиками с якоревидными окончаниями . . . . . 14.
- Листья яйцевидные или продолговатые, длинно заостренные; орешки белые, бугорчато-морщинистые, по бокам гладкие, шипики без якорной головки, неровные . . . . . Род 4. *Mertensia* Roth — Мертензия.
14. Орешек мелкобугорчатый, реже гладкий, по краю диска с якорными шипиками . . . . . Род 10. *Lappula* Gilib. — Липучка.
- Орешек по бокам с мелким жестким пушком, шипики на верхушке с якорной головкой, ниже ее гладкие, без зазубрин и волосков . . . . . Род 11. *Hackelia* Opiz — Гакелия.

Род 1. *TOURNEFORTIA* L. — ТУРНЕФОРЦИЯ

Стебель 15—40 см выс., оттопыренноветвистый, пушистый; листья 1—3 см дл., продолговатые, ланцетно-продолговатые или почти линейные, сероватые; завитки малоцветковые; цветки довольно крупные, белые. На юге Приморья; на морском берегу и как заносное на ж.-д. насыпях . . . . . 1. *T. sibirica* L. — Т. сибирская.

Род 2. *LITHOSPERMUM* L. — ВОРОБЕЙНИК

1. Многолетник до 40—80 (100) см выс., с темно-красным, красящим корни, обильно опушенный; венчик белый; орешки гладкие, блестящие, белые или коричневые. На сухих каменистых склонах . . . . . 1. *L. erythrorhizon* Sieb. et Zucc. — В. красногорный.
- Однолетник 10—20 (40) см выс., прижатоволосистый (волоски направлены вверх), с черноватыми, продолговато-линейными листьями; венчик белый, палевый или сине-фиолетовый; орешки крупнобугорчато-складчатые и мелкобороздчатые, тусклые или слабо блестящие, серые. Заносное; по сорным местам . . . . . 2. *L. arvense* L. — В. полевой.



*Brachyotrys paridiformis* Maxim. ex Oliv. (Коротколистник воронеглазый).

Род 3. *BOTHRIOSPERMUM* Bge. — КИСТЕСЕМЯННИК

Стебель обычно ветвистый, реже простой, толстый, 10—30 см выс.; листья 1—3 (5) см дл. и 5—15 (17) мм шир.; цветки на тонких цветоножках, при плодах поникающих. По берегам рек на галечниках и на каменистых склонах . . . . . 1. *B. tenellum* (Hornem.) Fisch. et Mey. — К. тонкий.

Таблица 154

Род 4. *MERTENSIA* Roth — МЕРТЕНЗИЯ

1. Стебли голые, лежачие; все растение сидит от воскового налета; цветки бледно-голубые. Галечники и пески морского берега . . . . . 1. *M. asiatica* Macbr. — М. азиатская.
- Стебли прямостоящие или иногда в нижней части восходящие, внизу голые, в верхней части с короткими, прижатыми волосками; соцветие кочечное, малоцветковое. На гольцах; северный Сихотэ-Алинь, у Кавчей . . . . . 2. *M. rivularis* (Turcz.) DC. — М. ручейковая.

Род 5. *BRACHYOTRYS* Maxim. — КОРОТКОКИСТНИК

Корневище длинное, тонкое, шнуровидное, ползучее; стебли 50—70 (80) см выс.; листья скучены у вершины почти в мутовку; завиток безлистный, с 3—5—7 темно-фиолетовыми, очень редко белыми цветками. В смешанных лесах; на самом юге Приморья; местами образует заросли . . . . . 1. *B. paridiformis* Maxim. ex Oliv. — К. воро неглазый (табл. 153).

Род 6. *TRIGONOTIS* Stev. — ТРИГОНОТИС

1. Однолетник; венчики всего около 1 мм в диам., цветоножки при плодах булавовидно утолщенные, прямые. На сухих отложениях рек и у дорог . . . . . 4. *T. peduncularis* (Trev.) Benth. — Т. булавовидный.
- Многолетники с более крупными (5—10 мм) венчиками; плодущие цветоножки поникающие . . . . . 2.
2. Листья не имеют обособленного черешка; стебли прямые; прицветные листья только при основании соцветий. На сырых лугах среди кустарников . . . . . 3. *T. mysotisidea* Maxim. — Т. незабудковый.
- Листья с обособленным черешком (особенно нижние); кисти разреженные, облиственные, часто цветки как бы одиночные; стебли восходящие или лежачие . . . . . 3.
3. Листья голые, острые; стебли укореняются верхушкой. На сырых скалах; в верхних Амура . . . . . 2. *T. radicans* (Turcz.) Stev. — Т. укореняющийся.
- Листья прижатоволосистые; укореняются на верхушке стеблей, а образующиеся под осью длинные, тонкие боковые веточки. На сырых скалах, в лесах и кустарниковых зарослях; Приморье и Приамурье . . . . . 1. *T. Koreana* Nakai — Т. корейский.

Род 7. *ESNIUM* L. — СИНИК


Стебли 30—60 (100) см выс., прямые; стеблевые листья сидячие, ланцетные, или линейно-ланцетные, острые, 2—6 см дл. и 5—10 мм шир.; завитки в рыхловатой кисти или в метелке; венчик 10—15 мм дл., яркий, синий или сине-фиолетовый; орешки тупобугорчатые. Заносное; у дорог и по ж.-д. насыпям . . . . . 1. *E. vulgare* L. — С. обыкновенный.

Род 8. *NONEA* Medic. — НОНЕЯ

Стебли прямые, 25—50 см выс.; листья ланцетные и продолговато-ланцетные, коротко серопушистые; венчик черно-красный. Заносное; на залежах, по речным галечникам и у дорог; в Шкотовском районе . . . . . 1. *N. rossica* Stev. — Н. русская.

Род 9. *MYOSOTIS* L. — НЕЗАБУДКА

1. Стебли крепкие, прямые, 20—40 см выс.; листья серопушистомахнатые; венчик голубой, 5—10 мм шир. На сухих лугах; по Амуру . . . . . 2. *M. suaveolens* Walld. et Kit. — Н. душистая.
- Стебли слабые, ветвистые, почти голые или с немногими прижатыми волосками; венчик голубой, 4—6 мм шир. На сырых лугах между кочками, иногда прямо в воде . . . . . 1. *M. caespitosa* Schult. — Н. дернистая.



1 — *Nackelia deflexa* (Wahl.) Opiz (Галечия пониклоплодная); а — часть стебля с листьями, б — плод; 2 — *Eritrichium incanum* (Turcz.) DC. (Незабудочник с листьями); 3 — *Scutellaria baicalensis* Georgi (Шлемник байкальский); а — верхняя часть стебля с цветками, б — нижняя часть стебля и корень; 4 — *S. dependens* Maxim. (Ш. повислый), часть стебля с листьями.



Род 10. LAPPULA Gilib. — ЛИПЧУЧКА

1. Листья аспенные, почти голые, ланцетные, 2—3 см дл.; шипы орешков не равные, в главном ряду 1—2 мм дл., с очень небольшой якорной головкой. На сухих участках, иногда как сорное . . . . . 1. *L. anisacantha* (Turcz.) Guérke — Л. перьяшиковья.
- Листья сероватые, ланцетные или ланцетно-линейные, 2—5 см дл., 3—8 мм шир.; шипы главного ряда тонкие, около 1 мм дл., с небольшой якорной головкой. Сорное; у дорог и по галечникам . . . . . 2. *L. echinata* Gilib. — Л. колючая.

Род 11. HASKELIA Oriz — ГАКЕЛИЯ

1. Стебли толстые, до 60 см выс.; листья ланцетные, острые, 3—7 см дл. и 0.5—1.5 см шир., с отстоящим опушением; венчик голубой, 4—5 (6) мм в diam. Част.; на каменистых склонах и у россыпей в лесу . . . . . 1. *H. deflexa* (Wahl.) Oriz — Т. повислоплодная (табл. 154, 1).
- Стебли тонкие, 10—20 (30) см выс.; листья 1—2.5 см дл. и 2.5 мм шир., с мелкими, полуприжатymi волосками; венчик голубой, 2—3 см. На степных каменистых склонах и скалах . . . . . 2. *H. thymifolia* (DC.) M. Pop. — Г. тимьянолистная.

Род 12. ERITRICHUM Schrad. — НЕЗАБУДЧОКНИК

1. Дуэлитник, реже многолетник; прикорневые листья сильно лопатчатые; орешки волос без коронки, трехгранно-яйцевидные. На скалах и каменистых склонах; верхний Амур . . . . . 1. *E. Maackii* Maxim. — Н. Маака.
- Орешки с коронкой из небольших шипов . . . . . 2.
2. Многолетник или дуэлитник; листья розетки сероопушенные, острые. На скалах; на юге Приморья . . . . . 3. *E. sibiricum* M. Pop. — Н. сихотылинский.
- Многолетник или дуэлитник; листья тускло-серые, округло-эллип., Каменистые склоны и степи по Амуру и на скалах в северном Сихотэ-Алине . . . . . 2. *E. incanum* (Turcz.) DC. — Н. серый (табл. 154, 2).

Род 13. ASPERUGO L. — АСПЕРУГО

Стебель сочный, с острыми гранями и по ребрам с шипиками, 10—40 см выс., лежащий или восходящий; цветки мелкие, в пазухах прицветных листьев, венчик 2—2.5 мм, фиолетовый или голубой. Заносное; по ж.-д. линии в окрестностях Владивостока (19-й км) . . . . . 1. *A. procumbens* L. — А. простертый.

Род 14. CYNODOSSUM L. — ЧЕРНОКОРЕНЬ

Дуэлитник; стебель полый, ветвистый; листья ланцетные или (прикорневые) продолговато-ланцетные, стебельные все черешковые, сероватопушенные; венчик 4—5 мм в diam., фиолетовый. Заносное; по ж.-д. линиям и дорогам . . . . . 1. *C. divaricatum* Steph. — Ч. расхопленный.

Сем. 110. VERBENACEAE Jaume — ВЕРБЕНОВЫЕ

Род 1. VERBENA L. — ВЕРБЕНА

Многолетник с лежащими или восходящими стеблями, до 25—30 см выс.; листья перистонадрезанные, 2—3 см дл. и 1.2—1.3 см шир., цветки в густых конечных колосках; венчик лиловый или пурпурно-синий, около 3.5 мм дл.; орешки почти линейные, 1.5—2 мм дл., рубчатые. Заносное; у дорог в ряде пунктов Приморья (пос. Шкотово, села Осиковка, Ивановка, Алушино) . . . . . 1. *V. bracteosa* Michx. — В. прицветничковая.

Сем. 111. LABIATAE Juss. — ГУБЦОВЕЧНЫЕ

1. Растения травянистые; однолетники или многолетники . . . . . 2.
- Небольшие ползучистарники со стеляющимися или приподнимающимися стеблями, с мелкими, 5—15 мм дл. и 1—3 (4) мм шир., листьями и розовыми, фиолетовыми или пурпурно-фиолетовыми цветками . . . . . Род 21. *Thymus* L. — Тимьян.
2. Однолетники, реже дуэлитники . . . . . 3.
- Многолетники . . . . . 12.

3. Соцветие метельчатое, цветки почти правильные, с ярко-синим венчиком, на длинных цветоносах, в полузонтиках . . . . . Род 3. *Amethystea* L. — Амистейка.
- Цветки в ложных мутовках, в пазухах верхних листьев или в конечных ложных кистях . . . . . 4.
4. Листья перисто- или ланцетнораздельные с глубоко рассеченными долями; стебли около 1 м выс. . . . . Род 15. *Leonurus* L. — Пустьрыник.
- Листья цельные (цельнокрайние, городчатые, шпильчатые, но не раздельные и не рассеченные) . . . . . 5.
5. Листья округлые или округло-почковидные, верхние почковидные, подстеблеобъемлющие . . . . . Род 14. *Lamium* L. — Яенотта.
- Листья иные (не почковидные и не стеблеобъемлющие) . . . . . 6.
6. Листья широкоэллипные, крупные, до 3—12 см дл. и 3—6 см шир.; соцветия ланцетные, вверх торжашие; цветки белые; все растение с очень сильным запахом . . . . . Род 24. *Perilla* L. — Перилла, Суа.
- Листья иной формы и менее крупные . . . . . 7.
7. Листья почти линейные, 1.5—2.5 см дл.; все растение сильно прижатостебельное; цветки мелкие (венчик едва превышает чашечку), белые или голубоватые, с красными точками в зеве, чашечка с ланцетными реснитчатыми зубцами, колокольчатая . . . . . Род 18. *Satureja* L. — Чабер.
- Листья более широкие, ланцетные, овально-ланцетные, овальные или эллип., вино-яйцевидные; чашечки иные; венчик более крупный (не менее 7 мм дл.) и обычно заметно длиннее чашечки . . . . . 8.
8. Листья эллиптические, овальные или овально-ланцетные, черешковые, городчатые или с немногими крупными зубцами; соцветия конечные, прерывистые или почти колосовидные; тычинок 2 . . . . . 9.
- Тычинок 4, листья чаще овально-ланцетные . . . . . 9.
9. Тычинок с длинными нитями; венчик 3.5—4 мм дл. розово-фиолетовый; листья яйцевидно- или продолговато-ромбические . . . . . Род 25. *Orthodon* Benth. — Ортодон.
- Тычинок с короткими нитями; венчик фиолетовый, 7—8 мм дл.; листья эллиптические или продолговато-ланцетные . . . . . Род 17. *Salvia* L. — Шалфей.
- 10 (от 8). Прицветники крупные, округлыми, черешчатыми налегающими друг на друга, травянистые, с сетчатым жилкованием или лопастными; венчики синие или красно-фиолетовые или лиловые, слабо дугубые . . . . . Род 26. *Elsholtzia* Willd. — Элзгольция.
- Прицветники иные — ланцетовидные, линейные или эллиптические; венчики явно дугубые . . . . . 11.
11. Стебель мякотоволокнистый или с длинными, жесткими, оттопыренными волосками; венчик с длинной трубкой; чашечка с 10 жилками . . . . . Род 13. *Galopsis* L. — Пылулик.
- Стебель коротко опушенный; венчик голубовато-лиловый, голубовато-фиолетовый или белый; чашечка с 15 жилками . . . . . Род 10. *Draconcephalum* L. — Змеелоговик.
- 12 (от 2). Стебли прямые . . . . . 13.
- Стебли лежащие или ползучие, плетевидные, иногда с вертикальными пугучими ветвями . . . . . 14.
13. Листья трехлопастные или зубчато-перистонадрезанные и даже рассеченные . . . . . 14.
- Листья цельные (цельнокрайние, городчатые, зубчатые или шпильчатые) или с выемкой на верхушке, откуда выходит длинное остроизогнутое . . . . . 16.
14. Листья зубчато- или перистонадрезанные, все или только нижние; венчик белый или сине-фиолетовый . . . . . 15.
- Листья трехлопастные, с неглубоко надразными лопастями; венчик бледно-красный или розовый . . . . . Род 15. *Leonurus* L. — Пустьрыник.
15. Листья зубчато- или перистонадрезанные или даже рассеченные; соцветие конечное, колосовидное; венчик сине-фиолетовый, резко дугубый; тычинок 4 . . . . . Род 7. *Schizonepeta* Briq. — Схиэнепета.
- Нижние листья перистонадрезанные или перисто-зубчатые, верхние цельные; нити; полумутовки плотные, в пазухах листьев; венчик белый, правильный; тычинок 2 . . . . . Род 22. *Lyceum* L. — Зисник.
- 16 (от 13). Венчик с недоразвитой верхней губой или одностой, так как все 5 лопастей его отогнуты кверху . . . . . 17.
- Обе губы венчика хорошо развиты или он правильный . . . . . 18.
17. Нижняя губа венчика трехлопастная, крупная, ярко-синяя, очень резко резаная; венчик с длинными, узкими, продолговатыми лопастями; венчик бледно-розовый, все растение весной бромхладое, с прикорневой розеткой длинночерешковыми листьями . . . . . Род 1. *Angia* L. — Ямичка.
- Все 5 лопастей губы отогнуты кверху, венчик пурпурный около 10 мм дл.; листья все стебельные, черешковые, продолговато-яйцевидные, с усеченным, слегка сердцевидным или клиновидным основанием . . . . . Род 2. *Teucrium* L. — Дубровник.
- 18 (от 16). Венчик колокольчатый, воронковидный или трубчатый . . . . . 19.
- Венчик дугубый . . . . . 21.



19. Венчик трубчатый, четырехлопастный, бледно-лиловый; соцветие колосовидное; листья линейно-ланцетные, в мутовках . . . . . Rod 27. *Dysophylla* Blume — Дизофилла.
- Венчик колокольчатый или воронковидный; листья не мутовчатые . . . . . 20.
20. Венчик колокольчатый, белый; стебли прямые, простые . . . . . Rod 22. *Lycopus* L. — Эозикс.
- Венчик воронковидный, сине-лиловый, более или менее яркий, реже бледный, светло-лиловый; стебли более или менее ветвистые; все растение с характерным запахом . . . . . Rod 23. *Mentha* L. — Мята.
- 21 (от 18). Соцветие в виде щитковидной метелки, до 10 см шир. и до 15 см дл., многоцветковое; венчик 5—10 мм дл., светло-пурпурный или лилово-розовый . . . . . Rod 20. *Origanum* L. — Душица.
- Соцветие иное, не щитковидное . . . . . 22.
22. Чашечка двугубая, колокольчатая, с широкими, цельными, тупыми лопастями; верхняя губа чашечки сильно выпуклая, шлемовидная, нижняя широкая, плоская . . . . . Rod 4. *Scutellaria* L. — Шлемник.
- Лопасты чашечки более или менее остроконечные, их чаще 5 . . . . . 23.
23. Верхняя губа венчика изогнута, шлемовидная, чашечки с 15 жилками, венчик яркий, лазурно-синий, пурпурно- или сине-фиолетовый . . . . . Rod 10. *Dracopis* L. — Змееголовник.
- Верхняя губа более или менее простая . . . . . 24.
24. Трубка венчика с горбом (шипом) у основания, тычинки прикрываются к нижней губе; цветки синие (очень редко белые) мелкие; соцветие крупное, метельчатое; стебли толстые и высокие (обычно выше 1 м) . . . . . Rod 28. *Plectranthus* L'Hér. — Шпорник.
- Шпора на трубке венчика нет; тычинки прикрываются к верхней губе венчика . . . . . 25.
25. Ложная мутовка собрана в плотное, головчатое или колосовидное соцветие, прицветники крупные, черешчатые, верхняя пара листьев охватывает основание соцветия; венчик темло-фиолетовый, чашечка двугубая, с 10 жилками . . . . . Rod 14. *Prunella* L. — Черника.
- Соцветия иные (не головчатые); прицветники мелкие и не налегают черешчатые; венчик иной окраски . . . . . 26.
26. Венчик резко двугубый, верхняя губа более или менее выпуклая . . . . . 29.
- Венчик двугубый, верхняя губа плоская или вогнутая . . . . . 27.
27. Прицветники шпоровидные, крепкие с прицветничками; чашечка фиолетовая или красная; венчик розовый; стебли с прижатым опушением . . . . . Rod 19. *Clinopodium* L. — Пахучка.
- Прицветники не шпоровидные . . . . . 28.
28. Прицветники ланцетные, рано опадающие; чашечка зеленая, трубчатая или ширококолокольчатая; венчик от бледно-розового до пурпурного, верхняя губа короче нижней; стебли более или менее опушенные, первичные или щетинистые только в узлах . . . . . Rod 16. *Stachys* L. — Чистец.
- Прицветники линейные или линейно-шпоровидные, железистые; венчик белый или сине-фиолетовый . . . . . Rod 8. *Nepeta* L. — Котовник.
- 29 (от 29). Соцветие — густой безлистный колос, венчик небольшой, узкий, лиловый; все растение с очень сильным запахом . . . . . Rod 5. *Agastache* Claret ex Gronov. — Многоколосник.
- Соцветие иное, облиственное; венчики крупные, белые или розовые . . . . . 30.
30. Листья длинночерешковые, широкоэллипсные, крупные, прикоренные широкоэллипсные или треугольно-яйцевидные; венчик розовый или фиолетовый, в 1,5 раза длиннее чашечки, шерстистый, с короткой трубкой . . . . . Rod 12. *Phlomis* L. — Зопник.
- Листья черешковые, черешки 4—2 (4) см дл., 3—8 (10) см дл. и (1,5) 2—4 см шир., яйцевидные или сердцевидные; венчик белый или розовый, с длинной, 0,8—1,5 см, трубкой . . . . . Rod 14. *Lemmonia* L. — Лебедушка.
- 31 (от 12). Стебли тонкие, литевидные; цветки мелкие, около 5 мм, бледные, паузунные, почти по всему стеблю; чашечка двугубая . . . . . Rod 4. *Scutellaria* L. — Шлемник.
- Стебли более толстые (не литевидные); цветки более крупные, 1—5 см дл., в средней и верхней части стебля или на приподнимающихся веточках . . . . . 32.
32. Листья широкоэллипсные, городчатые; цветки 10—25 мм дл., синеваато-лиловые, в паузах листьев . . . . . Rod 9. *Glechoma* L. — Будра.
- Листья сердцевидно-яйцевидные, городчатые или городчато-зубчатые; цветки очень крупные, до 5 см дл., ярко-лазурно-синие, в концевой редкой кисти . . . . . Rod 6. *Mechania* Britt. — Михелия.

#### Род 1. *AJUGA* L. — ЖИВУЧКА

Все растение в период цветения беломохнато; цветки в ложных мутовках почти сидячие, ярко-синие или (редко) розовые. На сухих склонах в лесу, на полянках и среди кустарников . . . . . 1. *A. reptans* Bge. — Ж. многоцветная.

#### Род 2. *TEUCRIUM* L. — ДУБРОВНИК

Стебель 40—50 см выс., обычно простой, реже с короткими веточками, листья продолговато-яйцевидные, 4—6 см дл. и около 2 см шир. (1,7—2,5), с крупно пильчатыми краями; соцветие кистевидное, цветки с пурпурными или пурпурно-розовым венчиком. На речных песках, в урессе и на старых залежах; по Суй-фуну и Сучану . . . . . 1. *T. ussuriense* Kom. — Д. уссурийский.

#### Род 3. *AMETHYSTEA* L. — АМЕТИСТКА

Одиолетник (10) 20—50 (70) см выс.; цветки мелкие (3—3,5 мм), с голубым венчиком; все растение с сильным запахом. По берегам рек, по каменистым осыпям и как сорное; часто . . . . . 1. *A. coerules* L. — А. голубая.

#### Род 4. *SCUTELLARIA* L. — ШЛЕМНИК

1. Цветки очень мелкие, около 5 мм дл., одиночные, паузунные, почти по всему стеблю; венчик бледный; стебли тонкие, литевидные. На лесных болотах и у ручьев . . . . . 4. *S. dependens* Maxim. — Ш. повислый (табл. 154, 4).
2. Листья цельнокрайные или в конечной части стебля . . . . . 2.
3. Листья более или менее городчатые, обычно сидячие или на очень коротких черешках; корни мощные; стебли до 50 см выс., крепкие; цветки синие, до 2,5 см дл., с густо опушенным сверху венчиком, в концевом кистевидном соцветии. По сухим склонам и на сухих гутах . . . . . 10. *S. baicalensis* Georgi — Ш. байкальский (табл. 154, 3).
4. Листья не плотные; цветки в паузах верхних, несколько уменьшенных листьев; корни очень толстые . . . . . 2. *S. regeliana* Nakai — Ш. Регеля.
5. Листья сверху с короткими щетинковидными волосками, снизу с мясистыми, курчавыми, густыми волосками; стебли до 60 см дл.; цветки 1,5—2 (2,5) см дл., с сине-фиолетовым венчиком. На сухих гутах, по берегам рек и на болотах, часто . . . . . 2. *S. regeliana* Nakai — Ш. Регеля.
6. Листья сверху голые или с редкими, рассеянными волосками, снизу опушены по жилкам и краям, мелкозернисто-железистые; все растение мелких размеров, 10—35 см выс., но цветки более крупные, до 2,5 см дл. На сухих гутах и болотах; преимущественно в Амурской области и в Хабаровском крае . . . . . 3. *S. ikonnikovii* Juz. — Ш. Иконникова.
- 7 (от 2). Листья на длинных черешках . . . . . 6.
8. Листья на коротких черешках или почти сидячие . . . . . 11. *S. ussuriensis* (Rgl.) Kudo — Ш. уссурийский.
9. Листья голые или рассеяно волосистые, черешки обычно почти равны листовой пластинке или длиннее ее; чашечка слабо опушенная. В лесах и кустарниках, зарослях . . . . . 12. *S. pacifica* Juz. — Ш. тихоокеанский.
10. Листья сверху амчатые-точечные, с наибольшей шириной в средней части . . . . . 8.
11. Листья снизу без точечных ямок, с наибольшей шириной в нижней части . . . . . 11.
12. Растения голые или с редким опушением снизу по жилкам листьев и по ребрам стебля; чашечка железистая или короткошерстистая . . . . . 9.
13. Растения сильно опушенные кустарники или прямые короткими волосками . . . . . 9.
14. Стебель простой или ветвистый, но с короткими ветвями, листья всегда тупые; цветки крупные, 1,8—2,3 см дл., фиолетово-синие, на коротких цветоножках; орешки 1,5—2 мм. На сухих гутах и на каменистых склонах; преимущественно в Амурской области и в западной части Хабаровского края . . . . . 5. *S. scordifolia* Fisch. — Ш. ежовидный.
15. Стебель сильно ветвистый, ветви длинные, простомочные, обычно облиственные; листья чаще коротко заостренные; цветки более мелкие, 1,3—1,7 см дл., орешки около 1 мм. По берегам рек в смешанных и хвойных лесах . . . . . 8. *S. polyphylla* Juz. — Ш. многолиственный.
- 16 (от 8). Корневище желтоватое, членистое, чаще некартальное или косое, редко ползучее; стебли от основания растопыренно сильно ветвистые (очень) редко простые; листья глубоко городчато-зубчатые, всего с 3—7 (10) зубцами с каждой стороны, тупые или на верхушке закругленные. Пески, галечники и жидкой стороны, тупые или на сухих гутах близ моря; часто . . . . . 6. *S. taquetii* Lévl. et Vaniot — Ш. Така.



- Корневище белое, толстое, ползучее; стебли чаще простые или слабо ветвистые; листья пальчато-зубчатые, с 7—12 зубцами с каждой стороны, на верхушке чаще остроявые. По речным долинам и склонам в дубяках и среди кустарников на юге Приморья . . . . . 7. *S. tuminensis* Nakai — Ш. тумынганский.
- 11 (от 7). Венчик около 1,5 см дл., сверху густо опушенный; листья неправильно городчато-зубчатые, светлые или ярко-зеленые, снизу часто почти бархатистые; корневище не четкообразное. По берегам рек и озер в ивниках и на сырых лугах . . . . . 1. *S. krassii* Kom. et I. Schischk. — Ш. Красная.
- Венчик до 3 см дл., сверху коротко опушенный; листья городчато-зубчатые, снизу с густым, мелким, зернисто-железистым опушением; корневище четкообразное, на белых сочных клубеньках. В лесах у каменистых россыпей и развалов, по берегам лесных ручьев; юг Приморья . . . . . 9. *S. moniliorrhiza* Kom. — Ш. четковиднокорневой.

#### Род 5. AGASTACHE Clat. ex Gronov. — МНОГОКОЛОСНИК

Корень деревянистый, стебель около 1 м выс., толстый; листья черешковые, тонкие с сердцевидным или овальным основанием, крупнозубчатые; соцветие плотное, цилиндрическое, из скученных ложных мутовок; венчик синева-лиловый, или сиреневый, сверху мелко опушенный; орешки темно-бурые, с рыжеватыми волосками; все растение с очень сильным мятым запахом. По каменистым склонам, у скал и на галечниках лесных рек . . . . . 1. *A. rugosa* (Fisch. et Mey.) Kuntze — М. морщинистый.

#### Род 6. МЕЕНАНИЯ Britt. — МХЕННИЯ

Растение с длинными, укореняющимися в узлах, плетевидными побегами; листья длинночерешковые, сердцевидно-яйцевидные, чаще городчатые или городчато-зубчатые; цветки крупные с ярко-синим или ярким лазорево-синим венчиком, до 5 см дл.; цветет в мае. В сырых лиственных и смешанных лесах; на самом юге Приморья (пока только в бассейнах рек Дзядуги, Грязной и Майхе) . . . . . 1. *M. urticifolia* (Miq.) Makino — М. крапиволистная.

#### Род 7. SCHIZONEPETA Briq. — СХИЗОНЕПЕТА

Корень деревянистый; стебли до 60 см выс., в нижней части опушенные; листья зубчатые или перисто-разрезанные или рассеченные (изредка цельные); соцветие колосовидное, из ложных мутовок; венчик синева-фиолетовый; чашечки с железками. На сухих и остепенных лугах и по каменистым сухим склонам среди кустарников . . . . . 1. *Sch. multifida* (L.) Briq. — С. многонадрезанная.

#### Род 8. NEPETA L. — КОТОВНИК

1. Цветки крупные; венчик ярко-синий, до 1,5 см дл.; стебель до 1 м выс.; листья яйцевидные или узколанцетные, крупные, 12—15 (16) см дл. и 6—7 см шир. Небольшими группами; в смешанных лесах у ручьев и по галечникам; только на юге Приморья . . . . . 1. *N. manchuriensis* S. Moore — К. маньчжурский.
- Цветки белые или чуть розоватые, венчик 7,5—10 мм дл.; стебель мягко пушистый, 40—100 см выс.; листья треугольно-яйцевидные, 2—8 см дл., 1,2—4 (5) см шир. Заносное; по берегам оз. Ханка . . . . . 2. *N. cataria* L. — К. кошачий.


#### Род 9. GLECHOMA L. — БУДРА

1. Венчик до 25 мм дл., синева-лиловый; зубцы чашечки равны 1/2 трубки. По берегам рек в кустарниках и долинных лесах . . . . . 2. *G. longifolia* (Nakai) Kurjian. — Б. длиннотрубчатая.
- Венчик 10—18 мм дл., синева-лиловый; зубцы чашечки в 3—4 раза короче трубки. Заносное; по ж.-д. насыпам у Владивостока и ст. Кангауз . . . . . 1. *G. hederacea* L. — Б. плющевидная.

#### Род 10. DRACOSERIALUM L. — ЗМЕЕГОЛОВНИК

1. Однолетники . . . . . 2.
- Многолетники . . . . . 3.
2. Венчик 7—9 мм дл., голубой, едва выдается из чашечки, листья городчато-пильчатые. Заносное; ст. Кангауз . . . . . 4. *D. thymiflorum* L. — 3. тиминоцветный.

Таблица 155



1 — *Dracoseriale argentea* Fisch. (Змееголовник аргунский); 2 — *D. multicolor* Kom. (З. многоцветный); а — верхняя часть стебля с листьями и цветками, б — корневище с корнями и основаниями стеблей.

- Венчик 20—25 мм дл., белый или голубовато-фиолетовый; листья тупозубчатые, Заносное . . . . . 5. *D. moldavica* L. — 3. молдавский.
- 3 (от 1). Листья эллиптически-линейные, 3—4 см дл.; голые; венчик 3—4 см дл., яркий, лазурно-синий. На галечниках морского берега и по сухим каменистым склонам . . . . . 6. *D. argenteum* Fisch. — 3. аргунский (табл. 155, 1).
- Листья иные — яйцевидные, продолговатые или округлые . . . . . 4.
4. Листья снизу беловатолочные, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, с пурпурными или сине-фиолетовыми. По окраинам каменистых россыпей и на скалах; в южном Сихота-Алине . . . . . 2. *D. multicolor* Kom. — 3. многоцветный (табл. 155, 2).
- Листья снизу беловатолочные . . . . . 5.
5. Чашечка 6—8 мм дл.; венчик 17—22 мм дл., сине-фиолетовый, очень редко белый. В лесах и на осыпях; по Амуре . . . . . 5. *D. nutans* L. — 3. поникший.
- Чашечка около 13 мм дл., венчик около 3 см дл., синева-голубой. На россыпях, на гольцах; хр. Джугджур . . . . . 6. *D. stellerianum* Hildebr. — 3. Стеллера.

#### Род 11. PRUNELLA L. — ЧЕРНОГОЛОВКА

Стебли прямые или приподнимающиеся, 20—30 (40) см выс; листья черешковые, яйцевидные или продолговатые; соцветие плотное, почти головчатое, венчик фиолетовый или темно-фиолетовый. По тропам и дорогам среди леса . . . . . 1. *P. vulgaris* L. — 4. обыкновенный.

#### Род 12. PHLOMIS L. — ЗОПНИК

Прикорневые листья широкояйцевидные или широкоовальные, крупно-остропильчатые или зубчатые, голые, сверху с рассеянными щетинистыми волосками, снизу с звездчатыми волосками; стебли 100—120 см выс; венчик розовый, в  $1\frac{1}{2}$  раза длиннее чашечки; орешки голые. В лесах по ручьям; часто в Хасанском районе, севернее отдельными группами, редко . . . . . 1. *Ph. maximowiczii* Rgl. — 3. Максимовича.

- Прикорневые листья треугольные или треугольно-яйцевидные, городчатые, снизу с простыми волосками . . . . . 2.
2. Корневые шаровидные, с клубневидными утолщениями; прикорневые листья треугольные, венчик розовый или фиолетовый; стебли 40—150 см выс. На степных участках; на западе Амурской области и как заносное в Приморском крае (ст. Кангауз) . . . . . 1. *Ph. tuberosa* L. — 3. клубненосный.
- Клубневидных утолщений нет; прикорневые листья треугольно-яйцевидные, городчатые. На гольцах; пока найден только в Хабаровском крае в верховьях р. Урки на высоте 1800 м над ур. м. . . . . 3. *Ph. koraiensis* Nakai — 3. корейский.

#### Род 13. GALEOPSIS L. — ШКУЛЬНИК

1. Стебель мягковолосистый; венчик лилово-пурпуровый. Заносное; по дорогам и яг.-д. насыпям . . . . . 1. *G. ladanum* L. — II. ладанниковый, Жабрей.
- Стебель с отстояющимися щетинистыми волосками . . . . . 2.
2. Цветки мелкие; венчик 10—15 мм, розовый или пурпурный, трубки венчика лишь немного длиннее чашечки. Часто; по речным галечникам, дорогам и огородам . . . . . 3. *G. bifida* Vossn. — II. двунадрезанный.
- Цветки более крупные, венчик 2—3.5 см дл., светло-желтый, с лиловой губой. Заносное; пока найдено только в районе ст. Кангауз . . . . . 3. *G. speciosa* Mill. — II. заметный.


#### Род 14. LAMIAM L. — ИСХОТРА

1. Многолетники со стеблями 40—100 (120) см . . . . . 2.
- Однолетник или двулетник; стебель до 20—30 см выс; листья округлые или округло-почковидные, верхние сидячие, почковидные, стеблеобъемлющие; цветки многочисленные, венчик пурпурный или розовый, 1.5—2 см дл. Заносное, сорное; на улинах Владивостока . . . . . 1. *L. applexicaule* L. — Я. стеблеобъемлющая.
2. Венчик бледно-розовый, 2 см дл., почти войлочный; листья неравно пильчатозубчатые или нижние городчатые. В лесах; часто . . . . . 2. *L. barbatum* Sieb. et Zucc. — Я. бородавчатый.
- Венчик белый или грязновато-белый, 2—2.5 см дл., густо опушенный; листья остропильчатые. Заносное; по сорным местам у жилья . . . . . 2. *L. album* L. — Я. белый.

#### Род 15. LEONURUS L. — ПУСТЫРНИК

1. Все растение голое; нижние листья пятинадрезанные, средние трехнадрезанные, в очертании яйцевидные или широкояйцевидные; венчик розовый, 9—9.5 мм дл.; многолетник с мощными стеблями, 1—1.5 (2) м выс. Заносное; по сорным местам . . . . . 1. *L. quinquelobatus* Gilib. — II. пятилопастный.

Таблица 156



1 — *Leonurus heterophyllus* Sweet (Пустырник разнолистный), часть стебля с листьями и цветками; 2 — *L. macranthus* Maxim. (II. крупноцветковый), часть стебля с листьями и цветками, а — цветок.

- Растения более или менее опушенные . . . . . 2.
2. Однолетник или двулетник (по общему облику похожий на полынь); стебли около 1 м выс., с желобчатыми гранями; листья перисто или дланевидно-раздельные, с глубоко рассеченными долями; венчик 9—10 мм, сиреневато-розовый. На речных галечниках и песках, как сорное у жилья; отличный мезонос . . . . . 3. *L. heterophyllus* Sweet — II. разнолистный (табл. 156, 1).



- Многолетник; листья с клиновидным, плоским основанием, трехлопастные, с неглубоко надрезанными лопастями; венчик 25—28 мм дл., розовый. На сухих каменистых склонах, чаще среди кустарников . . . . .  
 . . . . . 2. *L. macranthus* Maxim. — II. крупноцветковый (табл. 156, 2).

#### Род 16. STACHYS L. — ЧИСТЕЦ

1. Многолетник; цветки бледно-розовые, розовые, пурпурные или лиловые . . . 2.  
 — Однолетник; цветки беловато-желтоватые, в длинном, колосовидном соцветии. Заносное; пока найден на юге Приморья (ст. Кангауа, с. Краскино) . . .  
 . . . . . 1. *S. annua* L. — Ч. однолетний.  
 2. Листья сверху бархатистые, продолговато-яйцевидные, с сердцевидным основанием и притупленно-округлым концом; венчик бледно-розовый. На сырых лугах; на оз. Ханка . . . . . 2. *S. komarovii* Knorr. — Ч. Комарова.  
 3. Листья не бархатистые, щетинистые или голые . . . . . 3.  
 — Листья голые или лишь по жилкам с щетинковидными волосками, городчато-пильчатые; мутовки в соцветии у основания раставленные, а наверху сближенные. У ручьев, в лесах . . . . . 3. *S. japonica* Miq. — Ч. японский.  
 — Листья сверху и снизу или же только сверху с щетинковидными волосками . . . 4.  
 4. Листья сверху с рассеянными щетинковидными волосками, снизу почти голые, пильчатые; венчик розовый или пурпурный, в 1½—2 раза превышает чашечку. На сырых лугах и болотах . . . . . 4. *S. chinensis* Bge. — Ч. китайский.  
 — Листья с обеих сторон более или менее опушены отстоящими щетинковидными волосками, мелкопильчатые; венчик розовато-лиловый, зубцы чашечки равные трубке или короче ее. На сырых лугах и среди кустарников . . . . .  
 . . . . . 5. *S. bicalensis* Fisch. — Ч. байкальский.

#### Род 17. SALVIA L. — ШАЛФЕЙ

Небольшой железисто опушенный однолетник 30—50 см выс., с эллиптическими, продолговатыми или продолговато-ланцетными листьями и мелкими, 7—8 мм, фиолетовыми цветками. Заносное; отмечено пока только на юге Приморья, у с. Григорьевки . . . . . 1. *S. plebeja* R. Br. — III. обыкновенный.

#### Род 18. SATUREJA L. — ЧАБЕР

Небольшой однолетник; стебли 15—30 (45) см выс., сильно ветвистые; цветки мелкие, белые или голубоватые, в многоцветковых ложных мутовках. Заносное; пока найден только у оз. Ханка . . . . .  
 . . . . . 1. *S. hortensis* L. var. *manshurica* Boriss. — Ч. садовый маньчжурский.

#### Род 19. CLINODIUM L. — ПАХУЧКА

Стебли до 100 см выс., бороздчатые; листья черешковые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, пильчато-зубчатые, с прижатым опушением; соцветия — ложные мутовки, многочисленные; венчик розовый, 10—11 мм дл. Часто; среди кустарниковых зарослей . . . . . 1. *C. chinense* (Benth.) Kuntze — II. китайская.

#### Род 20. ORIGANUM L. — ДУШИЦА


Многолетник; стебель 30—60 (90) см выс., с черешковыми продолговато-яйцевидными, острыми листьями; соцветия верхушечные, раскидистые, многоцветковые, щитковидные метелки; венчик 5—10 мм дл., сине-пурпурный или лилово-розовый. Заносное; в южных районах Приморского края . . . . .  
 . . . . . 1. *O. vulgare* L. — Д. обыкновенная.

#### Род 21. THYMUS L. — ТИМЬЯН

1. Стебли с ясно выраженными 4 гранями, с опушением по 2 противоположным сторонам попеременно от междоузлия к междоузлию или же только по ребрам . . . 2.  
 — Стебли пильчатые или же с неясными гранями, равномерно опушенные . . . 4.  
 2. Столбики толстые, разветвленные; цветоносные ветви 3—7 см выс.; листья эллиптические или яйцевидные (длина их превышает ширину в 2—3 раза), на очень коротком, явственном черешке, цельнокрайние, по краям реснитчатые, сверху голые, с рассеянными мелкими точечными железками, стебленные 5—13 мм дл.

<sup>1</sup> Таблица для определения видов тимьяна составлена по М. В. Клокову (Флора СССР, т. XXI, стр. 470—591).

Таблица 157




1 — *Lycopus lucidus* Turcz. (Зюзник блестящий); 2 — *L. maackianus* (Maxim.) Makino (З. Маака).

- и 2—5,5 мм шир., низовые скучены у основания ветвей, мелкие 2,5—5 мм дл. и 1,5—2 мм шир.; соцветие головчатое, рыхлое; венчик розово-лиловый, почти вдвое длиннее чашечки. Близ моря, пока известен только из бухты *Нахтаху* . . . . . 1. *Th. semiglaber* Klok. — *T. полуголый*.
- Стволки тонкие; листья продолговато-эллиптические или продолговато-ййцевидные, длина их превышает ширину до 6 раз . . . . . 3.
3. Листья яйцевидные, до 14 мм дл. и 4 мм шир., полнокрайние, черенок нижних листьев на цветоносных ветвях равен пластинке; соцветие продолговато-головчатое, до 2,5 см дл. На известковых скалах и по обрывам у моря . . . . . 3. *Th. komarovii* Serg. — *T. Комарова*.
- Листья эллиптические, до 20 мм дл. и 7 мм шир., с 2—3 зубчиками с каждой стороны, черенок нижних листьев на цветоносных ветвях не длиннее  $\frac{1}{2}$  пластинки. На песчаных дюнах и на сухих остепненных каменистых участках; пока известен только из окрестностей с. Покровки (Октябрьский район Приморского края) . . . . . 2. *Th. disjunctus* Klok. — *T. раздельный*.
4. Стволки обычно заканчиваются стеколющим бесплодным побегом, а если побег на конце плодущий, то он приподнимающийся, боковые бесплодные побеги не развиты; листья черешковые обычно эллиптические; соцветие головчатое . . . . . 5.
- Стволки толстые, одеревесневшие, заканчиваются плодущим побегом; цветоносные ветви опушены длинными волосками, боковые ветви с оттопыренными или вниз наклоненными волосками; листья без ясно выраженного черешка, кизу сухонеровные, продолговато-эллиптические или эллиптические, 2,5—14 мм дл. и 1—5,5 мм шир., с обеих сторон волосистые; соцветие в начале цветения головчатое, позже удлинняющееся. На берегах оз. Ханка . . . . . 4. *Th. przewalskii* Kom. — *T. Пржевальского*.
5. Листья короткочерешковые, с обеих сторон длинноволосистые . . . . . 6.
- Листья с более длинным черешком, обычно около  $\frac{1}{2}$  длины пластинки или же у нижних стеблевых листьев равны ей, толые или волосистые . . . . . 7.
6. Стволки заканчиваются приподнимающимся не плодущим побегом; междоузлия удлиняющиеся; листья продолговато-эллиптические, густо опушенные, боковые жилки заметно выдающиеся; венчик почти в 2 раза длиннее чашечки, розово-лиловый, бледный. На каменистых склонах; в Амурской области . . . . . 5. *Th. amurensis* Klok. — *T. амурский*.
- Стволки заканчиваются плодущим побегом; междоузлия короткие; листья обычно яйцевидные, с обеих сторон почти мохнаты, боковые жилки слабо выдающиеся; венчик в  $\frac{1}{2}$ —2 раза длиннее чашечки, розово-лиловый, очень яркий. На каменистых склонах и скалах; в Сихотэ-Алине (р. Светлая) . . . . . 6. *Th. ussuriensis* Klok. — *T. уссурийский*.
- 7 (от 5). Черенок нижних стеблевых листьев не длиннее пластинки; гетерофиллия отсутствует вовсе или выражена слабо . . . . . 8.
- Черенок у нижних стеблевых листьев равен или почти равен пластинке; гетерофиллия выражена резко . . . . . 10.
8. Листья толые или почти толые, почти сидячие (кроме самых нижних), неравнобокие. На скалах и каменистых склонах . . . . . 10. *Th. inaequalis* Klok. — *T. неравный*.
- Листья равнобокие, с явно выраженными черешками . . . . . 9.
9. Листья блестящие, темно-зеленые, с резко выдающимися снизу жилками. Каменистые склоны и скалы; в Сихотэ-Алине (средняя Ботча) . . . . . 9. *Th. nervulosus* Klok. — *T. жилковатый*.
- Листья тусклые, с резко выдающимися жилками. На прибрежных песках; в Приморье (оз. Ханка) . . . . . 7. *Th. chankonius* Klok. — *T. ханковский*.
- Иногда гибридирует с *Th. przewalskii* Kom.
10. Цветоносные ветви с опушением из длинных волосков; листья в нижней трети по краю реснитчатые; венчик небольшой, розово-лиловый. Скалы морского берега; бухта Ольга . . . . . 11. *Th. arsenifolii* Klok. — *T. Арсеньева*.
- Цветоносные ветви с короткими, отстоящими волосками; листья с густым, но очень коротким опушением; венчик до 7 мм дл., розово-лиловый. На каменистых склонах; по Амуру . . . . . 8. *Th. curtus* Klok. — *T. короткий*.

## Род 22. LYCOPUS L. — ЗЮЗНИК

1. Все листья более или менее однородные . . . . . 2.
- Верхние листья полнокрайние, почти цельнокрайние или крупнозубчатые, а нижние глубоко надрезаннозубчатые или перисто-зубчатые . . . . . 3.
2. Листья плотные, часто кожистые, сверху блестящие, почти сидячие или даже полустебельнообъемлющие; ветви до 3,5 мм дл., чашелистики остистые. В лесах и среди кустарниковых зарослей, преимущественно на более сырых участках; часто . . . . . 2. *L. lucidus* Turcz. — 3. *блестящий* (табл. 157, 7).



1 — *Plectranthus excisus* Maxim. (Шнорцветник вырезной), верхняя часть стебля с листьями и цветками: а — цветок; 2 — *P. glaucocalyx* Maxim. (Ш. спячочашечный), часть стебля с листьями: а — плод с чашечкой, б — орешек; 3 — *P. serrata* Maxim. (Ш. пальчатый), часть стебля с листьями: а — плод с чашечкой, б — орешек.



- Листья тонкие, матовые, с более или менее заметными черешками; венчик до 2 мм дл., чашелистики тупые. На лугах и среди кустарников в поймах рек . . . . . 2. *L. parviflorus* Maxim. — 3. мелкоцветковый.
- 3 (от 1). Верхние и средние листья узколанцетные, цельнокрайние или с очень немногими, малозаметными зубчиками, нижние глубоко надрезаннозубчатые; все растение голое; реке с короткими, рассеянными волосками. Преимущественно на заболоченных лугах . . . . . 3. *L. maackianus* (Maxim.) Makino — 3. Маака (табл. 157, 2).
- Листья широколанцетные, верхние крупнораззубчатые, нижние до глубоко надрезан-ных, с обеих сторон волосистые; стебли с густыми, курчавыми волосками. На сы-рых лугах; преимущественно на юге Приморья . . . . . 4. *L. hirtellus* Kom. — 3. опушенный.

Известны также гибриды — *L. parviflorus* × *L. maackianus* и *L. maackianus* × *L. lucidus*.

## Род 23. MENTHA L. — МЯТА

1. Полумутовки сидячие, в пазухах стеблевых листьев; листья продолговатоланцет-ные, крупнопильчатые, зубцы чашечки длинноостроконечные; венчики сине-лиловые. На сырых лугах и по рекам . . . . . 1. *M. haplocalyx* Briq. — М. простоглазчатая.
- Полумутовки на ножках в верхней части стебля в конечном негустом соцветии; листья почти цельнокрайние или же отклоненно пильчато-зубчатые; зубцы чашечки широкоотреугольные, венчики от ярко-лиловых до бледных и беловатых. На долинных лугах и в ивняках . . . . . 2. *M. dahurica* Fisch. — М. даурская.

## Род 24. PERILLA L. — ПЕРИЛЛА, СУЗА

Стебель прямой, до 50 см высоты; листья длинночерешковые, широкояйцевидные или широкоовальные, пильчато-зубчатые; венчик белый. Культивируется как масличное, иногда дичает . . . . . 1. *P. esculentoides* L. — П. базиликковая.

В садах как декоративное разводится другой вид. — *P. nankinensis* (Lour.) Despe. — П. нанкинская с темноокрашенными листьями и розовыми или бело-красными цветками.

## Род 25. ORTHODON Benth. — ОРТОДОН


Однолетник; стебли 8—50 (60) см выс., тонкие, слегка шероховатые; листья черешковые, яйцевидно- или продолговатоморбические, при основании цельно-крайние, выше с немногими крупными зубцами; цветочные кисти конечные, длин-ные, тонкие, безлистные; прицветники мелкие; венчик 3—3.5 (4) мм, розово-фиолетовый. На лугах и среди кустарников . . . . . 1. *O. grosseserratum* (Maxim.) Kudo, *Mosla grosseserrata* Maxim. — О. крупнопильчатый.

## Род 26. ELSHOLZIA Willd. — ЭЛЬСОЛЬЗИЯ, ШАНДРА

1. Соцветие короткоцилиндрическое или почти яйцевидное; прицветники пленчатые, длинноостистые; листья узкие, ланцетные или яйцевидноланцетные. На скалах и каменистых осыпях; на юге Приморья (оз. Ханка, р. Суйфун, Хасанский район) . . . . . 1. *E. serotina* Kom. — Э. поздняя.
- Соцветие двурядное, гребневидное, обычно одностороннее; прицветники травяни-стые, с сетчатым жилкованием . . . . . 2.
2. Листья яйцевидно-ланцетные, с узкоклиновидным основанием и с 17—20 зубцами с каждой стороны; листовые черешки в 2 раза короче пластинки. На скалах и галечниках и как сорное в садах и огородах; часто . . . . . 2. *E. patrinii* (Lepech.) Garcke — Э. Патрина.
- Листья яйцевидные или широкояйцевидные, с ширококлиновидным или почти усеченным основанием, с крупными, редкими зубцами (по 7—8 с каждой стороны); листовые черешки почти такой же длины, как и пластинка. На скалах и галечни-ках и как сорное; только на юге Приморья (от оз. Хасан до бухты Ольги) . . . . . 3. *E. pseudo-cristata* Lévl. et Vaniot — Э. ложногребенчатая.

## Род 27. DYSOPHYLLA Blume — ДИЗОФИЛЛА

Листья линейно-ланцетные, 1.5—8 см дл. и 0.2—0.7 см шир., в мутовках, сид-ячие, при основании округлые, с редкими зубцами или почти цельнокрайние; цветки в колосовидном соцветии, мелкие; венчик бледно-лиловый, 3.5—4 мм дл.



1 — *Solanum depilatum* Kitag. (Паслен безволосый), часть стебля с листьями и цветками; 2 — *Physalisstrum echinatum* (Yatabe) Makino (Физалиструм иглистый); а — часть стебля с листьями и цветком, б — плод; 3 — *Physalis glabripes* Rojak. (Физалис голоножковый): а — верхняя часть стебля с листьями, б — отрезок стебля с плодом.

По берегам водоемов, иногда даже в воде; редкость  
1. *D. yatabeana* Makino — Д. Ятабе.

## Род 28. *PLECTRANTHUS* L'Her. — ШПОРОЦВЕТНИК

1. Листья обратносердцевидные, крупно остропильчатые, с сильно перетянутым у основания остроконечием, выходящим из выемки листа; чашечка зеленая, коротко опушенная, при плодах почти голая; венчик бледно-сине-фиолетовый; 7—8 мм дл. В лесах на каменистых развалах и россыпях или среди кустарников; очень часто . . . . . 1. *P. excisus* Maxim. — Ш. вырезной (табл. 153, 1).
- Листья без выемки на вершине . . . . . 2.
2. Листья пальчатые или городчатые, с крупными зубцами; чашечка зеленая, коротко опушенная, при плодах почти голая; венчик светло-фиолетовый, с темными пятнами на верхней губе, 3—6 мм дл.; орешки на верхушке голые. На сухих склонах в дубняках, среди кустарников и у скал . . . . . 2. *P. glaucocalyx* Maxim. — Ш. сизозачечный (табл. 158, 2).
- Листья с крупными, остропильчатыми, часто слабоизогнутыми зубцами, плотные (почти кожистые); метелка узкая, седоватая от мелких прижатых волосков; чашечки густо опушенные, желесные, при плодах голые, венчик 5—6 мм, фиолетовый, изредка чисто белый; орешки на верхушке бороздчатые и желесные. На сухих лугах среди кустарников; только на юге Хасанского района . . . . . 3. *P. serrata* Maxim. — Ш. пильчатый (табл. 158, 3).

## Сем. 112. *SOLANACEAE* Juss. — ПАСЛЕНОВЫЕ

1. Цветки очень крупные, с белым воронковидным венчиком 6—10 (12) см дл.; плод — крупная яйцевидная или почти шаровидная коробочка с жесткими шипами . . . . . Род 6. *Datura* L. — Дурман.
- Цветки значительно меньших размеров; плод — более или менее сочная ягода или коробочка без шипов . . . . . 2.
2. Плод — коробочка; венчик воронковидный . . . . . 3.
- Плод — ягода; венчик колокольчатый или с очень короткой трубкой . . . . . 4.
3. Однолетники или двулетники; листья ланцетные, глубоко перистопальчатые или раздельные или частично цельные; венчик крупный, 2—4,5 см дл., воронковидный, грязновато-желтый, с пурпурными жилками, реже беловатый и без окрашенных жилок . . . . . Род 4. *Hyoscyamus* L. — Белена.
- Многолетники; листья цельнокрайние или туповыемчатые; венчик фиолетовый, с почти колокольчатым отгибом; чашечка при плодах вздутая, перепончатая; коробочка шаровидная, около 1 см в diam. . . . . Род 5. *Physochlaina* G. Don — Пузырица.
- 4 (от 2). Чашечка при плодах сильно разрастается и полностью или большей частью закрывает ягду . . . . . Род 4. *Solanum* L. — Паслен.
5. Чашечка плотно прилегает к беловатой ягоде, верхушка которой свободна; цветки в пучках . . . . . Род 2. *Physalium* Makino — Физалиструм.
- Чашечка пузырчато вздутая полностью закрывающая ягду; цветки одиночные . . . . . Род 7. *Nicandra* Adams. — Никандра.
6. Однолетники 80—100 (120) см выс.; цветки крупные, голубые, синие или сине-фиолетовые . . . . . Род 3. *Physalis* L. — Физалис.
- Многолетники или однолетники; цветки белые или желтоватые . . . . . Род 3. *Physalis* L. — Физалис.

## Род 1. *SOLANUM* L. — ПАСЛЕН

1. Однолетники; цветки белые; ягода черная. Заносный сорняк на огородах у дорог и на сорных местах . . . . . 3. *S. nigrum* L. — П. черный.
- Многолетники (полукустарники); цветки фиолетовые; ягода красная . . . . . 2.
2. Венчик бледно-фиолетовый; ягода продолговатая, эллипсоидальная, до 15 мм дл.; листья узкояйцевидные, по краю с короткими ресничками. По долинкам рек; только на самом юге Приморья . . . . . 2. *S. pedunculatum* Koidz. — П. приподнятый.
- Венчик темно-фиолетовый; ягода шаровидная; листья яйцевидные или широкояйцевидные. По долинкам рек (Амур, Уссури, Даубай, Улахаи др.), преимущественно в вивках . . . . . 1. *S. depilatum* Kitag. — П. безволосый (табл. 159, 1).

## Род 2. *PHYSALIASTRUM* Makino — ФИЗАЛИСТРУМ

Многолетник; стебель до 80—100 см выс.; листья до 10 см дл. и до 6,5 см шир., яйцевидные, продолговатояйцевидные или эллиптические, обычно парные; венчик колокольчатый, зеленоватый или желтоватый; ягода почти сухая, белая, 10—15 мм в diam.; чашечка зеленая, плотно прилегает к ягоде. В долинках, лесах и кустарниковых зарослях; на юге Приморья . . . . . 1. *P. cchinatum* (Yatabe) Makino — Ф. иглистый (табл. 159, 2).

## Род 3. *PHYSALIS* L. — ФИЗАЛИС

1. Многолетник; стебли 20—80 (100) см выс., протые или слабо ветвистые; венчик белый, колокольчатый; чашечка при плодах оранжево-красная. По долинкам рек среди кустарниковых зарослей, преимущественно у жилых мест . . . . . 1. *Ph. glabripes* Pojark. — Ф. голоножковый (табл. 159, 3).
- Однолетник; стебли обычно сильно ветвистые, раскидистые; венчик бледно-желтый, коротко-воронковидный; чашечка при плодах желтовато-зеленая. Заносное; по ж.-д. насыпам; иногда культивируется . . . . . 2. *Ph. pubescens* L. — Ф. пушистый, Земляничный томат.

## Род 4. *HYOSCYAMUS* L. — БЕЛЕНА

1. Однолетник; цветет во второй половине лета; опушение сравнительно редкое; листья неглубоколопастные или частью цельные. Сорное; в паселенных пунктах . . . . . 2. *N. bohemicus* Schmidt — Б. чешская.
- Двулетник; цветет в первой половине лета; опушение густое, желесное; листья обычно глубоко перистопальчатые или раздельные . . . . . 1. *N. niger* L. — Б. черная.

## Род 5. *PHYSOCHLAINA* G. Don — ПУЗЫРИЦА

Многолетник с прямыми вверх ветвящимися стеблями; листья цельнокрайние или туповыемчатые, овальные; венчик фиолетовый, воронковидный; коробочка шаровидная, до 1 см в diam. На сухих скалах; в Амурской области . . . . . 1. *Ph. physaloides* (L.) G. Don — П. физалисоидная.

## Род 6. *DATURA* L. — ДУРМАН

Однолетник с толстыми стеблем; все растение с неприятным запахом; цветки одиночные, с очень крупным, белым воронковидным венчиком; коробочка крупная, с жесткими шипами. Заносное; на сорных местах и по улкам (г. Сучан, села Новиково, Фроловка, Красино) . . . . . 1. *D. stramonium* L. — Д. обыкновенный.

## Род 7. *NICANDRA* Adams. — НИКАНДРА

Однолетник до 100—120 см выс.; цветки одиночные, крупные синие или сине-фиолетовые; чашечка вздутая, с 5 крылатыми ребрами; арелая ягода сухая, бурая. Сорное; в паселенных пунктах; иногда культивируется как заменитель хмели . . . . . 1. *N. physaloides* (L.) Gaertn. — Н. физалисоидная.

## Сем. 113. *SCROPHULARIACEAE* Juss. — ПОРИЧНИКОВЫЕ


1. Все растение с густым сероватым или желтоватым войлочным опушением; стебли высокие, прямостоящие; листья крупные, 15—30 см дл.; цветки желтые; венчик правильных или почти правильных; двулетники . . . . . Род 1. *Verbascum* L. — Горючник.
- Растения голые или более или менее опушенные (но без сплошного войлока); листья значительно меньших размеров . . . . . 2.
2. Цветки с крупным шпорцем, желтые; венчик двугубый . . . . . Род 2. *Linaria* Mill. — Ляпица.
- Цветки без шпорца . . . . . 3.
3. Все листья в прикорневой розетке; маленькие, 2—5 см выс., растения с очень мелкими цветками на длинных цветоножках, однолетники . . . . . Род 7. *Limnoloba* L. — Лузница.
- Растения с более или менее обильным стеблем . . . . . 4.
4. Венчик колокольчатый или воронковидный, с короткой трубкой и плоским отгибом . . . . . Род 9. *Veronica* L. — Вероника.
- Венчик двугубый . . . . . 5.



5. Цветки одиночные, паузунные . . . . . 6.  
 — Цветки в конечном соцветии . . . . . 9.  
 6. Венчик розовый, крупный, 2,5—3 см дл.; цветки в паузах верхних листьев на концах ветвей; стебли 7—50 (80) см выс.; все растение железисто пушистое . . . . . Род 13. *Phterospermum* Bge. — Фрейроспермум, Виносемьяник.  
 — Венчик голубоватый, беловатый, желтоватый или желтый . . . . . 7.  
 7. Венчик желтый; чашечка призматическая, пятиугольная; стаминодий нет . . . . . Род 4. *Minulus* L. — Губастик.  
 — Венчик иной окраски; стаминодий есть . . . . . 8.  
 8. Венчик голубоватый, беловатый, желтоватый; стаминодий хорошо заметный; двулоспастные; цветоножки длинные; клейстогамные цветки красноватые; стебли чаще лежачие или приподнимающиеся . . . . . Род 8. *Lindernia* All. — Линдерния.  
 — Венчик белый или желтоватый; стаминодий малозаметный, короткий; цветки почти сидячие; стебли прямые, 8—20 см выс. . . . . Род 6. *Gratiola* L. — Астран.  
 9 (от 5). Трубка венчика вздутая, почти шарообразная, отгиб венчика бурый, красноватый или зеленоватый . . . . . Род 3. *Sceporhalaria* L. — Норичник.  
 — Трубка венчика не вздутая, цилиндрическая или воронковидная . . . . . 10.  
 10. Листья плотные, почти кожистые, прикорневые ланцетные или эллиптические, с черешком почти равным пластинке; пластинка 2—12 см дл. и 0,6 (9) см шир.; зубчатая или городчатая; соцветие плотное, цилиндрическое или яйцевидное; зубчатая или городчатая; цветки синеватый или беловатый привлекательный травянистые, голубоватые; венчик синеватый или беловатый . . . . . Род 10. *Lagotis* Gaertn. — Лаготис.  
 — Листья обильные, 2-мемные (не кожистые), иной формы . . . . . 11.  
 11. Цветоножки длинные чашечки . . . . . Род 10. *Lagotis* Gaertn. — Лаготис.  
 12. Цветоножки короче чашечки . . . . . 13.  
 12. Стебель простой; цветки в небольших конечных, часто односторонних кистях; венчик синевато-фиолетовый . . . . . Род 5. *Mazus* Lour. — Мадуэ.  
 — Стебель в верхней части сильно ветвистый; листья продолговатые или почти линейные; цветки многочисленные, белые . . . . . Род 15. *Omphalotrix* Maxim. — Омфалотрикс.  
 13 (от 11). Цветки мелкие, венчик 5—7 (8) мм дл. . . . . 14.  
 — Цветки более крупные; венчик обычно не менее 15 мм дл. . . . . 15.  
 14. Цветки грязно-розовые; верхняя губа цельная; листья сидячие, ланцетные или линейно-ланцетные, опушение из вниз отклоненных волосков . . . . . Род 16. *Odontites* Zinn — Зубчатка.  
 — Цветки белые, бледно-лиловые или желтые; верхняя губа двураздельная; листья овальные, яйцевидные или широкояйцевидные, лилововидно-зубчатые, опушение из оттопыренных или вниз отклоненных волосков . . . . . Род 14. *Euphrasia* L. — Очанка.  
 15 (от 13). Листья пальчато-раздельные . . . . . 16.  
 — Листья зубчатые, городчатые, пальчатые или перисторассеченные . . . . . 17.  
 16. Многолетники; листья очерченные, линейные, линейно-ланцетные, реже ланцетные, 3—9 см дл. и 2—5 (10) мм шир. цветки бледно-желтые или белые, в плотных колосовидных соцветиях; семена мелкие, 1,8 мм дл. . . . . Род 11. *Castilleja* L. f. — Кастиллея.  
 — Однолетники; листья супротивные, ланцетные, яйцевидно-ланцетные или линейно-ланцетные; цветки розовые или темно-розовые, в конечном прерывистом колосовидном соцветии, с крупными зелеными или более или менее окрашенными прицветниками; семена крупные, 4—5 мм дл. . . . . Род 12. *Melampyrum* L. — Марьяник.  
 17 (от 15). Трубка чашечки длинная, 10—18 мм, с темно-зелеными ребрами; венчик грязно-желтый; листья трижды-четырежды перисторассеченные . . . . . Род 19. *Siphonostegia* Benth. — Сифоностегия.  
 — Чашечка колокольчатая, трубчато-колокольчатая или вздутая; венчик розовый, красный, пурпурный или желтый . . . . . 18.  
 18. Чашечка вздутая, с боков сжатая, при плодах сильно увеличивающаяся; венчик желтый, со сплюснутой с боков верхней губой; листья ланцетные или продолговато-ланцетные, городчато-зубчатые; однолетники . . . . . Род 17. *Rhinanthus* L. — Погрехом.  
 — Чашечка трубчато-колокольчатая или колокольчатая, при плодах не разрастающаяся; венчик розовый, красный или желтый; листья преимущественно перисторассеченные или цельные, зубчатые; многолетники . . . . . Род 18. *Pedicularis* L. — Мытник.

# Род 1. VERBASCUM L. — КОРОВЯК

Стебли 50—150 (180) см высоты; листья продолговатые, городчатые или почти пальчато-раздельные; цветки 12—20 мм в diam., желтые, с 5 тычинками; коробочка эллиптическая или обратнояйцевидная, лишь немного превышающая чашечку;



1 — *Sceporhalaria oldhami* Oliv. (Норичник Олдэма); а — часть стебля с листьями, б — соцветие с раскрытыми коробочками; 2 — *S. amurensis* Fr. Schmidt (Н. амурский), часть стебля с листьями; 3 — *S. maximowiczii* Gorsch. (Н. Максимовича); а — часть стебля с листьями и цветками, б — цветок.

двулетник. Заносное; по речным галечникам и выгонам; по рекам Сучану, Суд-  
ахе, Кангаузу, Тудагу, Майхе . . . 1. *V. tharsus* L. — К. обыкновенный.

## Род 2. LINARIA Mill. — ЛЬНЯНКА

1. Листья овальные или продолговатоовальные, более или менее мясистые; стебли  
лежащие или приподнимающиеся; соцветия малочисловые; шпорец короткий,  
чуть загнутый. По морским берегам . . . 3. *L. japonica* Miq. — Л. японская.
- Листья линейные или линейно-ланцетные; стебли прямые; соцветия многоцветко-  
вые; шпорец более длинный, прямой или изогнутой . . . 2.
2. Ось соцветия с редкими железистыми волосками; листья линейные; стебли прямые,  
сорное; у дорог и на полях . . . 4. *L. vulgaris* Mill. — Л. обыкновенная.
- Все растение голое; листья линейно-ланцетные; стебли восходящие, реже прямые.  
По берегам рек и на дугах . . . 2. *L. melampyroides* Kurjian. — Л. марьяшиковья.

## Род 3. SCORPHULARIA L. — ПОРИЧНИК

1. Стебли и черешки листьев крылатые. Растение морского берега . . . 4. *S. grayana* Maxim. — Н. Грэй.
- Стебли и черешки не крылатые . . . 2.
2. Стебель голый, до 80 см выс.; листья голые, мелко-остропиличатые. На сырых лу-  
гах . . . 3. *S. oldhami* Oliv. — Н. Олджам (табл. 160, 1).
- Стебель с мелким железистым опушением; листья остропиличатые или крупнозуб-  
чатые, сверху голые или почти голые, снизу более или менее железисто опуше-  
нные . . . 3.
3. Листья яйцевидные, крупно-острозубчатые или надрезаннозубчатые. На сухих  
склонах и речных галечниках . . . 2. *S. amurensis* Fr. Schmidt — Н. амурский (табл. 160, 2).
- Листья яйцевидные или продолговатояйцевидные, остропиличатые. В лиственных  
лесах на склонах . . . 1. *S. maximoviczii* Gorschik. — Н. Максимовича (табл. 160, 3).

## Род 4. MIMULUS L. — ГУБАСТИК

1. Цветки мелкие, 10—12 мм дл., на очень коротких цветоножках; все растение со-  
вершенно голое. В лесах по берегам рек и ручьев; часто . . . 1. *M. tenellus* Bge. — Г. тоненький (табл. 161, 1).
- Цветки крупные, до 3—3.5 см дл., цветоножки длинные; все растение ясно волоси-  
стое. На морском побережье; мыс Олимпиады, зал. Нахтаху; редкость . . . 2. *M. stolonifer* (Maxim.) Novopokr. — Г. отпрысковый (табл. 161, 2).

## Род 5. MAZUS Lour. — МАДЗУС

1. Цветки одиночные или в небольших рыхлых конечных кистях; венчик 6—10 мм дл.;  
все растение 3—10 (15) см выс. Листья и песчаные отмели в низинах; иногда  
как сорное на сырых участках на огородах . . . 1. *M. japonicus* (Thunb.) Kuntze — М. японский (табл. 161, 3).
- Цветки в узких и рыхлых кистях; венчик 13—18 мм дл.; растение более крупное,  
10—40 (50) см выс. На сырых луговых склонах и у дорог по кюветам . . . 2. *M. stachydifolius* (Turcz.) Maxim. — М. чистецелистный (табл. 161, 4).


## Род 6. GRATIOLA L. — АВРАН

Однолетник; все растение голое; стебли прямые, восходящие, при основании  
укореняющиеся, до 20 см выс., слегка мясистые; листья цельнокрайные, про-  
долговатые или ланцетные, цветки пазушные, почти сидячие, одиночные; вен-  
чик белый или чуть желтоватый 5—6 мм дл. и 1.5—2 мм шир., короткодвугубый.  
На влажных и песчаных отмелях; редко . . . 1. *G. japonica* Miq. — А. японский (табл. 162, 3).

## Род 7. LIMOSELLA L. — ЛУЖИЦА

Маленький 3—5 (10) см выс., однолетник со стелющимися, тонкими, укореняю-  
щимися побегами; листья линейно-продолговатые или ланцетные, 0.3—1.5 см дл.  
и 0.5—5 мм шир., голые; цветки одиночные; венчик белый или розовый, 2—  
2.5—3.5 мм дл. На иловатых отмелях, часто даже в воде . . . 1. *L. aquatica* L. — Л. водная (табл. 162, 2).

Таблица 161



1 — *Mimulus tenellus* Bge. (Губастик тоненький); 2 — *M. stolonifer* (Maxim.) Novopokr. (Г. отпрысковый); 3 — *Mazus japonicus* (Thunb.) Kuntze (Мадзус японский); 4 — *M. stachydifolius* (Turcz.) Maxim. (М. чистецелистный).



Стебли лежачие, приподнимающиеся, реже прямые, ветвистые, 2—15 (25) см выс.; листья яйцевидные, продолговатоэллиптические или эллиптические, цельнокрайние; цветки одиночные, паузные, голубоватые или розоватые, нижние клейстогамные, розоватые. На лиственных отметах

1. *L. pyxidaria* All. — Л. естакалчатая (табл. 162, 1).

Род 9. VERONICA L. — ВЕРОНИКА

1. Цветки в верхушечных соцветиях на концах стеблей.
2. Цветки в пазушных соцветиях или одиночные; стебель обычно заканчивается
3. листьями.
4. Растения сероватые или густо-беловолочные; стебель 20—45 (60) см выс.; цветки
5. ярко-синие. Запасное; по ж.-д. насыпам.
6. Растения голые или более или менее опушенные железистыми волосками, или
7. бархатистые, по без войлока.
8. Листья в мутовках или частично супротивные
9. Листья супротивные или очередные
10. Листья в мутовках
11. 40—150 см выс.; кисти длинные; венчик 7—8 мм дл., обычно фиолетовых
12. как исключение, розовый или белый. На дугах и среди кустарниковых зарослей, часто
13. Листья в мутовках по 3 или частью супротивные, широкояйцевидные, широко-
14. зубчатые; стебли до 40 (50) см выс.; кисти короткие, около 3 см дл.; венчик
15. около 6 мм дл., голубой. На сухих дугах; бассейны р. Тегу
16. 17. V. cerasifolia Monjuschko — В. вильгельмстайн.
18. (от 3). Листья округлые, ланцетные, или ланцетно-линейные, 2—7 см дл. и 2
19. 40—60 см выс. По дугам и среди кустарников
20. 15. V. tubiflora Fisch. et Mey. — В. трубкоцветная.
21. Листья супротивные, трубка венчика короткая
22. Однолистный с цельнокрайными или почти цельнокрайными листьями; стебли
23. слабые, чаще приподнимающиеся, 10—25 см выс.; цветочные кисти рыхлые;
24. венчик белый или голубоватый, коротче чашечки. На откосах
25. 10. V. peregrina L. — В. иноземная.
26. Многолетник; венчик длиннее чашечки
27. Соцветия в верхушечных или по боковым, позднее сильно удли-
28. няющихся, рыхлых, малочисловых; венчик голубой или фиолетовый, до 8 мм
29. в diam.; выс. растения до 20—25 см выс., с ползучими корневыми; листья
30. перекрестнопарные, яйцевидные. В горах в зарослях кедрового стланика;
31. бассейны р. Хора и севернее
32. 1. V. stelleri Pall. — В. Стеллера (табл. 162, 4).
33. Кисти длинные, многоцветковые
34. Кисти рыхлые, при плодах с более или менее разставленными цветками; венчик
35. 3—4 мм дл., белый, голубой или беловатый; стебли восходящие, ползучие или
36. лежачие. По дорогам и выгонам, запасное
37. 2. V. serpyllifolia L. — В. тимьянлистная.
38. Кисти плотные; стебли крепкие, прямые
39. Листья с клиновидным основанием, мелкопильчатые, мелкозубчатые или цельно-
40. крайние
41. Листья с сердцевидным, округлым или плоским основанием, крупнозубчатые или
42. надрезанные
43. Листья заостренные или ланцетно-линейные, мелкопильчатые или мелкозубча-
44. тые, с основанием, часто голубоватым; кисти длинные, густая. На дугах, в
45. кустарниках и в лесу
46. 3. V. hirtifolia Pall. — В. лысикоцветная.
47. Листья более широкие, продолговатоланцетные или ланцетные
48. 11. Стебли до 1 м выс.; кисти продолговатоланцетные или ланцетные
49. 14 см дл. и 1.5—3.5 см шир; цветки колосовидная, густая, 6—30 см дл.; венчик
50. голубой или синий (очень редко белый). Среди кустарников и на разнотравных
51. дугах
52. Стебли 20—30 (35) см выс.; листья ланцетные, продолговатоланцетные или овально-
53. ланцетные, узкие; треугольно-ланцетные, 2.2—3.5 см дл. и 4—40 мм шир.; со-
54. цветие 7—9 см дл.; венчик синий, реже розовый или белый. На сухих склонах,
55. в дубяниках; у моря
56. 4. V. oligensis Kom. — В. олигская.
57. 12 (от 9). Стебли голубые, 40—120 см выс.; листья с длинно заостренными зубцами;
58. венчик синий. На дугах и в кустарниковых зарослях вдоль рек
59. 3. V. longifolia L. — В. длиннолистная.
60. Стебли бархатистые, 30—90 см выс.; листья густо и коротко железистоопушенные,
61. зубцы листьев широкие; цветки обычно белые, реже розовые или темно-синие



1 — *Lindernia pyxidaria* All. (Линдерния стаканчатая); 2 — *Limosella aquatica* L. (Лузжипа водяная); 3 — *Gratiola japonica* Miq. (Аврая японский); 4 — *Veronica stelleri* Pall. (Вероника Стеллера); 5 — *V. dahurica* Stev. (В. даурская), верхняя часть стебля с листьями и цветками.

На сухих песчано-галечниковых отложениях по рекам и у моря, а также на сухих каменистых склонах

- 13 (от 1). Листья узколанцетные или линейные, 2—5 см дл., 3—7 мм шир., острые, мелкозубчатые, с зубцами, обращенными назад, изредка цельнокрайние; кисти пазушные, многоцветковые, с очень толстыми, длинными цветоножками; венчик бледно-голубой или беловатый; коробочка сплюснутая с боков, яйцевидная или почковидная. На сырых лугах и болотах; р. Лфуу . . . . . 12. *V. scutellata* L. — В. щитковая.
- Листья ныме (широкояйцевидные, продолговатоовальные, ланцетные, или линейно-ланцетные) . . . . . 14.
14. Все цветки одиночные, в пазухах стеблевых листьев; венчик голубой, синий или светло-фиолетовый; стеблевые листья широкояйцевидные (до округлых), крупно городчато-зубчатые; стебли распростертые, часто лежачие или приподнимающиеся; однолетник или двулетник. Заносное; сорное на огородах и по уличам; Владивосток . . . . . 9. *V. persica* Poir. — В. персидская.
- Цветки в кистях . . . . . 15.
15. Стебель 10—45 см выс.; листья надрезаннозубчатые или городчатые, от округло-продолговатой до яйцевидных, 1.5—3 см дл. и 1—2 см шир., более или менее опушенные; цветочные кисти в пазухах верхних листьев, супротивные, малоцветковые; венчик 10—15 мм, ярко-голубой, или белоокаймленный, с темными жилками; коробочка трехгранно-обратносердцевидная, 2.5—3 мм дл. Заносное; по дорогам и в кустарниках; ст. Кангауэ . . . . . 11. *V. chamaedrys* L. — В. дубравная.
- Листья цельнокрайние или пильчато-зубчатые, голые, блестящие; венчик 2—3 мм в diam.; коробочка округлая или эллиптическая . . . . . 16.
16. Стебли (10) 40—80 (150) см выс., толстые, цилиндрические или неясно четырехгранные, внутри полые; листья яйцевидные, продолговатоланцетные или ланцетные (до линейных), 2—10 см дл. и до 3—4 см шир., часто полустеблеобъемлющие; кисти многоцветковые, длинные листья, в основном в пазухах верхних листьев. По берегам ручьев, часто в воде, заносное; на юге Приморья (пос. Шкотово, ст. Кангауэ) . . . . . 13. *V. angalyb-argentea* L. — В. ключевая.
- Стебли 10—30 см выс., прямые, крепкие (не полые) более или менее волосистые; листья ланцетные или линейно-ланцетные, 1.5—2.5 см дл. и около 7 мм шир. На речных отмелях, в канавах и у дорог; заносное . . . . . 14. *V. anagalloides* Guss. — В. ложно-ключевая.

#### Род 10. LAGOTIS Gaertn. — ЛАГОТИС

Стебель одиночный, 10—30 см выс.; прикорневых листьев 2—3 (4), прикорневые листья ланцетные или эллиптические, 2—12 см дл., 0.6—3 (9) см шир., длинноочерешковые, стеблевые сидячие; соцветие цилиндрическое или яйцевидное; прицветники голубоватые, перепончато-травянистые; венчик синеватый или беловатый, 8—10 мм дл. На моховых и луговых тундрах на склонах; указывается для верховьев р. Намуты в бассейне р. Зен . . . . . 1. *L. minor* (Willd.) Standl. — Л. малый.

#### Род 11. CASTILLEJA L. f. — КАСТИЛЛЕЯ

Стебли прямые, 20—45 (50) см выс.; листья линейные или линейно-ланцетные, очередные, сидячие, цельнокрайние; цветки в плотном, колозовидном соцветии; венчик двугубый, белый или бледно-желтый, до 3 см дл. На сухих лугах; по Амуру . . . . . 1. *C. pallida* (L.) Kunth — К. бледная.

#### Род 12. MELAMPYRUM L. — МАРЬЯННИК

1. Стебли 20—50 (60) см выс., ветвистые; листья ланцетные или яйцевидно-ланцетные, 4—6 см дл. и 1.2—1.5 (2.5) см шир.; венчик около 1.5 см дл., темно-розовый; прицветники зубчатые. В дубняках на каменистых склонах . . . . . 1. *M. roseum* Maxim. — М. розовый.
- Прицветники шиловидно-зубчатые или длинноцветнисто-зубчатые; венчик розовый. На сухих каменистых склонах . . . . . 2. *M. setaceum* (Maxim.) Nakai — М. щетинистый.

Таблица 163



1 — *Euphrasia maximoviczii* Wettst. (Очанка Максимовича); а — лист; 2 — *Omphalotrix longipes* Maxim. (Омфалотрикс длинноножковая).



Род 13. *PHITHEOSPERMUM* Вге. — *ФЕЙТРОСПЕРМУМ*,  
ВШИВОСЕМЯНИК

Все растение железисто-пушистое; стебли (10)15—50 (80) см выс., листья супротивные, перисто-раздельные или перисто-раздельные; венчик ярко-розовый; верхняя губа короче нижней. В кустарниковых зарослях и в дубяках, иногда у дорог . . . . . 1. *Ph. chinense* Вге. — Ф. китайский.

- Цветки в верхушечных соцветиях . . . . . 4.  
4. Цветки очень крупные; венчик 25—37 (37) см дл., шлем без носика; стебли до 70—80 (80) см выс. . . . . 5.  
— Цветки менее крупные; венчик до 20—25 мм дл.; шлем с носиком . . . . . 6.

Таблица 164

Род 14. *EUPHRASIA* L. — *ОЧАНКА*

1. Стебли 12—40 см выс., одеты курчавыми, оттопыренными многоклеточными железистыми волосками. На лесных лугах; по Амуру . . . . . 3. *E. amurensis* Freyn — О. амурская.  
— Волоски без железок . . . . . 2.  
2. Стебли 12—50 см выс., в верхней части ветвистые; стеблевые листья яйцевидные или широкояйцевидные; цветки мелкие; венчик 6—8 мм дл.; нижняя губа беловатая и лишь немного превышает верхнюю, фиолетовую. На разнотравных лугах, среди кустарников и на лесных опушках . . . . . 1. *E. maximoviczii* Wettst. — О. Максимовича (табл. 163, 1).  
— Стебли 3—15 см выс., простые; стеблевые листья широкояйцевидные до почти округлых; цветки мелкие, венчик 4—6 мм дл. (нижняя губа значительно превышает верхнюю), бледно-пурпурный, с темно-фиолетовыми жилками. На сухих склонах . . . . . 2. *E. ussuriensis* Juz. — О. уссурийская.

Род 15. *OMPHALOTRIX* Maxim. — *ОМФАЛОТРИКС*

Стебли тонкие, прямые, 10—45 см выс., в верхней части ветвистые; листья супротивные, продолговато-ланцетные, городчато-пильчатые, 4—10 мм дл. 1—2 (3) мм шир.; цветки по 1 в пазухах листьев и на концах ветвей; венчик около 5 мм дл., белый. По болотистым лугам; часто и помногу . . . . . 1. *O. longipes* Maxim. — О. длинноножковый (табл. 163, 2).

Род 16. *ODONTITES* Zinn — *ЗУБЧАТКА*


Стебли 10—30 (40) см выс., прижато опушенные; листья почти сидячие, ланцетные, или линейно-ланцетные, с малоаметными зубчиками или почти цельнокрайние; соцветие густое, однобокое, колосовидное; венчик красноватый, или грязно-розовый, 8—10 мм дл., с яркими, оранжево-желтыми тычинками. Запасное; на выгонах; по Амуру и на ст. Кантауэ . . . . . 1. *O. serotina* (Lam.) Dum. — З. поздняя.

Род 17. *RHINANTHUS* L. — *ПОГРЕМОК*

Стебель до 50 см выс., в верхней части ветвистый; прицветники черновато-зеленые; венчик желтый, 12—15 мм дл., со светлым или фиолетовым носиком верхней губы; коробочка округлая; семена с круговым крылом. Запасное; на сыром нейкиково-разнотравном лугу; близ с. Новая Рудня (бассейн Сучана) . . . . . 1. *Rh. minor* L. — П. малый.

Род 18. *PEDICULARIS* L. — *МЫШНИК*

1. Листья в мутовках . . . . . 2.  
— Листья очерченные или супротивные . . . . . 3.  
2. Однолетник; стебель прямой, реже в верхней части ветвистый, 12—60 (70) см выс.; прикорневые листья в розетке, мелкие, курчаво-волосистые, стеблевые в 3—5 мутовках, яйцевато-перисто-раздельные или выемчато-глубоко перистолопастные; соцветие плоское, головчатое; венчик ярко-пурпурный, 12—15 мм дл., шлем без носика; губа трехлопастная, очень широкая. На лугах и среди кустарников . . . . . 2. *P. spicata* Pall. — М. колосовой.  
— Многолетник, стеблей обычно несколько, реже 1, 40—20 (30) см выс.; прикорневые в 1—3 мутовках, нижние иногда супротивные, перисторассеченные, с крупноручечными, сильно хрящевато-окаймленными сегментами. По берегам рек и . . . . . 1. *P. verticillata* L. — М. мутовчатый.  
3 (от 1). Цветки не образуют соцветия, желтые, расположенные в пазухах верхних листьев по 1, на коротких цветоножках; стебли 10—20 см выс., тонкие; прихлещных листьев нет, стеблевые продолговатые перисторассеченные. В хвойных лесах . . . . . 3. *P. kuznetzovii* Kom. — М. Кузнецова.



1 — *Pedicularis resupinata* L. (Мышник перевернутый); 2 — *P. mandshurica* Maxim. (М. маньчжурской); а — верхняя часть стебля с листьями и цветками, б — лист.

5. Листья глубоко перистораздельные на широкие, овальные доли, почти все прикорневые, часто с рассеченными короткими волосками, реже голые; стебель простой, до 70 см выс.; венчик 34—37 мм дл., бледно-желтый. На сырых лугах и по окраинам болот . . . . . 10. *P. scerptum-carolinum* L. — М. Карлов-скитстр.  
— Листья трижды перисторассеченные на линейные доли; стебель ветвистый, до 80—90 см выс., равномерно облиственный; листья и стебель голые; венчик

- до 35 мм дл., пурпурный. На болотах и сырых лугах . . . 14. *P. grandiflora* Fisch. — М. крупноцветковый.
- 6 (от 4). Стебли тонкие, слабо или совсем прямые, с розеткой прикорневых листьев; стеблевые листья очередные, перистораздельные; венчик желтый, 15—17 (20) мм дл.; плод дугообразный, с косо обрубленным носиком. В хвойных и смешанных лесах . . . 6. *P. labradorica* Wirsing — М. лабрадорский.
- Стебли обычно более или менее толстые, реже тонкие, простые, 10—60 (70) см выс.; многолетники . . . 7.
7. Стебли тонкие, около 10 см выс.; корни тонкие, ползучие, укореняющиеся в узлах; прикорневые листья перистораздельные на продолговатые перистолопастные сегменты, стеблевые гребенчато-перистолопастные или гребенчато-перистораздельные; венчик желтый, около 15 мм дл.; соцветие головчатое, малоцветковое (цветков 2—5). На моховых болотах и на гольцах . . . 4. *P. lapponica* L. — М. лапландский.
- Стебли более крепкие, 20—40 (60) см выс.; ползучих корней нет; соцветие не головчатое, обычно с большим числом цветков . . . 8.
8. Стеблевые листья очередные или супротивные; цельные, надразинно-пильчатогородчатые (прикорневых нет); венчик пурпурный, 20—25 мм дл.; плод серповидный, без боковых зубчиков. В лесах на сырых участках; часто . . . 5. *P. resupinata* L. — М. перевернутый (табл. 164, 1).
- Прикорневые листья есть, стеблевые очередные, перистые или перистонадрезанные; цветки желтые . . . 9.
9. Прикорневые листья одиночные или парные, стеблевые многочисленные, перистораздельные; венчик желтый, с пурпурными жилками, 25—32 мм дл.; верхняя и средняя прицветники ланцетные, нижние дельтовидные, трехрассеченные. На сухих открытых лугах и в лесах на склонах; в Амурской области . . . 7. *P. striata* Pall. — М. полосатый.
- Прикорневые листья пучками; венчик светло-желтый или желтый, без пурпурных жилок; прицветники нижние листовидные, средние лопастные и перистораздельные . . . 10.
10. Стебель толстый, 15—40 (60) см выс.; прикорневые листья многочисленные, перистораздельные на перистораздельные или глубоко перистолопастные сегменты; цветоносы на коротких ножках, в рыхлом соцветии; венчик светло-желтый, 25—30 мм дл.; средние прицветники перистораздельные или перистолопастные. В дубяках по морскому побережью; пос. Тетюхе, пос. Ольга . . . 8. *P. mandshurica* Maxim. — М. маньчжурский (табл. 164, 2).
- Стебель более тонкий, 20—30 (40) см выс., прикорневые листья менее многочисленные; перистораздельные на глубоко перистораздельные сегменты; цветки в густом соцветии, почти сидячие; венчик желтый, 20—25 мм дл., средние прицветники трех- или пятилопастные. На лугах; в Амурской области . . . 9. *P. venusta* (Bge.) Schang. ex Bge. — М. милый.

## Род 19. SIPHONOSTEGIA Benth. — СИФОНОСТЕГИЯ


Однолетник или двулетник; стебли прямые, крепкие, 20—50 (70) см выс., густо облиственные; листья трижды-четырежды перистораздельные, 0,7—3 см дл. и 0,3—6 см шир.; цветки в пазухах верхних листьев, в кисти, 3—18 см дл.; венчик грязно-желтый, 20—30 мм дл., с узкой трубкой и коротким шлемом; чашечка ребристая. На сухих лугах и каменистых склонах . . . 1. *S. chinensis* Benth. — С. китайская.

## Сем. 114. BIGNONIACEAE Juss. — БИГНОНИЕВЫЕ

## Род 1. INCARVILLEA Juss. — ИНКАРВИЛЕЯ

Стебли до 1 м выс., гладкие; листья очередные, двоякоперистораздельные; цветки в конечной, редкой, облиственной кисти; чашечка пятигранная; венчик 30—50 мм дл., ярко-пурпурный, трубчато-колокольчатый, со слегка двугубым отгибом; тычинок 4; коробочка стручковообразная; семена с перепончатым крылом . . . 1. *I. sinensis* Lam. — И. китайская.

Здесь дано описание И. китайской, от которой найденное на скалах по р. Суфуну растение (без цветков и плодов) отличается тем, что оно многолетнее, а не двулетнее (В. Л. Комаров и Е. Н. Клобукова - Ади-сова. Определитель растений Дальневосточного края, т. II, 11., 1932, стр. 934). Нужны дополнительные гербарные сборы.



1 — *Trappella sinensis* Oliv. (Трапелла китайская); 2 — *Orobanch amurensis* (G. Beck) Kom. (Заразиха амурская); 3 — *Boschniakia rossica* (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. (Бошнякия русская); 4 — *Phacellanthus tubiflorus* Sieb. et Zucc. (Пучкоцвет трубчатоцветковый).



Род 1. TRAPPELLA Oliv. — ТРАПЕЛЛА

Все растение погружено в воду; стебли тонкие, до 60—70 см дл., листья супротивные, нижние линейно-продолговатые, зубчатые или городчатые, верхние округло-дельтовидные или яйцевидно-сердцевидные, выемчато-городчатозубчатые; цветки одиночные, паузные, 15—25 (27) см дл., белые или бледно-желтые, кроме того, бывают еще и мелкие клейстогамные цветки; плод односемянный, около 25 мм дл. и 5—6 (7) мм шир., на верхушке с 5 длинными, 30—50 (70) мм, тонкими, часто кольцевидно изогнутыми остиями. В старцах и озерах, у оз. Ханка и в окрестностях с. Иковлевки, а также у Хабаровска . . . . . 1. *T. sinensis* Oliv. — Т. китайская (табл. 165, 7).

Таблица 166

Сем. 116. OROBANCHACEAE Vent. — ЗАРАЗИХОВЫЕ

1. Соцветие пиктоидное, почти головчатое; завязь из 3 плодolistиков; чашечки из 2 (очень редко 3) свободных пилонидных боковых листочков, быстро опадающих; все растение белое или чуть желтоватое; растет большими гнездами, стебли частично скрыты в почве . . . . . Род 3. *Phacellanthus* Sieb. et Zucc. — ПУЧКОЦВЕТ.
- Соцветие колосовидное или кистевидное; завязь из 2 плодolistиков, чашечка сростнолистная, с 2—4—5 зубчиками; растения буроватые или желтоватые, реже белые; стебли чаще одиночные или по 2—3 (8), находятся над поверхностью почвы . . . . . 2.
2. Чашечка из 2—5 неравных зубчиков; тычинки сильно выдаются из венчика; стебли толстые, с шиповатым основанием; все растение бурое . . . . . Род 2. *Boschniakia* C. A. Mey. — БОШНЯКИЯ.
- Чашечка двух-трехраздельная; тычинки скрыты в трубке венчика; венчик синий, белый или бледно-желтый . . . . . Род 1. *Orobancha* L. — ЗАРАЗИХА.

Род 1. OROBANCHE L. — ЗАРАЗИХА


1. Цветки белые или бледно-желтые . . . . . 2.
- Цветки синие или фиолетовые . . . . . 3.
2. Цветки бледно-желтые, соцветие цилиндрическое, густое многоцветковое, опушение рыжеватое. На склонах и среди кустарников зарослей на корнях полыней . . . . . 3. *O. rupestrata* Nakai — З. тостоколая.
- Цветки белые, опушение белое, паутинисто-перистое; соцветие овальное, густое. Сухие склоны и разнотравные дуги; на корнях полыней . . . . . 2. *O. korshinskyi* Novopokr. — З. Коржинского.
- 3 (от 1). Все растение с коротким, железистым малозаметным опушением; соцветие рыхлое. На сухих склонах; на корнях полыней . . . . . 4. *O. amurensis* (G. Beck) Kom. — З. амурская (табл. 165, 2).
- Соцветие густое и опушение его паутинисто-перистое, беловаточное. На песках и галечниках рек и морского берега; на корнях полыней . . . . . 1. *O. coerulescens* Steph. — З. синеватая.

Род 2. BOSCHNIAKIA C. A. Mey. — БОШНЯКИЯ

Стебель 15—40 см выс., толстый с очень сильно утолщенным шиповатым основанием; соцветие многоцветковое, в 1,5—2 раза длиннее остальной части стебля; венчик 10—12 мм дл., широкотрубчатый, буроватый, реже красноватый; тычинки сильно выступают из зевы венчика. Паразитирует на корнях ольхи; Амурская область, Советская Гавань и севернее . . . . . 1. *B. rossica* (Cham. et Schlecht.) V. Fedtsch. — Б. русская (табл. 165, 3).

Род 3. PHACELLANTHUS Sieb. et Zucc. — ПУЧКОЦВЕТ

Растение 10—12 (18) см выс., с сильно ветвистым корневищем; обычно растет большими, плотными группами; стебли частично скрыты в почве; соцветие пиктоидное, почти головчатое; цветки с сильным лимонным запахом; венчик трубчатый, белый, 20—30 (35) мм дл., дугообразный. Паразитирует на корнях ясеня маньчжурского, сарани амурской, элутерококка и актинидии коломиксы; на юге Приморья (заповедник «Кедровая паадь», ст. Океанская, ст. Капгауз, р. Судзухе) . . . . . 1. *Ph. tubiflorus* Sieb. et Zucc., *Ph. continentalis* Kom. — П. трубкоцветковый, П. материковый (табл. 165, 4).



*Phryma leptostachya* L. (Фрима тонколистная): а — нижняя часть стебля с корневищем и корнями, б — верхняя часть стебля с листьями и соцветиями, в — часть стебля с листом.

Сем. 117. LENTIBULARIACEAE Rich. — ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

1. Растения болотные, с корнями и с розеткой прикорневых цельных листьев; цветки фиолетовые, одиночные, на верхушке безлиственного цветоноса . . . . . Род 1. *Pinguicula* L. — Жирянка.
- Растения водные, без настоящих корней; листья рассечены на линейные дольки и на них есть пузырьки-ловушки; цветки желтые . . . . . Род 2. *Utricularia* L. — Пузырчатка.

Род 1. *PINGUICULA* L. — ЖИРЯНКА

Листья овальные, тупые, с завернутыми вверх краями; цветонос одиночный (реже их 2—3), 3—10 см выс.; цветок 1, синевато-фиолетовый, с шпильчатым шпорцем; коробочка округлояйцевидная. На моховых болотах и на скалах в местах, где постоянно сочится вода . . . . . 1. *P. villosa* L. — Ж. волосистая.

Род 2. *UTRICULARIA* L. — ПУЗЫРЧАТКА

1. Ловчие пузырьки на особых белых побегах; зеленые листья расположены двурядно и без пузырьков. На болотах и в небольших озерах . . . . . 1. *U. intermedia* Hayne — П. средняя.
- Ловчие пузырьки на зеленых листьях . . . . . 2.
2. Шпорец очень короткий, конический; венчик бледно-желтый, с красно-бурыми полосками, 7—11 мм дл.; стебель слабо ветвистый, до 20 см дл. В небольших озерах и старицах . . . . . 2. *U. minor* L. — П. малая.
- Шпорец длинный; венчик оранжево-желтый, 12—20 мм; стебель ветвистый, до 1 м дл. Озера и старицы . . . . . 3. *U. vulgaris* L. — П. обыкновенная.

Сем. 118. PHRYMACEAE Schauer — ФРИМОВЫЕ

Род 1. *PHRYMA* L. — ФРИМА

Многолетник; стебель прямой, четырехгранный, до 1 м выс., опушенный или почти голый; листья супротивные, крупно пальчатозубчатые, овальные или широкояйцевидные; цветочная кисть конечная, редкая; венчик белый или розоватый, с темными жилками, 5—8 мм дл., двугубый; плод — сухая семянка 4—5 мм дл., четырехгранная. В кедрово-широколиственных и широколиственных лесах . . . . . 1. *Ph. leptostachya* L. — Ф. тонкокистевая (табл. 166).


Сем. 119. PLANTAGINACEAE Juss. — ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

Род 1. *PLANTAGO* L. — ПОДОРОЖНИК

1. Листья ланцетные; соцветие густое, головчатое или цилиндрическое. Заносное; в посевах клевера и у дорог . . . . . 6. *P. lanceolata* L., *P. fontis-curiae* Kom. — П. ланцетолистный.
- Листья эллиптические или яйцевидные . . . . . 2.
2. Растения голые или с редкими волосками . . . . . 3.
- Растения бархатистые или шершаво-пушистые . . . . . 4.
3. Растение голое или с редкими, короткими волосками; листья широкие, яйцевидные или эллиптические, длинночерешковые; соцветие узкое, цилиндрическое; коробочка с (4) 6—30 (34) семенами. Часто; у дорог . . . . . 1. *P. major* L. — П. большой.
- Листья продолговатоэллиптические или яйцевидно-ланцетные, суженные в основании; коробочка с (4) 5 семенами. По сухим склонам и у дорог . . . . . 3. *P. depressa* Willd. — П. прижатый.
- 4 (от 2). Черешок листа в 3—10 раз короче пластины; листья эллиптические или яйцевидные; соцветие густое, цилиндрическое, розовато-белое. Заносное, по дорогам; ст. Кавказ, Амурская область . . . . . 5. *P. indica* L. — П. средний.
- Черешок немного короче пластины или равен ей, листья продолговатоэллиптические, эллиптические или продолговатоэллиптические; соцветие буроватое. По морским берегам . . . . . 4. *P. samschatica* Link — П. камчатский.

В последнее время собран *P. indica* L. — заносное, отличающееся от остальных подорожников облиственным цветоносом и узколинейными листьями.

Таблица 167



1 — *Asperula maximowiczii* Kom. (Именинник Максимовича); 2 — *Galium kamischaticum* Stehlé (Подмаренник камчатский); 3 — *G. dahuricum* Turcz. (П. даурский), часть стебля с листьями и цветками.




1. Плоды сочные, костяковидные; венчик пяти-шестираздельный . . . . . Род 3. *Rubia* L. — Мarena.
- Плоды — сухие орешки; венчик четырех-пятираздельный . . . . . 2.
2. Венчик четырехраздельный, колесовидный, без ясно выраженной трубки; плод двучастный . . . . . Род 2. *Galium* L. — Подмаренник.
- Венчик четырех-пятираздельный, воронковидный или колокольчатый; с ясно выраженной трубкой, превышающей отгиб венчика или равный ему; плод с 2 шаровидными или яйцевидными мерикарпиями (полуплодиками) . . . . . Род 1. *Asperula* L. — Ясменник.

## Род 1. ASPERULA L. — ЯСМЕНИК

1. Листья по 6—10 в мутовке, с нижней стороны с 1 сильно выдающейся жилкой, ланцетные, на вершине внезапно заканчивающиеся острием; соцветие верхушечное, с 3 тройчато разветвленными полузонтиками; плоды с волосками; корни в гербарии не окрашиваются бумагу в красный цвет; цветет в мае—июне. В хвойных и смешанных лесах; небольшими группами; редко . . . . . 1. *A. odorata* L. — Я. душистый.
- Листья по 4—6 в мутовке ланцетные или овальные, тупые, с 3—5 жилками; корни окрашивают бумагу в гербарии в красный цвет; плоды гладкие . . . . . 2.
2. Стеблевые листья ланцетные, при основании с кольцом из коротких, густых волосков; нижние ветви рыхлой метелки пазушные; цветет в июле—августе. В дубяках и кустарниках; в Приморье . . . . . 3. *A. maximowiczii* Kom. — Я. Максимовича (табл. 167, 1).
- Стеблевые листья всегда по 4 в мутовке, яйцевидные, тупые, при основании без кольца из волосков, бледно-зеленые, кожистые; метелка густая, стебли низкие, прямо торчащие; цветет в июле—августе. В дубяках и редких смешанных лесах по склонам . . . . . 2. *A. platygalum* Maxim. — Я. широкий.

## Род 2. GALIUM L. — ПОДМАРЕННИК

1. Соцветие — сложная многоветковая метелка (цветоножки короткие), на вершинах прямостоячих стеблей, выходящие из пазух верхних листьев . . . . . 2.
- Соцветия маловетковые (цветоножки длинные и хорошо заметные), выходящие из пазух листьев в верхней половине лазающих или слабых прямостоячих стеблей . . . . . 3.
2. Листья в мутовках по 4, ланцетные (широкие и узкие), с 3 жилками; цветки белые . . . . . 1. *G. septentrionale* Roem. et Schult., *G. amurense* Pobed. — П. северный.
- Листья в мутовках более 4, линейных, с 1 жилкой, заворачивающихся по краям; цветки желтые или (var. *lactum* Maxim.) кремовые . . . . . 2.
3. Листья в мутовках по 4, ланцетные (широкие и узкие), с 3 жилками; цветки белые . . . . . 3. *G. lactum* L., *G. lactum* Pobed., *G. lactiflorum* Pobed. — П. настоящий.
- Листья в мутовках всегда больше 4 (нижние листья супротивные) . . . . . 4.
4. Листья с 3 жилками, нижние меньше, чем средние и верхние; растение 15—25 см выс. В тенистых местах смешанных и хвойных лесов . . . . . 6.
- Листья с 1 жилкой . . . . . 4. *G. kamtschaticum* Steud. — П. камчатский (табл. 167, 2).
5. Нижние листья супротивные, средние по 4 в мутовке, широколанцетные, 2 более крупные, чем в 2 другие; плоды опушенные; растение 15—20 см выс. В лесах; в Приморском и Хабаровском краях . . . . . 5.
- Листья линейно-ланцетные, на вершине тупые; цветоножки длинные, нитевидные; соцветие пазушное; плоды голые, мелкие; тонокостебельные трава 20—50 см выс. В лесах . . . . . 5. *G. baicalense* Pobed., *G. trifidum* L., p. p. — П. байкальский.
6. Цветоножки по длине равны (или едва превышают) опушенным, сравнительно крупным плодам; полузонтики пазушные, малочисленные; листья заостренные, как и стебли, жесткими шиповниками. Около дорог, по мемам посевов на склонах и в низинах рек . . . . . 2. *G. spurium* L. — П. лосяный.
7. Цветоножки нитевидные, в 2—3 раза превышают по длине плоды или цветки; плоды мелкие, голые. В лесах, на лугах, среди кустарников зарослей . . . . . 6. *G. dahuricum* Turcz. — П. даурский (табл. 167, 3).
- Цветоножки более толстые, соцветие (полузонтик) пазушное или конечное, листья продолговатоланцетные. В тайге . . . . . 1. *G. triflorum* Michx. — П. трехцветный.



1 — *Rubia silvatica* (Maxim.) Nakai (Мarena лесная); а — часть стебля с листьями, б — плод; 2 — *R. jessoensis* (Miq.) Miyabe et Miyake (М. неясная), верхняя часть стебля с листьями и цветками; 3 — *R. chinensis* Rgl. et Maack (М. китайская); а — часть стебля с листьями, б — верхняя часть стебля с цветками.



*G. trifloriforme* Kom. отличается нечеткими признаками — полужонтиками верхушечными или выходящими из пазух верхних листьев и продолговато-обратнояйцевидными листьями.

# Род 3. RUBIA L. — МАРЕНА

- Соцветие в виде метелки, на вершине стебля или в пазухах верхних мутовок; листья яйцевидные или сердцевидные, с 3—5 жилками, всегда с черешком . . . 2.
- Цветосос только в пазухах мутовок; листья ланцетные, с 1 жилкой, плотные, снизу щетинистые, к основанию суженные, сидимые; стебли почти прямые, простые, до 0,5 м выс. На сырых лугах; у моря и у оз. Ханка, на север до устья Амура . . . 4. *R. japonensis* (Miq.) Miyabe et Miyake, *R. grandis* Fr. Schmidt — М. лесная (табл. 168, 2).
- Листья, черешки и стебли волосисто опушены, без сердцевидного основания; соцветие длинное, но редкое. В лесах . . . 3. *R. chinensis* Rgl. et Maack — М. китайская (табл. 168, 3).
- Листья (черешки и стебли) с крючковатыми шипами, в основании выемчатые, сердцевидные . . . 3.
- Листья широко, сердцевидно-овальные, 5—9 см дл., почти равные по длине черешку, с верхней стороны опушены редкими, прижатыми, мелкими волосками, расположенными поперек листовой пластинки. В дубовых и смешанных лесах . . . 1. *R. silvatica* (Maxim.) Nakai, *R. cordifolia* f. *silvatica* Maxim. — М. лесная (табл. 168, 1).
- Листья более мелкие, сердцевидно-ланцетные (ланцетно-треугольные); черешки в 2,5—3 раза превышают листовую пластинку; листовая пластинка кожистая, с верхней стороны обычно голая (редко с волосками), с вдавленной сетью жилок. На лугах, в долинах рек, по скалистым обрывам . . . 2. *R. pratensis* (Maxim.) Nakai, *R. cordifolia* f. *pratensis* Maxim. — М. полевая.


## Сем. 121. CAPRIFOLIACEAE Vent. — ЖИМОЛОСТЕВЫЕ

- Листья перистосложные, со специфическим неприятным запахом . . . Род 1. *Sambucus* L. — Бузина.
- Листья простые, без особого запаха . . . 2.
- Травянистые многолетники; листья сидячие, сростные основаниями; плод сухой, костякостный, с 3 косточками . . . Род 3. *Triosteum* L. — Трехкосточник.
- Растения деревянистые — кустарники, кустарнички или небольшие деревья . . . 3.
- Стебли очень тонкие, ветвистые, лежачие; листья кожистые, вечнозеленые, зубчатые . . . Род 5. *Lilnaea Gronov.* ex L. — Лишай.
- Стебли более толстые, прямостоячие, реже приподнимающиеся; кустарники или небольшие деревья . . . 4.
- Цветки помногу в сложных щитках; плод сочный, костяковидный, с 1 косточкой, красный или черный . . . Род 2. *Viburnum* L. — Калина.
- Цветки чаще парные или в виде мутовок; плод сочный, ягодообразный или сухой (коробочка или односемянный) . . . 5.
- Плод сочный, ягодообразный, цветки по 2, реже по 1; кустарники, изредка небольшие деревья . . . Род 6. *Lonicera* L. — Жимолость.
- Плод сухой, односемянный или многосемянный; сравнительно небольшие кустарники . . . 6.
- Плод односемянный, не раскрывающийся, с крупным отгибом чашечки; венчик трубчатый, 10—15 мм дл., розовато-белый, цветки с сильным запахом; листья частью цельнокрайные, частью зубчатогордчатые (на одном и том же растении) . . . Род 4. *Abelia* R. Br. — Абелия.
- Плод — деревянистая коробочка с многочисленными семенами; венчик колокольчатый, воронковидный, 2,5—4,5 см дл., фиолетово-розовый, желтоватый, изредка белый . . . Род 7. *Weigela* Thunb. — Вейгела, Дьервилла.

В Определителе растений Дальневосточного края В. Л. Комарова и Е. И. Глабуковой-Алисовой и в целом ряде других работ род *Weigela* не был отделен от рода *Dierrella* Moench — Дьервилла.

## Род 1. SAMBUCUS L. — БУЗИНА

- Листья и оси соцветия опушены более или менее длинными, оттопыренными волосками; плод ярко-красный. В лесах по прогалинам и у ручьев и скал . . . 1.
- Листья и оси соцветия голые или с отдельными волосками . . . 2.



1 — *Sambucus sibirica* Nakai (Бузина сибирская); а — лист, б — листочек сложного листа; 2 — *Weigela plicatopinnata* (Carr.) C. Koch (Вейгела Милдендорфа), часть стебля, листья; 3 — *Weigela praecox* (Lemoine) Bailey (В. рання); а — часть стебля с листьями, б — цветки; 4 — *Weigela suavis* (Kom.) Bailey (В. приятная), часть побега с листьями и цветками.



2. Все растение совершенно голое; листья снизу беловатые, лоснящиеся; плод ярко-красный. По открытым лесистым склонам; в западной части Амурской области . . . . . 4. *S. manshurica* Kitag. — Б. маньчжурская.
- Листья голые или по средней жилке с очень коротким пушком; плод темно-пурпурный . . . . . 3.
3. Листья с 5—7 широкими, ромбическо-эллиптическими или широкоэллиптическими, крупнозубчатыми листочками. По долинам рек; на юге Приморья . . . . . 1. *S. latipinna* Nakai — Б. широколисточковая.
- Листья с 3—7 эллиптическими или продолговатоэллиптическими мелкозубчатыми листочками. По долинам рек; на юге Приморья . . . . . 2. *S. coreana* (Nakai) Kom. et Aliss. — Б. корейская.

Род 2. *VIBURNUM* L. — КАЛИНА

1. Листья цельные, овальные или эллиптические, мелкопильчатые; все цветки одинаковые, мелкие, кремовые; плод черный, сладкий, с эллиптической косточкой. На склонах и в долинах горных рек . . . . . 1. *V. burejeticum* Rgl. et Herd. — К. бурейская (табл. 170, 3).
- Листья обычно трехлопастные; краевые цветки бесплодные, крупные, белые; плод красный, горький, с округлой косточкой. В лесах и по долинам рек . . . . . 2. *V. sargentii* Koehne — К. Саргентта.

Род 3. *TRIOSTEUM* L. — ТРЕХКОСТОЧНИК

Корневище крепкое, деревянистое; стебель прямой, до 50—70 см выс. и 4,5—6 мм толщ., опушенный железистыми волосками; листья 10—20 см дл. и 4—10 см шир., супротивные или по 3, яйцевидно-эллиптические, иногда с выемками; цветки в пазухах средних листов; венчик 2,5—2,8 см дл., с грязно-фиолетово-пурпурным отливом; плод костянкообразный, шаровидно-яйцевидный, почти кожистый, около 1 см в диам., с 3 косточками. По лесным опушкам, у скал и россыпей . . . . . 1. *T. sinuatum* Maxim. — Т. выемчатый.

Род 4. *ABELIA* R. Br. — АБЕЛИЯ


Листья овальные или овально-ланцетные, цельнокрайные или неправильно крупно городчато-зубчатые; цветки по 2; трубка венчика с мешковидным выростом. В хвойных и смешанных лесах по морскому берегу; от Хасана до Тервея . . . . . 1. *A. coreana* Nakai — А. корейская (табл. 170, 1).

Род 5. *LINNAEA* Gronov. ex L. — ЛИННЕЯ

Стеклоподобный кустарничек с очень тонкими, деревянистыми ветвями и вечнозелеными листьями; цветки парные, на длинных цветоносах; венчик бледно-розовый, узкоколокольчатый; плод односемянный, пушистый. В хвойных лесах; в массе . . . . . 1. *L. borealis* L. — Л. северная (табл. 170, 2).


Род 6. *LONICERA* L. — ЖИМОЛОСТЬ

1. Листья на концах закругленные или коротко приостренные, эллиптические, яйцевидные или обратнояйцевидные, голые; венчик темно-пурпурный; плоды сростаются доверху, ярко-красные; небольшой, 0,5—1 м выс., ветвистый кустарничек. По лесным опушкам и открытым склонам у моря; от Советской Гавани и севернее . . . . . 6. *L. chamissoi* Bge. — Ж. Шамиссо.
- Листья на концах заостренные, более или менее опушенные (хотя бы по жилкам). 2. Цветоносы очень короткие, 2—2,5 (3) мм дл.; цветки крупные, чисто белые (при отцветании желтеющие); плоды шаровидные, совершенно свободные, темно-крупный куст или небольшое до 5 м выс. и до 20—25 (30) см в диам. дерево. По рекам; часто . . . . . 9. *L. maackii* Rupr. — Ж. Маака (табл. 171, 1).
- Цветоносы более длинные, цветки не белые (розовые, пурпурные, желтые). 3. Листья широкоэллиптические, яйцевидно-эллиптические или удлинненно-эллиптические, более или менее густоопушенные; цветет до распускания листьев, в апреле—мае; прицветники листообразные; плоды крупная, 6—8 мм, красная, созревает в июне . . . . . 4.
- Листья разнотипной формы; прицветники узкие, линейные, или шиловидные; цветет в конце июля, августе и сентябре, или черно-синие, созревают в конце июня—июле . . . . . 5.



1 — *Abelia coreana* Nakai (Абелия корейская), часть стебля с листьями и цветками; 2 — *Linnaea borealis* L. (Линнея северная); 3 — *Viburnum burejeticum* Rgl. et Herd. (Калина бурейская), часть стебля с листьями и плодами.

4. Цветки парные, розовые (при отцветании бледножелтые); листья широкоэллиптические или яйцевидно- или ромбически-эллиптические; опушение из мелких, жестких, прижатых волосков. В лиственных и смешанных лесах; на юге Приморья . . . . . 4. *L. praeflorens* Batai. — Ж. *райкаветуния*.
- Цветки одиночные, желтые; листья яйцевидно-эллиптические, удлинненно-эллиптические или продолговатые; опушение щетинисто-волосистое (из длинных щетинок и коротких волосков). Пока найдена только один раз в окрестностях с. Красино Хасанского района (Флора СССР, т. XXIII) . . . . . 3. *L. subhispidula* Nakai — Ж. *щетинистоволосистая*.
- 5 (от 3). Листья резко заостренные, с оттянутым остроконечием или же длинно заостренные, реснитчатые; цветки темно-красные или фиолетово-пурпурные; ягоды сросшиеся почти до зерушек. В смешанных и хвойных лесах . . . . . 5. *L. maximowiczii* (Rupr.) Rgl. — Ж. *Максимовича* (табл. 171, 2).
- Листья постепенно заостренные, с длинным или коротким остроконечием; цветки бледно-желтые или золотисто-желтые; ягоды черно-синие, продолговатые или красные, круглые (не сросшиеся) . . . . . 6.
6. Прилистники кожистые, часто сохраняющиеся до следующего года; кора старых ветвей продольно шелушащаяся; цветки бледно-желтые; цветет одновременно с распусканием листьев, плод продолговатый, черный, с сильным запахом . . . . . 7.
- Прилистники не кожистые; кора не отслаивается; цветки золотисто-желтые, цветет во вполне облиственном состоянии; плод круглый, красный . . . . . 8.
7. Листья обычно заостренные, сравнительно узкие, снизу по средней жилке всегда опушенные; плод сильно удлинненный. По окраинам болот и в лесах . . . . . 1. *L. edulis* Turcz. — Ж. *съедобная*.
- Листья чаще тупые или коротко заостренные, широкие, голые или рассеянно опушенные, под осень чаще голые; плод широкий, продолговатоэллипсоидальный. В горных лесах и у россыпей . . . . . 2. *L. turczaninowii* Rojark. — Ж. *Турчанникова*.
- 8 (от 6). Зимующие почки крупные, до 10 мм дл.; листья с рассеянным опушением из прямых, жестковатых, прижатых волосков; завязь железистая; цветки желтые, на длинных, 1,3—2,5 см, цветоносах; ягоды красная, мятая, шаровидная. В смешанных и хвойных лесах . . . . . 7. *L. gibbiflora* (Rupr.) Dippel, *L. chrysantha* Turcz., p. p. — Ж. *горбатая*, Ж. *золотистая* (табл. 171, 3).
- Зимующие почки мелкие, 1,3—3 мм дл.; листья снизу бархатистые; завязь гладкая; венчик меняет окраску от желтоватой до ярко-желтой; при отцветании цветоносы более короткие, 1—2 мм дл.; ягоды красная или оранжевая, плотная. По долинам рек и ручьев и на прилегающих склонах . . . . . 8. *L. ruprechtiana* Rgl. — Ж. *Рупрехта* (табл. 171, 4).



## Род 7. WEIGELA Thunb. — ВЕЙГЕЛА, ДИЕРВИЛЛА

1. Цветки желтоватые; листья с реснитчатым краем; семена крылатые. В ельниках и каменистых склонах . . . . . 3. *W. middendorffiana* (Carr.) C. Koch. — В. *Миддендорфа* (табл. 169, 2).
- Цветки красные или фиолетово-розовые, как исключение, белые; семена бескрылые или узкокрылые . . . . . 2.
2. Трубка венчика до середины узкая, выше постепенно воронковидно-расширенная; семена бескрылые; листья эллиптические или продолговатойцевидные. На каменистых склонах, а также по берегам ручьев и в долинах на каменистых участках; на юге Приморья (на север до окрестностей Владивостока) . . . . . 1. *W. praecox* (Lemoine) Bailey, *D. florida* Kom., non Sieb. et Zucc. — В. *ранняя* (табл. 169, 3).
- Трубка венчика узкая, цилиндрическая, резко расширенная вверх; семена узкокрылатые; листья узкие, продолговатые или ланцетные, острые. В горных лесах; по Амуру . . . . . 2. *W. suavis* (Kom.) Bailey — В. *притная* (табл. 169, 4).

## Сем. 122. ADOXACEAE J. Agardh — АДОКСОВЫЕ

## Род 1. ADOXA L. — АДОКСА

Растение многолетнее, голое, с длинночерешковыми дважды тройчатораздельными листьями; цветки мелкие, в головчатом колечном соцветии, зеленоватые; плод зеленый. В хвойных и смешанных лесах . . . . . 1. *A. moschatellina* L. — А. *мускусная*.

1 — *Lonicera maackii* Rupr. (Жимолость Маака); а — плоды; 2 — *L. maximowiczii* (Rupr.) Rgl. (Ж. Максимовича); 3 — *L. gibbiflora* (Rupr.) Dippel (Ж. горбатая); 4 — *L. ruprechtiana* Rgl. (Ж. Рупрехта).



1. Цветки желтые; плод без летучки . . . . . Род 1. *Patrinia* Juss. — Патриния.  
 — Цветки светло-лиловые или розовые; плод с летучкой из перистых щетинок . . . . . Род 2. *Valeriana* L. — Валерьяна.

Род 1. *PATRINIA* Juss. — ПАТРИНИЯ

1. Стебель 10—15 см выс., с 2 продольными рядами волосков и с 1 парой листьев или совсем без листьев; стебленные листья глубоко перисторассеченные, прикорневые цельнокрайные. Голые высокотерпкие . . . . . 1. *P. sibirica* (L.) Juss. — П. сибирская.  
 2. Стебли выше, равномерно опушенные или голые . . . . . 2.  
 2. Стебли 60—150 см выс.; прикорневые листья зубчатые; плод без крыльев. Сухие склоны, дубяки . . . . . 2. *P. scabiosifolia* Fisch. ex Link. *P. hispida* Bge. — П. скабиозолистная.  
 — Стебли 30—40 см выс.; прикорневые листья перистонадрезанные; плод с крылом. Скалы, щепистые склоны . . . . . 3. *P. rupestris* (Pall.) DuRoi. — П. скальная.

Род 2. *VALERIANA* L. — ВАЛЕРЬЯНА

1. Стебель вверх и веточки соцветия густо покрыты железистыми волосками; листья ланцетные, с крупной колючей долей; корневище без столонов; высота растения 50—80 см. Болота . . . . . 1. *V. amurensis* Smirn. ex Kom. — В. амурская.  
 — Железистое опушение отсутствует; листья не ланцетные . . . . . 2.  
 2. Плоды голые . . . . . 3.  
 2. Плоды опушенные . . . . . 4.  
 3. Растение со столонами; стебли 40—60 см выс., с 2—4 узлами; стебленные листья с 2—4 парами листочков. Леса . . . . . 2. *V. coelestis* Brid., *V. fauriei* Briq., *V. chinensis* Kreyer, non L. — В. корейская.  
 — Растение без столонов; стебли 60—90 см выс., с 4—6 узлами; стебленные листья с 5—7 парами более узких, чем у предыдущего вида, листочков. Леса, берега ручьев . . . . . 3. *V. transjensis* Kreyer, *V. pseudoumbrosa* Worosch. — В. заицисейская.  
 4 (от 2). Растение без столонов; листья снизу опушенные, с 6—9 парами ланцетных или узколанцетных листочков; высота растения 60—90 см. Сухие луга и склоны . . . . . 4. *V. alternifolia* Lab. — В. очерлохветная.  
 — Растение со столонами; листья снизу голые или слабо опушенные, с 5—6 парами ланцетных листочков, высота растения 30—60 см. Болота; в Приханкайской низменности . . . . . 5. *V. stubendorffii* Kreyer ex Kom. — В. Штубендорфа.

## Сем. 124. DIPSACACEAE Juss. — ВОРСЯНКОВЫЕ

1. Цветоложе с кроющими чешуями, каждый цветок в пазухе чешуи; оберточка с 8 ребрами, венчик пятилопастный . . . . . Род 2. *Scabiosa* L. — Скабиоза.  
 — Цветоложе покрыто щетинками, без прицветных чешуй; оберточка с 4 ребрами . . . . . Род 1. *Knaulia* L. — Короставник.

Род 1. *KNAULIA* L. — КОРОСТАВНИК


Листья ланцетные, ланцетные, перистонадрезанные, реже цельные; головки 2—3 см дл., венчик синева-лиловый. Заносное; по дорогам; ст. Кантау и др. . . . . 1. *K. argensis* (L.) Coult. — К. полевой.

Род 2. *SCABIOSA* L. — СКАБИОЗА

Стебли прямые, снизу оттопыренно-щетинистые и курчавоволосистые; прикорневые листья длинночерешковые, ланцетно-перистые или почти цельные, стеблевые — сидячие, ланцетно-черешковые; головки на длинных цветоносах; венчик сине-фиолетовый. На сухих лугах и по морскому берегу . . . . . 1. *S. lachnophylla* Kitag. — С. шерстистая.

## Сем. 125. CUCURBITACEAE Juss. — ТЫКВЕННЫЕ

1. Растения многолетние, двулетние; венчик желтый; листья широкие, ланцетно-сердцевидные, мелкозубчатые, густо-мелкозубчатые; плод круглый, 4—5 см дл., красный, волосатый; усики простые . . . . . Род 2. *Thladiantha* Bge. — Тыква.



1 — *Thladiantha dubia* Bge. (Тыква сомнительная): а — часть стебля с листьями и усиком, б — плод; 2 — *Schizoperon bryoniifolius* Maxim. (Схизоперон стом и усиком), б — плод; 3 — *Actinostemma lobatum* Maxim. (Актиностемма лопастная): а — часть побега с листьями и усиком, б — плод.

- Растения однолетние, однодомные; цветки белые; листья трех-семиплостные или трех-семиугольные, голые или рассеяно волосистые; усики дву-четырёхраздельные . . . . . 2.
2. Листья очень тонкие, трех-семиугольные, иногда почти лопастные, сердцевидно-остроконечные; усики спирально закрученные; плод мелкий, на висках, толстоостроконечный; усики спирально закрученные; . . . . . Род 3. *Schizopeton* Maxim. — Эхинопетон, или жонка . . . . . 3.
3. Листья более плотные, трех-семиплостные; усики более прямые или ветвистые . . . . . Род 4. *Echinocystis* Torr. et Gray — Эхиноцистис.
- Листья обычно пятилопастные, до раздельных; тычиночные цветки одиночные или в немногочисленных кистях; усики двураздельные; плоды 1.5—2 см дл., с мякоти, позднее опадающими шишками в нижней части . . . . . Род 1. *Actinostemma* Griff. — Актиностемма.

Род 1. *ACTINOSTEMMA* Griff. — АКТИНОСТЕММА

Стебли до 1 м выс.; корни многочисленные, мочковатые. По берегам водоемов, часто прямо в воде . . . 1. *A. lobatum* Maxim. — А. лопастная (табл. 172, 3).

Род 2. *THLADIANTHA* Bge. — ТЛАДИАНТА

Корни клубневидно утолщенные; стебли 0.5—1.5 м выс.; усики простые. В поймах рек и по огородам; г. Сучан, с. Красино, пос. Мраморный . . . . . 1. *Th. dubia* Bge. — Т. сомнительная (табл. 172, 1).

Род 3. *SCHIZOPETON* Maxim. — СХИЗОПЕТОН

Стебли до 2—3 м дл.; усики двураздельные; плоды зеленые, чаще голые, бугорчато-морщинистые, 10—15 мм дл., с 3 семенами. В лесах и кустарниковых зарослях по рекам . . . . . 1. *Sch. bryoniifolius* Maxim. — С. переступенчатый (табл. 172, 2).

Род 4. *ECHINOCYSTIS* Torr. et Gray. — ЭХИНОЦИСТИС

Стебли 3—4 (6) м выс., угловато-бороздчатые; усики трех-четырёхраздельные; плод двухгнездный; семена крупные, до 15—17 мм, черно-коричневые. Заносное; в окрестностях Владивостока и часто как декоративные в садах . . . . . 1. *E. echinata* (Muell.) Vass. — Э. шиповатый.

Сем. 126. *CAMPANULACEAE* Juss. — КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

1. Венчик разделен почти до основания на свободные доли; цветки меньше 5 мм в diam.; коробочка открывается маделками порами выше ее середины . . . . . Род 3. *Azorella* Griseb. et Schenk — Азореума.
- Венчик никогда не бывает надразен более чем наполовину; цветки крупные 5 мм в diam.; коробочка открывается створками или порами с верхушки или у основания или же общим верхушечным отверстием . . . . . 2.
2. Стебли вьющиеся; венчик желтоватый, сизовато-зеленый, грязно-пурпурный или темно-фиолетовый . . . . . Род 4. *Codonopsis* Wall. — Кодонopsis.
- Стебли не бывают вьющимися; венчик различных оттенков синего или голубого цвета, реже белый или (*Campanula punctata* Lam.) грязновато-белый с пурпурными точками . . . . . 3.
3. Листья с сизым налетом (особенно снизу); венчик широковоронковидный, почти колошвидный, 4—5 см в diam.; нити тычинок при основании волосистые; коробочка открывается 1 общим верхушечным отверстием . . . . . Род 5. *Platycodon* A. DC. — Ширококолокольчик.
- Листья без сизого налета; цветки не более 3 см в diam.; венчик колокольчатый, бокаловидный или ширококолокольчатый (не бывает широковоронковидным); нити тычинок при основании голые; коробочка открывается несколькими порами или створками, расположенными в ее нижней или верхней части . . . . . 4.
4. Корни редкочленные, мясистые, толстые (более 1 см в diam.); основание столбика окружено кольцеобразным или трубковидным диском (нектаром); цветоносные бутоны булавовидной формы; цветки всегда многочисленные (более 10), на длинных цветоножках, в кистевидном или метельчатом соцветии . . . . . Род 2. *Adenophora* Fisch. — Бубенчик.



1 — *Campanula punctata* Lam. (Колокольчик точечный); а — верхняя часть стебля с листьями и цветками, б — цветок с удаленными лепестками; 2 — *C. cephalotes* Nakai (К. головчатый); а — лист.



- Корни не бывают релюковидными, тонкие (толщина 0,5 см в диам.); диск при основании столбика не развит; цветочные бутоны не имеют булавовидной формы, цветки в числе 1—3, в распахнутых метелках, если же цветки многочисленные (*Campanula cerphalotes* Nakai), то они сидят на очень коротких цветоножках в пазухах листьев . . . . . Род 1. *Campanula* L. — Колокольчик.


Таблица 174

Род 1. *CAMPANULA* L. — КОЛОКОЛЬЧИК

1. Венчик 4—6 см дл., колокольчатый, грязновато-белый, с пурпурными точками, внутри бороздчатый; выемка между зубцами чашечки имеет яйцевидные острые придатки. Приморье и Приамурье; в долиньных лесах, дубняках и нелюстных смешанных лесах . . . . . 1. *C. punctata* Lam. — К. точечный (табл. 173, 1).
- Венчик не длиннее 1—3,5 см, колокольчатый, без крапчатости, окрашенный в синий или фиолетовые тона; чашечка не имеет хорошо развитых придатков . . . . . 2.
2. Стебель выше 70 см, как и листья, почти всегда шероховатый или бархатистый от густых, коротких волосков; прикорневые листья яйцевидно-сердцевидные, на черешках, превышающих их длину; цветки многочисленные (более 10), почти сидячие, не поникающие, собранные немногочисленными пучками; венчики фиолетовые. Весьма обильно в Приморье и Приамурье; на лугах, лесных полянах, опушках, среди мелколесья и зарослей кустарников . . . . . 2. *C. cerphalotes* Nakai — К. голубчатый (табл. 173, 2).
- Стебель 10—40 см выше, как и листья, толстый или слегка волосистый; прикорневые листья не бывают яйцевидно-сердцевидными, их черешки короче пластины листа или равны ей; цветки поникающие, одиночные или немногочисленные (2—5) на длинных (1—6 см) цветоножках, в кистях; венчики синие или голубые . . . . . 3.
3. Корень веретеновидный; стебель прямой, крепкий, при основании с остатками отмерших листьев; прикорневые листья от эллиптических до почти линейных; венчики до 3—4 см дл., синие; доли его по краям слегка ресничатые. На голых скалах, в Амурской области . . . . . 4. *C. turgidiorum* Fed. — К. Турчанникова.
- Корни нитевидные, сидячие, на тонком, ветвистом стебле сидят корневые; стебли тонкие (иногда почти нитевидные), не имеющие при основании остатков отмерших черешков листьев; прикорневые листья сердцевидные или не развиты; венчики 1—2 см дл., голубой, доли его не имеют ресничек. Голые и скалы лесного пояса; Приморье . . . . . 3. *C. lingsdorffiana* Fisch. ex Trautv. et Mey. — К. Лангдорфа.

Род 2. *ADEPHOPHORA* Fisch. — БУБЕНЧИК

1. Большая часть стеблевых листьев расположена в мутовках . . . . . 2.
- Все листья очередные . . . . . 3.
2. Почти все веточки соцветия расположены мутовчато, более чем по 5 веточек в мутовке; венчики бледно-голубые (1—1,5 см дл.); столбик вполне развитых цветков очень сильно выставляется из трубки венчика. Широко распространен по всему Приморью и Приамурью; широколиственные и смешанные леса, заросли кустарников . . . . . 4. *A. tetraphylla* (Thunb.) Fisch., *A. verticillata* Fisch. — Б. четырехлиственный (табл. 174, 1).
- Соцветие метельчатое, с очередным расположением веточек; венчики более крупные (1,5—2 см дл.); столбик лишь немного выставляется из трубки венчика или вовсе не выставляется. Приморье и Приамурье; на лесных полянах и опушках, среди зарослей кустарников . . . . . 5. *A. pereskifolia* (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don, *A. latifolia* Fisch. — Б. широколиственный.
- 3 (от 1). Почти все стеблевые листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, с длинными (1—5 см) черешками и оттянутой в длинное остроконечие верхушкой; цветки 2—3 см дл.; столбик не выставляется из трубки венчика. Юго-западные районы Приморья; в тенистых смешанных лесах, на богатых гумусом почвах . . . . . 3. *A. trachelioides* Maxim., *A. remotiflora* Zucc., по Miq. — Б. брахеллиевидный (табл. 174, 2).
- Стеблевые листья эллиптически, ланцетные или линейные, с невыраженными или очень короткими (менее 0,5 см дл.) черешками; пластинка листьев не имеет длину оттянутой в остроконечие верхушки; цветки 1—2 см дл. . . . . 4.
4. Листья очень многочисленные, местами расположены на стебле настолько густо, что кажутся супротивными; все листья или хотя бы нижние и верхние стеблевые линейные, цельнокрайные. Остепненные участки по Амуру, реже по Суйфуну (гора Сопхика Нанка и др.); по скалам, каменистым осыпям, прибрежным галечникам и пескам . . . . . 6. *A. stenanthina* (Ldb.) Kitag., *A. marsipiflora* Fisch. — Б. узкоцветный.



1 — *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch. (Бубенчик четырехлиственный); 2 — *A. trachelioides* Fisch. (Б. брахеллиевидный); а — часть стебля с мутовкой листьев; б — лист.



- Листья никогда не растут супротивными (так как располагаются на расстоянии 1—3 см друг от друга); линейно-ланцетные, продолговатые или эллиптические, всегда ясно зубчатые или пильчатые . . . . . 5.
5. Стеблевые листья линейно-ланцетные; диск узкогубчатый; столбик равен по длине венчику или короче его. Примамуре и некоторые районы Приморья (бассейн р. Спутуньки, п-ов Муравьева Амурского и др.); среди редколесья и зарослей кустарников . . . . . 1. *A. tricuspidata* Kusturikov

- Стеблевые листья широколанцетные, продолговатые или эллиптические; диск короткоцилиндрический . . . . . 6.
6. Стебли не выше 50—70 см; листья ланцетные, продолговатые или эллиптические; соцветие метельчатое; зубцы чашечки всегда недоразвитые, в 1,5—2 раза длиннее ее трубки; столбик не выставляется из трубки венчика. Рассеянно встречается в западной части Примамуре; дубовые и смешанные леса, дуга и заросли кустарников (Fisch. ex Boem. et Schult.) A. DC. *A. denticulata* Fisch. — *B. trexichneum* Fisch. — *B. tricuspidata* Kusturikov
- Стебли выше 70 см; листья широколанцетные или эллиптические, к основанию и на верхушке клиновидно оттянутые; соцветие — простая или слабо ветвистая кисть; зубцы чашечки всегда цельнокрайние, равны трубке или чуть длиннее ее; столбик у развитых цветков сильно выставляется из трубки венчика. Приморье и Примамуре; дубяники, березники, поляны и опушки смешанных и хвойных лесов . . . . . 2. *A. subulata* Kom. — *B. широковетвистый*.

Весьма полиморфный вид, который при дальнейшем изучении, по-видимому, будет расчленен на ряд самостоятельных форм. Некоторые виды рода *Adenophora* связаны друг с другом серией промежуточных форм, имеющих, по-видимому, гибридное происхождение.

#### Род 3. *ASYNEUMA* Griseb. et Schenk — АЗИНЕУМА

Должные леса и заросли кустарников, лесные опушки и поляны; Приморье и Примамуре . . . . . 1. *A. japonicum* (Miq.) Brq. — *A. японская*.

#### Род 4. *CODONOPSIS* Wall. — КОДОНОПСИС

1. Листья супротивные, яйцевидные; цветки желтоватые, с фиолетовым оттенком и темными крапинками; лопастей венчика не отогнутые (прямо торчат). Только на самом юго-западе Приморского края; по лесным опушкам, полянам и среди густых зарослей кустарников . . . . . 1. *C. pilosula* (Franch.) Nannfeldt, *C. silvestris* Kom. — *K. мелковолосяный*.
- Листья расположенные пучками по 3—5 на концах пазушных веточек (пучки эти напоминают пальчатосложные листья), реже листья одиночные; цветки сизовато-зеленые, желтоватые (с пурпурным краем, крапинками и пятнами), темновато-фиолетовые или грязно-пурпурные; лопастей венчика отогнутые . . . . . 2.
2. Корень длинный, редковидный; венчик сизовато-зеленый или желтый, с пурпурным краем, крапинками и пятнами; коробочка обратноконическая; семена крылатые, тусклые. Часто в равнинных и низкотерных районах Приморья, реже в Амурской области; на опушках, полянах, среди зарослей поляны и кустарников . . . . . 2. *C. lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. — *K. ланцетный*.
- Корень грушевидный или почти шаровидный; венчик темно-фиолетовый или грязно-пурпурный (с темными полосками и пятнами внутри); коробочка коническая; семена бескрылые, блестящие. Приморье и Примамуре; на дугах и в долинах зарослей кустарников . . . . . 3. *C. ussuriensis* (Rupr. et Maxim.) Hemsl. — *K. уссурийский*.

#### Род 5. *PLATYCODON* A. DC. — ШИРОКОКОЛОЛЬЧИК

Равнинные и низкотерные районы Приморья и Примамуре. В дубяниках, среди зарослей липы, разнотравья и на каменистых склонах . . . . . 1. *P. grandiflorus* (Jacq.) A. DC. — *Ш. крупноцветковый*.

#### Сем. 127. *LOBELIACEAE* R. Br. — ЛОБЕЛИЙНЫЕ

##### Род 1. *LOBELIA* L. — ЛОБЕЛИЯ

Стебель (30) 50—70 (90) см выс., густооблиственный; листья острозубчатые, продолговатые или ланцетные; венчик резко неправильный (почти двугубый),

темно-синий, коробочка раскрывается 2 створками, почти шаровидная. Часто; на болотах и сырых дугах, иногда по канавкам и как сорное на рисовых полях . . . . . 1. *L. scssiliflora* Lamb. — *Л. сцилестная*.

#### Сем. 128. *COMPOSITAE* P. F. Gmelin — СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ

1. Листья супротивные или частью мутовчатые . . . . . 2.
- Листья очередные или все в прикорневой розетке . . . . . 8.
2. Листья частью мутовчатые, частью супротивные; корзинки мелкие, собранные в густой щиток; цветки розовые . . . . . Род 1. *Eupatorium* L. — *Поскольник*.
- Листья супротивные; цветки желтые, белые или красноватые . . . . . 3.
3. Однолетники с небольшими корзинками; все цветки в корзинке трубчатые или краевые короткоязычковые . . . . . 4.
- Многолетники с крупными корзинками и большими краевыми светложелтыми язычковыми цветками . . . . . Род 38. *Arnica* L. — *Арника*.
4. Краевые цветки язычковые, белые . . . . . Род 24. *Galinsoga* Ruiz et Pav. — *Галинсого*.
- Все цветки в корзинке желтые, зеленые или красные, по не белые . . . . . 5.
5. Семянки с хохолком . . . . . Род 24. *Galinsoga* Ruiz et Pav. — *Галинсого*.
- Семянки без хохолка или иногда с редуцированным хохолком в виде зубчиков (от 4). Все цветки в корзинке трубчатые, зеленые или красноватые; корзинки 2—4 мм в diam., одиночные, расположенные на верхушках стеблей и в пазухах листьев, почти сидячие; листья парные, короткошершавые, цельнокрайние или с 2—4 зубчиками в верхней части . Род 34. *Centipedia* Lour. — *Стоножник*.
- Все цветки в корзинке желтые, семянки цепкие, с остями или липкие, с клейкими железками . . . . . 7.
7. Листья ланцетнопродолговатые, зубчатые или перистонадрезанные, голые или с черными железками; все цветки в корзинке трубчатые, реже краевые короткоязычковые; семянки с 2 или 4 короткими остями, покрытыми загнутыми выносками (сильно цепляются к одежде) . . . . . Род 23. *Bidens* L. — *Чердак*.
- Листья крупные, deltoidные, яйцевидно-треугольные или продолговатые; видные; все растение с железистым опушением, особенно корзинки (очень липкие), или же почти голые; краевые цветки короткоязычковые; семянки без хохолка . . . . . Род 21. *Siegesbeckia* L. — *Сигезбекия*.
- 8 (от 1). Пыльничковые цветки многочисленные, в полшаровидных верхушечных корзинках, пестичные по 2 в особой корзинке, обертка которой мешковидно сросшаяся и покрыта снаружи крючочковыми липкими (очень цепляются за одежду); у 1 вида при основании листьев есть крупные трехраздельные колючки . . . . . Род 20. *Xanthium* L. — *Дурнишник*.
- Пыльничковые и пестичные цветки в общих корзинках или же растущие одиночно, обертка мешковидно не срастаются . . . . . 9.
9. Все листья в прикорневой розетке; цветные безлистные, или стебли с чешуйчатыми листьями, или с изредканными зелеными листьями, но вскоре после цветения стелющимися, или стебли сохраняются до конца вегетации, но почти без облиственности . . . . . 10.
- Стебли более или менее облиственные и сохраняются до конца вегетации; прикорневые листья после цветения отмирают (задолго до полного развития прикорневых листьев); прикорневые листья очень крупные, пальчатонадрезанные или ланцетные . . . . . 11.
10. Стебли вскоре после цветения отмирают (задолго до полного развития прикорневых листьев); прикорневые листья очень крупные, сердцевидно-яйцевидные или сердцевидно-округлые, снизу беловатые или опушенные только по жилкам . . . . . 11.
- Признаки иные; стебли нет вовсе или они сохраняются продолжительное время . . . . . 12.
11. Корзинка 1, на верхушке стебля; цветки желтые; прикорневые листья сизовато-округлые или серовидные, от сердцевидно-яйцевидных до почти сердцевидно-округлых, с 3 крупными зубцами, почти лопастями, с каждой стороны . . . . . Род 36. *Tussilago* L. — *Мать-и-мачеха*.
- Корзинки много, в густой коневой или в небольшой щиткообразной кисти; цветки светложелтые или бесцветные; листья очень крупные, пальчатонадрезанные или небольшие, перисто-зубчатые, почковидные или сердцевидные . . . . . Род 37. *Nardostemum* Cass. — *Нардостем*, *Белокопытник*.
- 12 (от 10). Мясистого сока нет; листья ланцетные или линейные; цветки желтые; на длинном цветоносе с чешуйчатыми листьями . . . . . Род 53. *Leibnitzia* Cass. — *Лейбница*.
- Растения с млечным соком; под осень появляются клейстогамные цветки; цветки белые; цветоносы длинные; листья желтые или бледно-желтые (у 1 вида белые) . . . . . 13.
- Растения с млечным соком; под осень появляются клейстогамные цветки; цветоносы длинные; листья желтые или бледно-желтые (у 1 вида белые) . . . . . 13.
13. Стеблей нет; цветоносы внутри полый (дугчатый); корзинки крупные, одиночные; летучки с простыми волосками . . . . . Род 59. *Taraxacum* Wigg. — *Одуванчик*.



- Стебли есть . . . . . 14.
14. Стебель безлистный или с 1 линейным листом; листья вечнозеленые; все растение опушено черными волосками . . . . . Род 63. *Crepis* L. — Скерда (см. также ступень 27).
- Стебли иногда вильчато разветвленные, с почти чешуйчатыми листьями и 1 корзинкой на каждой ветви; летучки с перистыми волосками; черных волосков нет . . . . . Род 57. *Leonodon* L. — Кузубаба.
- 15 (от 9). Стебель чаще с 1 конечной шаровидной головкой, состоящей из многих одноцветковых корзинок; цветки и чешуя обертки синие; все растение сильно колючее; листья глубоко перистонадрезанные, снизу бесволосые . . . . . Род 43. *Echinops* L. — Мордовник.
- Признаки иные; корзинки многоцветковые . . . . . 16.
16. Стебель с 1 корзинкой . . . . . 17.
- Корзинок несколько . . . . . 19.
17. Млечного сока нет; цветки фиолетово-пурпурные; корзинки крупные; листочки обертки широкие, с большими сухими придатками; листья ланцетные, перистораздельные или перисторассеченные . . . . . Род 51. *Rhaponticum* Adams. — Ропотник.
- Растения с млечным соком; цветки желтые или ярко-оранжевые; листья цельные . . . . . 18.
18. Листья широкие, зубчатые, стебельмелкопильчатые; цветки ярко-оранжевые; корзинки широкие; обертка с жесткими по краям реснитчатыми листьями . . . . . Род 55. *Achyrotophus* Scop. — Просяник.
- Листья узкие, почти все в прикорневой розетке (стеблевых всего 1—3, мелких); цветки желтые; корзинки узкие . . . . . Род 58. *Scorzonera* L. — Косенек (см. также ступень 23).
- 19 (от 16). Растения с млечным соком; все цветки в корзинке язычковые; язычки на верхушке пятизубчатые . . . . . 20.
- Млечного сока нет; все цветки в корзинке трубчатые, двугубые или краевые цветки язычковые . . . . . 28.
20. Цветки синие или сине-голубые; соцветия щитковидные или корзинки в небольших пучках в пазах верхних, сильно уменьшенных листьев . . . . . 21.
- Цветки желтые, реже иной окраски, но не синие и не голубые . . . . . 22.
21. Цветки сплюснутые, корзинки мелкие, в небольших пучках в пазах верхних, сильно уменьшенных листьев . . . . . Род 54. *Glebium* L. — Цикорий.
- Цветки синие, корзинки более крупные, в щитковидной метелке, все растение голое . . . . . Род 60. *Mulgedium* L. — Мокляк.
- 22 (от 20). Стебли и листья с жесткими, частично якоревидными волосками (легко пристаю к одежде); цветки ярко-желтые . . . . . Род 56. *Picris* L. — Горчак.
- Растения голые или более или менее опушенные, но без якоревидных волосков (к одежде не пристаю) . . . . . 23.
23. Листья линейные, до 4 см дл. и 0,8—1,2 см шир.; корзинки до 4 см дл., узкие, немногочисленные; цветки желтые или светло-желтые (иногда белозелые); семени выгнуты в длинный носик, вместе с которым достигают 1,5—2,5 см дл. . . . . Род 58. *Scorzonera* L. — Косенек (см. также ступень 18).
- Признаки иные; семени 3—5 мм дл. . . . . 24.
24. Семени плоские, сжатые или сплюснутые, с носиком или без носика . . . . . 25.
- Семени не сплюснутые, цилиндрические или продолговатые, без носика, реже выгнуты в носик . . . . . 26.
25. Семени без носика, овальные; хохолок мягкий, белый; цветки желтые или светло-желтые; корзинки около 1 см дл.; растения сочные, с обильно выделяющимся при поранении млечным соком . . . . . Род 61. *Sonchus* L. — Осот.
- Семени с носиком то очень коротким, то почти равным по длине самой семени, у ряда видов семени черные, хохолок небольшой, простой, белый или грязно-белый; цветки желтые, бледно-желтые или палевые, иногда почти белые; корзинки более мелкие . . . . . Род 62. *Lactuca* L. — Латук.
- 26 (от 24). Листья сердцевидно-копьевидные или ромбовидно-овальные, длиннее, чем широкие или же ланцетно-перистые; цветки палевые или желтые; семени гладкие; стебли до 1,5—1,7 м выс. . . . . Род 64. *Prenanthes* L. — Косогорник, Пренантес.
- Листья иные . . . . . 27.
27. Семени веретенообразные или же с тонким носиком; листья ланцетно-линейные, зубчатые или перисторассеченные и тогда в основном прикорневые . . . . . Род 63. *Crepis* L. — Скерда (см. также ступень 14).
- Семени цилиндрические, без носика, черные; листья цельнокрайные, растертую зубчатые или же вечнозеленые; у наших видов прикорневых листьев нет . . . . . Род 65. *Hieracium* L. — Ястребинка.
- 28 (от 19). Листочки обертки заканчиваются крючковидным острием; при созревании семян корзинки легко прицепляются к животным и к одежде человека; листья очень крупные, широкие, яйцевидные, толстые или снизу серые, паути-

- нисто-войлочные . . . . . Род 45. *Aretium* L. — Лопух.
29. Листочки обертки зеленые, листобразные, перисторассеченные, с ланцетными или ланцетными долями и значительно превышают цветки; венчики белые или иногда бледно-фиолетовые или чуть розоватые; листья ланцетные, колючие, цельные, тройчатые или перистораздельные, со щетинисто-пильчатым краем . . . . . Род 44. *Atactylodes* DC. — Атрактилодес.
- Признаки иные . . . . . 30.
30. Листья и корзинки колючие или колючие только листья или только корзинки . . . . . 31.
- Листья и корзинки не колючие . . . . . 32.
31. Стебли крылатые, сильно колючие . . . . . Род 47. *Carduus* L. — Чертолох.
- Стебли не крылатые . . . . . 33.
32. Листочки обертки трехгранно-ланцетные, очень острые, колючие, отогнутые; корзинки до 4 см в diam.; цветки темно-фиолетовые; хохолок простой; все листья длинночерешковые, зубчатые, надрезано лопастные или вечнозелатые, снизу паутинисто-войлочные . . . . . Род 50. *Synurus* Iljin — Сrostохвостник.
- Листочки обертки иные, цветки розовые, розовато-пурпурные, пурпурные, фиолетово-пурпурные или белые; волоски летучки перистые; стеблемы листья короткочерешковые, сидячие или стебельмелкопильчатые . . . . . 33 (от 30).
- Листья иные . . . . . Род 48. *Girsium* Mill. — Бодяк.
33. Листовая пластинка округлая, до основания пальчатораздельная на 7—9 долей, каждая из которых тоже разделена на несколько долей . . . . . Род 40. *Synylesis* Maxim. — Синеялекс.
- Листья иные . . . . . 34.
34. Листья ланцетно-линейные, перисторассеченные с почти интенидными концевыми долями; стебли слабо облиственные; корзинки в простом или в пазуховидном соцветии; цветки диска склеены смолистыми выделениями и в пазуховидном соцветии, они обычно стерильные . . . . . Род 32. *Filifolium* Kitam. — Интелетник.
- Признаки иные . . . . . 35.
35. Листья цельные, цельнокрайные, пильчатые, зубчатые или городчатые . . . . . 36.
- Листья перистонадрезанные, перисторассеченные или лопастные . . . . . 70.
36. Корзинки скучены на верхушке стебля и головчатые соцветия и окружающие длинными, звездчатообразно расположенными прицветными листьями; растения без или сорококопчатые . . . . . Род 13. *Leontopodium* B. Br. — Эдельвейс.
- Признаки иные; звездчатообразно расположенных прицветных листьев нет . . . . . 37.
37. Листья цельнокрайные, слабо и малоаметно зубчатые или с 1—3 зубцами . . . . . 38.
- Листья явно зубчатые, пильчатые или городчатые . . . . . 35.
38. Цветки желтые . . . . . 39.
- Цветки иной окраски, белые, зеленоватые, розовые и др. . . . . 43.
39. Листочки обертки немногочисленные, одиорядные . . . . . Род 41. *Senecio* L. — Крестовник (см. также ступени 43, 58, 71).
- Листочки обертки двурядные или многорядные . . . . . 40.
40. Обертка двурядная, небольшие одиорядные . . . . . 41.
- Обертка многорядная . . . . . 42.
41. Стебли прямые, сверху коротко вильчато разветвленные; листья ланцетные, верхние линейные; корзинки сидячие, скучены по 2—4 в развилках стебля и его ветвей; цветки светло-желтые; семени 0,5—1 мм дл., с остатками венчика и редкими железистыми волосками . . . . . Род 11. *Symphylotrupis* Maxim. — Симфилотрупис.
- Стебли лежачие, распростертые или приподнимающиеся; корзинки одиночные, на верхушках стеблей или в пазухах листьев, почти сидячие; цветки зеленоватые или красноватые; семени без остатков венчика, около 1 мм дл., с мелким железистым опушением и с редкими, загнутыми на верхушке волосками . . . . . Род 34. *Centipeda* Loug. — Стоножка (см. также ступень 6).
- 42 (от 40). Краевые цветки язычковые, язычки длиннее центов . . . . . 43.
- Одиорядный из немногих неравных центов . . . . . Род 16. *Inula* L. — Девясил (см. также ступень 60).
- Краевые цветки с узкими или даже интенидными язычками; язычки почти не превышают обертку; все растение пушисто-войлочно-волосистое или перистое, мохнатое . . . . . Род 17. *Pulicaria* Gaertn. — Вьюнница.
- 43 (от 38). Краевые язычковые цветки огненно-красные или темно-фиолетовые; обертка одиорядная . . . . . Род 41. *Senecio* L. — Крестовник (см. также ступени 39, 58, 72).
- Цветки иной окраски . . . . . 44.
44. Краевые цветки хорошо заметные, язычковые или воронковидные, крупные . . . . . 51.
- Все цветки в корзинке интенидные . . . . . 51.
45. Краевые цветки воронковидные, синие или голубые; венчик средних цветков синие-фиолетовый или фиолетово-лиловый; хохолок короткий, 3—3,5 мм дл.,







- Краевые цветки язычковые, белые или розовые . . . . . 79.
75. Цветоложе очень сильно выпуклое; листочки обертки по краю безопленчатые; листья перисторассеченные или дважды перисторассеченные; растения с специфическим запахом . . . . . Род 29. *Matricaria* L. — Ромашка (см. также ступень 82).
- Цветоложе плоское или слабо выпуклое . . . . . 79.
76. Маленькие однолетники с ланцетно-линейными или ланцетными, цельнокрайными, зубчато-рассеченными или перистыми листьями; корзинки на верхушках стеблей и ветвей, одиночные, небольшие; обертка с немногочисленными листочками . . . . . Род 33. *Cotula* L. — Котула.
- Многолетники, реже крупные двулетники или однолетники; корзинки в соцветиях, помногу . . . . . Род 30. *Tapacetum* L. — Пижма.
77. Корзинки различной величины в метельчатом соцветии . . . . . Род 35. *Artemisia* L. — Полынь (см. также ступени 51, 57).
- Корзинки широкие, ярко- и золотисто-желтые, в густом щитковидном соцветии . . . 78.
78. Корзинки в густом щитке, многочисленные, крупные, ярко-желтые; листочки обертки с темно-бурой перепончатой каймой; листья с обеих сторон зеленые . . . . . Род 30. *Tapacetum* L. — Пижма.
- Корзинки в щитковидном соцветии, многочисленные, золотисто-желтые; листья сверху зеленые, снизу белые или сероватолочные . . . . . Род 31. *Dendranthema* (DC.) DesMoul. — Дендантема (см. также ступень 69).
- 79 (от 74). Корзинки мелкие, 5—10 мм в диам.; язычковые цветки 2—5 мм дл., белые или розовые . . . . . 80.
- Корзинки более крупные; язычковые цветки, 0,5—3 (5) см дл. . . . . 81.
80. Язычковых цветков 5; листья дважды или трижды перисторассеченные . . . . . Род 26. *Achillea* L. — Тысячелистник.
- Язычковых цветков 10; листья гребенчато-перистонадрезанные . . . . . Род 27. *Parnica* DC. — Чихотная трава, Парника (см. также ступень 66).
- 81 (от 79). Цветоложе с пленчатыми или щетинистыми колосками прицветниками, по отцветанию коническое . . . . . Род 25. *Anthemis* L. — Пушкыш.
- Пленок и щетинок в корзинках нет . . . . . 82.
82. Цветоложе сильно выпуклое . . . . . Род 29. *Matricaria* L. — Ромашка (см. также ступень 75).
- Цветоложе не выпуклое . . . . . Род 28. *Leucanthemum* Mill. — Нибилик (см. также ступень 69).

Род 1. *EUPATORIUM* L. — ПОСКОНИК

Стебель простой, 30—100 см выс., снизу голый, сверху опушенный курчавыми волосками; листья супротивные, нижние цельные, на черешках, верхние сидячие, тройчатые с ланцетными долями, образующими как бы шестилпестную мутовку; соцветие — сложный, верхушечный, сильно сжатый щиток, почти полушаровидный; листочки обертки воронковидные, от ярко-розовых до фиолетовых; хохолок белый, одиорядный, с зазубренными волосками; цветет в августе—сентябре. На лугах . . . . . 1. *E. lindleyanum* DC. — П. Линдлея.

Род 2. *SOLIDAGO* L. — ЗОЛОТЯРНИК

1. Нижние и средние стеблевые листья мелкозубчатые, постепенно сужены и хорошо заметный черенок; общее соцветие — узкая, длинная, разреженная или плотная, сложная кисть; цветет в августе. В лесах и кустарниках . . . . . 1. *S. pacifica* Juz., *S. virgaurea* L., p. p. — 3. тихоокеанский.
- Нижние и средние стеблевые листья крупнозубчатые, сидячие; соцветие из одиорядных, дугообразно изогнутых кистей, собранных в широкую метелку пирамидальной формы; цветет в августе. На полях и межах; редкое сорное . . . . . 2. *S. canadensis* L. — 3. канадский.

Род 3. *HETEROPAPPUS* Less. — ГЕТЕРОПАППУС

1. Хохолки у краевых язычковых цветков коронковидные, у цветков диска длинные, щетинистые-волосистые; опушение из густых, оттопыренных волосков, верхние листья широколанцетные, наверху притупленные; двулетники или однолетники. По каменистым обрывам и галечникам; в Приморье и в Хабаровском крае (долина Амура) . . . . . 1. *H. hispidus* (Thunb.) Less., *H. pectoratus* Kom. — Г. щетинисто-волосистый.
- Хохолки у всех цветков одинаковые, в случае редукции хохолок у язычковых цветков наблюдается недоразвитие семян . . . . . 2.



1 — *Aster tripolium* L. (Астра приморская), верхняя часть растения; 2 — *A. ageratoides* Turcz. (*A. ageratoides*); а — часть стебля с листом, б — верхняя часть растения; 3 — *A. incisus* Fisch. (*A. naudenianus* (Deb.) Franch. (*A. ageratoides*); 4 — *A. incisus* Fisch. (*A. naudenianus* (Deb.) Franch. (*A. ageratoides*); а — часть стебля с листьями, б — верхняя часть растения.







- Все семечки имеют одинаковые хохолки; растение опушено только крупными, хорошо заметными волосками; соцветие узкометельчатое; цветет в августе. В населенных пунктах, по огородам и около дорог . . . . . 2. *E. canadensis* L. — М. канадский.
- 4 (от 2). Стебли и листочки обертки красно-коричневые; соцветие пильчатое . . . . . 6. *E. elongatus* Ldb. — М. удлинённый.
- Растения зелёные; соцветие метельчатое или кистевидное . . . . . 5.
5. Листочки обертки опушены головчатыми железками, на коротких ножках, иногда с примесью длинных волосков; нижние стеблевые листья зубчатые. На дугах, залежах, в разреженных лесах . . . . . 5. *E. kamtschaticus* DC. — М. камчатский.
- Листочки обертки опушены длинными, оттопыренными многоклеточными волосками; стеблевые листья без зубцов. На дугах, залежах . . . . . 3. *E. acer* L. — М. едкий.

## Род 11. SYMPHYLOCARPUS Maxim. — СИМФИЛОКАРПУС

Небольшой однолетник. По илистым и песчаным берегам и отмелям; на Амуре . . . . . 1. *S. exilis* Maxim. — С. тонкий.

## Род 12. ANTENNARIA Gaertn. — КОШАЧЬЯ ЛАПКА

Растение с тонкими горизонтальными корневищами; стебли и лопатчатые (розеточные), а также линейные (на цветоносе) листья беловолочные; корзинки скучены на вершине стебля; обертки и язычковые цветки белые, различные у мужских (тычиночных) и женских (пестичных) корзинок. По сухим склонам; преимущественно в Приамурье . . . . . 1. *A. dioica* (L.) Gaertn. — Р. а. дудочная.

## Род 13. LEONTOPODIUM R. Br. — ЭДЕЛЬВЕЙС

1. Прицветники сильно отличаются от стеблевых листьев и образуют «звезду» . . . . . 2.
- Прицветники отличаются от стеблевых листьев только по величине, не образуют «звезды», имеют длинный хохолок; соцветия сложные, из 3—4 корзинок, окруженных приподнятыми прицветниками; растение с несколькими стеблями, 20—35 см выс., покрыто пепельным клочковатым опушением; цветет в июне—августе. На сухих дугах, склонах, среди редких кустарников . . . . . 4. *L. leontopodioides* (Willd.) Beauverd — Э. эдельвейсоидный.
2. Верхняя сторона широких ланцетовидных листьев зеленая и голая или очень слабо опушенная; прицветники широкие (снизу зеленоватые), образуют крупную, резко выделяющуюся «звезду» . . . . . 3.
- Листья с обеих сторон опушены, снизу беловолочные; прицветники узкие, «звезда» выделяется на редко . . . . . 4.
3. Стебли тонкие, извилистые, в нижней половине лысые; прицветники образуют неправильную, разлопаченную «звезду». На гольцах и скалах; Скотт-Альпс . . . . . 2. *L. discolor* Beauverd — Э. разноцветный.
- Стебли толстые, гранитные, прямые и крепкие; прицветники образуют правильную, с 5—6 лучами, крупную (до 6 см в диам.) «звезду» с 1 крупной корзинкой в центре и 5—10 мелкими периферическими. Сухие дуга и склона морского побережья; в юго-восточной части Приморья . . . . . 1. *L. palibinianum* Beauverd — Э. Палибина.
- 4 (от 2). «Звезда» белая, узколучевая; опушение всего растения рыхлое, сероволочное. Скалы и каменистые склоны; хребет Дусса-Альпс . . . . . 3. *L. kirilense* Takeda — Э. курильский.
- «Звезда» серно-желтая (желтовато-зеленая), из узколинейных, в основании резко суженных прицветников; опушение растения приклатое, плотное, сероватое. На сухих дугах; на западе Амурской области . . . . . 5. *L. ochroleucum* Beauverd var. *conglobatum* (Turcz.) Grub. — Э. бледно-желтый скученный.

## Род 14. ANAPHALIS DC. — АНАФАЛИС

1. Мощное растение, 30—60 см выс.; листья линейные, 5—10 см дл. и 3—12 мм шир., сверху голые или очень слабо опушенные, снизу густо- и коротковолочные; корзинки 8—10 мм в диам. В хвойных и березовых лесах на сухих почвах. В восточной части Приамурья и на севере Приморья . . . . . 1. *A. margaritacea* (L.) Benth. et Hook. f. — А. жемчужный.
- Растение более мелкое; листья 3—5 см дл., 4—8 мм шир., сверху паутинисто-волосистые, снизу волочные; корзинки более мелкие, 3—7 мм в диам. На склонах холмов, среди разнотравья; на юге Хасанского района . . . . . 2. *A. rossetica* Kom. — А. пте-  
рокаулон (Franch. et Sav.) Maxim. ? *A. sinica* Hance — А. посылетский.



1 — *Carpesium triste* Maxim. (Карпезиум печальный); 2 — *C. cernuum* L. (Р. поникший), часть стебля с листом.



Род 15. GNAPHALIUM L. — СУШЕНИЦА

Небольшое однолетнее растение, 15—35 см выс., с клочковатым опушением; стебель в основании древеснеющий; листья линейные, сложное соцветие из определенного числа (5—15) корзинок, сидящих на короткой, наутинистой ножке; цветет в июле—сентябре. На сырых лугах, около жилья, на паровых полях, по берегам разных водоемов и в других открытых местах на сырых почвах . . . . . 1. *G. uliginosum* L., s. l. — С. топяная.

Во «Флоре СССР» для Дальнего Востока указывается 2 вида сушеницы, различающихся тем, что *G. transchellii* Kipr. имеет в корзинке (вплоть до развитой) пестичных цветков около 125, а *G. mandshuricum* Kipr. — около 75.

Род 16. INULA L. — ДЕВЯСИЛ

1. Завязи и семечки по всей поверхности волосистые . . . . . 2. Завязи и семечки гладкие, редко только в верхней части коротковолосистые; язычковые цветки ж. т. в 1,5 раза превышают листочки обертки; трубчатые цветки желтые, рачие холоткам; листья ланцетные, с мелко- и острозубчатыми краями. По лугам и среди кустарников . . . . . 1. *I. salicina* L. — Д. иволжистый.
2. Стебли, цветоносы и листочки оберточки покрыты белыми, в основании утолщенными или сидящими на бородавках волосками; нижние листья эллиптические, 10—14 см дл. и 3—4 см шир., средние и верхние ланцетные, цельнокрайные; корзинки около 4 см в диам.; цветет в сентябре. На лугах . . . . . 4. *I. japonica* Thunb. — Д. японский.
- Растениям рассеяно шерстистое опушение, покрыты белыми, тонкими волосками . . . . . 3. *I. linariifolia* Turcz. — Д. льнянолистный.
3. Листья линейные, верхние сидячие; обертки снаружи рассеяно золотисто-железистые. На лугах и около дорог . . . . . 3. *I. linariifolia* Turcz. — Д. льнянолистный.
- Листья ланцетные, с сердцевидным стеблеобъемлющим основанием, часто с ушками; корзинки 3—5 см в диам.; язычковые цветки в 1,5—2 раза превышают листочки обертки, гладкие. На лугах по склонам сопок и в долинах; в Приморье и Приамурье . . . . . 2. *I. britannica* L. — Д. британский.

Род 17. PULICARIA Gaertn. — БЛОШНИЦА

Однолетник; стебли чаще ветвистые почти от основания; листья 1—3 см дл., продолговатые или продолговато-ланцетные, с обеих сторон войлочно-волосистые; корзинки полушаровидные, многочисленные; цветки желтые. Сорное; по ж.-д. насыпям и выгонам . . . . . 1. *P. prostrata* (Gilib.) Aschers. — Б. распростертая.

Род 18. CARPESIUM L. — КАРПЕЗИЙ

1. Листья крупные, до 20—23 см дл. и 10—15 см шир., на широко окрыленных черешках; корзинки 2—3 см в диам., с крупными, неравными по длине придаточными листьями. По долинам рек в лесу, у дорог; только на юге Приморья (Партизанский и Шкотовский районы) . . . . . 1. *C. macrocephalum* Franch. et Sav. — К. крупноголовый.
- Листья меньших размеров; корзинки до 1—1,5 см в диам. . . . . 2. Листовые черешки широко окрыленные, длинные. В листовых и смежных лесах; Приморье . . . . . 2. *C. triste* Maxim. — К. печальный (табл. 176, 1).
- Основания листьев клиновидно суженные. В листовых и смежных лесах; Приморье . . . . . 3. *C. cernuum* L. — К. понижный (табл. 176, 2).

Род 19. ADENOCALON Hook. — ПРИПЫЛАЛО

Стебель 30—80 см выс.; листья длинночерешковые, снизу сероваточные или пестичные, сверху почти голые; корзинки до 5 мм в диам.; цветки с белыми венчиками; семечки железистые, сильно липкие. В лесу по ручьям и лесным тропам . . . . . 1. *A. adhaerens* Maxim. — П. пристающее.


Род 20. XANTHIUM L. — ДУРНИШНИК

1. При основании листа есть крупные, трехраздельные, желтые колючки; листья сверху зеленые, снизу серые от густого пестичного опушения. Запасное; по сорным местам; пока известно только в Приморском крае (Пограничный,

Партизанский и Ольгинский районы)

1. *X. spinosum* L. — Д. игольчатый (табл. 177, 2).
- Колючек в основании листьев нет; листья с обеих сторон с негустым, приятным или пестичным опушением. Сорное; всходы; по сорным местам, по дорогам и в посевах сои . . . . . 2. *X. sibiricum* Patr. — Д. сибирский (табл. 177, 1).

Таблица 177



1 — *Xanthium sibiricum* Patr. (Дурнишник сибирский), часть стебля с листьями и плодами; 2 — *X. spinosum* L. (Д. игольчатый), часть стебля с листьями и плодами.

Род 21. SIEGESBECKIA L. — СИГЕЗБЕКЦИЯ

1. Стебель, особенно в верхней части, с курчавым опушением; обертки железистые; цветки желтые; семечки черные. Сорное; на огородах и у дорог; часто . . . . . 1. *S. orientalis* L. — С. восточная.
- Стебель и листья голые; железистые волоски только на соцветии. У дорог и жилья; только на юге Приморья . . . . . 2. *S. glabrescens* Makino — С. гладкая.



Однолетник (8) 10—50 (60) см выс., с продолговато-ланцетными, продолговато-овальными или продолговатыми листьями, цельнокрайними или слабо зубчатыми; корзинки многочисленные, 7—8 мм в diam.; цветки белые; семянки без хохолка. Сорное; было найдено на улицах Владивостока . . . . . 1. *E. alba* (L.) Hasskarl — Э. белая.

## Род 23. BIDENS L. — ЧЕРЕДА

1. Семянки сплюснутые, клиновидные, с 2 остями (если остей 3—4, то 2 из них длиннее остальных) . . . . . 2.
- Семянки трех-четырёхгранные, обратнопирамидальные, с 4 равными между собой остями (листья цельные), или семянки линейно-цилиндрические, «палочковидные», с 2—4 остями, но тогда листья рассеченные . . . . . 5.
2. Семянки по всей поверхности усажены прижатыми волосками . . . . . 5. *B. frondosa* L. — Ч. олистевная.
- Семянки толые или несут только по краям (или остям) шипики, обращенные вниз . . . 3.
3. Семянки по краям шершавые, волнистые, мелкобугорчатые, выемчатые (выгнутые); сегменты листьев длинные и узкие, от продолговато-ланцетных до линейных. По берегам водоемов и влажным западинам на лугах . . . . . 4. *B. maximowicziana* Oett. — Ч. Максимовича (табл. 178, 1).
- Семянки без бугорков по краям; сегменты листьев более широкие . . . . . 4.
4. Корзинки широкие, плосковатые (ширина их больше длины); наружные листочки обвертки в числе 9—14. По берегам рек и стариц и на других местах с сырой почвой . . . . . 3. *B. radiata* Thuill. — Ч. лучевая.
- Корзинки более узкие, ширина их равна длине, наружные листочки обвертки в числе 5—8 . . . . . 2. *B. tripartita* L., s. l. — Ч. трехраздельная (табл. 178, 2).
- 5 (от 1). Семянки обратнопирамидальные, на верхушке с 4 равными между собой остями; листья цельные, пальчато-зубчатые . . . 1. *B. cernua* L. — Ч. поникающая.
- Семянки линейно-цилиндрические, палочковидные; листья сложные, с линейными или узкими ланцетными сегментами . . . . . 6. *B. parviflora* Willd. — Ч. мелкоцветковая (табл. 178, 3).

## Род 24. GALINSOGA Ruiz et Pav. — ГАЛНСОГА

1. Стебли с рассеянными, мелкими, прижатыми волосками; листья с редкими, мелкими, расставленными, притупленными зубцами или же с волнистыми краями, яйцевидные, супротивные; корзинки мелкие; краевые цветки белые. Сорное; обычно на улицах Владивостока, Артема и пос. Шкотово . . . . . 1. *G. parviflora* Cav. — Г. мелкоцветковая.
- Стебли с длинными, оттопыренными волосками; листья крупнопальчато-зубчатые; корзинки более крупные, 4—5 мм в diam. Сорное; нередко в окрестностях Владивостока (Седанка, Океанская) . . . . . 2. *G. quadriradiata* Ruiz et Pav. — Г. четырехлучевая.

## Род 25. ANTHEMIS L. — ПУПАВКА


Сорное; заносное; в большом количестве встречается в пос. Шкотово . . . . . 1. *A. cotula* L. — П. собачья.

## Род 26. ACHILLEA L. — ТЫСЯЧЕЛИСТНИК

1. Стержень листа 0.5—1 мм шир.; последние дольки листа около 0.5 мм шир.; язычки розоватые; растение 40—60 см выс., с заметным перистым опушением. Луга, кустарники . . . . . 1. *A. asiatica* Serg. — Т. азиатский.
- Стержень листа 1—2 мм шир.; колючие доли листьев около 1 мм шир.; язычки белые; растение почти голое. Сорное; заносное . . . . . 2. *A. millefolium* L. — Т. обыкновенный.

## Род 27. PTARMICA DC. — ЧИХОТНАЯ ТРАВА, ПТАРМИКА

1. Листья цельные, линейно-ланцетные или линейные, по краям мелкопильчатые; обвертка 8—9 мм шир.; высота растения 50—100 см. Луга, кустарники . . . . . 1. *P. acuminata* Ldb., *Achillea acuminata* Sch. Bip. — Ч. т. заостренная.
- Листья перистолопастные или перистораздельные; корзинки мелкие . . . . . 2.



1 — *Bidens maximowicziana* Oett. (Черда Максимовича): а — часть стебля с листьями, б — плод («семя»); 2 — *B. tripartita* L. (Ч. трехраздельная): а — верхняя часть стебля с листьями и соцветием, б — плод («семя»); 3 — *B. parviflora* Willd. (Ч. мелкоцветковая): а — верхняя часть стебля с листьями и соцветиями, б — плод («семя»).



2. Язычки 0.5—1 (1.5) мм дл.; корзинки яйцевидные, около 5 мм дл., 3 мм шир., высота растения 50—80 см. Леса, кустарники . . . 2. *P. platnicoides* (Maxim.) Worosch., *Achillea platnicoides* Maxim. — Ч. т. старинковидная.
- Язычки 2—3 мм дл. . . . . 3.
3. Корзинки яйцевидные, около 5 мм дл., 3 мм шир.; листья линейно-ланцетные, 5—6 мм шир., перащенная их часть занимает менее половины всей ширины пластинки; высота растения 40—60 см. Луга . . . 3. *P. mongolica* (Fisch. ex Spreng.) DC., *Achillea mongolica* Fisch. ex Spreng. — Ч. т. монгольская.
- Корзинки полушаровидные, 5—6 мм дл. и шир.; листья шире, чем у предыдущего вида, причем перащенная их часть шире половины всей пластинки. Луга; в более северной части . . . . .
4. *P. alpina* (L.) DC., *P. sibirica* Ledeb., *Achillea alpina* L. — Ч. т. альпийская.

#### Род 28. LEUCANTHEMUM Mill. — ПИВНИК

1. Листья разделены на узкие, линейные доли; краевые цветки в корзинке бесплодные; высота растения 40—60 см. Болота, морские дуга . . . . . 1. *L. lineare* (Matsum.) Worosch., *Chrysanthemum lineare* Matsum., *Leucanthemella linearis* Tzvel. — П. линейный.
- Листья цельные, зубчатые или лопатные; все цветки в корзинке плодущие . . . . . 2.
2. Листья лопатные, мисчатые; корвиние ползучие, толстые; высота растения 25—50 см. Луга близ моря; в низовьях Амура . . . 2. *L. arcticum* (L.) DC., *Chrysanthemum arcticum* L., *Dendranthema arcticum* Tzvel. — П. арктический.
- Листья цельные, продолговатые или лопатные, по краю зубчато-городчатые, толстые; корвиние короткое, с корвинными мочками. Заносное . . . . .
3. *L. vulgare* Lam., *Chrysanthemum leucanthemum* L. — П. обыкновенный.

#### Род 29. MATRICARIA L. — РОМАШКА

1. Краевые цветки в корзинках, без язычков; семян гладкая, лишь с брюшной стороны с 3 тонкими ребрышками; одностолетник 10—25 см выс. Сорное . . . . . 1. *M. matricarioides* (Less.) Porter ex Britt., *M. suaveolens* Buch., *M. discoides* DC. — Р. ромашковидная.

Как заносное для некоторых районов Приморья и Приамурья указывается также *M. reculta* L. (*M. chamomilla* L.) — одностолетник с коническим полным цветоносом корзинки и белыми язычками краевых цветков.

- Корзинки с белыми язычками краевых цветков; семянки призматические, с сильно выступающими продольными ребрами . . . . . 2.
- 2. Язычки 2.5—3 мм дл.; диски крупные, после цветения сильно выпуклые; обертки около 15 мм шир., с широко- и белоперепончатыми листочками. Болотистые дуга; по Амуру, редко в Приморье (P. Суйфун) . . . . . 2. *M. himosa* (Maxim.) Kudo — Р. илестая.
- Язычки значительно крупнее, не менее 10 мм дл. . . . . 3.
- 3. Одностолетник с толстыми, длинными цветоносами и сравнительно небольшими корзинками, 2.5—3 см в поперечнике (с язычками); листочки обертки по краю с узким, буроватым краем, растение голое или с единичными волосками. Сорное . . . . . 3. *M. inodora* L., *Tripleurospermum inodorum* Sch. Bip. — Р. непахучая.
- Двустолетник или многостолетник с толстыми, короткими цветоносами и крупными, 3.5—4 см в поперечнике, корзинками; листочки обертки по краю с широкой темно-бурой каймой. Растение часто вверх шерстистое. Морские берега . . . . . 4. *M. tetragonosperma* (Fr. Schmidt) Hara et Kitam. — Р. четырехугольносемянная.

#### Род 30. TANACETUM L. — ПИЖМА

- Луга, кустарники; сорное . . . 1. *T. boreale* Fisch. ex DC. — П. северная.

Как заносное может быть встречена *T. vulgare* L., отличающаяся от *T. boreale* меньшей рассеченностью листьев и более мелкими корзинками, с более узким и светлым окаймлением листочков обертки.

#### Род 31. DENDRANTHEMA (DC.) DesMoul. — ДЕНДРАНТЕМА

1. Корзинки мелкие (обертки около 6 мм шир.), краевые цветки в них без язычков; листья снизу более или серо-топково-лопастные от двураздельных волосков; стебли травянистые, 30—50 см выс. Скалы, дубники, сухие склоны . . . . . 1. *D. pallasiatum* (Fisch. ex Bess.) Worosch., *Ajania pallasiata* Poljak., *Chrysanthemum pallasiatum* Kom. — Д. Палласа.

В 1872 г. в Уссурийске как заносное был собран близкий вид — *Ajania manshurica* Poljak., отличающийся от предыдущего вида одревесневающим вышним стеблем и опушением снизу листьев, состоящим из протых волосков. Возможно, это китайский *Chrysanthemum varifolium* Chang.

- Корзинки значительно более крупные, краевые цветки в них всегда с язычками; листья снизу голые или почти голые . . . . . 2.
- 2. Листья перистораздельные или дважды перистораздельные . . . . . 3.
- Листья лопатные или надрезанные . . . . . 4.
- 3. Конечные доли листьев линейные или линейно-ланцетные, 1—1.5 мм шир. . . . . 5.
- Конечные доли листьев значительно шире, до 3 мм шир.; цветки крупные, лилово-розовые . . . . . 6.
- 4. Листочки обертки с широким, темно-коричневым окаймлением; язычки интенсивно лиловые; все растение густошерстистое. Шибистые плоскогорья высокогорий; южный Сихотэ-Алинь (гора Снежная) . . . . . 2. *D. sichotense* Tzvel. — Д. сихотэ-алиньский.
- Листочки обертки с более узким, буроватым окаймлением или почти без него; язычки белые или розоватые; растения голые или с рассеянными волосками . . . . . 5.
- 5. Листья голые или почти голые; стебли простые или ветвятся только в основании; язычки розовые. Приморские дуга и скалы . . . . . 3. *D. coreanum* (Lévl. ex Vaniot) Worosch., *Chrysanthemum coreanum* Nakai ex K. Mott., *Ch. sibiricum* var. *acutifolium* Kom. — Д. корейский.
- Листья заметно волосистые, с более узкими лопастями, чем у предыдущего вида, ветвистый, 30—50 см выс.; язычки розовые или белые; двустолетник или монокарпик. Скалы, преимущественно известковые . . . . . 4. *D. maximowiczii* (Kom.) Tzvel., *Chrysanthemum maximowiczii* Kom. — Д. Максимовича.
- 6 (от 3). Листочки обертки со слегка буроватой каймой; ножки соцветия шерстистые или слабоволосные; высота растения 30—50 см. Луга; в Амурской области . . . . . 5. *D. zawadskii* (Herbich) Tzvel., *Chrysanthemum zawadskii* Herbig, *Ch. sibiricum* var. *zawadskii* Tzvel. — Д. Завадского.
- Листочки обертки с черно-бурой каймой; ножки соцветия густоволосные. Высокогорья и дуга; в низовьях Амура . . . . . 6. *D. mongolicum* (Ling) Tzvel., *Chrysanthemum mongolicum* Ling — Д. монгольский.
- 7 (от 5). Листья при основании сердцевидные или усеченные; корзинки небольшие, до 2.5 см в поперечнике (с язычками), на коротких цветоносах, в многократном соцветии. Каменстые места в лесах, реже на открытых скалах . . . . . 7. *D. erubescens* (Staph) Tzvel., *Chrysanthemum erubescens* Staph. *Ch. sinense* auct., пол Sabine — Д. краснотная.
- Листья при основании клиновидные; корзинки 3.5 см в поперечнике, расположены на длинных цветоносах. Открытые склоны, дубники . . . . . 8. *D. naktonense* (Nakai) Tzvel., *Chrysanthemum naktonense* Nakai, *Ch. sibiricum* var. *latilobum* Kom. — Д. нактонеская.

Указываемые в разное время для Приморья заносные виды *Chrysanthemum roxburghii* Cass. и *Pyrethrum parthenium* (L.) Smith уже давно никем не находились и не являются присущими флоре Дальнего Востока.

#### Род 32. FILIFOLIUM Kitam. — ПИТЕЛИСТИК

- Степи, каменные склоны . . . . . 1. *F. sibiricum* (L.) Kitam., *Tanacetum sibiricum* L. — П. сибирский (табл. 179).

#### Род 33. COTULA L. — КОТУЛА

- Одностолетник с ветвистыми стеблями и мисчатыми, в основании стеблеобъемлющими листьями; от ланцетно-линейных до зубчато-рассеченных или перистых мелких листьями; корзинки мелкие, до 1 см в diam., одиночные, на верхушках с линейными долями; ветвей, полушаровидные; цветет в июле. По морским берегам, по скалам и в долинах, в окрестностях Владивостока (14-й км); занесено из Европы плодатыми низкими . . . . . 1. *C. coronopifolia* L. — К. коронопифолия.
- или Африки . . . . .

#### Род 34. CENTIPEDA Lour. — СТОНОЖКА

- Небольшой одностолетник с распростертыми стеблями. По берегам рек и озер и тропам; по дорогам и тропам; P. Jedu, оз. Ханка, Амур . . . . . 1. *C. minima* (L.) A. Br. et Aschers. — С. малая.




1. Краевые цветки в корзинке плодущие, срединные бесплодные . . . . . 2.
- Все цветки в корзинке плодущие . . . . . 11.
2. Однолетник; стебель сильно ветвистый, до 1 м выс.; листья рассечены на нитевидные или линейные доли; корзинки многочисленные, поникающие, мелкие, 1,5—2 мм дл. Берега рек, склоны, сорные места . . . . . 3.
- 1. *A. scoparia* Walld. et Kit. — П. пенная (табл. 181, 2).
3. Травянистые многолетники с корневищем или ползучими стеблями . . . . . 3.
4. Бесплодные побеги с развитыми стеблями, 10—40 см выс., несут листья часто другой формы, нежели на цветущих стеблях . . . . . 4.
- Бесплодные побеги, если они есть, в виде розеток листьев (с укороченными стеблями), листья на них почти не отличаются от листьев на цветущих стеблях; если бесплодные побеги высокие, то листья на них нитевидные . . . . . 7.
4. Соцветие с длинными ветвями; листья цветущих побегов, как и бесплодных, все или большей частью цельные, лопастные и зубчатые; корзинки 2 мм дл.; высота растения 60—90 см. Луга, берега рек; на юге . . . . . 2.
- 2. *A. japonica* Thunb. — П. японская.
- Соцветие более короткое, скатое; листья на цветущих побегах до основания раздельные . . . . . 5.
5. Растения голые; корневище короткое, толстое, с тонкими корнями . . . . . 6.
- Молодые листья густо опушенные, на бесплодных и плодущих побегах по форме почти одинаковые, но у разных растений очень неодинаковые по степени расчлененности пластинки; корневище с утолщенными корнями; корзинки 3—4 мм дл.; высота растения 30—50 см. Скалы у моря; оз. Хасан, Советская Гавань . . . . . 3.
- 3. *A. littoralis* Kitam. — П. прибрежная (табл. 180, 1).

Форма 20—30 см выс. с листьями с обеих сторон густошерстистыми, дважды перистораздельными на доли 2 мм шир. и корзинками 2 мм дл., произрастающая у морских берегов бухты Терней и севернее, определялась как *A. pinnosa*, но является особым видом.

6. Листья бесплодных побегов все или почти все цельные, зубчатые или лопастные, плодущих раздельные на линейные доли; корзинки мелкие, 1,5—2 мм дл.; высота растения 40—60 см. Сухие леса, луга, кустарники; в Приморье . . . . . 4.
- 4. *A. manshurica* Kom. et Aliss. — П. маньчжурская (табл. 180, 2).
- Листья бесплодных побегов, все или кроме самых верхних, как и плодущих побегов, раздельные на линейные доли. В Приморье . . . . . 5.
- 5. *A. desertorum* Spreng. — П. пустынная.
- 7 (от 3). Корзинки крупные, полушаровидные, 3—5 мм дл.; растения густошерстистые . . . . . 8.
- Корзинки мелкие, 1,5—3 мм дл., если 4 мм дл., то яйцевидные; доли листьев нитевидные или линейные; листья розеток, если они есть, часто сероватые от густого опушения . . . . . 9.
8. Листья розеток сильно отличаются от стеблевых, первые перистые с широкими, надрезанными или почти раздельными долями и широкими зубцами; стеблевые листья раздельные на линейные доли; растение шерстистое, 20—30 см выс.; корзинки 3—4 мм дл. Скалы у моря; р. Подзихе, мыс Пласту и др. . . . . 6.
- 6. *A. pinnosa* Krasch. — П. лохматая.

От *A. ledebouriana* Bess. (которая в Приморье и Приморье не встречается) отличается прежде всего более или менее развитой гетерофиллией (разнолистностью) розеточных и стеблевых листьев. В бухте Ольги собрана *A. pinnosa* var. *olgensis* Vorobiev, отличающаяся от типа клочковатым опушением, высоким ростом (50—70 см) и более крупными корзинками (4—5 мм дл.). Вероятно, заслуживает выделения в особый вид.


- Листья розеток и стеблевые одинаковые, трижды-четырежды перистые, с нитевидными или линейными долями, 1 мм шир., сероватые от толстого опушения; корзинки 4—5 мм дл. Низкий Амур . . . . . 7.
- 7. *A. borealis* Pall. — П. северная.
- 9 (от 7). Ползучи стебли с вертикальным деревнистым корнем и деревенеющим внизу стеблем, возобновляющимся значительно выше корневой шейки; корзинки 2,5—3 мм дл. Пески, каменистые склоны; у оз. Ханка . . . . . 8.
- 8. *A. capillaris* Thunb. — П. волосовидная.
- Травянистые многолетники с толстым, коротким корневищем, возобновляющиеся только от корневища . . . . . 10.
10. Корзинки шаровидные или широкояйцевидные, 1,5—2 мм дл.; доли листьев нитевидные; растение голое, 40—60 см выс. Степи, каменистые склоны; на западе Приморья и Приморье . . . . . 9.
- 9. *A. micellata* (Maxim.) Krasch. — П. худощавая.
- Корзинки яйцевидные, 3—4 мм дл.; доли листьев линейные. Сухие склоны и скалы; по Амуру . . . . . 10.
- 10. *A. commutata* Bess. — П. замещающая.



*Filifolium sibiricum* (L.) Kitam. (Нителестник сибирский).



- 11 (от 1). Однолетники и двулетники . . . . . 12.  
 — Многолетники . . . . . 15.  
 12. Стебли 60—100 см выс. . . . . 13.  
 13. Стебли 20—50 см выс., обертки золотистые, лоснящиеся . . . . . 14.  
 13. Растение густо шелковисто опушенное; конечные доли листьев 2 мм шир.; кор-  
 занки 4—5 мм шир. На сорных местах . . . . . 11. *A. sieversiana* Willd. — П. Сиверса.  
 — Растение голое или с рассеянными волосками; конечные доли листьев 0.5 мм шир.;  
 корзанки 2—2.5 мм шир. Сорное; на улицах населенных пунктов и у дорог;  
 часто . . . . . 12. *A. annua* L. — П. однолетняя.  
 14 (от 12). Листья 6—12 см дл.; дважды перисторассеченные, конечные дольки узко  
 линейно-ланцетные. Скалы и осыпи; на юге . . . . . 12. *A. aurata* Kom. — П. золотистая.  
 — Листья 2—5 см дл., почти просто перисторассеченные, с линеально-ланцетными  
 дольками. Галечники, выгоны; на западе Амурской области . . . . . 13. *A. palustris* L. — П. болотная.  
 15 (от 11). Полукустарники с одревесневающими на большом протяжении стеб-  
 лями . . . . . 16.  
 16. Травянистые растения с однолетними стеблями . . . . . 19.  
 16. Корзанки 4—6 мм шир.; листья цельные, нижние наверху с 3 короткими лопастями;  
 густо серовато опушенное растение 20—40 см выс. Высокогорья . . . . . 14. *A. lagoccephala* (Bess.) DC. — П. зайцевская (табл. 181, 1).  
 — Корзанки 2—3 мм шир.; листья дважды перисторассеченные . . . . . 17.  
 17. Высота растения 70—150 см; листья с обеих сторон зеленые; корзанки полушаро-  
 видные 2.5—3.5 мм шир. Склоны, светлые леса . . . . . 15. *A. gmelinii* Web. ex Stechm. — П. Гмелина (табл. 182, 3).  
 — Высота растения 30—50 см; листья мельче, с более мелкими долями, хотя бы  
 с одной стороны беловатые от густого паутинистого опушения . . . . . 18.  
 18. Листья с обеих сторон белоопушенные, травянистые склоны; на юге . . . . . 16. *A. messerschmidiana* Bess. — П. Мессерсмида.  
 — Листья сверху зеленые, снизу белоопушенные. Травянистые склоны и кустар-  
 ники; на юге . . . . . 17. *A. freyniana* (Ramp.) Krasch. — П. Фрейна.  
 19 (от 15). Корзанки 6—8 мм дл.; все растение белое от густого опушения; листья  
 перисто надрезанно рассеченные; высота растения 40—60 см. Морские берега  
 . . . . . 18. *A. stelleriana* Bess. — П. Стеллера (табл. 182, 2).  
 — Корзанки мельче . . . . . 20.  
 20. Конечные доли листьев узколинейные, 0.5—1 мм шир.; растения часто беловатые  
 от шелковистого опушения . . . . . 24.  
 — Конечные доли листьев шире 1 мм . . . . . 22.  
 21. Соцветие кистевидное; корзанки 4—5 мм дл.; растение образующее дернину;  
 стебли 15—25 см выс. Высокогорья; в северной части области . . . . . 19. *A. fureata* M. B. — П. вильчатая.  
 — Соцветие метельчатое; корзанки 2—3 мм дл.; высота растения 40—60 см. Заносное,  
 у дорог . . . . . 20. *A. austriaca* Jacq. — П. австрийская.  
 22 (от 20). Листья голые или более или менее опушенные, с обеих сторон зеленые . . . . . 23.  
 — Листья снизу, а иногда и сверху беловатые или сероватые от густого опуше-  
 ния . . . . . 28.  
 23. Листья цельные, вильчато-надрезанные, с округлыми остроколючими зубцами;  
 корзанки 2.5—3 мм дл.; высота растения 20—50 см. Дубовые леса, суховатые  
 склоны . . . . . 21. *A. keiskeana* Miq. — П. Кейке (табл. 180, 3).  
 — Листья однажды-трижды перисторассеченные . . . . . 24.  
 24. Бесплодные побеги, если они есть, с развитым стеблем; конечные доли листьев  
 расставленные, линейные или линейно-ланцетные, 7—10 мм дл., цельнокрай-  
 ные; высота растения 50—80 см. Леса, луга . . . . . 22. *A. mesochkina* Krasch. ex Poljak. — П. промежуточная.  
 — Бесплодные побеги, если они есть, в виде розеток листьев; конечные доли листьев  
 короче или шире, часто зубчатые . . . . . 25.  
 25. Листья снизу опушенные, доли первого порядка рассечены до средней жилки;  
 доли второго порядка глубокораздельные на узкие, до 1 мм шир.; дольки;  
 корзанки около 3 мм дл., высота растения 40—60 см. Луга, склоны . . . . . 23. *A. laciniosa* Willd. — П. рассеченная (табл. 182, 1).  
 — Доли первого порядка раздельные не до средней жилки . . . . . 26.  
 26. Растение голое или почти голое; доли второго порядка чаще цельнокрайные или  
 с единичными зубчиками; высота растения 30—60 см. Луга, кустарники; на  
 западе Амурской области и у оз. Ханка (?) . . . . . 24. *A. latifolia* Ldb. — П. широколистная.  
 — Листья снизу (хотя бы в молодости) и веточки соцветий опушенные . . . . . 27.  
 27. Листья крупные, до 25 (35) см дл., с черешком, молодые слегка опушенные; доли  
 первого порядка с широкой нерассеченной частью, доли второго порядка тре-  
 угольные, длинно заостренные, острозубчатые; главный стержень цельнокрайный;



1 — *Artemisia littoralis* Kitam. (Ползуч. прибрежная); 2 — *A. manshurica* Kom.  
 et Aliss. (П. маньчжурская); 3 — *A. keiskeana* Miq. (П. Кейке); 4 — часть стебля с со-  
 цветиями, 6 — прикорневые листья.




- корзинки 4—6 мм дл.; высота растения 80—120 см. Лесные склоны . . . 25. *A. maximoviciana* Krasch. ex Poljak. — П. Максимовича (табл. 183, 7).  
 — Листья значительно мельче, около 10 см с черешками, снизу густо опушенные, часто серые от опушения; доли первого порядка узко крылевые, доли второго порядка остовидные, островатые, с короткими зубчиками; главный стержень зубчатый (в промежутках между долями); высота растения 40—80 см. Светлые леса, склоны; Амурская область . . . 26. *A. tanacetifolia* L. — П. пижмолистная.

От *A. latifolia* Ldb. отличается более или менее густым опушением и всегда зубчатыми долями второго порядка.


- 28 (от 22). Листья, хотя бы нижние, разделены до или почти до средней жилки . . . 29.  
 Листья разделены не так глубоко, максимум до  $\frac{1}{3}$  ширины пластины . . . 34.  
 29. Корзинки мелкие, 2—2,5 мм дл., 1,5 мм шир., продолговатые . . . 30.  
 — Корзинки крупнее, 3 мм дл. и более . . . 31.  
 30. Листья, хотя бы в молодости, сверху более или менее опушенные; соцветие сильно облистненное; веточки соцветия с частыми, оттопыренными мелкими листочками; листья небольшие, нижние разделены, верхние цельные; конечные доли около 25 мм дл., 2,5—3 мм шир. Луга, склоны, на самом юге . . . 27. *A. feddei* Lévl. et Vaniot. *A. lavandulifolia* DC., non Salisb. — П. Федде.  
 — Листья сверху совершенно голые; соцветие более или менее безлистное; растение часто очень мощное, с широкими долями листьев (3—10 мм шир.). Леса, берега рек, луга . . . 28. *A. rubripes* Nakai, *A. venusta* Rampr., *A. vulgaris* auct., non L. — П. красочерешковая (табл. 181, 3).  
 31 (от 29). Листья сверху с тонким опушением, снизу войлочные; конечные доли длинные, до 7,5 мм дл., 4 мм шир., цельнокрайние; корзинки спаружи более или менее войлочные. Пустыри, суховатые леса, луга . . . 29. *A. umbrosa* (Bess.) Turcz. — П. теневая.  
 — Листья сверху голые; корзинки паутиноистые, но не войлочные . . . 32.  
 32. Корзинки повислые, широкояйцевидные или почти шаровидные, сидят на волосовидных ножках; ветви поникающие; листья с широкими (до 12 мм шир.) зубчатыми сегментами и более или менее окрыленной средней жилкой. Леса; на юге . . . 30. *A. sylvatica* Maxim., *A. nutantiflora* Kom. — П. лесная (табл. 183, 2).  
 — Корзинки более или менее прямостоячие, удлинненные; веточки корзиночек не волосовидные; высота растения 100—150 см . . . 33.  
 33. Листья с крупными, почти цельнокрайними конечными долями, разделены не до средней жилки. Леса, луга; в низовьях Амура . . . 31. *A. gigantea* Kitam., *A. montana* Rampr., non Schlecht. — П. крупная.  
 — Листья с длинными и узкими (до 12 см дл., 8 мм шир.), по краю мелко- и остропильчатыми или почти цельнокрайними долями; соцветие узкое, с прижатыми вверх ветвями. Берега рек, уремы, луга . . . 32. *A. selengensis* Turcz. — П. селенгинская.  
 34 (от 28). Листья линейные, до 6,5 см дл., 3—5 мм шир., цельнокрайние или почти цельнокрайние, с ушками внизу. Сухие склоны; на юге . . . 33. *A. stenophylla* Kitam., *A. subulata* Nakai, non Willd. — П. узколистная.  
 — Листья более широкие, крупнозубчатые, выемчатые или более или менее глубоко разрезные . . . 35.  
 35. Корзинки снаружи густовойлочные . . . 36.  
 — Корзинки более или менее шерстистые, но не войлочные . . . 38.  
 36. Корзинки бочковидной формы, крупные, около 5 мм дл., на ножках до 7 мм дл.; соцветие более или менее пирамидальное, довольно крупное; листья надрезаны на  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  ширины пластины на доли с острыми зубами, с обеих сторон или только снизу густовойлочные. Склоны у моря; в северной части области . . . 34. *A. koidzumii* Nakai, *A. samamita* Bess., p. r. — П. Койдзума.  
 — Корзинки мелкие, 3—4 мм дл.; ножки корзиночек короче . . . 37.  
 37. Листья надрезаны до половины пластины или несколько глубже, с округло-остроконечными зубцами, снизу и сверху войлочные; высота растения до 50 см; соцветия узкие, облистненные. Горные склоны близ моря . . . 35. *A. saligna* Kitam., *A. brachyloba* Kom., non Franch. — П. Сайто.  
 — Листья, по крайней мере средние, разделены на  $\frac{1}{4}$  ширины пластины на более или менее острые доли; верхние листья цельные, широкие, до 12—14 мм шир., с обеих сторон войлочные, позднее сверху иногда оголяющиеся; высота растения 1 м. Сухие луга . . . 39. *A. argy* Lévl. et Vaniot — П. Арген.  
 38 (от 35). Листья крупные, выемчато-лопастные, с крупнопильчатыми долями, снизу слабо войлочные, сверху волосистые, позднее оголяющиеся; высота растения 90—150 см. В лесах . . . 37. *A. stolonifera* Kom. — П. побегоносная.  
 — Листья мелкие и узкие, по краю остро- и крупнозубчатые, с цельнокрайними зубцами, снизу густовойлочные, сверху голые. Болота, сырые луга . . . 38. *A. integrifolia* L., *A. komarovii* Poljak. — П. цельнолистная.



1 — *Artemisia lagocephala* (Bess.) DC. (Полынь зайцеголовая): а — прикорневые листья, б — часть стебля с соцветиями, в — краевой цветок, г — серповидный цветок, д — листочки обвертки; 2 — *A. scoparia* Waldst. et Kit. (П. веерная); а — лист, б — часть стебля с соцветиями; 3 — *A. rubripes* Nakai (П. красочерешковая): а — лист, б — часть стебля с соцветиями; 4 — *A. integrifolia* L. (П. цельнолистная): а — лист, б — часть стебля с соцветиями.



1 — *Artemisia laciniata* Willd. (Полюнь рассеченная); 2 — *A. stelleriana* Bess. (П. Стеллера); 3 — *A. gmelinii* Web. (П. Гмелина); а — часть стебля с соцветиями, б — лист.



1 — *Artemisia maximovicziana* Krasch. ex Poljak. (Полюнь Максимовича); 2 — *A. sylvatica* Maxim. (П. лесная); а — часть стебля с листьями и соцветиями, б — лист.



Многолетник; цветет весной до появления листьев; корзинки одиночные; цветки золотисто-желтые; хохолок значительно длиннее семян; листья длинночерешковые, округло-сердцевидные, снизу беловолочные, сверху зеленые. Завосное; по канавкам и откосам; в окрестностях Владивостока . . . . . 1. *T. farfara* L. — М.-п-м. обыкновенная.

## Род 37. NARDOSMIA Cass. — НАРДОСМИЯ, БЕЛОКОПЫТИНИК

1. Листья очень крупные, пальчато надрезанные. По берегам рек и ручьев в лесу . . . . . 1. *N. palmata* (Ait.) Hook., *Petasites palmatus* A. Gray — Н. дальневосточная.
- Листья выемчато-остроугольные, почковидные, небольшие, 2—5 см дл. и 3—10 см шир. На гольцах и в горах по ключкам; в Амурской области . . . . . 2. *N. saxatilis* Turcz., *Petasites saxatilis* Kom. — Н. скальная.

## Род 38. ARNICA L. — АРНИКА

Стебель высокий (до 100 см), обычно голый или опушенный лишь под корзинкой; листья супротивные, сидячие, 5—15 см дл. и до 4 см шир., срастающиеся в короткое влагалище; корзинки одиночные или в щитковидном соцветии, до 30—35 мм в diam.; цветки светло-желтые; семена с хохолком. На горных склонах; близ устья Амура . . . 1. *A. sachalinensis* (Rgl.) A. Gray — А. сахалинская.

## Род 39. SASALIA L. — КАКАЛИЯ, ПЕДОСПЕЛКА

1. Черешки всех листьев к основанию сужены и не образуют ушков; средние стеблевые листья треугольно-копьевидные, с выгнутой средней лопастью и небольшими боковыми; обертки колокольчатые, из 8—10 листочков. Повсеместно в лесах . . . . . 1. *S. lasata* L. — К. концевидная.
- Черешки средних стеблевых листьев у основания расширены в стеблеобъемлющие ушья; обертки цилиндрические или колокольчато-цилиндрические, из 4—7 (8) листочков . . . . . 2. *S. komaroviana* (Pojark.) Pojark., *S. farfariifolia* auct., non Sieb. et Zucc. — К. Комарова.
2. Стебли до 2—3 м выс.; листья в общем очертании широкотреугольные или широко треугольно-копьевидные, с широкими боковыми лопастями и выгнутой, коротко заостренной к верхушке средней лопастью; корзинки собраны в крупную, сложную (с боковыми ветвями) метелку. В смешанных и хвойных лесах и по долинам горных рек и ручьев; на юге Приморья . . . . . 2. *S. komaroviana* (Pojark.) Pojark., *S. farfariifolia* auct., non Sieb. et Zucc. — К. Комарова.
- Стебли более низкие, от 0,3 до 1,5 м выс.; листья широкие, с боковыми лопастями, равными по длине срединной; общее соцветие в виде простой кисти или раскидистой метелки, на боковых ветвях которой корзинки собраны кистью . . . . . 3. *S. angustata* DC. — К. узкая.
3. Растение 30—100 см выс., с толстым стеблем и расставленными листьями, по краям с редкими, широкими, мелкими зубцами, резко заканчивающимися острием; корзинки собраны в виде простой кисти или в виде сжатой метелки с немногими короткими боковыми веточками. В долинных лесах, на лужайках или среди кустарников, на сырых местах; на севере Приморья и в Приамурье . . . . . 4. *S. angustata* DC. — К. узкая.
- Растение более крупное, с крупнозубчатыми листьями и соцветием в виде рыхлой, узкоцилиндрической метелки. По увлажненным местам в смешанных и хвойных лесах; по берегам рек и ручьев; на юге Приморья . . . . . 3. *S. praetermissa* (Pojark.) Pojark. — К. пропущенная.

## Род 40. SYNEILESIS Maxim. — СИНЕИЛЕЗИС

Стебель 70—150 см выс., тонкобороздчатый, пурпурный; стеблевых листьев 2, округлых в общем очертании и до основания разделенных на 7—9 долей, глубоко рассеченных на линейные доли, по краю с длинными зубцами; соцветие в виде крупного, плоского, сложного щитка. По сухим склонам, на лугах с песчаной почвой, в разреженных лесах, среди кустарников; в Приморье и на юге Приамурья . . . . . 1. *S. aconitifolia* Maxim., *Cacalia aconitifolia* Bge. — С. аконитовидный.

## Род 41. SENECIO L. — КРЕСТОВНИК


1. Растения многолетние . . . . . 3.
- Растения однолетние или двулетние . . . . . 2.
2. Растение железисто опушенное, мелкое, сильно ветвистое; листья простоперистые;



1 — *Senecio argutus* Turcz. (Крестовник аргусский): а — часть стебля с листьями, б — соцветия; 2 — *S. vulgaris* L. (К. обыкновенный), верхняя часть стебля с листьями; б — соцветия; 3 — *S. nemorensis* L. (К. дубравный), часть стебля с листьями; 4 — *S. amurensis* Schischk. (К. амурский): а — часть стебля с листьями, б — верхняя часть стебля с соцветиями; 5 — *S. flammeus* Turcz. (К. пламенный): а — часть стебля с соцветиями; б — верхняя часть стебля с соцветиями.



- корзинки 6—8 мм дл.; семянки голые. Около дорог в окрестностях Владивостока и близ ст. Приморской; заносное . . . . . 13. *S. viscosus* L. — К. липкий.
- Растение 15—50 см выс., опушено паутистыми редкими волосками; семянки плотно и прижато опушены; листья перистолопастные, с широкими зубчатыми лопастями, корзинки в густой, щитковидной метелке. По улицам, огородам и около населенных пунктов . . . . . 14. *S. vulgaris* L. — К. обыкновенный (табл. 184, 2).
- 3 (от 1). Обвертка двурядная, листочки ее от крупнозубчатых до дважды-трижды перистых . . . . . 4.
- Обвертка ошноридная, с цельными, мелкозубчатыми или цельнокрайними листочками . . . . . 9.
4. Листья цельные, по краям зубчатые, реже цельнокрайние . . . . . 5.
- Листья простоперистые, редко дигривидные . . . . . 7.
5. Листья при основании снабжены продолговатыми или полукруглыми ушками, по краю с вверх направленными зубцами, оттянутыми в острие; листья с нижней стороны по жилкам опушенные. В смешанных лесах и одишанках . . . . . 6. *S. litvinovii* Schischk., *S. otophorus* auct., non Wedd. — К. Литвинова.
- Листья без ушек, по краю с примостоящими зубцами, снизу обыкновенно голые; завязи и семянки голые . . . . . 6.
6. Семянки 6—7 мм дл., блестящие; листья сверху зеленые, снизу плотнопаутистые, опушенные, беловатые; при основании с мелкозубчатыми ушками; обертка широколопастчатая, 10—12 мм дл. и 20—25 мм шир.; цветет в июле. На берегу моря . . . . . 3. *S. pseudocornica* Less. — К. жезарниковый.
- Семянки 3—4,5 мм дл., матовые; листья с черешками (по крайней мере нижние), по краям с прямыми, мелкими зубцами; корзинки мелкие; обертка 5—8 мм дл. и 4—7 мм шир., с наружными листочками в числе 4—5, по длине одинаковыми с внутренними; цветоносы голые или паутистые. В смешанных лесах, на лугах, по окраинам болот и т. д. . . . . 4. *S. nemorensis* L. — К. дубравный (табл. 184, 3).
- 7 (от 4). Центральные семянки волосистые, краевые голые, без хохолка, который опадает; язычковые цветки в числе 12—30, 12—15 мм дл., вдвое длиннее обертки; корзинки крупные, вместе с язычковыми цветками 2—3 см в поперечнике; цветет в июле—августе. На влажных лугах, в лиственных лесах, на речных галечниках; в Амурской области . . . . . 1. *S. ambraceus* Turcz. — К. амбровый.
- Все семянки голые . . . . . 8.
8. Язычковые цветки в числе 5; семянки 5—6 мм дл.; листья перистонадрезанные, доли их с вверх направленными зубцами; растение крупное, 4—2 м выс.; цветет в июле. В кустарниках, прибрежных лесах, на заливных лугах . . . . . 5. *S. cannabifolius* Less., *S. palmatus* Pall. — К. коноплеолистный.
- Язычковые цветки в числе 10—15; листья продолговатые, 8—20 см дл., перистонадрезанные, с узкими долями, снизу зеленые; наружные листочки обертки линейные, в числе 10, значительно короче внутренних; язычковые цветки в числе 12, желтые; цветет в августе—сентябре. В кустарниках, по опушкам лесов, на лугах, в Приморье . . . . . 2. *S. argenteus* Turcz. — К. серебристый (табл. 184, 4).
- 9 (от 3). Стебель внутри полый, в верхней половине ветвистый, по всей длине густо покрыт оттопыренными железистыми волосками; язычковые цветки светло-желтые, многочисленные; хохолок во время цветения почти равен цветкам диска, при плодах сильно удлиняющийся. На берегах рек и по болотам . . . . . 7. *S. arcticus* Rupr. — К. арктический.
- Стебель внутри без полости, опушение иного характера; язычковые цветки от желтых до пурпурных, немногочисленные; хохолок при плодах не удлиняющийся . . . . . 10.
10. Язычковые цветки желтые, лимонно-желтые . . . . . 11.
- Язычковые цветки темно-пурпурные, линейные, 15—20 мм дл. и 1—2 мм шир.; цветет в июле. На сыроватых лугах . . . . . 12. *S. flammeus* Turcz. — К. пламенный (табл. 184, 5).
11. Прикорневые и нижние стеблевые листья округло-яйцевидные или широкояйцевидные, с крупными зубцами; соцветие зонтиковидное; корзинки на длинных цветоносах, 2,5—4 см дл.; листочки обертки темно-фиолетовые, с черной верхушкой; цветет в августе. На травянистых луговниках на высоте 1800—1900 м над ур. м.; на северо-востоке Сихотэ-Алине . . . . . 9. *S. sichotensis* Kom. — К. сихотэ-алинский.
- Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговатые, эллиптически, с мелкими, неясными зубцами или почти цельнокрайние . . . . . 12.
12. Семянки голые или почти голые . . . . . 13.
- Семянки опушенные, 2—2,5 мм дл.; листья и стебли с тонким, плотным, белым войлоком, по краям с остистыми, очень мелкими, черными зубцами; корзинки 3—10; цветет в июле—июле. На лугах и опушках . . . . . 8. *S. amurensis* Schischk., *S. campestris* auct., non DC. — К. амурский (табл. 184, 4).



1 — *Ligularia schmidtii* (Maxim.) Makino (Бузулыкин Шмидта); a — лист, стом, b — часть соцветия; 2 — *L. calthifolia* Maxim. (Б. калужникolistный); a — лист, стом, b — часть соцветия; 3 — *L. splendens* (Lévl. et Vaniot) Nakai (Б. великолепный), часть стебля с листьями.



13. Обвертка 4 мм дл. и 6 мм шир.; листочки обертки в числе 12, длинно заостренные, с оттянутой наружку черноватоокрашенной верхушкой. На приречных скалах и склонах; на северном Сихота-Алине . . . . . 10. *S. hieracifolius* Kom. — К. астрелиноидный.
- Обвертка 8–10 мм дл. и около 15 мм шир.; листочки обертки в числе 20–30, на верхушке, без черной окраски; стебель почти безлистный, 15–30 см выс.; в верхушке, без черной окраски; стебель почти безлистный, 15–30 см выс.; цветет в июле. В трещинах скал и на каменистых лугах; на юге Приморья (р. Сунан, п-ов Гамова) . . . . . 41. *S. subscaposus* Kom. — К. прикорневистый.

#### Род 42. LIGULARIA Cass. — БЪЗУДЬНИК

1. Голые, низкие растения с мясистыми листьями . . . . . 2.
- Растения более или менее опушенные, не низкие; листья не мясистые, при основании глубокосердцевидные или стреловидные . . . . . 3.
2. Листочки обертки сросшиеся; листья крупные, в основании слегка сердцевидные или тупые, по краю неясно выемчато-зубчатые; высота растения 1–3 м. Луга, кустарники; на юге . . . . . 9. *L. schmidtii* (Maxim.) Makino — Б. Шмидта (табл. 185, 1).
- Листочки обертки свободные; листья в клиновидных или округло-усеченным основанием; высота растения 50–100 см. Луга; в Амурской области (с. Константиновка) . . . . . 8. *L. mongolica* (Turcz.) DC. — Б. монгольская.
- 3 (от 1). Хохолок семянки снежно-белый; мощное растение 1–2 м выс., с очень крупными, почковидно-треугольными или треугольно-лицевидными листьями; соцветие 20–40 (50) см дл. Влажные луга; на юге . . . . . 7. *L. jaluensis* Kom. — Б. ялусский.
- Хохолок буроватый . . . . . 4.
4. Соцветие одно-пятикорзинчатое, более или менее пикувидное; корзинки на длинных ножках, в 2–3 раза превышающих обертку; растения 20–40 (50) см выс. . . . . 5.
- Соцветие многокорзинчатое, кистевидное, ножки корзинки не длинные или слегка длинные оберток, редко самые нижние в 2 раза длиннее оберток . . . . . 6.
5. Обвертки 1.5–2 см шир., снаружи более или менее железисто опушенные; корзинки с язычками, 6–7 см в поперечнике; листья плотные (жесткие), длина их обычно превышает ширину; цветет в августе. Высокогорья; Сихота-Алине . . . . . 1. *L. calthifolia* Maxim. — Б. калужинелистный (табл. 185, 2).
- Обвертки 1–1.5 см шир., без железистого опушения; корзинки с язычками, до 5 см в поперечнике; листья тонкие, мягкие, длина их много меньше ширины; цветет в июне. В лесах; в Хасанском районе . . . . . 10. *L. kaialpina* Nakai — Б. кайалпинский.

Возможно, наше растение относится к особому виду.

- 6 (от 4). Стеблевые листья без пластинок или почти без пластинок, реже в самом низу с пластинкой; листья в прикорневой розетке, плотные (жесткие), прижатые к почве; высота растения 50–70 см. В светлых лесах у морского побережья; Советская Гавань . . . . . 5. *L. sichotensis* Pojark. — Б. сихоталинский.
- Стебель облиственный; листья не прижаты к почве . . . . . 7.
7. Листочки оберток голые, лишь верхушки их шероховатые; стебли, кроме самого верха, голые; прицветники все или почти все широкие, яйцевидно-ланцетные . . . . . 8.
- Листочки оберток, как и всей длине волосистые . . . . . 9.
8. Ножки, по крайней мере у нижних корзинков, перелетающимися волосками; обертка 10–13 мм дл.; прицветники в большей части соцветия широкие; высота растения 80–150 см. Кустарники, влажные луга; по Амуре и у оз. Ханка . . . . . 2. *L. fischeri* (Ldb.) Turcz. — *L. vesicosa* Fisch. et Mey. — Б. Финшера.
- Стебель (кроме верхней части) голый; обертка 7–10 мм дл.; прицветники только внизу соцветия широкие, выше узкие, шпильчато-ланцетные или линейные; высота растения 100–150 см. Влажные луга, кустарники; близ моря . . . . . 4. *L. sachalinensis* Nakai — Б. сахалинский.


В Амурской области может встретиться *L. sibirica* (L.) Cass., у которой ширина листьев превышает длину.

- Ножки корзинков обычно короче оберток; листья до 15 см шир. и больше; высота растения 60–150 см. Сырые луга, кустарники; на юге . . . . . 3. *L. splendens* (Lévl. et Vaniot) Nakai — Б. великолепный (табл. 185, 3).
- 9 (от 7). Стебель от самого низа опушенный буроватыми, перелетающимися волосками; обертка 10–13 мм дл.; прицветники в большей части соцветия широкие; высота растения 80–150 см. Кустарники, влажные луга; по Амуре и у оз. Ханка . . . . . 2. *L. fischeri* (Ldb.) Turcz. — *L. vesicosa* Fisch. et Mey. — Б. Финшера.
- Стебель (кроме верхней части) голый; обертка 7–10 мм дл.; прицветники только внизу соцветия широкие, выше узкие, шпильчато-ланцетные или линейные; высота растения 100–150 см. Влажные луга, кустарники; близ моря . . . . . 4. *L. sachalinensis* Nakai — Б. сахалинский.

#### Род 43. ECHINOPS L. — МОРДОВНИК

- Сухие склоны, степные луга; в юго-западной части области . . . . . 1. *E. dissectus* Kitag., *E. gmelinii* auct., non Turcz., *E. latifolius* auct., non Tausch — М. рассеченный.

Таблица 186



1 — *Atractylodes ovata* (Thunb.) DC. var. *pinnatifida* Kom. (Атрактилодес овальный перистый); а — верхняя часть стебля с соцветиями, б — часть стебля с листьями; 2 — *A. o. var. ternata* Kom. (А. о. тройчатый), часть стебля с листьями.

#### Род 44. ATRACTYLODES L. — АТРАКТИЛОДЕС

Стебель прямой, голый; листья черешковые, кожистые, щетинисто-пильчатые, блестящие, простые или перистораздельные; корзинки с зеленой многократной оберткой и часто окружены листьями; цветки белые. Воду; в дубняках на сухих склонах . . . . . 1. *A. ovata* Thunb. — А. овальный, Серпуха белая.



В. Л. Комаров приводит следующие разновидности:

а) С простыми листьями.

1. *A. o. var. simplicifolia* Loes. — *A. o.* простой, листья сидячие, прижаты к стеблю.
2. *A. o. var. amurensis* Freyn — *A. o.* амурский, листья черешковые, горизонтально отклоняющиеся.
- б) С перистораздельными листьями.
3. *A. o. var. ternata* Kom. — *A. o.* тройчатый (табл. 186, 2), листья тройчатые.
4. *A. o. var. pinnatifida* Kom. — *A. o.* перистый (табл. 186, 1), листья с 5—7 листочками.

Наиболее часто встречается разновидность с тройчатыми листьями — *A. o. var. ternata* Kom.

#### Род 45. ARCTIUM L. — ЛОПУХ

1. Все растение голое; листья очень крупные. Сорное; у населенных мест, иногда на галечниках; часто . . . . . 1. *A. lappa* L. — Л. крупный.
- Листья снизу и корзинки паутинисто-войлочные. Сорное; нередко . . . . . 2. *A. tomentosum* Mill. — Л. войлочный.

#### Род 46. SAUSSUREA DC. — СОСЮРЕЯ

1. Растения голые или более или менее опушенные, у некоторых видов нижняя сторона листьев с густым белым опушением, но сверху листья голые или паутинисто-сероватые . . . . . 2.
- Все растения густо-беловатовойлочные; стебли 25—60 см выс.; корзинки довольно многочисленные (10—13), в тесном сложном щитке, крупные, около 2 см дл.; цветки розовые. На гольцах; Сихотэ-Алинь . . . . . 5. *S. sovietica* Kom. — С. советская.
2. Листья цельнокрайные, зубчатые, пальчатые или же неглубоко выемчато-зубчатые . . . . . 3.
- Все листья или же только нижние и средние глубоко перистораздельные, перисто-надрезанные, выемчато-лопастные или глубоковыемчатые, верхние или самые верхние листья могут быть с неглубокими выемками или даже почти цельнокрайные . . . . . 19.
3. Листья снизу серовато- или беловойлочные . . . . . 4.
- Листья не бывают серовато- или беловойлочными . . . . . 9.
4. Все листья с клиновидным или почти клиновидным основанием . . . . . 5.
- Листья с почти сердцевидным или слегка копьевидным основанием (кроме самых верхних) . . . . . 7.
5. Стебли 30—120 см выс., прикорневые листья крупнозубчатые, стеблевые почти цельнокрайные, снизу обычно беловойлочные, реже сероватые, сверху блестящие, часто по краю слегка завернутые; корзинки более или менее многочисленные, чаще собраны в метельчатый циток. На сырых лугах; часто . . . . . 10. *S. amurensis* Turcz. — С. амурская (табл. 187, 1).
- Стебли более низкие, 10—15 (25) см выс.; листья цельнокрайные, слегка зубчатые, или же неравно острозубчатые; корзинки одиночные или немногочисленные, в верхушечном щитке. Растения гольцовые . . . . . 6.
6. Стебель 15—20 (25) см выс., с 1, реже с 2 корзинками; прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые, (3) 5.5—12 см дл. и 1—2 см шир., снизу серовато- или беловатовойлочные, сверху паутинистые или почти голые, корзинки до 2—2.5 см в поперечнике; цветки розово-фиолетовые. На гольцах; Сихотэ-Алинь и Дуссе-Алинь . . . . . 2. *S. japonica* Kom. — С. войлочная.
- Стебли 10—18 (20) см выс., с несколькими корзинками; корзинки 10—12 см шир., в верхушечном щитке; цветки темно-фиолетовые; листья сверху темно-зеленые, почти голые или с точечными железками, снизу беловатовойлочные, ланцетные или продолговатоланцетные, до 6 см дл. и 1.5—2 см шир., прикорневые и в нижней половине стебля на щитках, до 2—2.5 см дл., верхние сидячие. На гольцах; Дуссе-Алинь . . . . . 20. *S. soczavae* Lipsch. — С. Сочавы.
- 7 (от 4). Стебель высокий, 90—120 см; нижние листья очень крупные, длинночерешковые, длина листового пластинки до 18 см, ширина 9—11 см, основание почти сердцевидное; сверху листья почти голые или с короткими, рассеянными, торсицистыми волосками, снизу густо паутинисто-войлочные; соцветие метельчатое, из отдельных цитков; корзинки 1.5—2 см дл. и 0.7—1 см шир. Среди кустарниковых зарослей и по опушкам лиственных лесов; пока известна только на Амуре (села Сутар, Помнеевка) . . . . . 6. *S. splendida* Kom. — С. блестящая.
- Стебель менее высокий, 8—50 (60) см; листья меньших размеров . . . . . 8.
8. Стебель 8—15 (20) см выс.; корзинки одиночные (очень редко стебель ветвится и тогда корзинки 2), крупные, 2—2.5 см дл. и 0.8—1.1 см шир.; листья черешковые, с сердцевидным основанием, снизу густо-беловойлочные, сверху вой-



1 — *Saussurea amurensis* Turcz. (Сосюрея амурская): а — часть стебля с листьями, б — верхняя часть стебля с соцветиями; 2 — *S. subtriangulata* Kom. (С. почти треугольная): а — часть стебля с листьями, б — часть стебля с соцветиями; 3 — *S. grandifolia* Maxim. (С. крупнолистная): а — лист, б — верхняя часть стебля с соцветиями; 4 — *S. recurvata* (Maxim.) Lipsch. (С. отвороченная): а — лист, б — соцветия.



- лочно-пупчатые, под осями почти . . . . . 1. *S. porcelleana* Lipsch. — С. жемчужная, Аляска . . . . . 2. Стебли более высокие, 30—50 см; корзинки мелкие, в скатях щитках, 4—10 мм дл.; листья черешковые, пупсы пупнисто-волочные, сверху сильно шероховатые, жесткие. На известковых скалах; на юге Приморья . . . . . 8. *S. ussuriensis* Maxim. var. *firmifolia* Lipsch. — С. уссурийская . . . . . 9 (от 3). Стебли крылатые . . . . . 10. Стебли бескрылые . . . . . 11. Листья неравнозубчатые . . . . . 12. Листья остроколюче-зубчато-пильчатые, снизу сизые или сизоватые, сверху зеленые, чаще толще или с редкими, рассеянными, ворсинчатыми волосками; корзинки многочисленные, мелкие, 1—1,2 см дл. и 0,4—0,5 см шир.; цветки пурпурные или бледно-пурпурные. По долинам горных рек и ключей . . . . . 19. *S. neoeserrata* Nakai . . . . . 20. Листья сверху темно-зеленые, с курчавыми волосками; цветоносы светлые, с хорошо заметной средней жилкой, опушенные только по жилкам бурыми волосками; корзинки до 2 см дл. и 1—1,2 см шир.; цветки темно-фиолетовые. В смешанных хвойных и лиственных лесах на болотистых, часто минеральных участках . . . . . 12. *S. umbrosa* Kom., *S. karoi* Frey . . . . . 21. Листья сверху зеленые, слабо опушенные, снизу пупнисто опушенные, с мелкими, блестящими, сидячими железками; соцветие — многокорозное метелка; корзинки мелкие; цветки розовые или пурпурные. В лесах, среди кустарниковых зарослей и на лугах; по Амуру и в северном Сихота-Алине . . . . . 9 (от 9). Прикорневые листья с округлым или клиновидным основанием, снизу со слабым пупнистым седловатым опушением; стебли с 1 корзинкой, низкие, 4,5—7 см выс. Горы Сихота-Аляска . . . . . 4. *S. kitamurana* Miyabe et Tatewaki — С. Китамуры . . . . . 22. Основания прикорневых листьев более или менее сердцевидные или усеченные; стебли более высокие, обычно с несколькими корзинками. Растения лесов, кустарниковых зарослей и на лугах; по Амуру и в северном Сихота-Алине . . . . . 23. Пластинки длинных листьев удлиненно-треугольные, треугольно-копьевидные, удлиненно-копьевидные или дельтовидные . . . . . 14. Пластинки листьев иной формы . . . . . 15. Корзинки на длинных ножках, колокольчатые, 1,5—2,5 см дл. и 1,5 (2) см шир.; листочки обертки с тонкими, 1—1,2 см дл., отогнутыми, остроколючими придатками. В хвойных и смешанных лесах . . . . . 15. *S. subtriangulata* Kom. — С. почти треугольная (табл. 187, 2). Корзинки почти до 1 см дл. и 1 см шир., округлые; листочки обертки без придатков. В лиственных и хвойных лесах, в дуплах близ моря; преимущественно в северной части Приморья и Приморью . . . . . 17. *S. triangulata* Trautv. et Mey. — С. треугольная. 15 (от 13). Листья зубчато-пильчатые, прикирпневые, нижние и средние длинночерешковые (длина черешка от 1/4 до 1/2 длины пластинки или даже почти равна пластинке) . . . . . 16. Листья зубчатые или глубоко выемчато-зубчатые; листовые черешки относительно более короткие . . . . . 16. Листья с длинными, отогнутыми остриями, чаще жесткие, сверху темно-зеленые, снизу более сизые, с обеих сторон опушенные, шероховатые, более или менее глубоко сердцевидные или усеченные; корзинки до 2 см дл. и 1,2—1,4 см шир.; листочки обертки пяти-семиразные, многочисленные, с черноватыми, короткими, хорошо заметными остриями. В широколиственных и смешанных лесах и среди кустарников; часто . . . . . 13. *S. grandifolia* Maxim. — С. крупнолистная (табл. 187, 3). Листья короткоостроколючие, обычно мягкие (иногда жесткие); корзинки мелкие, около 1 см дл. и до 0,5 см шир.; листочки обертки пяти-семиразные, многочисленные, коротко заостренные. В еловых лесах, по ключам и на скальных обрывах; пока найдена только в южном Сихота-Алине (горы Дзедолаа и Облчанка) . . . . . 14. *S. petiolata* Kom. — С. черешковая.

424


и каменноберезовых лесах, по ключам и скалам

9. Корзинки довольно крупные, до 1,8—2 см дл., около 1 см шир.; обертка с плотно прижатыми наружу, гладкими или слегка бугорчатыми листочками, часто темно-окрашенными; листья яйцевидно-продолговатые или овальные, плотные, неглубоко крупнозубчатые. На сухих дутах, скалах и среди кустарников . . . . . 7. S. recurvata (Maxim.) Lipsch. — С. отторчающаяся (табл. 187, 4).
- Вид, очень близкий к S. elongata DC., находящиеся которой вполне возможны в западных районах Амурской области. У S. elongata DC. листочки обертки без загнутых наружку краев.
- Корзинки более мелкие, до 1—1,2 (1,5) см дл. и 6—8 мм шир.; обертка с плотно прижатыми (не отогнутыми наруку), часто мушкетирообразными листочками, иногда различной формы; от продолговато-яйцевидных до загибчатых или (самыми верхними) линейно-ланцетных, более или менее зубчатых; нижние у основания часто выемчато-зубчатые. На сухих дутах, скалах и среди остатков леса . . . . . 8. S. ussuriensis Maxim. — С. уссурийская.
- 19 (от 2). Нижние листья перистые, перистораздельные, глубоко перистеросеченные или лировидно перистеросеченные, перистонадрезанные . . . . . 20.
- Нижние листья выемчато-лопастные или губовкочеваемые . . . . . 27.
20. Листочки обертки с крупными, пленчатыми, округлыми, розово-фиолетовыми прицветниками; листовые пластинки перисто раздельные . . . . . 21.
- Листочки обертки без пластинок окучкованных чешуек; нижние чаще глубоководы перистеросеченные, лировидно расщепленные или перисто надрезанные . . . . . 23.
21. Стебель крылатый, очень высокий, до 150 (180) см выс.; прикорневые и нижние стеблевые листья перисто раздельные, средние стеблевые перисто надрезанные, а самые верхние почти цельные; корзинки с густонадутьным опушением. На дутах и у приморских скал . . . . . 22. S. neopulchella Lipsch. S. japonica aust., non Thunb., S. japonica var. alata Kom., non Rgl. — С. японская.
- Стебель обычно бескрылый, бороздчато-угловатый (реже крылатым), . . . . . 25.
- 100 (120) см выс.; корзинки больше или почти равны по диаметру . . . . .
22. Все листья перистые, жесткие, тертые или шероховатые (с многощетинными очень мелкими щипчиками и железками) . . . . . 21. S. pulchella Fisch. — С. хорошеюкая.
- Нижние листья перистые, а средние и верхние целые или же по краю зубчатые, более мягкие . . . . .
- 21а. S. pulchella var. subintegra Rgl. — С. хорошеюкая голуючиелостная.
- 23 (от 20). Прикорневые листья лировидно перистеросеченные, пальчатоперистые (или до средней жилки) перистеросеченные, средние перисто раздельные, более или менее выемчатые, гребенивидноперистые, пестиковые . . . . . 24.
- Прикорневые и нижние стеблевые листья ланцетные, более или менее глубоко перистоили округлающемятемы, перисто надрезанные или перистеросеченные . . . . . 26.
24. Листочки обертки с длинными, тупыми, гребенчато-зубчатыми, прямыми или отогнутымнаруку издатками; листья глубоко перистеросеченные (почти до срединнойжилки); с многочисленными боковыми парами долей. На сухих дутах,нейжилки). В кустиках, в дубняках, а также у скал . . . . . 1. S. odontolepis Sch. Bip. — С. зубчатогопейная.
- . . . . . 25.
- Листочки обертки без травнистых приростков; обертка узкотрубчатая.
25. Листочки обертки прямые, с очень коротким острием; обертка узкотрубчатая,прикорневые и нижние стеблевые листья лировидно перистеросеченные,более или менее широколанцетные, по краю мелкозазубчатые, верхнюю лопасть с 4—6 парамиибоковых волосков, черные. На сырых и сухих дутах, в кустикахиногда всреди лесов, преимущественно на юге Примория . . . . . 8. S. Максимовича.
- . . . . . 9. S. Максимовичii Herd. — С. Максимовичова.
- Листочки обертки отогнуты наруку, обертка продолговатая; прикорневые и нижние стеблевые листья средние или глубоко перистеросеченные. На сухих дутах и среди кустарников . . . . . 7. S. recurvata (Maxim.) Lipsch., S. polypodiifolia Kom., non DC. — С. отторчающаяся.
- 26 (от 23). Листья перисто надрезаны. Листочки ланцетные, плоскими зубчатыми. . . . . riensis Maxim. var. pinnatifida Maxim. — С. уссурийская перисто надрезанная.
- Листья выемчато-лопастные; лопасти листа нервные, с уссурийскими разрезами. . . . . 8. S. ussuriensis var. incisae Maxim. — С. уссурийские разрезы.
- Листочки более или менее плотные (часто жесткие), с различной величиною . . . . . 8. S. ussuriensis var. incisae Maxim. — С. уссурийские разрезы.
- 27 (от 19). Листья тонкие; корзинки на коротких, 1—1,5 (2) см, цветоносных ветвях . . . . . 8. S. ussuriensis var. incisae Maxim. — С. уссурийские разрезы.
- Ковьох зарослях и на скалах . . . . . 8. S. ussuriensis var. incisae Maxim. — С. уссурийские разрезы.
- Листья тонкие, с каждой стороны с 2—4 округлыми, более или менее одинаковыми, глубокими выемками; корзинка на очень длинных, 4—6 (7) см, цветоносах . . . . . 16. S. sinuata Kom. — С. выемчатая.
- Преимущественно в хвойных лесах . . . . .
- 425



1. Стебель с зубчатыми, почти сплошными, колючими крыльями; корзинки с линейно-шиловидными листочками обвертки; листья снизу сероватоволочные. По долинам рек, среди кустарников, по ж.-д. насыпям и у дорог часто . . . . .  
 . . . . . 1. *C. crispus* L. — Ч. курчавый (табл. 188, 1).

Таблица 188



1 — *Carduus crispus* L. (Чертополох курчавый): а — часть стебля, б — лист, в — верхняя часть стебля с листьями и соцветиями; 2 — *C. acanthoides* L. (Ч. шиповатый): а — часть стебля, б — лист.

- Крылья на стебле прерывистые, с более крупными колючками; корзинки более крупные; листочки обвертки треугольные, с длинным шипиком; листья снизу без опушения; все растение очень колючее. Замосское, по галечникам р. Судзухе (села Лазо, Кипиневка, Белевское), на ст. Кангауз и во Владивостоке . . . . .  
 . . . . . 2. *C. acanthoides* L. — Ч. шиповатый (табл. 188, 2).

Род 48. *CIRSIIUM* MILL. — БОДЯК

1. Листья перистонадрезанные или крупно выемчато-зубчатые . . . . . 2.  
 — Листья с пальчато-зубчатыми или крупно выемчато-зубчатыми краями . . . . . 5.  
 2. Листья крупнозубчатые (шишки с 4—5 зубцами с каждой стороны, верхушка с 1—2 малоаметными зубцами); корзинки прямостоячие, с почти бокальчатой обверткой, сравнительно небольшие (около 1 см в diam.); цветки розовые, трубка венчика значительно длиннее отгиба. Сорное; в посевах, на заделах и у дорог . . . . .  
 . . . . . 1. *C. setosum* (Willd.) M. B. — Б. щетинистый.



1 — *Cirsium pendulum* Fisch. (Бодяк поникающий), часть стебля с листом; 2 — *C. lasiocarpum* Fisch. (Б. Власова): а — часть стебля с листьями и соцветиями, б — лист.



- Листья перистонадрезанные или перисторассеченные; корзинки более крупные (1,5—3 см в диам.) . . . . . 3.
- 3. Листья с более или менее стеблеобъемлющим основанием; корзинки прямостоячие или слабо поникающие; трубка венчика такой же длины, как и отгиб . . . . . 4.
- Листья без стеблеобъемлющего основания; корзинки сильно поникающие; трубка венчика в 3 раза длиннее отгиба. Часто; по рекам в уреме и на галечниках, а также у дорог и по сорным местам . . . . . 2. *C. repens* Fisch. — *В. поникающий* (табл. 189, 7).
- 4. Цветовозжки густо опушенные (до беловоидных); чешуи обертки с клейкой полоской на спинке; венчики яркие, фиолетово-пурпурные. На сухих лугах и среди кустарников . . . . . 3. *C. maackii* Maxim. — *В. Маака*.
- Цветовозжки голые или немного паутинистые, клейкой полоски на чешуях обертки нет; цветки пурпурные. В лесах и на лесных джунглях в горах . . . . . 4. *C. schantarense* Trautv. et Mey. — *В. шантарский*.
- 5 (от 1). Листья снизу беловоидные; цветки розовые, корзинки по окружности листьями. На лугах, чаще среди кустарников; часто . . . . . 5. *C. vlassovianum* Fisch. — *В. Власова* (табл. 189, 2).
- Листья снизу серые, паутинистые; цветки белые, корзинки окружены превышающими их листьями. На сухих лугах, среди кустарниковых зарослей; только в Приморье (Хасанский, Лазовский и Ольгинский районы) . . . . . 6. *C. coryleorum* Kom. — *В. орешниковый*.

Род 49. *SERRATULA* L. — СЕРПУХА

- 1. Внутренние чешуи буршерстистой обертки длинноостроконечные; цветет в августе. В редких смешанных лесах . . . . . 1. *S. coronata* L. — *С. венечная*.
- Внутренние чешуи обертки с сухими, закругленными или заостренными придатками. По сухим каменистым склонам . . . . . 2. *S. komarovii* Hjin — *С. Комарова*.

Род 50. *SYNURUS* Hjin — СРОСТНОХВОСТНИК, СИНУРУС

Корневище короткое, толстое; стебель около 1 м выс., тонкопаутинисто-шерстистый, поникающе ветвистый; все листья яйцевидные, черешковые, нижние лопастно-зубчатые, верхние цельнокрайные; корзинки на концах длинных ветвей, поникающие; листочки обертки трехгранно-ланцетные, колючие, паутинистые; цветки темно-фиолетовые. В смешанных лесах и на опушках . . . . . 1. *S. deltoides* (Ait.) Nakai, *Serratula atriplicifolia* Benth. et Hook. — *С. дельтовидный*.

Род 51. *RHARONTICUM* DC. — РАПОНТИКУМ

Корзинка крупная, одиночная, 4—6 см в диам., полушаровидная; листики обертки голые, с колючим, ложковидным, тупым придатком, закрывающим основание листочка; венчики темно-розовые; стебель и листья паутинисто-войлочные. На сухих открытых каменистых склонах . . . . . 1. *Rh. uniflorum* (L.) DC., *Rh. satzyperokii* Sosk. — *Р. одноцветковый*.

Род 52. *CENTAUREA* L. — ВАСИЛЕК

- 1. Венчик краевых цветков синий или голубой, а у срединных сине-фиолетовый или фиолетово-лиловый; семянка 3—4 (4,5) мм дл. и 1,5—1,8 мм шир.; хохолок 3—3,5 мм дл. Культивируется в садах, изредка дичает и встречается по сорным местам и у дорог . . . . . 1. *C. cyanus* L. — *В. синий*.
- Все цветки розовые или фиолетово-пурпурные . . . . . 2.
- 2. Цветки розовые; листочки обертки с черно-бурыми или почти черными, по краю ресничатыми, колючими придатками; хохолок 4—5 мм дл.; листья перисто-раздельные или перистолопастные. Запасное; по дорогам и ж.-д. насыпям; окрестности Владивостока, Шкотовский район, окрестности Имана . . . . . 2. *C. scabiosa* L. — *В. скабиозный*.
- Цветки лилово-пурпурные; листочки обертки со светлыми, бахромчато-зубчатыми придатками; хохолок нет; стеблевые листья эллиптические или яйцевидно-ланцетные, цельнокрайные или расставленно зубчатые. Запасное; по ж.-д. насыпям; близ Уссурийска и Владивостока . . . . . 3. *C. jacea* L. — *В. луговой*.

Род 53. *LEIBNITZIA* Cass. — ЛЕЙБНИЦИЯ

Цветовосы в числе 1—5, бесцветные, с маленькими ланцетными прицветничками, корзинка одиночная, с беловатыми или розоватыми цветками; листья в прикорневой розетке, покрыты белым войлоком; цветет в апреле (*f. vernalis* Turcz.)



1 — *Scoroneria albicaulis* Bge. (Козелец белостебельный); а — верхняя часть стебля с соцветиями, б — лист; 2 — *S. radiata* Fisch. (К. лучистый); 3 — *Lactuca repens* (L.) Maxim. (Латук ползучий).

бело-розоватыми цветками с цветоносами 10—20 см дл. и в сентябре (*L. autumnalis* Turcz.) с более высокими цветоносами, 20—40 см дл., и скрытыми цветками, как бы сразу плодоссеющими. На сухих склонах среди кустарников . . . . .  
1. *L. anandria* (L.) Turcz., *Gerbera anandria* Sch. Bip. — Л. бестычиночная.

# Род 54. CICHORIUM L. — ЦИКОРИЙ

Многолетник с голыми, жесткими, растопыренными стеблями, 40—80 см выс.; прикорневые стеблевые листья струговидно перисторассеченные, стеблевые яйцевидные, стеблеохватывающие, слегка зубчатые; корзинки сидят в пазухах верхних листьев; язычковые цветки сине-голубые, длиннее обертки (до 20 мм). В посевах, на залежах, пустырях, около дорог . . . . .  
1. *C. intybus* L. — Ц. шутритрубчатый.

# Род 55. ASHYROPHORUS Scop. — ПРОЗАННИК

Многолетник; стебель 30—60 см выс., с 5—6 стеблеобъемлющими листьями, продолговатыми или овальными, неправильно мелко- и редкозубчатыми, снизу по главной жилке с жесткими волосками; корзинка одиночная, конечная, крупная, с ярко-оранжевыми цветками; цветет в июле. На сухих долинах дугах и среди редких кустарников . . . . .  
1. *A. ciliatus* (Thunb.) Sch. Bip., *Hypochaeris grandiflora* Ldb. — П. реснитчатый.

# Род 56. PICRIS L. — ГОРЧАК

Двулетник; стебель до 1 м выс.; на стебле и листьях имеются якоревидные черные волоски (живые листья легко пристаю к одежде); листья сидячие, неясно зубчатые, продолговатые; корзинки до 1 см в диам., в редкой щитковидной метелке; цветки ярко-желтые. На сухих дугах и среди кустарниковых зарослей . . . . .  
1. *P. koreana* (Kitam.) Worosch. — Г. корейский.

# Род 57. LEONTODON L. — КУЛЬБАБА


Многолетник с прикорневыми линейно-ланцетными или узкопродолговатыми, выемчато-перисто-зубчатыми листьями; стебли 20—50 см выс., без листьев, с 3—5 корзинками; цветки желтые; семянки с коротким носиком; летучка перистая. Заносное; у населенных пунктов и дорог; Владивосток, Уссурийск . . . . .  
1. *L. autumnale* L. — К. осенняя.

# Род 58. SCORZONERA L. — РОЗЕЛЕЦ

1. Стебель до 1 м выс., одиночный, высокий, облиственный; корзинки в зонтикообразном соцветии; семянки с длинным носиком. На сухих дугах . . . . .  
1. *S. albicaulis* Bge. — К. белосебелый (табл. 190, 1).
- Стебель низкий, с 1 маленьким линейным листом; корзинка одиночная, крупная; семянки без носика; листья в прикорневых пучках. На сухих скалистых склонах; на севере Приморья и по Амуру . . . . .  
2. *S. radiata* Fisch. — К. лучистый (табл. 190, 2).

# Род 59. TARAXACUM Wigg. — ОДУВАНЧИК

1. Цветки беловатые, снаружи красновато-фиолетовые; листья струговидно раздельные; все растение шерстистое, позднее отчасти оголяющееся. Луга; в Хасанском районе . . . . .  
1. *T. coreanum* Nakai — О. корейский.
2. Наружные листочки обертки много уже внутренних, отворочены вниз, все без рожек на конце; голое или почти голое растение. Заносное; у селений . . . . .  
2. *T. officinale* Web. 7. *T. vulgare* Schrank — О. аптечный.
- Наружные листочки обертки шире внутренних, прижаты к внутренним или отстоящие . . . . .  
3.
3. Наружные листочки обертки вниз отогнутые, с небольшими рожками или почти без рожек, внутренние без рожек, 10—17 мм дл.; листья струговидно раздельные или рассечены на узкие, тонкозубчатые доли, с многочисленными про- . . . . .  
3. *T. multisectum* Kitam. — О. много рассеченный.
- Наружные листочки обертки прижаты к внутренним . . . . .  
4.



1 — *Lactuca triangulata* Maxim. (Ларук треугольный); а — лист, б — семянка; 2 — *L. raddeana* Maxim. (Л. Радде); а — часть стебля с листьями, б — семянка; 3 — *L. raddeana* Maxim. (Л. Радде); а — часть стебля с листьями, б — семянка; 4 — *L. denticulata* (Houtt.) Maxim. (Л. мелкозубчатый), лист.



4. Обертка 22—25 мм дл.; крупный опушечник с листьями около 25 см дл., 6 см шир. и стрелкой 30—40 см выс.; листочки обертки с рожками, внутренние с более крупными. У дорог; верхнее течение р. Б. Зыбуга . . . . . 4. *T. brassicifolium* Kitam. — *O. капустилистный*.
- Обертки 15—17 мм дл.; менее крупные растения . . . . . 5.
5. Листочки обертки без рожек; листья очень разные на одном растении, от почти цельнокрайних, до перистораздельных, с небольшой тупой конечной долей. Луга и сорное; р. Сунутника, с. Хаган . . . . . 5. *T. ussuriense* Kom. — *O. уссурийский*.
- Листочки обертки с рожками . . . . . 6.
6. Наружные листочки обертки с более крупными рожками, чем внутренне, последние иногда без рожек; листья струговидно раздельные, с довольно крупной конечной долей. Луга, склоны, сорное; часто . . . . . 6. *T. mongolicum* Hand.-Mazz. — *O. монгольский*.
- Рожки на внутренних листочках обертки крупнее, чем на наружных; листья по краям зубчатые или лопастные, иногда почти раздельные. Нижний Амур . . . . . 7. *T. ceratophorum* (Ldb.) DC. — *O. рогапошный*.

Род 60. *MULGEDIUM* L. — МОЛОКАН


Стебли голые, до 1 м выс.; листья цельные, зубчатые или лопастные; цветки синие. Одно из обычных растений ивняков и полных зарослей в долинах рек . . . . . 1. *M. sibiricum* (L.) Less. — *M. сибирский*.

Род 61. *SONCHUS* L. — ОКОТ

1. Одволетники; корзинки небольшие, обертка около 1 см шир. . . . . 2.
- Многолетники; корзинки крупные, обертка 2—2,5 см шир. . . . . 3.
2. Листья жестковатые, цельные, по краю мелкозубчатые, в основании с округлыми ушками; высота растения 40—60 см . . . . . 1. *S. asper* (L.) Hill. — *O. жесткий*.
- Листья мягкие, струговидно перистораздельные или надрезанные, с крупной треугольной конечной долей, по краю остроколючезубчатые, в основании с острыми ушками; высота растения 50—80 см. Сорное . . . . . 2. *S. oleraceus* L. — *O. огородный*.
- 3 (от 1). Листья струговидно перистонадрезанные, при основании с довольно крупными, стеблеобъемлющими, зубчатыми ушками; высота растения 50—100 см. Заносное . . . . . 3. *S. arvensis* L. — *O. полевой*.
- Листья цельные, по краю мелкозубчатые или почти цельнокрайние, при основании с небольшими полустеблеобъемлющими, цельнокрайними ушками; высота растения 40—80 см. Посевы, обгаженные склоны, пустыри . . . . . 4. *S. brachyotus* DC. — *O. короткоушковый*.

Род 62. *LACTUCA* L. — ЛАТУК

1. Растение с длинными, ползучими побегами; листья широкие, тройчато- или пальчатораздельные или надрезанные, с лопастными или цельными, по краю иногда мелкозубчатыми долями; корзинки довольно крупные; обертки 5—7 мм шир.; высота растения 5—10 см. Приморские пески . . . . . 1. *L. repens* (L.) Maxim. — *L. ползучий* (табл. 190, 3).
- Растения с прямостоячим стеблем, без ползучих побегов . . . . . 2.
2. Обертки черешчатые . . . . . 3.
- Обертки двурядные . . . . . 5.
3. Листья цельные, треугольные, с прямым или слегка сердцевидным основанием, по краю выемчато-зубчатым; верхние в основании клиновидные; семянка с коротким носиком и 1 выдающимся ребром с каждой стороны; высота растения 50—120 см. Пески . . . . . 2. *L. triangulata* Maxim. — *L. треугольный* (табл. 191, 1).
- Листья, хотя бы некоторые, струговидно раздельные или надрезанные, а если все цельные, то линейные или продолговато-линейные . . . . . 4.
4. У струговидных листьев конечная доля крупная, треугольно-йцевидная, выемчато-зубчатая; семянка с коротким носиком и несколькими сильными ребрами с каждой стороны; высота растения 60—120 см. Кустарники, луга . . . . . 3. *L. ridgwayi* Maxim. — *L. Ридгея* (табл. 191, 2).
- У обычных форм листья струговидно раздельные, у них конечная доля линейная или ланцетная, цельнокрайняя; есть форма только с цельными, линейными, цельнокрайними листьями; семянка с длинным носиком и 1 выдающимся ребром с каждой стороны. Кустарники, у дорог, на пустырях . . . . . 4. *L. squarrosa* (Thunb.) Miq. — *L. располыренный*.
- 5 (от 2). Растение с прикорневыми ланцетными или линейными листьями; стебель ветвистый обычно в верхней половине, 20—40 см выс.; цветки от желтоватых



*Hieracium coreanum* Nakai (Истремник корейский): а — язычковый цветок, б — семянка.



- до лиственных; семка с длинным носиком. Сухие дуба, берега рек, сорное . . . 1. разноцветный (табл. 191, 3).
5. *L. versicolor* (Fisch.) Sch. Bip. ex Herd. — *L. разноцветный* (табл. 191, 3).
- Растения без прикорневых листьев; цветки желтые, по форме напоминают листья чистотела; нежно; от основания ветвистое сопло; в Хасанском районе . . . 6.
6. *L. saxatilis* A. Bagan. — *L. скальный*, сыны . . . 6.
- Листья цельные, растения более крепкие . . . 7.
7. Листья по краю *сглаженнозубчатые* или почти *цельнокрайные*; стебель обычно от низа коротковетвистый, 40—60 см выс. Дубники, трещины скал . . . 7.
- 7. *L. denticulata* (Houtt.) Maxim. — *A. мелкозубчатый* (табл. 191, 4).
- Листья по краю с длинными, узкими и острыми лопастями; стебель ветвится чаще в верхней половине, 60—80 см выс. Кустарниковые склоны; в Амурской области . . . 8.
8. *L. szechuensis* (Bge.) Deb. — *L. остроланцетный*.

#### Род 63. CREPIS L. — СРЕПДА

1. Однолетник, без прикорневых листьев; листья линейные или линейно-ланцетные, по краю отдаленно зубчатые или цельнокрайные, при основании с широкими или узкотравятыми лопастями; высота растения 30—50 см. Сорное; на залежах или у дорог . . . 1. *C. betorum* L. — *C. кровельная*, у дорог . . . 1.
- Многолетник с прикорневыми листьями; листья цельные, по краю выемчато-зубчатые; стебель безлиственный или с 1 листом, 10—15 см выс.; корзинки чаще одиночные. Высокогорья . . . *C. burejensis* Fr. Schmidt — *C. бурейская*.

#### Род 64. PRENANTHES L. — КОСОГОРНИК, ПРЕНАНТЕС

1. Растение без опушения или же стебель с короткими, малозаметными волосками; листья сердцевидно-копьевидно или ромбовидно-овальные или широкосердцевидные, часто с добавочными лопастями на черешке, пластинка листа очень тонкая; корзинки многочисленные, узкие; цветки очень бледные (палевые), с фиолетовыми кончиками. По ручьям, в смешанных и долинных лесах, на юге Приморья . . . 1. *P. latifolia* Maxim. — *K. Татарника*.
- Опушение более или менее густое, из прямых, почти черных волосков; нижние листья ланцетно-перистые, верхние продолговатоланцетные, цветки желтые. Среди кустарников; только на самом юге Приморья; большая редкость . . . 2. *P. maximowiczii* Kirp. — *K. Максимовича*.

#### Род 65. HIERACIUM L. — ЯСТРЕБИНКА

1. Листья цельнокрайные, линейно-ланцетные, до 30 см дл.; все растение голое. Долинные сухие луга . . . 1. *H. hololeion* Maxim. — *Я. гладкая*.
- Листья зубчатые или выемчато-зубчатые, реже почти цельнокрайные, 5—10 см дл. . . 2.
2. Прикорневых листьев нет; стебельные листья с округлым или суженым основанием или полустебельнообъемлющие; от почти цельнокрайных до зубчатых или выемчато-зубчатых; корзинки чаще многочисленные . . . 3.
- Прикорневые листья с округлыми, длинными черешками, выемчато-зубчатые, стебельные сидячие, частью полустебельнообъемлющие; корзинки малочисленные, 1—3. На лугах в каменистых берегах; у нас пока найдена только на горе Облучной (Чугуевский район Приморья) . . . 2. *H. cotesianum* Nakai — *Я. корейская* (табл. 192).
3. Листья линейные или ланцетные, с суженым или округлым основанием, голые (опушение развито только на корзинке и цветоножках). В кустарниковых зарослях и на сухих дубках; часто . . . 3. *H. pilosum* Maxim. — *Я. зонтичная*.
- Стебель и листья густо длинноперистые; листья полустебельнообъемлющие, зубчатые или выемчато-зубчатые. В дубниках на сухих склонах . . . 4. *H. virescens* Pall. — *Я. ядовитая*.

### VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОКРЫТОСЕМЯНЫХ ДЕРЕВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ (ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, КУСТАРНИЧКОВ, ПОЛУКУСТАРНИКОВ И ЛИАН)

1. Листья цельные или лопатные . . . 2.
- Листья перистораздельные или перисторассеченные, тройчатые, пальчатые, перистые, двояко- или тройкоперистые . . . 80.

2. Листья вечнозеленые, обычно более или менее плотные, кожистые . . . 3.
- Листья на зиму отмирающие, опадающие осенью или остающиеся на растениях до середины зимы и даже до весны . . . 3.
3. Пестичность кустарники с вильчато разветвленными стеблями и супротивными, паразитируют на ветвях многих деревьев (липы, яблони, груши, ольхи, тополя, клена, ильма, ивы, чохали и др.) . . . *Viscum* — *Омела*.
- Растения не паразиты, с нормальными развитыми корнями, живущие на почве . . . 4.
4. Листья очерченные или у одного вида частью супротивные, частью очерченные . . . 6.
- Листья супротивные . . . 6.
5. Маленькие кустарнички с очень тонкими (1—2 мм), сглаженными стеблями и сухой, кожистой, односемянной . . . *Linnaea* — *Линней*.
- Распростертые кустарнички с более толстыми стеблями (3—5 мм); цветки по 2—5 плод — многосемянная коробочка . . . *Loiseleuria* — *Луизеюри*.
- 6 (от 4). Листья надрезанно городчатозубчатые, морщинистые, снизу беловолосные; цветки одиночные, белые; столбики при плодах перистые; маленькие кустарнички . . . *Diandra* — *Двухдольный*.
- Признаки иные; листья снизу голые или опушенные, но тогда цельнокрайные . . . 7.
7. Стебли очень толстые, почти нитевидные; листья сверху блестящие, снизу сызые, с затупленным краем; венчик ярко-розовый; плод — красная, шаровидная, очень кислая ягода . . . *Oxycoccus* — *Клюква*.
- Стебли более толстые, прямостоячие или приподнимающиеся . . . 8.
8. Листья чешуевидные, черешчатые, налегающие друг на друга; цветки малочисленные, колокольчатые, белые; плод — коробочка . . . *Cassiope* — *Кассиопея*.
- Листья иные . . . 9.
9. Плод более или менее сочный — ягода или костянка . . . 10.
- Плод сухой — коробочка . . . 13.
10. Плод — красная или темно-красная ягода; цветки белые или чуть розоватые, колокольчатые, за исключением листьев азиатские или частично азиатские, снизу точечные; небольшие кустарнички . . . *Vaccinium* — *Врунцвик*.
- Завязь верхняя; плод черный или красный . . . 11.
11. Плод черный, ягодовидный, воднистый; листья линейные или узколанцетные; все растение со специфическим приятным запахом; небольшие стеблистые или приподнимающиеся кустарнички . . . *Empetrum* — *Шиповник*.
- Плоды красные или темно-красные, малочисленные или мучнистые; листья не линейные, без особого запаха . . . 12.
12. Листья мелкозубчатые, с сильно прерывистой жилкой, морщинистые; цветки пахучие, мелкие, белые; плоды ягодовидные, красно-бурые, с 4 косточками . . . *Plex* — *Остролист*.
- Листья цельнокрайные, сетчатонервные; цветки на концах ветвей в коротких, поникающих соцветиях, розовые; плод — мучнистая, шаровидная, красная, костянка с 5 косточками . . . *Aretosaphylos* — *Аретофилос*.
- 13 (от 9). Цветки одиночные, белые, до 1 см в diam, из жестких чашечкообразных; листья ланцетные; коробочка трехгнездная; маленькие кустарнички, образующие рыхлые подушки . . . *Diapensia* — *Диапенси*.
- Признаки иные . . . 14.
14. Небольшие, часто прижимаемые к травянистым растениям кустарнички с 1—2 белыми цветками, или цветки собраны в щиток или зонтик, белые или розовые; листья мелко- или остропильчатые, очерченные или частично супротивные; коробочка шаровидная или приплюснuto-шаровидная, четырех-шестигнездная . . . *Chimaphila* — *Зимнолюб*.
- Признаки иные . . . 15.
15. Венчик свободнолепестный, белый, лепестков 5, цветки в щитках; листья линейные, продолговатые или продолговатоэллиптические, от 1 до 20 мм шир.; все растение с сильным запахом . . . *Ledum* — *Багульник*.
- Признаки иные; венчик сростнолепестный . . . 16.
16. Листья линейные, до 15 мм дл. и около 1 мм шир.; венчик колокольчатый, синевато-голубой, цветки по 2—6, в конечных зонтикообразных соцветиях, реже одиночные . . . *Phyllocladus* — *Филлоклад*.
- Листья более широкие . . . 17.
17. Венчик крупный, колокольчатый, слегка неправильный, золотисто-желтый (при сушке в гербарии иногда зеленовато-желтый), фиолетово-розовый или фиолетовый . . . *Rhododendron* — *Розоводор*.
- Признаки иные; венчик небольшой, белый или розовый, правильный кустарничек . . . 18.
18. Листья снизу с ополотом-белым восковым налетом; цветки ярко-розовые, в конечных зонтикообразных соцветиях . . . *Andromeda* — *Подбес*.



- Листья снизу без воскового налета, со звездчатыми волосками в виде беловатых чешуек; цветки белые, и концевых односторонних обильных кистях . . . *Chamaedaphne* — Хамедафне . . . 20.
- 19 (от 2). Листья супротивные или почти супротивные . . . 30.
- Листья очередные . . . 30.
20. Листья перекрестнопарные, почти супротивные, снизу с снизу налетом, почти сидячие, с широколанцетовидными или округлым основанием, в верхней части по краю мелкопильчатые, редко цельнокрайные . . . *Salix* — Ива (*S. integra* — И. цельнолистная) . . . 21.
- Листоположение иное . . . 21.
21. Цветки мелкие, белые, лиловые или розовые, в концевых многоцветковых соцветиях или крупные, белые, в малоцветковых кистевидных соцветиях . . . 22.
- Цветки парные, в малоцветковых пазушных или (у 1 рода) концевых полузонтиках . . . 27.
22. Завязь верхняя . . . 23.
- Завязь нижняя . . . 24.
23. Венчик двугубый, фиолетовый или розовый; плод распадается на 4 орешка, молодые побеги четырехгранные; маленькие полукустарнички со стелющимися или немного приподнимающимися стеблями . . . *Thymus* — Тимьян . . . 25.
- Венчик не двугубый, трубчатый, с 4 лопастями, кремовыми или лиловыми лепестками; плод — коробочка, раскрывающаяся 2 створками; небольшие деревья и крупные кустарники . . . *Syringa* — Сирень . . . 25.
- 24 (от 22). Цветки раздельнолепестные, белые, с 4 или 5 лепестками, все одинаковые, плодущие; плод — коробочка или сочная, ягодообразная голубовато-белая; листья цельные . . . 25.
- Цветки сростнолепестные, белые или кремовые, с 5 лепестками, все одинаковые или краевые крупные, бесплодные; плод сочный — красная или черная костянка; листья трехлопастные, цельные, эллиптические, остропильчатые . . . 25.
- *Viburnum* — Калина . . . 25.
25. Цветки с 5 лепестками, тычинок 10, соцветие щитковидное; плод — коробочка . . . *Deutzia* — Дейция . . . 26.
- Цветки с 4 лепестками, тычинок 4 или 20; плод сочный или коробочка . . . 26.
26. Цветки крупные, 2—3 см в диам., тычинок 20; плод — коробочка; соцветие малоцветковое, кистевидное . . . *Philadelphus* — Чубушник . . . 26.
- Цветки мелкие, тычинок 4; плод сочный, голубовато-белый; соцветие многоцветковое, зонтиковидное; молодые побеги голые, часто ярко-красные или буровато-красные . . . *Thelycrania* — Сивдия . . . 26.
- 27 (от 21). Цветки раздельнолепестные, четырех-пятимерные, зеленоватые или (у 1 вида) темно-коричневые, почти пурпурные; плод — кожистая коробочка, семена с тонкой, сочной, оранжевой или красной крошечкой (присемянником); соцветие — малоцветковый полузонтик . . . *Elaeagnus* — Бересклет . . . 27.
- Цветки сростнолепестные, плод — ягода или сухая коробочка с мелкими семенами, редко плод сухой, односемянный . . . 28.
28. Плод — красная, черно-синяя или оранжевая ягода; венчик с двугубым отгибом, белый, желтый, оранжевый, розовый или красный . . . *Lonicera* — Жимолость . . . 29.
- Плод сухой, односемянный или многосемянная двугнездная коробочка . . . 29.
29. Цветки небольшие, белые, венчик с длинной трубкой и коротким пятираздельным отгибом; плод односемянный; листья неправильно городчатозубчатые, некоторые цельнокрайные . . . *Abelia* — Абелия . . . 30.
- Цветки крупные, розовые, красные или желтоватые (как исключение встречаются отдельные кусты с чисто белыми цветками), трубчато-колокольчатые; листья пильчатые; плод — двугнездная коробочка с мелкими многочисленными семенами . . . *Weigela* — Вейгела, Дивервилла . . . 30.
- 30 (от 19). Листья цельные . . . 31.
- Листья лопастные . . . 35.
31. Растения выходящие, или прикрепляющиеся к коре деревьев колониями прилистниками (лиана), или всползающие на опору полукустарники . . . 32.
- Прямостоячие или стелющиеся деревья, кустарники, кустарнички и полукустарники . . . 36.
32. Все растение со специфическим лимонным запахом; листья сочные (при сушке в гербарии буренеют или чернеют); цветки белые или чуть розоватые, раздельнолопастные; по отщипыванию цветоложа удлиняется в 25—50 раз и образует из одного цветка длинную простую кисть с очень сочными, красными, кислыми ягодами . . . *Schizandra* — Лимонник . . . 33.
- Лимонного запаха нет, признаки иные . . . 33.
33. Полукустарники, использующие на кусты и травы; листья овальные или частично перисто-надрезанные; цветки сростнолепестные, фиолетовые, плод — небольшая красная ягода . . . *Solanum* — Паслен . . . 33.
- Большие или мелкие крупные лианы, всегда с цельными листьями; плод — крупная темно-зеленая или оранжевая ягода или костянка, округлая, трехгнездная

- коробочка с крупными семенами, окруженными тонкой, сочной, оранжево-красной крошечкой (присемянником) или длинная пятигранная коробочка с крылатыми семенами . . . 34.
34. Лианы с отчетливо выраженными на срезе годичными кольцами; цветки белые, зеленоватые или зеленовато-желтые, в небольших пучках; плод — костянка, округлая коробочка; семена крупные, с тонкой, сочной, оранжево-красной крошечкой; у 1 вида прилистники превращены в крючкообразные колечки, которыми лиана плотно прикрепляется к коре дерева . . . *Celastrus* — Крапиволистник, Древогубен . . . 35.
- Лианы без различных годичных колец . . . 35.
35. Крупная лиана с мягкой пробковой корой и характерным камфорным запахом; листья очень крупные (10—30 см дл.), округло-сердцевидные, полукругло-чашчатые, коричневатые; плод — крупная (7—10 см дл.) шестигранно-цилиндрическая коробочка . . . *Aristolochia* — Гирканзон, Аристолохия (*A. manshuriensis* — К. маньчжурская) . . . 35.
- Лиана различных размеров, с мелкими или расселивающимися корой, без особого запаха; листья у 2 видов к моменту цветения становятся наполовину ярко-белыми (позднее эти участки розовеют, а под осью краснеют); цветки белые, правильные; плод — темно-зеленая или оранжевая ягода . . . *Actinidia* — Актинидия . . . 36.
- 36 (от 31). Растения с шишками или колочками . . . 37.
- Шишки и колочки нет . . . 38.
37. Листья мелко-колочезубчатые, прилистники обращены в крупные (до 3 см, а на ростовых побегах и до 5 см) трехраздельные колечки; цветки ярко-желтые, в кистях; плод — красная, продолговатая ягода с 1 или 2 семенами . . . *Berberis* — Барбарис . . . 38.
- Листья цельнокрайные или почти цельнокрайные; ветви с редкими крупными колочками; цветки в пучках, желтые; плод — сочная, ярко-красная костянка с плоской, сильноsilicified боков косточкой, с весьма характерной крупноборозчатой скульптурной поверхностью . . . *Prinsepia* — Принсеция. Плоскосемянник . . . 38.
- 38 (от 36). Листья скучены на концах ветвей; цветки бледно-желтые, по 2—5; околоцветник трубчатый, с четырехраздельным отгибом; плод — красная ягодообразная костянка; небольшие (30—50 см) кустарники со светло-серой или желтовато-серой корой . . . *Daphne* — Волчье, Дадия . . . 39.
- Признаки иные . . . 40.
39. Соцветие с черепонатным крылом на общем цветоносе; у некоторых видов в цветках есть стаминоид; завязь верхняя; плод — орешек . . . *Tilia* — Липа . . . 40.
- Признаки иные; крыла на общем цветоносе нет . . . 40.
40. Листья с резко выделяющейся сетью жилок, обратноовальные, осенью краснеющие; цветки белые или желтоватые, с кувшиночатым венчиком; плод — ягодообразная красная или черно-пурпурная костянка с 4—5 косточками; маленькие, часто стелющиеся кустарнички, 30—60 см дл. . . . *Arctostaphylos* — Арктофил, Альпийская толокнянка . . . 41.
- Признаки иные . . . 41.
41. Листья неравнобокие, лопастнозубчатые; крупные деревья, цветущие до распускания листьев; цветки обоеполые, в многоцветковых пучках; плод — орешек, окруженный широким черепонатным крылом . . . *Ulmus* — Илья . . . 42.
- Признаки иные; листья равнобокие . . . 42.
42. Листья крупнородоватые, верху сильно расширенные, пестичные — сидячие; цветки в длинных, перышчатых, тонких соцветиях, пестичные — сидячие; плод — жолудь, окруженный плоской . . . *Quercus* — Дуб . . . 43.
- Признаки иные . . . 43.
43. Небольшие полукустарники (обычно принимаемые за травянистые многолетники) с густым коротким опушением; цветки в корзинках, синие; цветут в самом конце сентября и в октябре. На скалах морского берега на юге Приморья . . . *Erigeron* — Мелькоцветник (*E. ochraei* (Nakai) Botsch. — М. Охари) . . . 44.
- Признаки иные . . . 45.
44. Растения двудомные . . . 45.
- Растения однодомные, с обоеполыми или раздельнополыми цветками . . . 50.
45. Цветки в небольших пучках, тычиночные по 3—12, пестичные по 3—8 или чаще, одиночные, зеленовато-желтые, без лепестков; плод трехгнездная коровидная бочка; листья эллиптические или яйцевидные; кустарники с обмерзающими концами ветвей . . . *Securingia* — Секуригения . . . 46.
- Признаки иные . . . 46.
46. Плоды (соплодия) черные, сочные, сладкие; пестичные цветки в коротких, плотных яйцевидно-продолговатых соцветиях, пыльниковые в продолговатых сережках; листья с сердцевидным основанием . . . *Morus* — Туг, Шелковица . . . 47.
- Плоды сухие — коробочка или костянка, округлая, трехгнездная



- 438



- 78 (от 70). Завязь нижняя, плод — красная, бурая или черная ягода; листья трех- или пятилопастные, у некоторых видов железистые, со специфическим запахом; кустарники . . . . . *Ribes* — Смородина, кустарники . . . . .
- Завязь верхняя; плод сухой — воздушная листовка или двукрылатка; листья без железок; деревья и кустарники . . . . . 79.
79. Кустарники с продолговато отслаивающейся корой; цветки белые, в щитках; плодиков 5, воздушных, с блестящими семенами . . . *Physocarpus* — Пузыреплодник.
- Признаки иные; плод — двукрылатка; деревья или очень крупные кустарники . . . . . *Acer* — Клен.
- 80 (от 1). Листья сложные, тройчатые, пальчатые или перистые (иногда — тройкоперистые (каждый лист состоит из нескольких отдельных листочков)) . . . . . 81.
- Листья перистонадрезанные, перисторассеченные или перистораздельные . . . . . 99.
81. Листья супротивные . . . . . 82.
- Листья очерченные . . . . . 84.
82. Листья, сцепляющиеся листовыми черешками; цветки крупные, белые, пазевые, светло-желтые, фиолетовые или буро-фиолетовые; завязь верхняя; плоды сухие, с длинным перистым столбиком . . . . . 83.
- Кустарники; листья с резким, неприятным запахом; цветки мелкие, желтоватые, в крупных кистях, завязь нижняя; плод ягодовидный; с 5 косточками, кирпично-красный или темно-красный . . . . . *Sambucus* — Бузина.
83. Листья овальные или трижды тройчатые; цветки крупные, светло-фиолетовые, с небольшими зонтиками внутри . . . . . *Atragene* — Княжик.
- Листья дважды перистые или частично тройчато раздельные; листочков нет, чашечка яркоокрашенная, белая, желтоватая, пазевая или буро-фиолетовая . . . . . *Clematis* — Ломонос.
- 84 (от 81). Листья тройчатые или пальчатые . . . . . 85.
- Листья перистые или дважды перистые . . . . . 90.
85. Растения с шишками . . . . . 86.
- Шипов нет . . . . . 88.
86. Цветки относительно крупные, около 2 см в diam, белые, в малочисленных (обычно не более 10) соцветиях; плод — красная, сходящая костянка; листья чаще тройчатые; небольшие кустарники . . . . . *Rubus* — Малина.
- Цветки мелкие, в многоцветковых зонтиках или полузонтиках; плоды сочные, черные, с 2 или 5 косточками . . . . . 87.
87. Черешки листочков с ясным сочленением, обычно голые; листья с 5 листочками, верхние иногда с 3 или 4 листочками; цветки в плотных, почти головчатых зонтиках или полузонтиках; плоды с 2 косточками; шипы на стеблях редкие, довольно крупные, у основания расширенные . . . *Acanthopanax* — Акантопанакс.
- Черешки листочков без ясного заметного сочленения, всегда опушенные, листочков всегда 5; цветки в зонтиках; плоды с 5 косточками; шипы на стеблях многочисленны, тонкие, преимущественно голые . . . . . *Elaeagnus* — Элеагнус.
- 88 (от 85). Лианы с очень крупными, опушенными листьями; цветки мотыльковые, розово-красные, бобы волосистые . . . . . *Pueraria* — Пуэрария.
- Деревья или кустарники . . . . . 89.
89. Листочки цельнокрайние, овальные или округлые; цветки мотыльковые, розовато-фиолетовые; плод — односемянный боб; кустарники с обмерзающими концами ветвей . . . . . *Lepedeza* — Леспедеца.
- Листочки зубчатые, зазубенно-острокопечные; плод — двойная крылатка; крупные деревья . . . . . *Acer* — Клен (*A. manshuricum* Maxim. — К. маньчжурский).
- 90 (от 84). Листья парноперистые, каждый лист заканчивается шипиком; у одного вида всего 2 пары сильно сближенных, плотных листочков, у двух других листочков больше . . . . . *Caragana* — Карагана.
- Листья не парноперистые, каждый сложный лист заканчивается листочком . . . . . 91.
91. Листья небольшие, обычно 2,5—3 см дл., с 5 (очень редко с 7) листочками, 3 конечных листочка очень часто бывают сближены как бы в один трехраздельный; цветки крупные, 1,5—3 см в diam, желтые или белые; небольшие кустарники . . . . . *Dasiphora* — Дазифора.
- Листья более крупные, конечные листочки не сближены . . . . . 92.
92. Листья и стебли с шипами . . . . . 93.
- Шипов нет . . . . . 94.
93. Цветки крупные, розовые, красные или белые, плоды (дозрелые) более или менее сочные с многочисленными семенами внутри и массой волосков (это сильно разросшееся кушикообразное цветоложе); листья простоперистые, небольшие . . . . . *Rosa* — Роза, Шиповник.
- Цветки мелкие, белые, или кремовые, многочисленные; плоды сочные, черные, с 5 косточками; листья дважды или трижды перистые, очень крупные . . . . . *Alalia* — Аралия.
- 94 (от 92). Листья очень крупные, от 30—50 до 100—125 см дл., листочки снизу с коротким железистым опушением; плод костяшкообразный (орех, окруженный мясистой зачаткой, позднее бурой оболочкой) . . . . . *Juglans* — Орех.
95. Листочков 9—11 (13), ланцетные, плод иной . . . . . 96.
- Листочки 9—11 (13), ланцетные, сверху голые; листья со специфическим запахом; и ярко-желтым лубом . . . . . *Phellodendron* — Бархат, Бархатное дерево.
- Признаки иные . . . . . 96.
96. Нижние листочки обычно не супротивные, а один выше или ниже противоположного на 3—7 мм, верхние же супротивные; цветки мотыльковые, белые или кремовые; плод — боб; древесина с темным, шоколадно-коричневым ядром . . . . . *Maackia* — Маакия.
- Признаки иные; все листочки супротивные . . . . . 97.
97. Листочки крупные, всегда без прилистников; плод — крылатка; крупные деревья . . . . . *Fraxinus* — Ясень.
- Листочки меньших размеров; плод — листовка или яблоко . . . . . 98.
98. Листья с остающимися прилистниками и резко выраженной сетью жилок с 9—13 (21) парами листочков; цветки белые, в крупных пирамидальных метелках; плоды — листовки . . . . . *Sorbaria* — Рябинник.
- Листья гладкие, обычно с рано опадающими прилистниками; цветки белые, в щиткообразных соцветиях; плоды сочные (яблоко), красные или желтые . . . . . *Sorbus* — Рябина.
- 99 (от 80). Небольшие деревья с крупными колочками, глубоко перистонадрезанными листьями . . . . . *Craegus* — Борщевик.
- Колочек нет; лианы, кустарники и полукустарники . . . . . 100.
100. Листья перистораздельные, с 5—7 листочками; цветки одиночные, крупные, 2,5—3,5 см в diam., белые; плодники сухие, односемянные, с остающимися при плодах длинными перистыми столбиками; полукустарники 5—15 см выс. . . . . *Sieversia* — Сиверсия.
- Признаки иные . . . . . 101.
101. Листья с характерным полынным запахом; цветки мелкие, трубчатые, в шарообразных корзинках; полукустарники . . . . . *Atemisia* — Полынь.
- Признаки иные . . . . . 102.
102. Листья частично перистонадрезанные и частью цельные; стебель ползучий, использующий на кусты и деревья; цветки небольшие, фиолетовые; плод — красная ягода . . . . . *Solanum* — Паслен.
- Листья очень глубоколопастные, со средней перистораздельной долей и общим крылатым черешком; соцветие — щитовидная метелка; цветки мелкие, обоевые, желтоватые; плоды мелкие (6—8 мм), от почти белых и брызговых до синих или сиреневых; имеются подземные клубни . . . . . *Ampelopsis* — Виноградовник [*A. japonica* (Thunb.) Makino — В. японский].

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Абелия 378, 380, 436  
— корейская 380, 381  
Абрикос 212, 232, 438  
— маньчжурская 234  
— сибирский 234  
Авраи 360, 362  
— японский 362, 365  
Адиантум 19, 37  
— стоповидный 37, 38  
Аллумия 192, 194  
— азиатская 194  
Алока 382  
— мускусная 382  
Адоковые 5, 18, 382  
Адонис 178, 190  
— амурский 181, 190  
Азинеума 386, 390  
— японская 390  
Аир 197  
Акалифа 255, 256  
— южная 256, 258  
Акантопнакс 287, 440  
— сидячецветковый 288, 289  
Акатик 236, 237  
Аксирис 168, 169  
— пирамидальный 169  
Актиноидея 5, 14, 272  
Актинидия 272, 437  
— аргута 272, 273  
— дикиральди 272  
— коломинта 272, 273  
— острая 272, 273  
— полигамная 272, 273  
Актинотема 380  
— лопастная 385, 386  
«Алданийский виноград» 210  
Альдрованда 202  
— дузюристая 202  
Альпийская тодоклянка 437  
Амарант 169  
— белый 169  
— белосемный 170  
— жемчужный 170  
— запрокинутый 170  
— залобчатый 170  
— подсекольный 170  
— хвостатый 170  
Амарантовые 5, 12, 169  
Амистота 345, 347  
— голубая 347  
Анафалис 394, 400  
— жемчужный 400  
— посьетский 400

Анейлема 110  
— Кейсака 110, 112  
Антракилодес 6  
Аралевые 5, 18, 287  
Аралия 287, 440  
— маньчжурская 288, 291  
— материковая 288, 291  
Аризема 107, 109  
— амурская 109  
— японская 109  
Артиктаргисте 68, 80  
— тростниковидный 80  
— шпоролистный 80  
Артикус 316, 321  
— альпийский 321  
Армерия 326  
— арктическая 326  
Ариика 6, 391, 416  
— сахалинская 416  
Ароидные 5, 9, 107  
Арграксон 66, 74  
— Лангсдорфа 72, 74  
— щетинозаводский 74  
Арудинеда 66, 74  
— волосистая 74  
— уклоняющаяся 73, 74  
Асперуго 338, 344  
— простертый 344  
— Астмита 294  
— китайская 294  
Астра 6, 394, 395, 398  
— агедратовидная 397, 398  
— виргинская 398  
— Маака 399  
— приморская 397, 398  
— надрезанная 397, 398  
— сибирская 398  
— сусудозная 397, 399  
— суматская 398  
— татарская 398  
Астрагал 235, 240  
— даурский 240  
— китайский 240, 241  
— кустарниковый 240  
— неосаженный 240  
— олобный 240  
— перешитый 240, 241  
— приморский 240  
— приподнимающийся 240  
— сходный 240  
— Шенхова 240  
Атрактилодес 393, 421  
— овальный 421, 422

Ахудемия 160, 161  
— японская 159, 161  
Ацелилит 115, 116  
— антилейный 116

Багульник 316, 318, 435  
— болотный 318  
— крупнолистный 318  
— подбел 318  
— приземистый 318  
Бадан 15, 204  
— тихоокеанский 206  
Бальзамин 263  
Бальзамитовые 14, 263  
Барбарис 190, 436  
— амурский 190  
Барбарисовые 5, 15, 190  
Бархат 255, 441  
— амурский 255  
Батхатное дерево 441  
Батлачек 80  
Башеница 195, 199  
— гладкая 199  
Башмачок 129, 132  
— воздушный 131, 132  
— крупноцветковый 131, 132  
— пестичный 131, 132  
— пятилистный 132  
Бедренец 293, 300  
— Теллуна 300  
Бекмания 68, 82  
— восточная 82  
Беламканда 128  
— китайская 128  
Белена 358, 359  
— чешская 359  
— черная 359  
Белозор 15, 204, 207  
— болотный 15, 207  
Белокопытный 6, 391, 416  
Белокрыльный 107  
— болотный 107  
Беломытник 69, 88  
— белопыльный 88  
«Белый охот» 288, 290  
Береза 151, 438  
— бархатистая 152  
— белая 154  
— даурская 152, 154  
— Дмитриева 156  
— железная 152, 154  
— желтая 152, 154  
— каменистая 152  
— Комарова 152, 153  
— кустарниковая 152, 153  
— маньчжурская 154, 156  
— Милдендорфа 152, 153  
— оваллолистная 152, 153  
— плосколистная 154, 156  
— Прохорова 152  
— ребристая 152, 154  
— тонкая 152, 153  
— черная 152, 154  
— шерстистая 152, 153  
— Шмидта 152, 154  
Березовые 5, 13, 151  
Бересклет 260  
— болыкрыльный 260  
— крылатый 260, 261

— Маака 260, 261  
— Максимовича 260, 261  
— малоцветковый 260, 261  
— священный 260, 261  
Бересклетовые 5, 16, 260  
Бескильница 69, 88  
— Гаута 88  
— курильская 88  
— облепешная 88  
Бигнониевые 5, 16, 370  
Блошница 6, 393, 402  
— распростертая 402  
Бобовые 5, 13, 234  
Бояка 6, 393, 426  
— Власова 427, 428  
— Маака 428  
— орешниковый 428  
— поникающий 427, 428  
— пантарский 428  
— щетиный 426  
Болитовые 293, 298  
— пятилистный 298  
Болотник 256  
— назный 256  
— неясный 256  
— осенний 256  
— сомнительный 256  
Болотниковые 5, 12, 256  
Болотница 80, 98  
— воздушная 100  
— иглолистная 98, 99  
— камчатская 100  
— Максимовича 98, 99  
— мальская 98  
— промежуточная 100  
— Сенилова 98  
— сосноватая 99, 100  
— шипоносная 98, 99  
— яйцевидная 98  
Болотоцветник 330  
— корейский 332  
— шитовидный 330  
Бор 68, 78  
— ракситский 78, 79  
Борей 5, 179, 184, 186  
— бело-фиолетовый 183, 184  
— бирюзово-красный 186  
— болотный 186  
— бородачатый 184  
— Воробьева 185  
— выхидный 186  
— гириный 183, 184  
— Десулави 184  
— дугишский 183, 185  
— назный 186  
— корейский 185  
— Кузнецова 186  
— лотичный 184  
— лаухоцветковый 185  
— Радде 185  
— сикотунский 185  
— скальный 185  
— слабоветвистый 185  
— сомнительный 186  
— тинистый 185  
— Токи 186  
— тодотостный 185  
— тростниковый 186  
— Цуккина 186  
— южносахалинский 185



- Бородач 129, 134  
 — японская 133, 134  
 Бородавник 293, 312  
 — Воронилов 312  
 — Меллендорфа 312, 315  
 — сладкий 312  
 Бошняк 372  
 — русская 371, 372  
 Боярка 218  
 Боярышник 212, 218, 439, 441  
 — даурский 218, 219  
 — Максимовича 218, 219  
 — перистоадрезанный 218, 219  
 Бразения 175  
 — Шребера 175, 177  
 Брахипастиа 6, 394, 399  
 — реснитчатый 399  
 Бронник 129, 136  
 — одноклубный 136  
 Бруслина 321, 435  
 Бруслинчик 5, 18, 321  
 Брусличник 18, 386, 388  
 — корончатолистный 390  
 — трахелиодный 388, 389  
 — трехлопастный 390  
 — узколистный 388  
 — четырехлистый 388, 389  
 — шпороносный 390  
 — шпоролистный 388  
 Бугра 346, 348  
 — длинноплодная 348  
 — плодовая 348  
 Бузина 378, 440  
 — корейская 380  
 — маньчжурская 380  
 — сибирская 378, 379  
 — широколистная 380  
 Бузульник 6, 394, 420  
 — великолепный 419, 420  
 — длинноязычковый 420  
 — крупнолопастный 419, 420  
 — кайлистый 420  
 — монгольский 420  
 — сахалинский 420  
 — сихотелинский 420  
 — Фишера 420  
 — Шмидта 419, 420  
 — ялусский 420  
 Буковые 5, 13, 156  
 Бульбостильс 93, 100  
 — волосовидный 100  
 Бурачниковые 5, 17, 338  
 Ваида 195, 200  
 — японская 200  
 Вальерия 384  
 — амурская 384  
 — корейская 384  
 — японская 384  
 — ошернолистная 384  
 — Штубендорфа 384  
 Вальериевые 6, 18, 384  
 Валинерия 64  
 — спиральная 64  
 Вальшрейния 210, 212, 226  
 — сибирская 225, 226  
 — тройчатая 225, 226  
 Василек 6, 394, 395, 428  
 — луговой 428  
 — синий 428  
 — скабиозовый 428  
 Васильки 179, 189  
 — амурский 190  
 — байкальский 189  
 — волючий 189  
 — клубноносный 189  
 — лепестковый 189  
 — малый 189  
 — оттопыренный 189  
 — простой 190  
 — прямой 190  
 — редкоцветковый 189  
 — скрученный 189  
 — Туйберга 189  
 — тычиночный 189  
 Ватчинниковые 6, 392  
 Вахта 330  
 — трехлиственная 330  
 Вахтовые 5, 16  
 Вейгела 378, 382, 436  
 — Меллендорфа 379, 382  
 — приятная 379, 382  
 — ранняя 379, 382  
 Вейник 67, 81  
 — горный 81  
 — короткоцветковый 81  
 — Лангсдорфа 81  
 — дальневосточный 81  
 — докитропический 81  
 — наземный 81  
 — незамечаемый 81  
 — расставленноцветковый 81  
 — тукоколовый 81  
 — Турчанинова 81  
 — узколистный 81  
 Вербеиник 322, 324  
 — густоцветковый 324  
 — даурский 324  
 — заданный 324  
 Вербея 344  
 — прицветничковая 344  
 Верберовые 5, 16, 344  
 Верблюдка 168, 169  
 — вытянутая 169  
 — крупнолопастная 169  
 — скученная 169  
 Вересковые 5, 15, 16, 316  
 Вероника 359, 364  
 — вишневая 364  
 — даурская 365, 366  
 — длиннолистная 364  
 — дубравная 366  
 — японская 364  
 — клочковатая 366  
 — Комарова 364  
 — ложно-кочковатая 366  
 — длиннолистная 364  
 — ольгинская 364  
 — персидская 364  
 — седая 366  
 — сибирская 364  
 — Стедлера 364, 365  
 — тимилющая 364  
 — трубчатая 364  
 — цитковая 366  
 Вертицилла 316  
 — одноцветковая 316, 319  
 Вертициллы 5, 9, 316  
 Вессиник 179, 180  
 — звездчатый 180, 181  
 Ветреница 178, 186  
 — амурская 187  
 — вильчатая 186  
 — головчатая 186  
 — коротконожковая 186  
 — лесная 186  
 — отогнутая 187  
 — прибрежная 186  
 — Радде 187  
 — сибирская 186  
 — слабая 187  
 — теневая 187  
 — удская 187  
 Вех 293, 300  
 — ядовитый 300, 303  
 — ядовитый узколистный 300  
 Вздохотоподник 294, 306  
 — Комарова 306  
 — сибирский 306  
 Взморник 60  
 — морской 60  
 — тихоокеанский 60  
 — японский 60  
 Взморниковые 6, 9, 60  
 Вика 236  
 — амурская 247, 248  
 — байкальская 248  
 — волостная 246  
 — жидкоцветная 248  
 — забора 246  
 — кругловатая 248  
 — крупнолистная 247  
 — ложнолиственная 246, 247  
 — многостебельная 246, 247  
 — мышиная 247  
 — одношарная 246  
 — посевная 246, 247  
 — приятная 248  
 — разветвленная 248  
 — узколистная 246  
 — японская 247, 248  
 Виноград 266, 439  
 — амурский 268, 269  
 Виноградовик 266, 268, 439, 441  
 — короткоцветочный уссурийский 268, 269  
 — разнолистый 268, 269  
 — японский 268, 269, 441  
 Виноградовые 5, 16, 266  
 Випши 212, 232, 439  
 — железистая 232  
 — Максимовича 232  
 — сахалинская 232  
 Водокрас 62, 64  
 — азиатский 64, 65  
 Водокрасовые 6, 11, 62  
 Водосбор 179, 480  
 — амурский 184  
 — железистый 184  
 — медноцветковый 180  
 — остролистный 184  
 Водная звездочка 12, 256  
 — сосенка 12, 286  
 Водяника 259  
 Водный орех 284  
 — амурский 286  
 — вырезной 283, 284  
 — ложновырезной 286  
 — Максимовича 284  
 — маньчжурская 283, 286  
 — японский 286  
 Водный перел 165  
 Водные орехи 6, 9, 284  
 Водяник 171, 174  
 — японский 174  
 Волянка 210, 211, 216  
 — азиатская 216  
 — малая 216  
 Волондунка 292, 298  
 — длиннолопастная 300, 301  
 — козлецветная 300  
 — Комарова 300  
 — круглолистная 300  
 — молочайная 298, 299  
 — сахалинская 298  
 — трехлопастная 298  
 Волчичник 280  
 — камчатский 280, 281  
 Волчишниковые 5, 14, 280  
 Воробейник 340  
 — красноокрасный 340  
 — полевой 340  
 Воронек 178, 180  
 — заостренный 180  
 — краснолопастный 180  
 Вороний глаз 115, 124  
 — маньчжурская 124  
 — пестиглистая 124  
 Воронцовые 5, 10  
 Восковник 5, 12, 148  
 Восковница 148  
 — пушистая 148, 149  
 Вострик 69, 93  
 — ложнопырейный 93  
 Вудзия 20, 22  
 — гладкоцветная 22, 23  
 — крупнолопастная 22, 24  
 — маньчжурская 22, 23  
 — многорядниковая 22, 23  
 — северная 22, 23  
 — средняя 22, 24  
 Вшивосемянник 360, 368  
 Вьюнковые 6, 17, 334  
 Вьюнок 334, 336  
 — полевой 336, 339  
 Вяз 158, 439  
 Галексия 340, 344  
 — повислолопастная 343, 344  
 — тимилющая 344  
 Галевка 6  
 Галения 328, 330  
 — рогатая 330, 333  
 Галеорис 130, 138  
 — круглолопастный 138  
 Галинскоя 6, 391, 404  
 — мелкоцветковая 404  
 — четырехлопастная 404  
 Глодица 170, 175  
 — амурская 175  
 — бордюрная 175  
 — пильная 175  
 Глоздицы 5, 12, 15, 170  
 Гомартрия 66, 70  
 — сибирская 70  
 Гераньевые 5, 16, 250  
 Герань 250  
 — Вильфорда 250  
 — Власова 253, 254  
 — волосистоглизиновая 250

Герань волосистоцветковая 254

- даурская 253, 254
- Зибольда 253, 254
- Максимовича 250
- округлолистная 250
- побегоносная 253, 254
- сибирская 250
- Гетеропанхус 6, 394, 396
- Мензиевский 398
- мягковолосистый 398
- скально-приморский 398
- татарский 398
- щетино-волосистый 398
- Гибискус 270, 272
- тройчатый 272
- Гидрилла 62, 64
- мутовчатая 64
- Гименофилломы 7
- Гирчовник 294, 304
- камчатский 304
- Глаукус 322, 326
- приморский 326
- Глосия 292, 306
- прибрежная 306, 310
- Гледоика 129, 134
- азиатская 134
- сосочконосная 134
- Глицины 53
- Голосемьяные 4, 7, 46
- Голубика 321
- Горец 5, 162, 164
- альпийский 167
- амурский 165
- аянский 166
- Бунге 165
- буро-раструбный 164
- восточный 165
- вьюнковый 167
- дернистый 165
- длиннощетиновый 165
- живородящий 166
- Зибольда 167
- зубчатокрылый 167
- идиный 166
- клейкий 165
- Коржанинского 167
- крылатый 166
- крупнолидный 166
- кустарный 167
- Лаксмана 166
- лежачий 164
- липкий 165
- лисохвостовый 166
- лиственный 165
- Маака 167
- малоцветковый 167
- маньчжурский 166
- мяликий 164
- реликтовый 166
- черенный 165
- почечульный 165
- приречнолистный 167
- пшечный 164
- расставленноцветковый 167
- растопырченный 167
- сальматолистный 164
- стреловидный 167
- терновый 167
- тихоокеанский 166
- тошотун 164

— треугольнолидный 165

- Тунберга 167
- узколистный 166
- уссурийский 166
- ушковатый 166
- широколистный 166
- щавелелистный 165
- щетиный 167
- эллиптический 166
- Горечавка 328
- бородатая 330
- Комарова 330
- крупнолистная 328
- нишпоская 329
- растопырчатая 328, 331
- трехцветковая 328
- ушконосная 329
- холодная 328
- Поллигера 328, 331
- шероховатая 328, 331
- Горечавковые 5, 17, 328
- Горичивет 181, 190
- Горичник 294, 306
- дельтовидный 312
- извилистый 306
- лапшаевский 306
- прибрежный 312, 312
- синеолоднолистный 306
- тайваньский 312
- терпентиновый 312
- Горноколосьник 202, 203
- вваренге 204
- колючий 203
- мягколистный 204
- хрищеватый 203
- Гормак 6, 392, 430
- корейский 430
- Горнила 196, 201
- полевая 201
- сарептская 201
- Горький кипмин 272, 273
- Горняк 15, 190
- корейская 190, 191
- Граб 151, 156, 438
- сердцевидный 155, 156
- Гравилат 211, 226
- аллеспек 226
- Гречица 162, 167
- полевая 163
- татарская 167
- Гречишные 5, 11, 14, 162
- Гроздовник 19, 40
- виргинский 40
- Кренш 40, 42
- липовый 40
- луговой 40
- северный 40
- Груша 212, 216, 439
- уссурийская 216
- Грушанка 314
- даурская 314
- малая 314
- мисорасная 314
- почковидная 314
- почти бокальная 314
- японская 314
- Грушанковые 5, 15, 314
- Губастик 360, 362
- отпрысковый 362, 363
- тоненький 362, 363

Губоцветные 5, 13, 344

- Гудайера 130, 136
- полузачная 136
- Гуляник 195—197
- лекарственный 197
- жесткий 197
- Лесса 197
- Гусиный лук 115, 118
- гонимый 118
- мелкоцветковый 118
- Накая 118
- Гульдентшедта 236, 240
- малоцветковая 240
- Дазифора 211, 220, 440
- даурская 220
- густариковая 220
- маньчжурская 220
- Дафна 437
- Двуудольные 140
- Двукосточник 67, 76
- тростниковидный 76
- Двулепестник 282, 284
- альпийский 284
- сердцевидный 284
- четырехлобоцветчатый 284
- Девичий виноград 265, 268, 439
- триостренный 268
- Девиса 393, 395, 402
- британский 402
- иволжистый 402
- льянолистный 402
- японский 402
- Дейция 18, 204, 208, 436
- амурская 208
- гладкая 208
- Дельгинтерия 6, 395, 399
- шершавая 399
- Дендрантема 6, 395, 396, 406
- Завадского 407
- корейская 407
- краснеющая 407
- Максимовича 407
- монгольская 407
- ноктонская 407
- Палла 406
- сиктоазиатская 407
- Дентария 196
- Дербеник 282
- иволжистый 282
- промежуточный 282
- Дербениковые 5, 15, 282
- Дерен 312
- канадский 314, 317
- липовый 312, 317
- Дескуссия 196, 197
- София 197
- Десмодиум 234, 242
- маньчжурский 242, 244
- Ольдгама 242, 244
- Джефферсония 190
- сомнительная 190
- Диапенсия 5, 14, 322
- Диапенсия 322
- обратнотропная 322
- Диаррена 69, 84
- маньчжурская 84, 87
- японская 84, 87
- Диартрон 280
- листолистный 280, 281

Диервилла 378, 382, 436

- Диозифилла 346, 350
- Ятабе 358
- Дикий перер 288, 289
- Димерия 66, 70
- изометическая 70
- Диморфант 288, 290
- Дисокорея 5, 11, 124
- Дисокора 124
- нишпоская 124, 126
- Диспорум 116, 122
- зеленоватый 122
- Дичитра 192, 195
- бродячая 195
- Долготон 195, 197
- крылатосемянный 197
- Дошик 234, 238
- ароматный 238
- белый 238
- Довгостом 195, 200
- гребенчатый 200
- зубчатый 200
- мелкоцветковый 200
- цельнолистный 200
- Дрема 171, 174
- белая 174
- коротколистная 174
- ольговидная 174
- ольговидная 174
- пустынная 174
- твердая 174
- Дремлик 130, 134
- сосочковый 134, 135
- Тунберга 134, 135
- Дрыла 211, 228
- аянская 227, 228
- Чоноски 228
- Дуб 13, 156, 437
- зубчатый 156, 157
- курчавый 156
- монгольский 156, 157
- Дубровник 343, 347
- уссурийский 347
- Дудник 294, 304
- амурский 304
- даурский 304, 309
- зеленоцветковый 304
- корейский 304
- Максимовича 304, 307
- Микел 304, 308
- низбегающий 304
- Чернышева 304
- ялуская 304
- Дурман 17, 338, 359
- обыкновенный 359
- Дурнишник 6, 391, 402
- игольчатый 403
- сибирский 403
- Душица 346, 352
- обыкновенная 352
- Дымковик 13
- Ека 68, 86
- сборная 86
- Ежеголовник 55
- побегоносный 55, 56
- простой 55
- скученный 55, 56
- узколистный 55, 56
- японский 55



Ежеголовниковые 6, 10, 55  
 Ежевик 67, 74  
 — петушие просо 74  
 — — короткоостное 76  
 — — длинноостное 76  
 — рисовый 74  
 — хвостатый 74  
 — хлебный 74  
 Елатиновые 12, 274  
 Ель 9, 50  
 — аянская 49, 50  
 — Комарова 50  
 — корейская 50  
 — мелкосемянная 50  
 — сибирская 49, 50  
 Жаброй 350  
 Жасми 204  
 Жгун-корень 294, 302  
 — аянский 302  
 — даурский 302  
 — Монье 302  
 Желтая акация 240  
 Желтушник 195, 197  
 — левконый 198  
 — Маршала 198  
 — орайский 197  
 Женьшень 287, 292  
 — настоящий 292  
 Жерушник 197, 198  
 — исландский 198  
 — мелкосемянный 198  
 — шаровидный 198  
 — щетинополосый 198  
 Живокость 174, 184  
 — губоцветная 184  
 — крупноцветковая 184  
 — Маака 184  
 — толстолистная 184  
 Живучка 345, 346  
 — многоцветковая 346  
 Жимолостевые 5, 18, 378  
 Жимолость 378, 380, 436  
 — горбатая 382, 383  
 — золотистая 382, 383  
 — Маака 380, 383  
 — Максимовича 382  
 — раннецветущая 382  
 — Рупрехта 382, 383  
 — съедобная 382  
 — Турчанинова 382  
 — Шамиссо 382  
 — щетино-полосистая 382  
 Жирдяния 160, 161  
 — остроколючая 159, 161  
 Жирянка 374  
 — волосистая 374  
 Житняк 69, 91, 92  
 Жостер 266, 438  
 Журавельник 250, 254  
 — обыкновенный 254  
 Заманха 287, 288  
 Заникелля 55, 60  
 — болотная 60  
 Заразиха 372  
 — амурская 371, 372  
 — Коржинского 372  
 — синенатая 372  
 — толстоколая 372  
 Зираховые 5, 9

Звездчатка 171  
 — бесприцветниковая 171  
 — Бунге 171  
 — вильчатая 172  
 — двуветвистая 172  
 — извилистая 172  
 — лучистая 171  
 — призмистая 172  
 — раскидистая 172  
 — средняя 171  
 — топяная 172  
 — перлериовидная 171  
 — Фенля 172  
 — алуэская 172  
 Зверобой 272  
 — большой 272, 275  
 — Гейлера 272  
 — камчатский 274  
 — отдаленный 274, 275  
 Зверобойные 6, 14, 272  
 Зеленоцвет 139, 140  
 Земляника 210, 220  
 — восточная 220  
 Земляничный томат 359  
 — Зигадену 115, 116  
 — сибирский 116  
 Зимолубка 314, 316  
 — зонтичная 316  
 — японская 316  
 Знаки 5, 10, 64  
 Змеевка 68, 84  
 — китайская 83, 84  
 Змеголовник 345, 346, 348  
 — аргусский 349, 350  
 — многоцветный 349, 350  
 — молдавский 350  
 — поникший 350  
 — Стеллера 350  
 — тимьяноцветный 348  
 Золотарник 6, 394, 396  
 — кандакский 396  
 — тихоколенский 396  
 Зонтичные 5, 6, 18, 292  
 Зонник 346, 350  
 — клубненосный 350  
 — корейский 350  
 — Максимовича 350  
 Зубровка 67, 76  
 — альпийская 76  
 — Бунге 78  
 — голая 78  
 — Луиастая 78  
 Зубянка 198  
 — тонколистная 198  
 Зубчатка 360, 368  
 — поздняя 368  
 Зюзник 345, 346, 354  
 — блестящий 353, 354  
 — Маака 353, 356  
 — мелкоцветковый 356  
 — опушенный 356  
 Ива 5, 140, 142  
 — барбарисолистная 147  
 — Бебба 148  
 Ива бурекунта 146  
 — грушанолистная 147  
 — даурская 144, 145  
 — длинноствольная 141, 145  
 — дамчатая 147

— зеленосерая 147  
 — зеленоватая 147  
 — кангискакая 144  
 — калиновидная 146  
 — козы 145, 146  
 — копейвидная 144, 148  
 — корзиночная 146  
 — короткопоясковая 143, 146  
 — Коха 147  
 — Крылова 148  
 — Максимовича 143, 146  
 — мартовская 147, 148  
 — монгольская 144  
 — иппонская 144  
 — оваловидная 147  
 — продолговатостная 147  
 — Пьеро 144  
 — пятизачинковая 146  
 — Радде 148  
 — растопыренная 144  
 — розистая 144, 145  
 — сахалинская 144  
 — сердцелистная 143, 147  
 — сизая 146  
 — синевато-серая 147  
 — скальная 147  
 — Старка 147  
 — сухобливая 148  
 — Сюева 141, 145  
 — темновидная 146  
 — тонколистная 141, 146  
 — тонкоствольная 143  
 — трехзачинковая 144  
 — удская 144  
 — узловатая 146  
 — цельнолистная 142, 143  
 — черничная 148  
 — чешуесережчатая 144  
 — Шверина 143, 146  
 — шерстистоветвистая 146  
 Иван-чай 282, 284  
 Ивовые 5, 12, 140  
 Ивком 272, 273  
 Икотник 195, 200  
 — серый 200  
 Ильм 158, 437, 439  
 — длинный 158  
 — горный 158  
 — крупноколючий 158  
 — лобастый 158, 439  
 — шакский 158  
 — сродный 158  
 Ильмовые 5, 13, 158  
 Инкарвиллея 370  
 — китайская 370  
 Ипомея 334, 336  
 — сибирская 336  
 Ирисовые 11, 128  
 Ириный корень 107  
 Истод 255  
 — сибирский 255, 257  
 — Татарникова 255, 257  
 — тонколистный 255, 257  
 — японский 255, 257  
 Истодовые 5, 18, 255

Кавалии 6, 395, 416  
 — Комарова 416  
 — копейвидная 416  
 — понуцная 416

— ушастая 416  
 Калля 378, 380, 436  
 Каленика 380, 381  
 — Саржента 381  
 Каллино 129, 131, 132  
 — луковичная 132  
 Каллистифус 6, 393, 398  
 — китайский 398  
 Калопанакс 288, 439  
 — семилостный 288, 290  
 Калужница 179  
 — карликовая 179  
 — лесная 180  
 — перепончатая 180  
 — плавающая 179  
 Кальдезия 62  
 — белозаролистная 62  
 Камилекома 204  
 — астильбовидная 206  
 — годостебельная 206  
 — гребенчато-ресничатая 206  
 — колючая 206  
 — Коржинского 206  
 — короткозубчатая 205, 206  
 — листочная 206  
 — маньчжурская 206  
 — Нельсона 206  
 — охотская 207  
 — поникающая 207  
 — продолговатостная 206  
 — сибирская 207  
 — топяная 206  
 — шерстелистная 206  
 Камилекомые 5, 15, 17, 18, 204  
 Камыш 93, 98  
 — Вихуры 98  
 — восточный 98  
 — Десуляя 98  
 — Комарова 98  
 — Максимовича 98  
 — обесценный 98  
 — озерный 98  
 — остроколючный 98  
 — прямой 98  
 — скученный 97, 98  
 — Габриельсманна 98  
 — трехгранный 97, 98  
 — укоренившийся 98  
 Канареечниковые 66, 67  
 Канатик 270  
 — Теофраста 270  
 Канута 195, 201  
 — лесная 201  
 Каратана 236, 440  
 — древовидная 240  
 — кустарниковая 238, 239  
 — уссурийская 238, 239  
 Карлеви 6, 402  
 — крупноколючий 402  
 — пестрый 401, 402  
 — поникший 401, 402  
 Касатик 128  
 — Глухова 129  
 — вильчатый 128  
 — вилуцый 127  
 — восточный 128  
 — гадкий 128  
 — желтый 129  
 — Кошфера 128  
 — мечевидный 127

- Касатик одноцветный 128  
 — щетинистый 128  
 Касатиковые 5, 11, 128  
 Кассиопы 316, 320, 435  
 — вересковидная 320  
 Кедовского 320  
 Кедраш 360, 366  
 — бледная 366  
 Кашин 171, 174  
 — поздний 174  
 — тихоокеанский 175  
 — фиолетовый 175  
 «Кедр корейский» 52, 53  
 Кедровая сосна 52, 53  
 Кедровик 52  
 Кедровый стланчик 52, 53  
 Келерия 68, 84  
 — азиатская 84  
 — аскольдова 84  
 — корейская 84  
 — тонкая 84  
 Кизилковые 5, 17, 312  
 Кизильник 212, 216  
 — черноплодный 216, 217  
 Кизил 322, 324  
 — кистецветный 324  
 Киллинг 93, 94  
 — коротколистная 94, 96  
 Кипарисовые 53  
 Кипрей 282  
 — даурский 284  
 — болотный 282  
 — даурский 282  
 — железистый 284  
 — токий 282  
 — угловатый 282  
 — гидро-рыльцевый 284  
 — каменный 284  
 Кипрейные 6, 17, 282  
 Кирказон 161, 162, 437  
 — маньчжурский 162, 163, 437  
 — приречный 162, 163  
 Кирказоновые 5, 17, 161  
 Кислица 254  
 — обратнодельтовидная 254  
 — обыкновенная 254  
 — рождественская 254  
 — торчатая 254  
 Кислячковые 5, 15, 254  
 Кислячник 161, 164  
 — двухлобчатый 164  
 Кистеесемный 340, 342  
 — тонкий 342  
 Кисшам 272, 273  
 Кисшвет 293, 298  
 — посевной 298  
 Клайтония 14, 170  
 — Эшшольда 170  
 Клевер 234, 238  
 — белый 238  
 — гибридный 238  
 — крапиво 238  
 — луговой 238  
 — долиннодолиный 238, 239  
 — ланцетный 238  
 — полевой 238  
 — ползучий 238  
 — розовый 238  
 — тихоокеанский 238, 239  
 Клен 262, 440  
 — американский 262  
 — борщчатый 262, 265  
 — желтый 262, 267  
 — зеленочерный 262  
 — Комарова 263, 265, 266  
 — красный 262  
 — ложнооблаженный 262, 264  
 — маньчжурский 262, 264, 440  
 — мелколистный 262, 264  
 — мохо 262  
 — приречный 262, 265  
 — укорученный 262, 267  
 — яснелистный 262  
 Клен-липа 262, 264  
 Кленовые 5, 16, 262  
 Клинтоны 115, 122  
 — удская 122  
 Клоповка 321  
 Клоповник 197, 201  
 — беззуболистный 201  
 — виргинский 201  
 Клопогон 179, 180  
 — борщевиколистный 180  
 — даурский 180  
 — простой 180  
 Клякша 321, 435  
 — мелкоплодная 321  
 — обыкновенная 321  
 Княженица 218, 221  
 Княжик 178, 187, 440  
 — крупноплостный 187  
 — охотский 187  
 Ковыл 67, 78  
 — байкальский 77, 78  
 — развесистый 77, 78  
 — сибирский 78  
 Кодонансис 386, 390  
 — ланцетный 390  
 — мелкооволокнистый 390  
 — уссурийский 390  
 Козелец 6, 392, 430  
 — белостебельный 429, 430  
 — лучистый 429, 430  
 Кокшуник 139, 138  
 — комарниковый 138  
 Колеантус 67, 80  
 — тонкий 80  
 Колокольчик 388  
 — голочатый 387, 388  
 — Лангсдорфа 388  
 — точечный 387, 388  
 — Турчанинова 388  
 Колокольчиковые 6, 18, 386  
 Колосник 70, 91  
 — высокий 92  
 — даурский 92  
 — мягкий 91, 92  
 — сибирский 91, 92  
 Колчачая вишня 232  
 Комелина 110  
 — обыкновенная 110, 112  
 Комелиновые 5, 11, 110  
 Комптограмма 19, 37  
 — средняя 37, 39  
 — яснелистная 37  
 Комондены 5, 12, 158  
 Конона 158, 160  
 — посевная 160  
 Коночник 235, 242  
 — альпийский 242  
 — даурский 242, 243  
 — уссурийский 242, 243  
 — щетинистый 242  
 Контис 179, 180  
 — трехлиственный 180, 182  
 Копытец 161, 162  
 — Зибольда 162, 163  
 Корнандр 293, 298  
 — посевной 298  
 Коряк 359, 360  
 — обыкновенный 362  
 Коротколистник 338, 342  
 — воронеголазый 341, 342  
 Короставник 384  
 — полевой 384  
 Кортуса 322, 324  
 — амурская 324  
 — нежинская 324, 325  
 Косогорник 6, 392, 434  
 — Максимовича 434  
 — Татарникова 434  
 Костенец 20, 35  
 — надрезанный 32, 35  
 — письменный 32, 35  
 — постенный 35  
 Костер 69, 90  
 — безостый 90  
 — береговой 90  
 — Рычардсона 90  
 — ржавый 91  
 — полевой 91  
 — японский 91  
 Костяника обыкновенная 220  
 — хмелистная 218  
 Котовник 346, 348  
 — кошачий 348  
 — маньчжурский 348  
 Котула 6, 396, 407  
 — корончатая 407  
 Кохия 168, 169  
 — веничная 169  
 Кошачья лапка 6, 394, 400  
 — двудомная 400  
 Кочедыжник 20, 30  
 — городчатый 33, 35  
 — женский 34, 35  
 — иглолистный 30, 33  
 — инокский 34, 35  
 — корейский 33, 35  
 — краснотерешковый 35  
 — крапчатый 33, 35  
 — мелкогородчатый 35  
 — письменный 35  
 — почти щетинистый 34, 35  
 Крапиво 20, 37  
 — Куна 37, 38  
 — серебристый 37, 38  
 — темный 37  
 Крапива 160  
 — ягучая 160  
 — коноплевая 160  
 — светло-зеленая 160  
 — синюшная 160  
 — усложненная 160  
 Крапиво 5, 12, 160  
 Крапиво 321, 438  
 Краснопузырьник 260, 437  
 — круглолистный 262, 263  
 — палеобразный 260, 263  
 Красодив 115, 116  
 — Демонье 118  
 — малый 116, 117  
 — Миллерея 117, 118  
 Краудурдия 328  
 — высокая 328, 331  
 Крашенинниковия 171, 172  
 — Давида 172  
 — жесткая 172  
 — Максимовича 172  
 — лесная 172  
 — скальная 172  
 — японская 172  
 Крепкоплодный 196, 200  
 — сиринский 200  
 Крестовик 6, 393, 394, 395, 416  
 — амбровый 418  
 — амурский 417, 418  
 — артурский 418  
 — арктический 418  
 — дубравный 417, 418  
 — коноплеволистный 418  
 — липкий 418  
 — Литвинова 418  
 — лизеяриков 418  
 — обыкновенный 417, 418  
 — пламенный 417, 418  
 — прикоричневый 420  
 — сиктозалинский 418  
 — стробильный 420  
 Крестовые 5, 12, 15, 195  
 Кривокулич 19, 35  
 — сибирский 35, 36  
 Кринтограмма 19, 37  
 — Радде 37, 39  
 Критозон 70, 93  
 — Гринштейн 92, 93  
 Кровавока 211, 228  
 — алтеяная 230  
 — великолистная 229, 230  
 — железистая 228  
 — мелкоцветковая 228  
 — ситхинская 229, 230  
 — толстолистная 230  
 Кронос 19, 37  
 — ялчачий 36, 37  
 Крупа 196, 200  
 — лесная 200  
 — сахалинская 200  
 — сердцевиднолистная 200  
 — уссурийская 200  
 Крушина 266, 438  
 — даурская 266  
 — диамантная 266  
 — уссурийская 266  
 Крушиновые 5, 16, 266  
 Крюковник 18, 204, 210  
 — бурчанинский 209, 210  
 Кубышка 175, 178  
 — малая 177, 178  
 — японская 178  
 Кушница 175, 178  
 — четырехгранная 177, 178  
 — малая 178  
 Кушниковые 5, 11, 14, 175  
 Куколь 171, 173  
 — обыкновенный 173  
 Кулаба 6, 392, 430  
 — осенний 430  
 Кулалыч 179, 180  
 — китайский 180



- Кундалинская Ледобура 180  
 — Рилера 180  
 Кулепа 116, 124  
 — вздутая 124  
 — Десуави 124, 125  
 — душистая 124, 125  
 — низкая 124, 125  
 — обвертковая 124, 125  
 — остроколючая 124, 125  
 — уколостная 124, 125  
 Кумыр 292, 294  
 — похожий 295  
 — похожий щетинистоплодный 295, 296  
 Курильский чай 211, 220  
 Лабазник 211, 212, 228  
 — гладкий 228  
 — далаевидный 228  
 — корейский 228  
 — средний 228  
 — узкодольный 228  
 Лаготис 360, 366  
 — малый 366  
 Ладья 129, 134  
 — трехнадрезный 134  
 Ландыш 116, 124  
 — Кейске 124  
 Лапорея 160  
 — клубнистая 159, 160  
 Ланчатка 5, 211, 212, 220  
 — амурская 222  
 — беловишная 220  
 — белобельная 222  
 — видчатая 223, 224  
 — гусиная 224  
 — земляничковидная 226  
 — земляникообразная 222  
 — пазухная 222  
 — китайская 223, 224  
 — ледяная 226  
 — Клеина 222  
 — крипотенная 222, 223  
 — лабазниковидная 226  
 — многонадрезная 224  
 — мутчатая 224  
 — неблестящая 222  
 — не определенный вид 226  
 — низкая 226  
 — норвежская 222  
 — пачкающая 224  
 — цветевидная 222, 223  
 — подражающая 224  
 — подугладкая 224  
 — разноцветная 222  
 — снежная 220  
 — столбная маньчжурская 220, 222, 223  
 — тихоокеанская 224  
 — Траншея 224  
 — уссурийская 224  
 — Фрейна 222  
 — Ширенгеля 226  
 Ластовень 332  
 — аляскинский 334  
 — аэстрокарпальный 334, 337  
 — лепидовидный 334  
 — неприятный 334  
 — пурпуровый 334  
 — стеблелобный 334, 337  
 — Вильфорда 334  
 — черноватый 332, 337  
 — Ластовень 6, 16, 332  
 — Ластовень 6, 392, 432  
 — мелкозубчатый 431, 434  
 — осолощенный 434  
 — ползучий 429, 432  
 — Раде 431, 432  
 — разноцветный 431, 434  
 — растопыренный 432  
 — скальный 434  
 — треугольный 431, 432  
 Лебеда 168  
 — Гмелина 169  
 — ковыльная 168  
 — прибрежная 169  
 — раскидистая 169  
 — Лесерн 67, 76  
 — рисовидная 75, 76  
 — Лейбница 6, 391, 428  
 — бестычинчатая 430  
 — Лен 254  
 — амурский 254  
 — прутьевидный 255  
 — Ленец 161  
 — китайский 161  
 — преломленный 161  
 — щетинистый 161  
 — Лептопирум 179, 180  
 — дымчатый 180  
 — Лесной мак 192  
 — — весенний 192  
 — Леспедеца 234, 242  
 — даурская 245, 246  
 — двухцветная 237, 242  
 — колесчатая 243, 245  
 — мохнатая 245, 246  
 — плотная 237, 242  
 — полосатая 243, 245  
 — прилистниковая 243, 245  
 — Лещина 151, 156, 438, 439  
 — короткостебельная 156  
 — маньчжурская 155, 156  
 — разнолистая 155, 156, 439  
 — Лигустикум 292, 302  
 — курпуловоплодный 302, 305  
 — Хулиана 302  
 — Лианхитон 107  
 — камчатский 107  
 — Лилейные 5, 6, 11, 115  
 — Лилия 145, 120  
 — даурская 119, 120  
 — красильная 119, 120  
 — Максимовича 120  
 — медолюбивая 120  
 — молистая 120  
 — японская 120  
 — тигровая 120  
 — тонколистная 120  
 — Лиморхис 130, 138  
 — пестроцветная 138  
 — Лимонник 192  
 — китайский 192  
 — Линдерия 360, 364  
 — стелющаяся 364, 365  
 — Липня 378, 380, 435  
 — северная 380, 381  
 — Липа 268, 437  
 — амурская 270, 271  
 — Комарова 270  
 — корейская 270, 271  
 — маньчжурская 268, 270, 271  
 — монгольская 268  
 — пенкистая 268, 271  
 — раскидистая 268  
 — Таке 270  
 — кжигуусурийская 268  
 — Липарис 130, 132  
 — Макино 132  
 — японский 132  
 — Липовые 5, 14, 268  
 — Липучка 340, 344  
 — неравнолинейная 344  
 — колючая 344  
 — Лисохвост 67, 80  
 — альпийский 80  
 — амурский 80  
 — вздутый 80  
 — длинноостный 80  
 — короткоколючковый 80  
 — луговой 80  
 — Листовница 8, 50  
 — даурская 50  
 — Комарова 50  
 — курильская 50  
 — Миддендорфа 50  
 — ольгинская 50, 51  
 — охотская 50  
 — приморская 50  
 — припика Рундхейта 50  
 — Листовник 19, 35  
 — японский 35, 36  
 — Листовник 255, 256  
 — уссурийский 256, 258  
 — Лихнис 171, 174  
 — Вильфорда 174  
 — родственный 174  
 — сверкающий 174  
 — сибирский 174  
 — Лобелия 115, 122  
 — пазухная 122  
 — трехцветная 122  
 — Лобелии 5, 17, 390  
 — Лобелия 390  
 — сидячелюстная 391  
 — Ложечница 196, 201  
 — продолговатая 201  
 — Ложноберенек 292, 300  
 — чашечный 300  
 — Ломатошник 328, 330  
 — колесовидный 330  
 — Ломонос 178, 187, 440  
 — бурый 187  
 — корышчатый 188  
 — короткоостный 188  
 — маньчжурский 188  
 — шашечный 188  
 — шестилестный 188  
 — Лопух 6, 393, 422  
 — войлочный 422  
 — крупный 422  
 — Лотос 175  
 — Комарова 175, 176  
 — Луазелерия 318, 320, 435  
 — лесная 320  
 — Луговик 68, 81  
 — пазухный 81  
 — северный 82  
 — Сукачева 82  
 — Лукияна 359, 362  
 — Лукияна волная 362, 365  
 — Лук 115, 118  
 — густой 118  
 — душистый 118  
 — Комарова 120  
 — крупнотычинковый 118  
 — Ледобура 120  
 — Маки 118  
 — метелковатый 120  
 — нервнозудовой 118  
 — однокотловый 118  
 — охотский 118  
 — скорода 120  
 — стареющий 120  
 — топящий 118  
 — Луносеминный 5, 11, 190  
 — Луносеминный 190, 439  
 — даурский 192, 193  
 — Лыжные 5, 15, 254  
 — Лыжная 359, 362  
 — марьяникова 362  
 — обыкновенная 362  
 — японская 362  
 — Люба 130, 138  
 — дальневосточная 138  
 — комариновая 138  
 — Максимовича 138  
 — Фрейна 138  
 — Лютиция 282  
 — расцветшая 282  
 — Лютис 178, 188  
 — амурский 188  
 — бескорневой 188  
 — Гмелина 188  
 — Кауфмана 188  
 — китайский 188  
 — однокотловый 189  
 — ползучий 189  
 — стоячий 188  
 — Тахире 189  
 — уссурийский 189  
 — ядовитый 188  
 — японский 189  
 — Лютисовые 5, 6, 13, 14  
 — Лютиса 234, 236  
 — посевная 236  
 — серповидная 238  
 — хмелевидная 236  
 — Лядвенек 234, 238  
 — рогастый 238  
 — Маки 234, 236  
 — амурская 236, 237  
 — Магнолиевые 5, 15, 192  
 — Мадус 360, 362  
 — чистоцветный 362, 363  
 — японский 362, 363  
 — Майник 116, 122  
 — дуэльный 122  
 — средний 122  
 — широколистный 122  
 — Макные 5, 13, 14, 192  
 — Мак 192  
 — амурский 192  
 — Малина 210, 212, 218, 439, 440  
 — боярышниковидная 220, 221, 439  
 — Комарова 220, 221  
 — сахалинская 220, 221  
 — Мальвовые 5, 14, 270  
 — Малик 68, 88

Манин колосковый 88  
 — литовский 88  
 — плавающий 88  
 — тонкокоричневый 88  
 — трехцветный 88  
 — уссурийский 88  
 Маревые 12, 168  
 Марена 376, 378  
 — пещерная 377, 378  
 — китайская 377, 378  
 — лесная 377, 378  
 — полевая 378  
 Мареновые 6, 18, 376  
 Марь 168  
 — белая 168  
 — бромнелистная 168  
 — Бахса 168  
 — гибридная 168  
 — городская 168  
 — остистая 168  
 — сизая 168  
 Марьяник 360, 366  
 — розовый 366  
 — щетинистый 366  
 Маслиновые 5, 12, 46, 326  
 Мать-и-мачеха 6, 391, 416  
 — обыкновенная 416  
 Мелкоцветник 6, 394, 395, 399, 437  
 — едкий 400  
 — камчатский 400  
 — канадский 400  
 — Охари 395, 399, 437  
 — удлиненный 400  
 — щетинистый 399  
 Медколюдики 212, 218, 439  
 — ольховитный 217, 218  
 Медкошечуйник 20, 30  
 — Вильфорда 30, 32  
 — волосистый 30, 32  
 Мерияны 171, 173  
 — бокоцветная 173  
 Мертензия 338, 340, 342  
 — азиатская 342  
 — рудеяковская 342  
 Металлексы 332  
 — японский 332, 335  
 Микробиота 8, 53  
 — перекрестнопарная 48, 53  
 Микрогостем 66, 70  
 — узловатый  
 Минуария 171, 173  
 — листенничная 173  
 — тонконожика 173  
 Мискантус 66, 70  
 — краснеющий 70, 71  
 — сахароцветный 70, 71  
 Мителла 204, 207  
 — голая 207  
 Михеия 346, 348  
 — крапиволистная 348  
 Млечник 322, 326  
 — приморский 326  
 Многоколосник 346, 348  
 — морщинистый 348  
 Многокоренник 109, 110  
 — обыкновенный 110  
 Многоножка 19, 20, 37  
 — виргинская 36, 37  
 — уссурийская 36, 37  
 Многогрядник 20, 30  
 — Грива 30, 31  
 — трехраздельный 30, 31  
 — укореняющийся 30, 31  
 Можжевельник 8, 9, 53  
 — даурский 48, 53  
 — сибирский 48, 53  
 — твердолопный 48, 53  
 Мокрица 171  
 Молокаи 6, 392, 432  
 — сибирский 432  
 Молодая 255, 256  
 — двухцветный 256  
 — Комарова 256  
 — маньчжурский 256  
 — приземистый 256  
 — рошечный 256  
 — Савари 256  
 Молочайные 6, 12, 13, 255  
 Монохория 110  
 — Корсакова 110  
 — подорожниковая 110, 111  
 Монция 14, 170  
 — блестящесемная 170  
 Мордовник 6, 392, 421  
 — расщепленный 421  
 Морозка 218, 221  
 Морьян 171, 173  
 — бутербаловидная 173  
 Моховка 210  
 Мшанка 171, 173  
 — крупная 173  
 Мыльнянка 171, 175  
 — аптечная 175  
 Мытник 360, 368  
 — Кардов-скипетр 369  
 — колосовой 368  
 — крупноцветный 370  
 — Кузнецова 368  
 — лабдорский 370  
 — лапландский 370  
 — маньчжурский 369, 370  
 — миловидный 370  
 — мутноватый 368  
 — перевернутый 369, 370  
 — полосатый 370  
 Мышный горошек 247  
 Мюленбергия 67, 78  
 — Гюгеля 78, 79  
 — японская 78, 79  
 Мята 346, 356  
 — даурская 356  
 — прострочащенная 356  
 Мытник 69, 86  
 — артистический 88  
 — болотный 88  
 — боровой 88  
 — веретеновидный 86  
 — выдающийся 86  
 — кистевидный 86  
 — крупночашечный 86  
 — луговой 86  
 — олодотский 86  
 — сибирский 86  
 — сизосемянный 86  
 — узколистный 86  
 — узлопочечный 86  
 — уссурийский 86  
 — шероховатый 86  
 — широкометельчатый 86

Надбородник 129, 136  
 — беззастытый 136  
 Нарциссы 391, 416  
 — дваневидная 416  
 — скальная 416  
 Настоящие папоротники 8, 22  
 Наюда 60  
 — малая 60  
 — морская 60  
 — ячешастая 60  
 Нелюбовые 6, 10, 60  
 Нелюбка 395, 416  
 Недотрога 263  
 — вильчатая 266  
 — Комарова 266  
 — Маака 266  
 — обыкновенная 266  
 — Ройля 263  
 — Текстора 266  
 Незабудка 340, 342  
 — дернистая 342  
 — душистая 342  
 Незабудочник 338, 344  
 — Маака 344  
 — серый 343, 344  
 — сикотэалинский 344  
 Неоттианта 130, 136  
 — клубочковая 138  
 Неслия 196, 249  
 — метельчатая 202  
 Нивяник 6, 395, 396, 406  
 — арктический 406  
 — линейный 406  
 — обыкновенный 406  
 Никандра 358, 359  
 — физалисовидная 359  
 Нителестник 6, 393, 407  
 — сибирский 407, 409  
 Нюпа 340, 342  
 — русская 342  
 Норичник 360, 362  
 — амурской 361, 362  
 — Грая 362  
 — Максимовича 361, 362  
 — Оддэма 361, 362  
 Норичниковые 5, 13, 17, 359  
 Обманчиволодики 293, 294  
 — тонкий 294  
 Овес 68, 82  
 — пустой 82  
 — посевной 82  
 Овес 68, 82  
 — даурский 82  
 — Шелля 82  
 Овсяные 69, 68  
 Овсяк 82  
 Овсяница 69, 90  
 — дальневосточная 89, 90  
 — красная 90  
 — лесная 90  
 — лежбищевидная 89, 90  
 — луговая 90  
 — мшистая 90  
 — приземистая 90  
 — якутская 90  
 Овсянниковые 66, 68  
 Однодольные 53  
 Одноцветка 314  
 — крупноцветковая 314  
 Одуванчик 6, 391, 430  
 — аптечный 430  
 — калустолистный 432  
 — корейский 430  
 — монгольский 432  
 — многогранный 430  
 — роголистный 432  
 — уссурийский 432  
 Ожика 112, 114  
 — бледноватая 113, 114  
 — мелководная 114  
 — многоцветковая 114  
 — рыжеватая 113, 114  
 Ожика 220, 221  
 Оляка 9, 151, 439  
 — камчатская 151  
 — красильная 151  
 — кустарниковая 149, 151  
 — Максимовича 151  
 — маньчжурская 151  
 — пушистая 149, 151  
 — японская 149, 151  
 Омер 293, 298  
 — пятилиственный 298  
 Омежник 293, 302  
 — лежачий 302  
 Омега 161, 435  
 — окрашенная 161  
 Омфалотрикс 360, 368  
 — длинноязычковый 367, 368  
 Оноклея 19, 22  
 — чувствительная 22  
 Ореорхис 130, 134  
 — расщепленный 134  
 Орех 148  
 — маньчжурский 148, 150  
 Ореховые 5, 12, 148  
 Оряк 20, 37  
 — обыкновенный 37, 38  
 Ортодон 345, 356  
 — крупноплодный 356  
 Орхидеи 6, 9, 11, 129  
 Осина 140, 141  
 Осляк 282, 284  
 — двукветный 284  
 — коротковетный 284  
 Осморица 292, 298  
 — остистая 297, 298  
 Осмунда 40  
 Осока 5, 93, 100  
 — Августинская 104  
 — амурская 105  
 — Арнея 106  
 — бледная 102  
 — бледно-зеленая 105  
 — болотная 102  
 — болотная 103  
 — буроватая 103  
 — Ван-Хьюри 105  
 — вазутоносная 105  
 — возмативная 105  
 — возмативная 105  
 — патикута 106  
 — высокотерная 102  
 — гладкая 102  
 — Гмелина 104  
 — голоножковидная 101, 102  
 — голоножковидная 100  
 — глянцевая 107



Осека двухсумчатая 102  
 — дутыччиновал 102  
 длинноносая 106  
 женосильная 106  
 жесткозатая 103  
 жьялгохолодная 102  
 жьялчатая 105  
 жэсочная 105  
 камелюбная 102  
 Каро 104  
 кирганинская 106  
 кобомути 102  
 козерогой 106  
 корейская 104  
 Коржинского 104  
 крапчатая 103  
 красовлас 105  
 кривноносая 106  
 кровноколосная 106  
 круглая 105  
 кругловатая 106  
 курчавая 105  
 курчаворыльчатая 105  
 кушачья 105  
 лапаласная 103  
 ланская 104  
 ложнокурчавая 102  
 ложношлемовая 103  
 ложносизая 104  
 Маака 103  
 малокосовая 106  
 малорисоватая 105  
 малосизая 106  
 малоретчатая 100  
 маньчжурская 105  
 Мейера 104  
 мечевидная 107  
 мечковочная 105  
 Милдендорфа 103  
 миндальная 106  
 мохнатая 102  
 мягчайная 106  
 пызельная 105  
 ножкоподная 104  
 ноукутсунская 104  
 носколюбивая 102  
 пшелевая 103  
 плоскошлемовая 106  
 плоская 103  
 притупленная 102  
 примокосая 107  
 пузыреватая 106  
 раздвинутая 103  
 расходящаяся 106  
 равновиситная 101, 104  
 рыхлая 104  
 редкая 104  
 сосоватая 103  
 сериовидная 107  
 скритошлемовая 103  
 сосочковая 107  
 степенная 102  
 стоношлемовая 105  
 ступокоренная 102  
 субфундкая 104  
 сукосная 102  
 ситовидная 102  
 тазовская 105  
 твердая 102  
 тоушкочетковая 103

- топяная 104
- туманская 103
- усурейская 101, 104
- уховертка 106
- ханганская 105
- четырехцветковая 105
- шершаволистная 106
- широколепестная 107
- Шимиди 103
- эвкалиптовая 103
- — сосковая 104
- Янковского 100, 101
- Осоковые 5, 6, 10, 93
- Осот 6, 392, 432
- жесткий 432
- короткоушковый 432
- огородный 432
- полевой 432
- Остролист 260
- остроланцевитый 259, 260
- Остролистовые 5, 15, 260
- Остролопастный 236, 241
- глянцевитый 241
- махляжурский 242
- русский 242
- ханкайский 241
- шпиковидный 242
- Оттелия 64
- махушювонная 64, 65
- Офис 328, 330
- Вилдфорда 330
- китайская 330, 333
- Черского 330
- четырехпестичная 330
- Очанка 360, 368
- амурская 368
- Максимовича 367, 368
- усурейская 368
- Очеретник 93, 100
- Бери 100
- Охот 202, 203
- бледный 203
- живородящий 203
- живучий 203
- камчатский 203
- Максимовича 203
- Мидлендфорда 203
- мохообразный 203
- пуруриный 203
- Сельского 203
- спичный 203
- стрелитовидный 203
- усурейский 203
- Элакомба 203
- Пакистин 234, 236
- Гордеева 236
- Корнянского 236
- плосколопастный 236
- Паиза 74
- Паноретикиообразные 4, 7
- Пасленок 5, 558, 436, 441
- беговой 357, 358
- крупнолопастный 358
- черный 358
- Пасленовые 5, 16, 47, 358
- Пастернак 292, 312
- лесной 312
- Пастушья сумка 197, 202

- обмыленная 202
- Папирус 384
- сибирская 384
- слабоолистная 384
- скальная 384
- Пахучая 346, 352
- китайская 352
- Первоцвет 322
- лудчатый 322, 323
- килиостный 322, 323
- мучнистый 322
- отогнутый 322, 323
- тислатский 322
- Первоцветные 6, 17
- Перец 272
- Перечник 197, 201
- Перилла 345, 356
- базиликовая 356
- наикиская 356
- Перловник 69, 84
- Комарова 84, 85
- поникающий 84, 85
- Туранинова 84, 85
- Перулария 130, 138
- китайская 138
- уссурийская 138
- Перчик 272, 273
- Песчанка 174, 173
- ситниковая 173
- Печеночница 178, 187
- азиатская 187
- Пижма 6, 396, 406
- северная 406
- Пикнотельма 352
- метельчатая 322, 335
- Пикунник 345, 356
- двунадрезный 350
- заостренный 350
- ладанниковый 350
- Пилля 160, 161
- зеленейшая 161
- круглолистная 161
- Пион 179
- ветвистый 179
- белоцветный 179
- обратныйсвидный 179
- японский 179
- Пихта 9, 49
- белокорая 49
- почкоцветущая 49
- цельнолистная 49
- Пилуновые 8, 44
- Пилуи 44
- альпийский 44
- баранец 44
- булавчатый 45, 46
- годичный 45, 46
- китайский 45
- колчаный 46
- монгольский 44
- обводостроитель 44
- пильчатый 44, 45
- темный 44
- Пилуниковые 46
- Пилунок 46
- Пилельс 68, 90
- микостелый 90
- мисостелый 90
- Пилуросуруник 19, 37
- Мяндо 37, 38

- Плюскосяевиный 211, 232, 235, 437
- Плюска 67, 74
- Повиликомые 6, 9, 336
- Повилка 336
  - европейская 338
  - китайская 338
  - японская 338
  - окрасочная 336
  - южная 338
  - японская 336
- Поводник 130, 136
  - линейнолистный 136
  - лучший 136
- Повоз 334, 336
  - дурный 336, 339
  - забирный 336, 339
  - плюгевидный 336
  - создательный 336
- Повойничек 274
  - прямосемянный 274
  - туфчиновский 274
- Поворачивание 6, 12, 274
- Погромок 360, 368
  - малый 368
- Подбел 318, 320, 435
  - многолистный 320
- Подблюдина 62, 64
  - мутовчатая 65
- Подолник 292, 294
  - китайский 294
  - красноцветковый 294, 295
- Подмаренник 376
  - байкальский 376
  - дурский 375, 376
  - камчатский 375, 376
  - ложный 376
  - истолый 376
  - северный 376
  - трехцветковый 376
  - удивительный 376
- Подорожник 374
  - большой 374
  - камчатский 374
  - ланцетовидный 374
  - прижатый 374
  - средний 374
- Подорожниковые 5, 16
- Подольник 316
  - обыкновенный 316, 319
- Покосыщенные 4, 5, 6, 53
- Ползига 67, 68, 80
  - белая 81
  - булавчатая 80
  - зимующая 81
  - северная 80
  - собачья 80
  - Тихууса беззаста 81
- Полесевые 66, 67
- Полесевича 69, 84
  - волосистая 83, 84
  - малая 83, 84
- Ползунук 47, 178, 188
  - солончаковый 188
- Полуденный 130, 138
  - асеньный 138
- Полудобосор 179, 180
  - маньчжурский 180, 182
- Полудиниомые 7, 46
- Полудиниук 46
  - маньчжурский 46, 47

Подпня 5, 6, 9, 394, 396, 408, 441  
 — аустрическая 410  
 — Аржи 412  
 — болотная 410  
 — венечная 408, 413  
 — вильчатая 410  
 — волосовидная 408  
 — Гмелляна 410, 414  
 — зайцевоухая 410, 413  
 — замещающая 408  
 — золотистая 411  
 — Кейске 410, 411  
 — Койдауни 412  
 — красноперегородковая 412, 413  
 — крупная 412  
 — лесная 412, 413  
 — ломатая 408  
 — Максимовича 412, 415  
 — маньчжурская 408, 411  
 — Мессеримидта 410  
 — одиолетная 410  
 — пыжиколетная 412  
 — побегоносная 412  
 — прибрежная 408, 411  
 — промысловая 410  
 — пустынная 408  
 — рассеченная 410, 414  
 — Сайто 412  
 — северная 408  
 — селенгинская 412  
 — Севера 410  
 — Стеллера 410, 414  
 — тонкая 412  
 — узколиственная 412  
 — Фелде 412  
 — Фрейна 410  
 — худощавая 408  
 — цельнолистная 412  
 — широколистная 410  
 — японская 408  
 Поштеревые 5, 11, 110  
 Порезник 293, 302  
 — амурский 302  
 — густоцветковый 302  
 — жабрицевидный 302  
 Портулак 5, 14, 18, 170  
 — огородный 170  
 Поручейника 293, 302  
 — прикладкательная 302  
 — прикладкательная узколистная 302  
 — тонкий 302  
 Посконник 6, 391, 396  
 — Лиддла 396  
 Постенница 160, 161  
 — мелкоцветная 161  
 Превалие 392, 434  
 Придлало 395, 432  
 — пристающее 402  
 Принсеня 232, 437  
 — китайская 232, 235  
 — Прищипки 312  
 — лиучковской 312  
 Прозанник 6, 392, 430  
 — реснитчатый 430  
 Пролеска 110, 122  
 — японская 122  
 Проложник 322, 324  
 — Гмелляна 324  
 — зонтичный 324

— молочнокветковый 324  
 — нитовидный 324, 325  
 — северный 324, 325  
 — себей 324  
 Просирник 270  
 — мавританский 270  
 — могиловский 270  
 — низкий 270  
 Провоса 64, 66, 67  
 Просо 67, 76  
 — верхоцветное 76  
 — посевное 76  
 Прострел 178, 187  
 — даурский 187  
 — китайский 187  
 — Кисса 187  
 — многораздельный 187  
 — лопиканский 187  
 — Турчаншова 187  
 Птарника 6, 395, 396, 404  
 Птицелогостис 67, 78  
 — монгольский 77, 78  
 Пуерария 234, 250, 440  
 — волосистая 250, 252  
 Пузатка 129, 136  
 — высокая 136  
 Пузыреплодник 212, 440  
 — амурский 212, 213  
 — смородинолистный 213, 214  
 Пузырник 20, 22  
 — ломкий 22, 24  
 — судетский 22  
 Пузырница 358, 359  
 — физалисовая 359  
 Пузырчатка 374  
 — малая 374  
 — обыкновенная 374  
 — средняя 374  
 Пузырчатковые 5, 13, 374  
 Пулавка 6, 396, 404  
 — собачья 404  
 Пушпырик 292, 298  
 — японский 298  
 Пусторебрышник 294, 306  
 — Гмелляна 306  
 — скальный 306  
 Пустырьник 345, 351  
 — крупнокветковый 351, 352  
 — пятилопастный 351  
 — разнотелый 351  
 Пухонос 93, 94  
 — альпийский 94, 96  
 Пучковик 372  
 — материковый 372  
 — тубуловетковый 371, 372  
 Пушпа 83, 94  
 — влагаловидная 94  
 — корейская 94, 96  
 — короткокомбинированная 94  
 — многоколосая 94  
 — рыжиковая 94  
 — широколистная 94  
 Пыльцедождик 130  
 — длиннолиственный  
 — Пырей 69, 70, 91  
 — амгунский 91  
 — гребенчатый 91  
 — ползучий 91  
 Пятигиделик 204  
 — китайский 204

Раминия 314, 316  
 — однобокая 316  
 — тулая 316  
 Рапонтник 6, 392, 428  
 — одноцветковый 428  
 Раст 201  
 Раст 55  
 Раст взморникостный 58  
 — гребенчатый 58, 59  
 — длинный 58  
 — злаковый 58  
 — курчавый 58  
 — лужайникостный 58  
 — Маака 55, 57  
 — малайский 58  
 — маленький 55  
 — маньчжурский 58  
 — Мидухимико 57, 58  
 — остролостный 57, 58  
 — отливный 58  
 — плавающий 58, 59  
 — произвольный 57, 58  
 — тонколистный 58, 59  
 — яванский 58  
 Растовые 6, 10, 55  
 Реброплодник 293, 298  
 — камчатский 298  
 Ревень 162, 164  
 — плотный 164  
 Регерия 69  
 — «американский шарей» 91  
 — амурская 91  
 — повислая 91  
 — реснитчатая 91  
 — смешанная 91  
 — Турчаншова 91  
 Редька 196, 201  
 — полевая 201  
 Резуха 195, 196, 199  
 — амурская 199  
 — Максимовича 199  
 — повислая 199  
 — Стеллера 199  
 — шершавая 199  
 Ремнецветниковые 5, 9, 161  
 Ренянок 211, 228  
 — бархатистый 228  
 — волосистый 228  
 — мелкоцветный 228  
 — японский 228  
 Ресноне 64, 67  
 Рогоз 53  
 — восточный 55  
 — Лаксмана 54, 55  
 — суженный 53  
 — широколистный 53, 54  
 Рогозовые 5, 9, 53  
 Роголистник 178  
 — рисовый 178  
 Роголистниковые 5, 12, 178  
 Родiola 202  
 — розовая 202  
 Рододедрон 318, 435  
 — даурский 318  
 — золотистый 320  
 — камчатский 320  
 — мелколистный 318  
 — остроконечный 318  
 — поддельный 320  
 — Редового 320

— сиктоэвандийский 318  
 — Шиповника 320  
 Роза 210, 230, 440  
 — даурская 230, 232, 233  
 — итагская 230, 232, 233  
 — Максимовича 230, 231  
 — морщинистая 230, 232  
 — сиктоэвандийская 230  
 — тоноклоновая 230, 233  
 — уссурийская 230, 232  
 Розоцветные 5, 14, 17, 210  
 Ромашка 6, 396, 406  
 — влистая 406  
 — пестичная 406  
 — ромашковидная 406  
 — четырехугольносемянная 406  
 Росника 66, 74  
 — азиатская 72, 74  
 — обыкновенная 74  
 Росника 202  
 — английский 202  
 — круглолистный 202  
 Росниковые 5, 15  
 Рупия 55, 58  
 — морская 58  
 — спиральная 55  
 Рутыоые 5, 16, 258  
 Рыжик 196, 201  
 — гладкий 201  
 — мелколодный 202  
 Рыбница 211, 216, 441  
 — амурская 218  
 — бузинолистная 218  
 — сибирская 218  
 — Шнейдера 218  
 Рыбник 211, 216  
 — альпийский 216  
 — обыкновенный 216  
 — Палласа 216, 217  
 — рыбностный 216  
 — суматошный 216, 217  
 Рыбчик 115, 120  
 — камчатский 120, 121  
 — Максимовича 120, 121  
 — уссурийский 120, 121  
 Рыска 109, 110  
 — маленькая 110  
 — тройчатая 110  
 Рысковые 6, 109  
 Сабельник 211, 220  
 — болотный 220  
 Сальвиниевые 7, 40  
 Сальвиния 40  
 — плавающая 40, 42  
 Санталовые 5, 17  
 Саянококский 293, 306  
 — растопыренная 306, 311  
 Сассифрагил 115  
 — Ольдхэма 115, 123  
 Сида 168, 169  
 — узкая 169  
 — уссурийская 169  
 Сиврига 197, 200  
 — восточная 200  
 Сиврига 328, 330  
 — тупая 330, 333  
 — черемуховая 330  
 Сиврига 312, 314, 436  
 — белая 314, 317



Свинчатковые 5, 16  
 Свободноогонник 288, 440  
 Седлоцвет 130, 132  
 — сахалинский 132, 133  
 Седмичник 322, 324  
 — европейский 326  
 Сезамовые 5, 17  
 Секуринга 13, 255, 256  
 — подкустарник 256, 258  
 Селатигелла 46  
 — закрывающаяся 46, 47  
 — кроваво-красная 46  
 — Росса 46, 47  
 — соварная 46, 47  
 — сибирская 46, 47  
 — шавкатовская 46, 47  
 — швейцарская 46, 47  
 Селатигелловые 8, 46  
 Селезеночник 204, 207  
 — ветвистый 207  
 — волосистый 207  
 — китайский 207  
 — Комарова 207  
 — очеределистный 207  
 — побегоносный 205, 207  
 — широковетосемянный 207  
 Сердечник 196  
 — белый 199  
 — неясный 198  
 — крупнолистный 199  
 — лировидный 198  
 — луговой 199  
 — маргаритковый 199  
 — мелкоцветковый 199  
 — недотрога 199  
 — ползучий 198  
 — Регеля 199  
 Сербородник 66, 70  
 — сибирский 70, 71  
 Серпуха 6, 395, 428  
 — белая 424  
 — вечная 428  
 — Комарова 428  
 Сибальдия 211, 216  
 — крупнолистная 226  
 Сиверсия 211, 226  
 — малая 226, 227  
 Сивилесовия 226, 227  
 Сигебекзия 6, 391, 403  
 — восточная 403  
 — гладкая 403  
 Симподокarpus 107  
 — вошкочий 107, 108  
 Симфиллокарпус 6, 393, 400  
 — тощий 400  
 Синеголовник 282, 294  
 — плосколистный 294  
 Сийейлесис 6, 393, 416  
 — аконитовидный 416  
 Синурус 6, 428  
 Синюха 338  
 — альпийцеватая 338  
 — опушенная 338  
 Синюховые 5, 16, 338  
 Сипик 340, 342  
 — обыкновенный 342  
 Сирень 9, 16, 326, 436  
 — амурская 326  
 — Вольфа 326, 329  
 Сисориинх 128, 129

— узколистный 129  
 Ситниковые 5, 11, 60  
 Ситник 112  
 — амурский 114  
 — Генко 113, 114  
 — жабий 114  
 — зеленостылый 114  
 — краткокоричневостылый 114  
 — Лепено 114  
 — питевский 114  
 — обманчивый 114  
 — сомнительный 114  
 — стигийский 114  
 — тонкий 114  
 — тончайший 114  
 — Турчанниова 114  
 Ситниковые 6, 10, 112  
 Сифностетия 360, 370  
 — китайская 370  
 Скабиоза 384  
 — шерстистолетная 384  
 Скерда 6, 392, 434  
 — бурунская 434  
 — кровельная 434  
 Скрученник 129, 136  
 — китайский 136, 137  
 — приютный 136  
 Сланоголовковые 5, 286  
 Слива 212, 232, 438  
 — китайская 232  
 — уссурийская 232  
 Сложноцветные 5, 6, 10  
 Смедовския 196, 197  
 — белая 197  
 — неясная 197  
 Смылания 116, 122  
 — волосистая 122  
 — даурская 122  
 — трехлистая 122  
 Смолевка 171, 173  
 — воддыриковая 173  
 — длинноствольниковая 174  
 — енисейская 174  
 — корейская 174  
 — обильная 174  
 — ползучая 174  
 — узколистная 174  
 Смородина 18, 204, 208, 439, 440  
 — белоцветковая 210  
 — дикуша 210  
 — душистая 210  
 — Комарова 208, 209  
 — лежачая 210  
 — Максимовича 208, 209  
 — малочетковатая 210  
 — маньчжурская 208  
 — опетивная 208, 209, 439  
 — Пальцевого 208  
 — печальная 208  
 Смыш 293, 300  
 — Генри 302  
 — горная 300  
 — горная морковистая 300  
 Солерос 168, 169  
 — европейский 169  
 Солodka 234, 242  
 — белоцветковая 242, 243  
 Солонечник 394, 399  
 — даурский 399  
 Солянка 168, 169

Солянка Комарова 169  
 — холмовая 169  
 Сорговы 64, 66  
 Сосна 8, 50  
 — могильная 50, 52  
 — обыкновенная 52, 53  
 Сосновые 49  
 Соскорен 5, 6, 395, 422, 423  
 — амурская 422  
 — блестящая 422  
 — войлочная 422  
 — выемчатая 425  
 — жемчужная 424  
 — зубчато-чешуйчатая 425  
 — Китауры 424  
 — крупнолистная 423, 424  
 — Максимовича 425  
 — маньчжурская 425  
 — попилакатая 424  
 — отвороченная 423, 425  
 — почти треугольная 423, 424  
 — советская 422  
 — сомнительная 424  
 — Сочавы 422  
 — теневая 424  
 — треугольная 424  
 — уссурийская  
 — — жасмолистная 424  
 — настоящая 425  
 — перисто-надрезанная 425  
 — разрезная 425  
 — хорошенская 425  
 — полудельчатая 425  
 — черешковая 424  
 — японская 425  
 Софора 235, 236  
 — желтеющая 236, 237  
 Соя 234, 250  
 — уссурийская 250, 251  
 Спаржа 115, 122  
 — даурская 122  
 — маловетвистая 122  
 — поберевидная 122  
 Сростнохвостник 393, 428  
 — дельтовидный 428  
 Стагачка 130, 132  
 — однолиственный 132  
 Стебелест 190  
 — мощный 190, 191  
 Стевенция 195, 199  
 — левкоидная 199  
 Стеллера 280, 282  
 — карликовая 281, 282  
 Стоножка 391, 393, 407  
 — малая 407  
 Струконос 20, 22  
 — термисный 22, 25  
 Стреловид 62  
 — плавающий 62, 63  
 — трилистный 62, 63  
 Стрелотелус 116  
 — стеблеобъемлющий 123, 124  
 — стрелотеловидный 122, 123  
 Суа 345, 356  
 Суарка 196, 198  
 — приморская 198  
 Сусак 62  
 — зонтичный 62  
 Сусакосые 5, 11, 62  
 Сухоцвет 12, 170, 173

Сухоцвет однолиственный 173  
 Сушенница 6, 394, 402  
 — тонкая 402  
 Схизахна 69, 90  
 — мозолистая 89, 90  
 Схизонета 345, 348  
 — многогрозная 348  
 Схизонелла 386  
 — переступелестный 385, 386  
 Сымь 93  
 — амурская 94  
 — илстая 94  
 — луговая 93  
 — Миноты 94  
 — нильстринская 94  
 — нипонская 94  
 — поздняя 94  
 — ползучая 94, 95  
 — разнородная 94  
 — скученная 94, 95  
 — усеченная 94, 95  
 — щетинковидная 93  
 Тавола 211, 214, 438  
 — безрозистая 213, 214  
 — Бовера 214  
 — иволжистая 214, 215  
 — извилистая 214  
 — изынная 213, 214  
 — никакая 214  
 — опушенная 214, 215  
 — пушистая 214  
 — средняя 214  
 — уссурийская 214, 215  
 — шепчотистая 214, 215  
 Табак 130, 134  
 — нипонский 133, 134  
 — сердцевидный 133, 134  
 — Ятабе 134  
 Термопис 234, 236  
 — бобовый 236  
 — линоньевый 236  
 Тилея 202  
 — водная 202  
 Тимофеевка 67, 78  
 — альпийская 78  
 — луговая 78  
 — степная 78  
 Тимьян 344, 352  
 — амурский 354  
 — Арсеньева 354  
 — жидковатый 354  
 — Комарова 354  
 — короткий 354  
 — перавный 354  
 — полуденный 354  
 — Прижельского 354  
 — разветвленного 354  
 — уссурийский 354  
 — ханкайский 354  
 Тис 9, 46  
 — острокопечный 46, 48  
 Тисовые 46  
 Тладина 384, 386  
 — сомнительная 385, 386  
 Тын 293, 300  
 — обыкновенный 300  
 Тогозиния 316, 321, 435  
 — обыкновенная 321  
 Толстиковые 15, 202

Токиовласник 19, 20  
 — маленский 20, 21  
 Токиовласник 19, 20  
 — Райна 20, 21  
 Токиовласниковые 7, 20  
 Токионор 68, 84  
 Тоноль 140  
 — амурский 140  
 — Давида 140, 141  
 — душистый 140  
 — корейский 141, 142  
 — Максимовича 141, 142  
 — уссурийский 140  
 Торилис 292, 298  
 — японский 298  
 Торица 171, 173  
 — полевая 173  
 Торичник 171, 173  
 — крапчатый 173  
 — солончаковый 173  
 Тофиллиа 115, 116  
 — поникающая 116  
 Трапелла 372  
 — китайская 371, 372  
 Траутфеттерия 178, 188  
 японская 188  
 Трескун 326  
 Трифоль 330  
 Трехросточник 68, 82  
 — китайский 82, 83  
 Трехросточник 18, 378, 380  
 — выемчатый 380  
 Тригонитис 340, 342  
 — булавовидный 342  
 — корейский 342  
 — псабуксовый 342  
 — укореняющийся 342  
 Трижелтеник 272  
 — японский 272, 275  
 Триллум 115, 124  
 — камчатский 124  
 Триостенник 60  
 — болотный 60, 61  
 — морской 60, 61  
 Тристиковые 64, 66  
 Тристилик 68, 82  
 — колосистый 82  
 — сибирский 82  
 Тростник 68, 82  
 — обыкновенный 82  
 — поздний 84  
 Турпифорния 338, 340  
 — сибирская 340  
 Турчаниновия 6, 394, 399  
 — верхушечная 399  
 Тут 158  
 — белый 158  
 Тутовые 5, 13  
 Тывенные 5, 18, 159, 384  
 Тысячелогов 170, 175  
 — полевой 175  
 Тысячелистник 8, 396, 404  
 — азиатский 404  
 — обыкновенный 404  
 Ужовник 19, 40  
 — обыкновенный 40, 42  
 Ужовниковые 8, 40  
 Уруть 286  
 — колосовидная 286

— мутовчатая 285, 286  
 — уссурийская 285, 286  
 Фалькача 234, 250  
 — японская 250, 251  
 Филлаха 5, 274  
 — Алевской 278  
 — амурская 274, 280  
 — бутеневиная 274  
 — волосисточерешковая 278  
 — восточная 276, 279  
 — Гмелина 278  
 — горная 276  
 — двухцветковая 276  
 — дуговая 276, 279  
 — зубчаточетковая 278  
 — короткошашелистковая 276, 280  
 — короткошорцевая 278  
 — Кузнецова 280  
 — лимонидная 278  
 — маньчжурская 278, 279  
 — Мюльдорфа 276  
 — надрезанная 274  
 — одностовчатая 278  
 — пальчатая 274, 277  
 — Патрона 278, 279  
 — пестрая 277, 278  
 — ползучая 280  
 — приростная 276, 277  
 — Радде 274  
 — рассеченная 274  
 — ретикулятошашелистковая 280  
 — Росса 279, 280  
 — сахалинская 276  
 — Селькирка 278, 280  
 — скальная 276  
 — скромная 276, 279  
 — тихоокеанская 278  
 — Турчанинова 276  
 — холмовая 277, 280  
 — ложноуссурийская 276  
 Физаликовые 5, 14, 274  
 Физалиструм 358, 359  
 — пилатий 357, 359  
 Физалис 358, 359  
 — голоножковый 357, 359  
 — луистый 359  
 Филлодоце 316, 320  
 — голубая 320  
 Филлоспадикс 60  
 — Скоулера 60  
 Фимбристелис 93, 100  
 — бордоватый 100  
 — гладкоподный 100  
 — растопыренный 100  
 Фрима 374  
 — тонколистная 373, 374  
 Фризомые 5, 374  
 Фтейреспериум 360, 368  
 — китайский 368  
 Функия 115, 116  
 — ланцетовидная 116  
 Хамедафне 318, 320, 436  
 — болотная 320  
 Хаменириум 282, 284  
 — узколистный 284  
 — широколистный 284  
 Хамероиде 211, 226  
 — примостный 225, 226

Хвойник 8, 53  
 — односемянный 51, 53  
 Хвостник 286  
 — обыкновенный 285, 286  
 — четырехлиственный 285, 286  
 Хвостниковые 5, 12  
 Хвод 40  
 — болотный 44  
 — зимующий 43, 44  
 — камышовый 44  
 — лесной 43, 44  
 — луговой 43, 44  
 — пестрый 44  
 — полевой 43, 44  
 — топяной 44  
 Хвоцевые 8, 40  
 Хлорант 140  
 — японский 139, 140  
 Хлорантовые 5, 11, 140  
 Хлорис 68, 82  
 — прутьевидный 82  
 Хлорисовые 66, 68  
 Хмель 12, 158  
 — обыкновенный 160  
 — японский 158  
 Хохлатка 192, 194  
 — амурская 194  
 — белая 194  
 Буша 194  
 — гигантская 194  
 — гребенчатая 194  
 — диманковолостная 194  
 — крупноцветковая 194  
 — линейная 194  
 — обманчивая 194  
 — охотская 194  
 — ползучая 194  
 — расставленная 194  
 — сибирская 194  
 Хрен 195, 196  
 — обыкновенный 198  
 Цикорий 6, 392, 430  
 — внутрирубчатый 430  
 Цинанхум 332  
 Цинна 68, 80  
 — широколистная 80  
 Цизания 67, 76  
 — широколистная 75, 76  
 Цойселевые 64, 66  
 Цойсия 66, 74  
 — японская 73, 74  
 Чабер 345, 352  
 — саломый маньчжурский 352  
 Частуха 62  
 — восточная 62  
 Частуховые 5, 11, 62  
 Чемерица 115, 116  
 — даурская 116  
 — Лобеля 116  
 — Маака 116  
 — остродольная 116  
 — уссурийская 116  
 Череда 6, 391, 404  
 — лучевая 404  
 — Максимовича 404, 405  
 — мелководниковая 404, 405  
 — одностовчатая 404  
 — поникающая 404  
 — трехраздельная 404, 405  
 Черемуха 212, 232  
 — азиатская 232  
 — обыкновенная 232  
 — Маака 232  
 — медвежья 232  
 Черемша 118  
 Черника 438  
 — обыкновенная 321  
 — овальнолистная 321  
 Черноголовая 346, 350  
 — обыкновенная 350  
 Чернокорень 340, 344  
 — растопыренный 344  
 Чертовое дерево 288  
 Чертополох 6, 393, 426  
 — курчавый 426  
 — шпатовый 426  
 Чина 236, 248  
 — болотная 248  
 — волосистая 248, 249  
 — Давида 248  
 — гусиная 248  
 — Комарова 248, 249  
 — морская 248  
 — призматическая 248, 249  
 — пятилиственная 248, 249  
 — японская 248  
 Чистец 346, 352  
 — байкальский 352  
 — китайский 352  
 — Комарова 352  
 — одностовчатый 352  
 — японский 352  
 Чистотел 192  
 — большой 192  
 Чистотел 20, 40  
 — Клейтона 40, 41  
 — коричневый 40, 41  
 Чистотеловые 7, 40  
 Чихотная трава 395, 396, 404  
 — альпийская 406  
 — заостренная 404  
 — монгольская 406  
 Чирокония 406  
 Чованья 140, 141, 438  
 — крупночешуйчатая 141, 142  
 Чубушник 17, 204, 207, 436  
 — толстолистный 207  
 — Шренка 208  
 Чумиза 76  
 Чусва 132, 140  
 — одноклоная 140  
 Шалфей 345, 352  
 — обыкновенный 352  
 Шандра 356  
 Шейхерия 60, 62  
 — болотная 61, 62  
 Шелковница 158, 437, 439  
 Шелковниковые 83, 158  
 Шероховатка 70, 92  
 — Комарова 92  
 — корейская 92  
 Шерстотельный 110  
 — десятичлениковый 110  
 — китайско-русский 110, 111  
 — мощный 110  
 — уссурийский 110, 111  
 Шерстотельниковые 5, 10, 110



- Шерстяк 67, 74  
— волосистый 74  
Шията 259, 435  
— черная 259, 260  
Шиповые 5, 14, 259  
Шип-ярево 388  
Шиповник 210, 230, 440  
Ширококозольчатый 386, 390  
— крупноцветковый 390  
Широколистный 46  
Шлемник 346, 347  
— байкальский 343, 347  
— Иконникова 347  
— Красная 348  
— многолистный 347  
— повислый 343, 347  
— Регеля 347  
— скордицелистный 347  
— Такэ 347  
— тихоокеанский 347  
— туманганский 348  
— уссурийский 347  
— чотковиднолистный 348  
Широколистный 346, 358  
— выростной 355, 358  
— пальчатый 355, 358  
— сизоцветный 355, 358  
Шавель 162  
— амурский 162  
— Гиссина 162  
— длиннолистный 164  
— кисельный 162  
— кислый 162  
— курчавый 164  
— малый 162  
— пирамидальный 162  
— приморский 162  
— удлиненный 164  
— узколистный 162  
— шпигатый 162  
Щетинник 66, 76  
— гигантский 76  
— зеленый 76  
— итальянский 76  
— крупнолистный 76  
— сызны 76  
Шириния 169  
Широкотелый 20, 26  
Широкотелый 29, 30  
— амурский 29, 40  
— ароматный («амурский зверобой») 26  
— бороздчатый 26  
— буковый 26  
— Буша 26, 27  
— владивостокский 30  
— горнокорейский 27, 30  
— Ливия 26  
— луговой 26  
— Микеля 29, 30  
— ниппонский 26  
— почти угрюмоперистый 28, 30  
— Роберта 26  
— сихотэлинский 26  
— толстокожий 26, 27  
Щучка 68, 81  
Эвриала 175, 178  
— устранимая 177, 178  
Эдельвейс 6, 393, 400  
— бледно-желтый скученный 400  
— курильский 400  
— Палибина 400  
— разноцветный 400  
— адельвейсовидный 400  
Экзипта 6, 391, 404  
— белая 404  
Элеутерококк 288, 440  
— колючий 288, 289  
Эльсгольция 343, 356  
— ложногребенчатая 356  
— Патрина 356  
— поздняя 356  
Энемон 179, 180  
— Радде 180  
Эрикакаулоновые 10  
Эфедровые 53  
Эхинопанах 288  
— высокий 287, 288  
Эхинопистис 386  
— шпигатый 386  
Яблоня 212, 216, 439  
— маньчжурская 216  
— Палласа 216  
— сибирская 216  
Ярута 196, 201  
— ложечная 201  
— ползлая 201  
Ясенец 255  
— пушистолистный 255  
Ясень 9, 12, 326, 441  
— горный 326, 327  
— маньчжурский 326, 327  
— носолистный 326, 327  
Ясколка 171, 172  
— дернистая 172  
— малочветковая 172  
— ползлая 173  
— Фидлера 172  
Ясменник 376  
— душистый 376  
— Максимовича 375, 376  
— широкий 376  
Яснотка 345, 346, 350  
— белая 350  
— бороздчатая 350  
— стеблеобъемлющая 350  
Ястребинка 6, 392, 434  
— гладкая 434  
— зипчатая 434  
— корейская 433, 434  
— ядовитая 434  
Ятрышниковые 11, 129  
Ямчяны 66, 69  
Ячмень 70, 93  
— короткоостистый 93  
— узловатый 93

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ, (ЗНАКОМ \* ОТМЕЧЕНЫ СИНОНИМЫ)

- Abelia R. Br. 378, 380, 436  
— coreana Nakai 380, 381  
Abies Hill. 9, 49  
— holophylla Maxim. 49  
— nephrolepis Maxim. 49  
Abutilon Adans. 270  
— theophrasti Medic. 270  
Acalypha L. 255, 256  
— australis L. 256, 258  
Acanthosax Seem. 287, 288, 440  
— sessiliflorum (Rupr. et Maxim.) Seem. 288, 289  
Acelidanthus Trautv. et Mey. 115, 116  
— anticloides Trautv. et Mey. 116  
Aceraceae Juss. 16  
Acer L. 262, 440  
— barbinerve Maxim. 262, 265  
— ginnala Maxim. 262, 265  
— komarovii Pojark. 263, 265  
— nandshuricum Maxim. 262, 264, 440  
— mono Maxim. 262, 264  
— negundo L. 262  
— pictum Thunb. 262  
— pseudosieboldianum (Pax) Kom. 262, 264  
— tomentosum Maxim. 262, 267  
— ukuruduense Trautv. et Mey. 262, 267  
Achillea 396, 404  
— acuminata Sch. Bip. \* 404  
— alpina L. \* 406  
— asiatica Serg. 404  
— millefolium L. 404  
— mongolica Fisch. ex Spreng. \* 406  
— ptarmicoides Maxim. \* 406  
Achudemia Blume 150, 161  
— japonica Maxim. 159, 161  
Achyroperus Scop. 392, 430  
— ciliatus (Thunb.) Sch. Bip. 430  
Aconitum L. 184  
— albo-violaceum Kom. 183, 184  
— ambiguum Rchb. 186  
— arcuatum Maxim. 183, 185  
— axilliflorum Worosch. 185  
— barbatum Pers. 184  
— hirsutissimum Worosch. 186  
— crassifolium Steinh. 185  
— desoulavii Kom. 184  
— fischeri Rchb. 185  
— flagellare Steinh. \* 185  
— karafutense Miyabe et Nakai 185  
— kirinense Nakai 183, 184  
— komarovii Steinh. \* 185  
— koreanum Rapes. 185  
— kusnezoffii Rchb. 186  
— macrohynchum Turcz. 186  
— phragmiticola Kom. 186  
— possieticum Worosch. 186  
— pulcherrimum Nakai 186  
— puchonraenicum Uyeke et Sakata 185  
— raddeanum Rgl. 185  
— ranunculoides Turcz. 184  
— saxatile Worosch. et Vorobiev 185  
— sezukinii Turcz. 185  
— sibiricum Poir. 184  
— sichotense Kom. 186  
— subvillosum Worosch. 185  
— tokii Nakai 186  
— umbrosum Kom. 185  
— volubile Pall. 186  
— vorobievii Worosch. 185  
Acomis L. 107  
— calamus L. 107  
Actaea L. 178, 180  
— acuminata Walr. 180  
— erythrocarpa Fisch. 180  
Actinidiaceae Hutch. 14, 272  
Actinidia Lindl. 272, 437  
— arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. 272, 273  
— giraldis Diels 272  
— kolomikta Maxim. 272, 273  
— polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim. 272, 273  
Actinostemma Griff. 386  
— lobatum Maxim. 385, 388  
Adenocaulon Hook. 395, 402  
— adhaerens Maxim. 402  
Adenophora Fisch. 386, 388, 390  
— coronopifolia Fisch. 390  
— denticulata Fisch. \* 390  
— latifolia Fisch. \* 388  
— marsipiflora Fisch. \* 388  
— pereskifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don 388  
— remotiflora auct., non Miq. \* 388  
— stenanthina (Ldb.) Kitag. 388  
— subulata Kom. 390  
— tetraphylla (Thunb.) Fisch. 18, 388, 389  
— tracheloides Fisch. 388, 389  
— tricuspidata (Fisch. ex Roem. et Schult.) A. DC. 390

*Adenophora subulata* Kom. 390  
 — *verticillata* Fisch.\* 388  
*Adiantum* L. 19, 37  
 — *pedatum* L. 37, 38  
*Adumia* Raf. 92, 194  
 — *asiatica* Oltw. 195  
*Adonis* L. 178, 190  
 — *amurensis* Rgl. et Radde 181, 190  
*Adoxaceae* J. Agardh 18, 382  
*Adoxa* L. 382  
 — *moschatellina* L. 382  
*Aegopodium* L. 293, 300  
 — *alpestre* Ldb. 300  
 — *var. daucifolia* Gorovoi 300  
 — *henryi* Diels 302  
*Agastache* Clayt. ex Gronov. 346, 348  
 — *rugosa* (Fisch. et Mey.) Kuntze 348  
*Agrimonia* L. 211, 228  
 — *granulosa* Juz. 228  
 — *japonica* (Miq.) Koidz. 228  
 — *pilosa* Ldb. 228  
 — *velutina* Juz. 228  
*Agropyron* Gaertn. 69, 70, 91  
 — *amurensis* Nevski 91  
 — *cristatum* (L.) Gaertn. 91  
 — *repens* (L.) Beauv. 91  
*Agrostemma* L. 171, 173  
 — *githago* L. 173  
*Agrostideae* Kunth 66, 67  
*Agrostis* L. 67, 68, 80  
 — *alba* L. 81  
 — *borealis* Hartm. 80  
 — *canina* L. 80  
 — *clavata* Trin. 80  
 — *hiemalis* (Walt.) Britt. 81  
 — *trinitii* Turcz. 80  
 — *var. mutica* Kom. 81  
*Ajania manshurica* Poljak.\* 407  
 — *pallasiana* Poljak.\* 406  
*Ajuga* L. 345, 346  
 — *multiflora* Bge. 346  
*Aldrovanda* Monti 202  
 — *vesiculosa* L. 202  
*Alismataceae* Vent. 11, 62  
*Alisma* L. 62  
 — *orientale* (Sam.) Juz. 62  
*Allium* L. 115  
 — *anisopodium* Ldb. 118  
 — *condensatum* Turcz. 118  
 — *komarovianum* Vved. 120  
 — *latissimum* Prokh.\* 118  
 — *ledebourianum* Roem. et Schult. 120  
 — *maackii* Prokh. ex Kom. 118  
 — *macrostemon* Bge. 118  
 — *maximoviczii* Rgl. 120  
 — *monanthum* Maxim. 118  
 — *ochotense* Prokh. 118  
 — *odorum* L. 118  
 — *sacculiferum* Maxim. 120  
 — *schoenoprasum* L. 120  
 — *senescens* L. 120  
 — *spirale* Willd. 120  
 — *splendens* Willd. 118  
 — *strictum* Sohrad. 118  
 — *victoralis* auct., non L.\* 118  
*Alnus* Gaertn. 151, 438  
 — *fruticosa* Rupr. 149, 151  
 — *hirsuta* Turcz. 149, 151  
 — *japonica* Sieb. et Zucc. 151  
 — *kamtschatica* (Call.) Kom. 151  
 — *manshurica* (Call.) Hand.-Mazz. 151  
 — *maximoviczii* Call. 151  
 — *tinctoria* Sarg. 151  
*Alopecurus* L. 67, 80  
 — *alpinus* Sm. 80  
 — *amurensis* Kom. 80  
 — *brachystachyus* M. B. 80  
 — *longiaristatus* Maxim. 80  
 — *pratensis* L. 80  
 — *ventricosus* Pers. 80  
*Amaranthaceae* Juss. 12, 169  
*Amaranthus* L. 169  
 — *albus* L. 169  
 — *biflorus* L. 169  
 — *caudatus* L. 170  
 — *leucospermus* S. Wats. 170  
 — *paniculatus* Miq. 170  
 — *retrofractus* L. 170  
*Amethystea* L. 345, 347  
 — *coerulea* L. 347  
*Ammodiola* Patr. 171, 173  
 — *peplodes* (L.) Rupr. 173  
*Ampelopsis* Michx. 266, 286, 439, 441  
 — *brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. 268, 269  
 — *heterophylla* (Thunb.) Sieb. et Zucc. 268, 269  
 — *japonica* (Thunb.) Makino 268, 269, 441  
*Anaphalis* DC. 394, 400, 435  
 — *margaritacea* (L.) Benth. et Hook. f. 400  
 — *possettica* Kom. 400  
 — *pteroaula* (Franch. et Sav.) Maxim.\* 400  
 — *sinica* Hance 400  
*Andromeda* L. 318, 320, 435  
 — *polifolia* L. 320  
*Andropogoneae* Presl 64, 66  
*Androsace* L. 322, 324  
 — *filiformis* Retz. 324, 325  
 — *gmelini* (Gaertn.) Roem. et Schult. 324  
 — *incana* Lam. 324  
 — *lactiflora* Pall. 324  
 — *septentrionalis* L. 324, 325  
 — *umbellata* (Lour.) Merr. 324  
*Anemone* R. Br. 110, 112  
 — *keiskei* Hassk. 110, 112  
*Anemone* L. 178, 186  
 — *amurensis* Kom. 187  
 — *brevipedunculata* Juz. 186  
 — *debilis* Fisch. 187  
 — *dichotoma* L. 186  
 — *glabrata* Juz. 186  
 — *litoralis* Juz. 186  
 — *raddiana* Rgl. 187  
 — *reflexa* Sieb. 187  
 — *sibirica* L. 180  
 — *syvestris* L. 186  
 — *udensis* Trautv. et Mey. 187  
 — *umbrosa* C. A. Mey. 187  
*Aneurolepidium* Nevski 69, 93  
 — *pseudogrotyum* (Trin.) Nevski 93  
*Angelica* L. 294, 304  
 — *amurensis* Schischk. 304  
 — *anomala* auct., non Avé-Lall., p. p.\* 304  
 — *czernaevia* (Fisch. et Mey.) Kitag. 304  
 — *dahurica* (Fisch.) Benth. 304, 309

— *decursiva* (Miq.) Franch. et Sav. 294, 304  
 — *jaluana* Nakai 304  
 — *koreana* Maxim. 304  
 — *laevigata* Benth. et Hook.\* 304  
 — *maximoviczii* (Fr. Schmidt) Benth. 304, 307  
 — *miqueliana* Maxim. 304, 308  
 — *viridiflora* (Turcz.) Benth. 304  
*Angiospermae* 7, 53  
*Anogramma* makinoi H. Christ.\* 37  
*Antennaria* Gaertn. 394, 400  
 — *dioica* (L.) Gaertn. 400  
 — *cotula* L. 404  
*Anthriscus* (Pers.) Hoffm. 292, 294  
 — *acemula* (Woron.) Schischk. 295  
 — *var. hirtifolius* (Oltw.) Kitag. 295, 296  
 — *memorosa* auct., non Spreng.\* 295  
 — *silvestris* auct., non Hoffm.\* 295  
*Antiochicum acuminatum* (Decne.) Pobed.\* 334  
 — *amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Pobed.\* 334  
 — *atratum* (Bge.) Pobed.\* 332  
 — *inamoenum* (Maxim.) Pobed.\* 334  
*Antiochicum sibiricum* (L.) Pobed.\* 334  
 — *volubile* (Maxim.) Pobed.\* 334  
*Apium graveolens* auct., non L. 312  
*Aquifoliaceae* Bartl. 15  
*Aquilegia* L. 179, 180  
 — *amurensis* Kom. 184  
 — *oxysepala* Trautv. et Mey. 184  
 — *parviflora* Ldb. 180  
 — *viridiflora* Pall. 184  
*Arabis* L. 195, 196, 199  
 — *amurensis* N. Busch 199  
 — *hirsuta* Scop. 199  
 — *maximoviczii* N. Busch 199  
 — *pendula* L. 199  
 — *stellari* DC. 199  
*Araceae* Neck. 9, 107  
*Araliaceae* Juss. 18  
*Aralia* L. 287, 288, 440  
 — *continentalis* Kitag. 288, 291  
 — *mandshurica* Rupr. et Maxim. 291  
*Arctagrostis* Griseb. 68, 80  
 — *arundinacea* (Trin.) Bed 80  
 — *latifolia* (R. Br.) Griseb. 80  
*Arctium* L. 393, 422  
 — *lappa* L. 422  
 — *tomentosum* Mill. 422  
*Arctostaphylos* Adans. 316, 321, 435  
 — *nva-ursi* (L.) Spreng. 321  
*Arctous* (A. Gray) Nied. 316, 321, 437  
 — *alpina* (L.) Nied. 321  
*Arenaria* L. 171, 173  
 — *juncosa* M. B. 173  
*Arisaema* Martius 107, 109  
 — *amurensis* Maxim. 109  
 — *japonicum* Blume 109  
*Aristolochiaceae* Juss. 17  
*Aristolochia* Tourm. 161, 162, 437  
 — *contorta* Bge. 162, 163  
 — *mandshuriensis* Kom. 162, 163, 437  
*Armenica* Mill. 212, 232, 438  
 — *mandshurica* (Maxim.) Skvortz. 234  
 — *sibirica* Lam. 234  
*Armeria* Willd. 326  
 — *arctica* (Cham.) Wallr. 326  
*Armoracia* Gaertn. 195, 196, 198  
 — *rusticana* (Lam.) Gaertn., Mey. et Schreb. 198  
*Arnica* L. 391  
 — *sachalinensis* (Rgl.) A. Gray 416  
*Artemisia* L. 394, 396, 408, 441  
 — *annua* L. 410  
 — *argyi* Lévl. et Vaniot 412  
 — *aurea* Kom. 410  
 — *austriaca* Jacq. 410  
 — *borealis* Pall. 408  
 — *brachyloba* Kom., non Franch.\* 412  
 — *capillaris* Thunb. 408  
 — *commutata* Bess. 408  
 — *desertorum* Spreng. 408  
 — *feddei* Lévl. et Vaniot 412  
 — *freyana* (Pampan.) Krasch. 410  
 — *forcata* M. B. 410  
 — *gigantea* Kitam. 412  
 — *gmelini* Web. ex Stechm. 414  
 — *integrifolia* L. 412  
 — *japonica* Thunb. 408  
 — *koiskeana* Miq. 410, 411  
 — *koidzumii* Nakai 412  
 — *komarovii* Poljak.\* 412  
 — *lacinata* Willd. 410, 414  
 — *lagocephala* (Bess.) DC. 410, 413  
 — *latifolia* Ldb. 410, 412  
 — *lavandulifolia* DC., non Salisb.\* 412  
 — *ledebouriana* Bess.\* 408  
 — *littoralis* Kitam. 408, 411  
 — *macilenta* (Maxim.) Krasch. 408  
 — *manshurica* Kom. et Aliss. 408, 411  
 — *maximovicziana* Krasch. ex Poljak. 412, 415  
 — *medioxima* Krasch. ex Poljak. 410  
 — *messerschmidiana* Bess. 410  
 — *montana* Pampan. ex Schlecht.\* 412  
 — *nuttalliflora* Kom.\* 412  
 — *palustris* L. 410  
 — *pannosa* Krasch. 408  
 — *var. oligensis* Vorobiev 408  
 — *rubripes* Nakai 412, 413  
 — *saitoana* Kitam.\* 412  
 — *samamisa* Bess., p. p.\* 412  
 — *scoparia* Walst. et Kit. 408, 413  
 — *selengensis* Turcz. 412  
 — *sieversiana* Willd. 410  
 — *stelleriana* Bess. 410, 414  
 — *stenophylla* Kitam. 412  
 — *stolonifera* Kom. 412  
 — *subulata* Nakai, non Willd.\* 412  
 — *sylvatica* Maxim. 412, 415  
 — *tanacetifolia* L. 412  
 — *umbrosa* (Bess.) Turcz. 412  
 — *venusta* Pamp.\* 412  
 — *vulgaris* auct., non L.\* 412  
*Arthaxon* Beauv. 66, 72, 74  
 — *hispidus* (Thunb.) Makino 74  
 — *langsdorffii* (Trin.) Hochst. 74  
*Aruncus* Adans. 210, 211  
 — *asiaticus* Poljak. 216  
 — *parvulus* Kom. 216  
*Arundinella* Raddi 66, 74  
 — *anomala* Steud. 73, 74  
 — *hirta* (Thunb.) Tanaka 74  
*Asarum* Tourm. 161, 162  
 — *sieboldii* Miq. 162, 163



- Asclepiadaceae R. Br. 16, 332  
 Asparagus L. 115, 122  
 — dahuricus Fisch. 122  
 — oligoclones Maxim. 122  
 — schoberioideus Kunth 122  
 Asperella Humb. 70, 92  
 — coreana (Honda) Nevski 92  
 — komarovii Roshev. 92  
 Asperugo L. 338, 344  
 — procumbens L. 344  
 Asperula L. 376  
 — maximoviczii Kom. 375, 376  
 — odorata L. 376  
 — platygalium Maxim. 376  
 Asplenium L. 20, 35  
 — anogrammoides H. Christ 32, 35  
 — incisum Thunb. 32, 35  
 — ruta-muraria L. 35  
 Aster L. 394, 395, 398  
 — ageratoides Turcz. 397, 398  
 — dauricus Benth.\* 399  
 — fastigiatus Fisch. 399  
 — incisus Fisch. 397, 398  
 — lauteus (Dek.) Franch. 397, 399  
 — maackii Rgl. 399  
 — novi-belgii L. 398  
 — pensuensis Tamamsch.\* 398  
 — scaber Thunb. 399  
 — see-burejensis Tamamsch.\* 398  
 — sibiricus L. 398  
 — sutchanensis Kom. 398  
 — tataricus L. 398  
 — trinervius Roxb.\* 398  
 — tripolium L. 394, 397, 398  
 Astilbe Hamilt. 204  
 — chinensis Franch. et Sav. 204  
 Astragalus L. 235, 240  
 — adurgens Pall. 240  
 — chinensis L. f. 240, 241  
 — dahuricus (Pall.) DC. 240  
 — fruticosus (Pall.) DC. 240  
 — inopinatus Boriss. 240  
 — maritimus Boriss. 240  
 — membranaceus Fisch. 240, 241  
 — propinquus Schischk. 240  
 — schelichovii Turcz. 240  
 — secundus DC. 240  
 — uliginosus auct., non L., p. p.\* 240  
 Asyneuma Griseb. et Schenk 386, 390  
 — japonicum (Miq.) Briq. 390  
 Athyrium Roth 20, 30  
 — austro-ussuriense (Kom.) Fom.\* 35  
 — coreanum H. Christ 33, 35  
 — crenatum (Sommerl.) Rupr. 33, 35  
 — crenulato-serulatum Makino 35  
 — filix-femina (L.) Roth, s. l. 34, 35  
 — pterorhachis H. Christ 33, 35  
 — pycnosorum H. Christ 35  
 — rubripes Kom. 35  
 — spinulosum (Maxim.) Milde 30, 33  
 — subspinulosum (H. Christ) Ching 34, 35  
 — yokoseense (Franch. et Sav.) H. Christ 34, 35  
 Atractylodes L. 393, 421  
 — ovata Thunb. 421  
 — var. amurensis Freyn 422  
 — var. pinnatifida Kom. 421, 422  
 — var. simplicifolia Less. 422  
 — var. ternata Kom. 421, 422  
 Atragene L. 178, 187, 440  
 — macropetala Ldb. 187  
 — ochotensis Pal. 187.  
 Atriplex L. 168.  
 — hastata L. 168  
 — gmelinii C. A. Mey. 169  
 — litoralis L. 169  
 — patula L. 169  
 Avena L. 68, 82  
 — fatua L. 82  
 — sativa L. 82  
 Ayoneae Nees 66, 68  
 Axyris L. 168  
 — amaranthoides L. 169  
 Balsaminaceae A. Rich. 14, 263  
 Barbara Beckm. 198  
 — orthoceras Ldb. 198  
 Beckmannia Host 88, 82  
 — sylvatica (Steud.) Fern. 82  
 Belamcanda Adans. 128  
 — chinensis (L.) Leman 128  
 Berberidaceae Juss. 15, 190  
 Berberis L. 190, 437  
 — amurensis Maxim. 190  
 Bergenia Moench 15, 204  
 — pacifica Kom. 206  
 Bertero DC. 195, 200  
 — incana (L.) DC. 200  
 Betulaceae S. Gray 13, 151  
 Betula (Tourn.) L. 151, 438  
 — costata Trautv. 152, 154  
 — dahurica Pall. 152, 154  
 — demetrii Ig. Vassil. 154  
 — ermanii auct., non Cham. 152\*  
 — exilis Sukacz. 152, 153  
 — fruticosa Pall. 152, 153  
 — komarovii Perfl. et Kolesn. 152, 153  
 — lanata V. Vassil. 152, 153  
 — mandshurica (Rgl.) Nakai 154, 156  
 — ovalifolia Rupr. 152, 153  
 — ovalifolia Rupr. 152, 153  
 — platyphylla Sukacz. 154, 156  
 — prochorowii Kuzen. 152  
 — schmidtii Rgl. 152, 154  
 — velutina V. Vassil. 152  
 Bidens L. 391, 404  
 — frondosa L. 404  
 — maximowicziana Oett. 404, 405  
 — radiata Thuill. 404  
 — tripartita L. s. l. 404, 405  
 — cernua L. 404  
 — pavlovii Willd. 404, 405  
 Bignoniaceae Juss. 16, 370  
 Bolboschoenus compactus Drob.\* 98  
 Boltonia laetiflora Deb. 399  
 Boraginaceae G. Don 17, 338  
 Boschniakia C. A. Mey. 372  
 — rossica (Cham. et Schleht.) Fedtsch. 371, 372  
 Bothriospherum Ege. 340, 342  
 — tenellum (Horn.) Fisch. et Mey. 342  
 Botrychium L. 19, 40  
 — boreale (Franch.) Milde 40  
 — lanceolatum Angstr. 40  
 — lunaria (L.) Sw. 40  
 — robustum Underw. 40, 42  
 — virginianum (L.) Sw. 40  
 Brachyactis Ldb. 394, 399  
 — ciliata Ldb. 399  
 Brachybotrys Maxim. 338, 342  
 — paridiformis Maxim. 341, 342  
 Brasenia Schreb. 175  
 — schreberi J. F. Gmel. 175, 177  
 Brassica L. 195, 201  
 — campestris L. 201  
 — juncea Czern. 201  
 — rapum L. 201  
 Bromus L. 69, 90  
 — arvensis L. 90  
 — inermis Leyss. 90  
 — japonicus Thunb. 90  
 — richardsonii Link 90  
 — riparius Rehm. 90  
 — scaberrimus L. 90  
 Bulbostylis Kunth 93, 100  
 — capillaris (L.) Nees 100  
 Bunias L. 197, 200  
 — orientalis L. 200  
 Bupleurum L. 292, 298  
 — brevifolium auct., non Rgl.\* 300  
 — euphorbioides Nakai 298, 299  
 — falcatum auct., non Rgl.\* 300  
 — komarovianum Link. 300  
 — longiradiatum Turcz. 300, 301  
 — multinerve auct., non DC.\* 298  
 — rotundifolium L. 300  
 — sachalinense Fr. Schmidt 298  
 — scorzonifolium Willd. 300  
 — tridactylum Adams 298  
 Butomaceae Rich. 11, 62  
 Butomus L. 62  
 — umbellatus L. 62  
 Calacia L. 395, 416  
 — aconitifolia Bge.\* 416  
 — auriculata DC. 416  
 — farfaraefolia auct., non Sieb. et Zucc.\* 416  
 — hastata L. 416  
 — komaroviana (Pojark.) Pojark. 416  
 — praetermissa (Pojark.) Pojark. 416  
 Calamagrostis Adans. 67, 81  
 — angustifolia Kom. 81  
 — brachytricha Steud. 81  
 — distantiflora Lucznik 81  
 — epigeios (L.) Roth 81  
 — lapponica (Wahl.) Hartm. 81  
 — langsdorffii Trin. 81, 84  
 — monticola V. Petrov 81  
 — neglecta (Ehrh.) Beauv. 81  
 — obtusata Trin. 81  
 — pseudophragmites (Hall. f.) Koeler 81  
 — turczaninowii Litw. 81  
 Caldesia Parl. 62  
 — pamaassifolia (Bassi) Parl. 62  
 Calla L. 107  
 — palustris L. 107  
 Callistephus Cass. 395, 398  
 — chinensis (L.) Nees 398  
 Callitricheaceae Link 12, 256  
 Callitriche L. 256  
 — autumnalis L. 256  
 Callitriche elegans V. Petr. 256  
 — fallax V. Petr. 259  
 — subanceps V. Petr. 256  
 Caltha L. 179  
 — membranacea Schipcz. 180  
 — natans Pall. 179  
 — palustris auct., non L.\* 179  
 — pygmaea Nakai 179  
 — silvestris Worosch. 180  
 Calypso Salisb. 129, 132  
 — bulbosa (L.) Rehb. 132  
 Calystegia R. Br. 334, 336  
 — americana (Greene) Daniels.\* 336  
 — dahurica (Herib.) Choisy 336, 339  
 — hederacea Wall. 336  
 — pellita (Ldb.) G. Don\* 336  
 — sepium (L.) R. Br. 336, 339  
 — soldanella (L.) R. Br. 336  
 — subvulvula Ldb. 336  
 Camelia Crantz 196, 201  
 — glabrata (DC.) Fritsch 201  
 — microcarpa Andrz. 201  
 Campanulaceae Juss. 18, 386  
 Campanula L. 388  
 — cephalotes Nakai 387, 388  
 — langsdorffiana Fisch. et Trautv. et Mey. 388  
 — punctata Lam. 386—388  
 — turczaninowii Fed. 388  
 Camptoporus Link 19, 35  
 — sibiricus Rupr. 35, 36  
 Cannabaceae Lindl. 12  
 Cannabis L. 158, 160  
 — sativa L. 160  
 Caprifoliaceae Juss. 18  
 Capsella Medic. 197, 201  
 — bursa-pastoris (L.) Medic. 201  
 Caragana Lam. 236, 238, 440  
 — arborensis Lam. 240  
 — fruticosa (Pall.) Bess. 238, 239  
 — ussuriensis Pojark. 238, 239  
 Cardamine L. 196, 198  
 — bellidifolia L. 199  
 — dasyloba Turcz.\* 199  
 — impatiens L. 199  
 — leucantha (Tausch) O. E. Schulz 199  
 — lyrata Ege. 198  
 — macrophylla Willd. 199  
 — parviflora L. 199  
 — pratensis L. 199  
 — prorepens Fisch. 198  
 — regeliana Miq. 199  
 — tenuiflora Turcz.\* 198  
 — yezoensis Maxim. 198  
 Carduus L. 393, 426  
 — acanthoides 426  
 — crispus L. 426  
 Carex L. 93, 100  
 — accrescens Ohwi\* 102  
 — alticola Popl. ex Sukacz. 102  
 — amurensis Fr. Schmidt 105  
 — amurensis Kik.\* 107  
 — appendiculata Kik. 105  
 — arenicola Fr. Schmidt 102  
 — arnellii Christ. ex Scheuch 106  
 — augustiniowitzi Meinh. 104  
 — bostrichostigma Maxim. 105  
 — brunneus Polr. 103  
 — callitriche Krez. 103  
 — campylorhiza Krez. 106  
 — canescens L. 103  
 — capillaris L. 104  
 — capitata L. 100  
 — capituliformis Meinh. 101, 102  
 — carpicomis Meinh. 105  
 — chinganensis Litw. 103  
 — chondorhiza Ehrh. 102  
 — chosonica Ohwi 100



- Carex cryptocarpa C. A. Mey. 103  
 — cyperoides Murr. 102  
 — diandra Schrank 102  
 — diplosiocrapa V. Krecz. 103  
 — dispalata Boott 106  
 — disperma Bosc. 102  
 — drymophila Turcz.\* 107  
 — diursucula C. A. Mey. 102  
 — elusoides Turcz. ex Bess. 103  
 — falcata Turcz. 107  
 — forficula Franch. et Sav. 106  
 — glaberrima Meinh. 104  
 — globularis L. 105  
 — gmelini Hook. et Arn. 104  
 — gotoi Ohwi 106  
 — gynocrates Wormsk. 100  
 — haematostachys Lev. et Vaniot.\* 106  
 — hypochlora Freyn 105  
 — inflata Huds. 106  
 — jaluensis Kom. 104  
 — jankowskii Gorodk. 100, 101  
 — karoi Freyn 104  
 — kirganaica Kom. 106  
 — kobomugi Ohwi 102  
 — koraginis Meinh.\* 104  
 — koreana Kom.\* 104  
 — korshinskyi Kom. 104  
 — laevissima Nakai 102  
 — lanceolata Boott 105  
 — laponica O. F. Lang 103  
 — lasiocarpa Ehrh. 105  
 — latisquamata Kom. 107  
 — laxa Wahl. 104  
 — leiophylla C. A. Mey. 102  
 — lenaeensis Kük. 104  
 — leucoclora Bge. 105  
 — limosa L. 104  
 — lithophila Turcz. 102  
 — liliacea L. 103  
 — longirostrata C. A. Mey. 106  
 — maackii Maxim. 103  
 — macrocephala Willd. 102  
 — mandschurica Meinh. 105  
 — meyeriana Kunth 104  
 — middendorffii Fr. Schmidt 103  
 — minuta Franch. 103  
 — mollissima Christ ex Scheutz. 106  
 — nanella Ohwi 105  
 — nervata Franch. et Sav. 105  
 — neurocarpa Maxim. 102  
 — nikolskensis Kom.\* 107  
 — obtusata Lilijeb. 102  
 — oligostachys Meinh. ex Maxim. 106  
 — pallida C. A. Mey. 107  
 — papillosa Boott 107  
 — pauciflora Lightf. 100  
 — pediformis C. A. Mey. 105  
 — peiktusani Kom. 104  
 — pergrandis Krecz. et Lucznik.\* 107  
 — planiculmis Kom. 106  
 — podocarpa R. Br. 104  
 — procerula Krecz. 106  
 — pseudo-curatica Fr. Schmidt 102  
 — pseudo-liliacea Fr. Schmidt 103  
 — pumila Thunb. 106  
 — quadriflora Ohwi 105  
 — remotiuscula Wieh. 103  
 — reventa Krecz. 105  
 — rhyneophylla C. A. Mey. 106  
 — rigidoides Gorodk. 103  
 — rotundata Wahl. 106  
 — rubra Lévl. et Vaniot. 103  
 — rugulosa Kük. 106  
 — scaberrima Steud. 106  
 — schmidtii Meinh. 103  
 — sedakowii C. A. Mey. 104  
 — siderosticta Hance 101, 104  
 — soridula Cham. 107  
 — squamigera Krecz. et Lucznik 103  
 — stipata Muehl. 102  
 — subbracteata Ohwi 105  
 — suifunensis Kom. 104  
 — sutschanensis Kom. 105  
 — tasorum Kom. 105  
 — tenuiflora Wahl. 103  
 — tenuiformis Lévl. et Vaniot. 104  
 — tumidissima Kom. 103  
 — uda Maxim. 102  
 — ulobasis V. Krecz. 105  
 — ussuriensis Kom. 101, 104  
 — uticulata Boott.\* 106  
 — vanheurckii Muell. Arg. 105  
 — vesicata Meinh. 106  
 — xiphium Kom. 107  
 — Carpesium L. 394, 402  
 — cernuum L. 401, 402  
 — macrocephalum Franch. et Sav. 402  
 — triste Maxim. 401, 402  
 — Carpinus L. 151, 156, 438  
 — cordata Blume 155, 156  
 — Carum L. 293, 300  
 — carvi L. 300  
 — Caryophyllaceae Juss. 12, 15, 170  
 — Cassiope D. Don 316, 435  
 — ciceroides (Pall.) D. Don 320  
 — redowskii (Cham. et Schlecht.) G. Don 320  
 — Castilleja L. f. 360, 366  
 — pallida (L.) Kunth 366  
 — Caulis L. 312  
 — lappula (Web.) Grande 312  
 — Caulophyllum Michx. 190  
 — robustum Maxim. 190, 191  
 — Celastraceae R. Br. 16, 260  
 — Celastrus L. 260, 437  
 — flagellaris Rupr. 260, 263  
 — orbiculata Thunb. 262, 263  
 — Centaurea L. 394, 395, 428  
 — cyanus L. 428  
 — jacea L. 428  
 — scabiosa L. 428  
 — Centipedia Lour. 391, 393, 407  
 — minima (L.) A. Br. et Aschers. 407  
 — Cephalanthus L. C. Rich. 130, 136  
 — longibracteata Blume 136  
 — Cerastium L. 171, 172  
 — arvense L. 173  
 — caespitosum Gilib. 172  
 — fischerianum Ser. 172  
 — pauciflorum Stev. 172  
 — pilosum Ldb.\* 172  
 — Cerasus Juss. 212, 232, 439  
 — glandulosa (Thunb.) Losinsk. 232  
 — Cerasus maximoviczii (Rupr.) Kom. 232  
 — sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom. 232  
 — Ceratophyllaceae S. Gray 12, 178  
 — Ceratophyllum L. 178  
 — oryzetorum Kom. 178  
 — Chamaedaphne Moench 318, 320, 436  
 — calyculata (L.) Moench 320  
 — Chamaenerium Adams. 282, 284  
 — angustifolium (L.) Scop. 284  
 — latifolium (L.) Th. Fries et Lange 284  
 — Chamaepericlymenum Graebn. 312  
 — canadense (L.) Graebn. 314, 317  
 — succium (L.) Graebn. 312, 317  
 — Chamaerhodos Bge. 211, 226  
 — erecta (L.) Bge. 225, 226  
 — Cheilanthes Sw. 20, 37  
 — argentea Kuntze 37, 38  
 — var. obscura H. Christ 37  
 — kuhni Mide 37, 38  
 — Chelidonium L. 192  
 — majus L. 192  
 — Chenopodiaceae Vent. 12, 168  
 — Chenopodium L. 168  
 — album L. 168  
 — aristatum L. 168  
 — bryoniifolium Bge. 168  
 — glaucum L. 168  
 — hybridum L. 168  
 — urticum L. 168  
 — vacheli Hook. et Arn. 168  
 — Chenopodium viride L. 168  
 — Chimaphila Pursh 314, 316, 435  
 — japonica Miq. 316  
 — umbellata (L.) Nutt. 316  
 — Chloranthaceae R. Br. ex Lindl. 11, 140  
 — Chloranthus Swartz 140  
 — japonicus Sieb. 139, 140  
 — Chlorideae Kunth 66, 68  
 — Chloris Swartz 68, 82  
 — virgata Swartz 82  
 — Chosenia Nakai 140, 142, 438  
 — arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. 141, 142  
 — macrolepis (Turcz.) Kom.\* 142  
 — Chrysanthemum arcticum L.\* 406  
 — coreanum Nakai ex Mori.\* 407  
 — crubescens Stapf.\* 407  
 — leucanthemum L.\* 406  
 — linearis Matsum.\* 406  
 — maximoivicii Kom.\* 407  
 — mongolicum Ling.\* 407  
 — nactongense Nakai.\* 407  
 — pallasiense Kom.\* 406  
 — roxburgii Cass.\* 407  
 — sibiricum Turcz.\* 407  
 — var. acutifolium Kom.\* 407  
 — var. latifolium Kom.\* 407  
 — sinense auct., non Sabine.\* 407  
 — variifolium Chang.\* 407  
 — zawadskii Herbieh.\* 407  
 — Chrysosplenium L. 204, 207  
 — alternifolium L. 207  
 — flagelliferum Fr. Schmidt 205, 207  
 — komarovii A. Los. 207  
 — pilosum Maxim. 207  
 — ramosum Maxim. 207  
 — sinicum Maxim. 207  
 — trachyspermum Maxim. 207  
 — Chusua Nevski 132, 140  
 — secunda Nevski 140  
 — Cichorium L. 392, 430  
 — intybus L. 430  
 — Cicuta L. 293, 300  
 — virosa L. 300, 303  
 — var. tenuifolia (Froel.) Koch 300  
 — Cimicifuga L. 179, 180  
 — dahurica (Turcz.) Maxim. 180  
 — heracleifolia Kom. 180  
 — simplex Wormsk. 180  
 — Cinnam L. 63, 80  
 — latifolia (Trev.) Griseb. 80  
 — Circeia L. 282, 294  
 — alpina L. 284  
 — caulescens (Kom.) Nakai 284  
 — cordata Royle 284  
 — quadrilobata Maxim. 284  
 — Cirsium Mill. 393, 426  
 — corylotum Kom. 428  
 — maackii Maxim. 428  
 — pendulum Fisch. 427, 428  
 — schantarense Trautv. et Mey. 428  
 — setosum (Willd.) M. B. 426  
 — vossianum Fisch. 427, 428  
 — Claytonia Gronov. 14, 170  
 — celscholtzii Cham. 170  
 — Cleistogonites Keng.\* 68, 84  
 — chinensis (Maxim.) Keng 83, 84  
 — hancei Keng 84  
 — Clematis L. 178, 187, 440  
 — actinifolia Turcz. 188  
 — brevicaudata DC. 188  
 — fusca Turcz. 187  
 — hexapetala Pall. 188  
 — mandschurica Rupr. 188  
 — serratifolia Rehd. 188  
 — Clinopodium L. 346, 352  
 — chinense (Benth.) Kuntze 352  
 — Clintonia Raf. 115, 122  
 — udensis Trautv. et Mey. 122  
 — Cnidium Russ. 294, 302  
 — ajanense (Rgl. et Til.) Drude 302  
 — dahuricum (Jacq.) Turcz. 302  
 — monnieri (L.) Guss. 302  
 — Cochlearia L. 136, 201  
 — oblongifolia DC. 201  
 — Codonopsis Walp. 396, 390  
 — lanceolata (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. 390  
 — pilosula (Franch.) Nannfeldt 390  
 — silvestris Kom.\* 390  
 — ussuriensis (Rupr. ex Maxim.) Hemsl. 390  
 — Coeloglossum Hartm. 130, 138  
 — viride (L.) Hartm., s. l. 138  
 — Coelopleurum Ldb. 294, 306  
 — gmelinii (DC.) ? 306  
 — saxatile (Turcz.) Drude 306  
 — Coleanthus Seidl. 67, 80  
 — subtilis (Tratt.) Seidl. 80  
 — Comarostaphylos 211, 220  
 — palustre L. 220  
 — Commelinaceae R. Br. 11  
 — Commelina L. 110  
 — communis L. 110, 112  
 — Compositae P. F. Gmelin 10, 391  
 — Coniferae 46  
 — Coniogramma Fée 19, 37  
 — fraxinea auct.\* 37  
 — intermedia Hieron. 37, 39  
 — Conioselinum Fischer. 294, 304  
 — kamschatcicum Rupr. 304  
 — Conium L. 293, 298  
 — maculatum L. 298  
 — Convolvulus L. 118, 124  
 — keiskei Miq. 124  
 — majalis L. var. manshuricum Kom.\* 124



- Convolvulaceae Juss. 17, 334  
 Convolvulus L. 334  
 — arvensis L. 336  
 — var. sagittifolius (Fisch.) Turcz. 336, 339  
 Coptis Salisb. 179, 180  
 — trifolia (L.) Salisb. 180, 182  
 Corallorhiza Hall. 129, 134  
 — trifida Chatel. 134  
 Coriandrum L. 293, 298  
 — sativum L. 298  
 Corispermum L. 168, 169  
 — confertum Bge. 169  
 — elongatum Bge. 169  
 — macrocarpum Bge. 169  
 Cornaceae Dum. 17, 312  
 Cornus alba L. 314  
 — canadensis L.\* 314  
 — suecica L.\* 312  
 — tatarica Mill.\* 314  
 Cortusa L. 322, 324  
 — amurensis Fed. 324  
 — pekinensis (Al. Richt.) Kom. et Alliss. 324, 325  
 Corydalis Medic. 192, 194  
 — ambigua Cham. et Schlecht. 194  
 — var. amurensis Maxim. 194  
 — var. lineariloba Maxim. 194  
 — var. pectinata Kom. 194  
 — buschii Nakai 194  
 — fumarifolia Maxim. 194  
 — gigantea Trautv. et Mey. 194  
 — macrantha (Rgl.) M. Pop. 194  
 — ochotensis Turcz. 194  
 — pallida Pers. 194  
 — remota Fisch. 194  
 — repens Mandl et Muehld. 194  
 — sibirica (L. f.) Pers. 194  
 Corylus L. 151, 156, 439  
 — brevifolia Kom. 156  
 Corylus heterophylla Fisch. 155, 156, 439  
 — mandshurica Maxim. 155, 156  
 Cotoneaster Medic. 212, 216, 439  
 — melanocarpa Lodd. 216, 217  
 Cotula L. 396, 407  
 — coronopifolia L. 407  
 Crassulaceae DC. 15, 202  
 Crataegus L. 212, 218, 439, 441  
 — dahurica Koehne 218, 219  
 — maximoviczii C. K. Schn. 218, 219  
 — pinnatifida Bge. 218, 219  
 Crawfordia Wall. 328  
 — volubilis Maxim. 328, 331  
 Crepis L. 392, 434  
 — bupleioides Fr. Schmidt 434  
 — tectorum L. 434  
 Critonon Raf. 70, 93  
 — jubatum (L.) Nevski 92, 93  
 Cruciferae Juss. 12, 15, 195  
 Cryptogramma R. Br. 19, 39  
 — raddeana Fom. 37, 39  
 Cucubalus L. 171, 174  
 — bacifer var. japonicus Miq.\* 174  
 — japonicus Worosch. 174  
 Cucurbitaceae Juss. 18, 384  
 Cupressaceae Neger 8, 53  
 Cuscutaceae Dum. 9, 336  
 Cuscuta L. 336  
 — australis R. Br. 338  
 — chinensis Lam. 338  
 — colorans Maxim. 336  
 — epilinum Weihe 338  
 — europaea L. 338  
 — japonica Choisy 336  
 Cyclophorus Desv. 19, 37  
 — lingua (Thunb.) Desv. 36, 37  
 Cynanchum L. 332  
 — acuminatifolium Hemsl. 334, 337  
 — amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 334, 337  
 — atratum Bge. 332, 337  
 — inamoenum (Maxim.) Loes. 334  
 — purpureum (Pall.) Schumann 334  
 — thesioides Schumann 334  
 — volubile (Maxim.) Hemsl. 334  
 — wilfordii (Franch. et Sav.) Hook. f. 334  
 Cynoctonum purpureum (Pall.) Pobed.\* 334  
 Cynoglossum L. 340, 344  
 — divaricatum Steph. 344  
 Cyperaceae Juss. 10, 93  
 Cyperus L. 93  
 — amuricus Maxim. 94  
 — difformis L. 94  
 — fragrostis Vahl 94, 95  
 — fusco-ater Meinh.\* 94  
 — fuscus L. 94  
 — glomeratus L. 94, 95  
 — limosus Maxim. 94  
 — michelianus (L.) Link 94  
 — nilagiricus Hochst. 94  
 — nipponicus Franch. et Sav. 94  
 — pratensis Korotk. 93  
 — serotinus Roth. 94  
 — setiformis Korsch. 93  
 — truncatus Turcz. 94, 95  
 Cyrtopodium L. 129, 132  
 — bulbosa 131  
 — calceolus L. 131, 132  
 — calceolus × C. macranthum 132  
 — guttatum Sw. 132  
 — macranthum Sw. 131, 132  
 — l. albiflorum 132  
 — ventricosum Sw. 131, 132  
 Cystopteris Bernh. 20, 44  
 — filix-fragilis (L.) Borb. 22, 24  
 — sudetica A. Br. et Milde 22  
 Dactylis L. 68, 86  
 — glomerata L. 86  
 Daphne Tourn. 280, 437  
 — kantschatica Maxim. 280, 281  
 Dasiphora Raf. 211, 220, 440  
 — davurica (Nesl.) Kom. et Alliss. 220  
 — fruticosa (L.) Rydb. 220  
 — mandshurica (Maxim.) Juz. 220  
 Datura L. 358, 359  
 — stramonium L. 359  
 Delphinium L. 179, 184  
 — cheilanthum Fisch. 184  
 — grandiflorum Schrad. 184  
 — korsinskyanum Nevski\* 184  
 — mackianum Rgl. 184  
 Dendranthema (DC.) DesMoul. 395, 396, 406  
 — arcticum Tzvel.\* 406  
 — coreanum (Lévl. ex Vaniot) Worosch. 407  
 — erubescens (Stapf.) Tzvel. 407  
 — maximoviczii (Kom.) Tzvel. 407  
 — mongolicum (Ling) Tzvel. 407  
 — nactongense (Nakai) Tzvel. 407  
 — pallianum (Fisch. ex Bess.) Worosch. 406  
 — tchitense Tzvel. 407  
 — zavetskii (Herbich) Tzvel. 407  
 Dentaria (Tourn.) L. 196, 198  
 — tenuifolia Ldb. 198  
 Deschampsia Beauv. 68, 81  
 — borealis (Trautv.) Roshev. 81  
 — flexuosa (L.) Trin. 81  
 — sukatschewii (Popl.) Roshev. 81  
 Descurainia Webb. et Berth. 196, 197  
 — sophia (L.) Schur 197  
 Desmodium Desv. 224, 242  
 — manshuricum (Maxim.) Nakai 242, 244  
 — oldhami Oliv. 242, 244  
 Deutzia Thunb. 18, 204, 208, 436  
 — amurensis (Rgl.) Airy-Schow 208  
 — glabrata Kom. 208  
 Dianthus L. 170, 175  
 — amurensis Jacq. 175  
 — barbatus L. 175  
 — superbus L. 175  
 — versicolor Fisch. 175  
 Diapensiaceae Lindl. 14, 322  
 Diapensia L. 322, 435  
 — obovata (Fr. Schmidt) Nakai 322  
 Diarrhena Beauv. 69, 84  
 — japonica Franch. et Sav. 84, 87  
 — manshurica Maxim. 84, 87  
 Diarrhena Turcz. 280  
 — rinifolium Turcz. 280, 281  
 Dicentra Bernh. 192  
 — peregrina (Rudolph) Makino 195  
 Dichostylis micheliana Nees\* 94  
 Dicotyledoneae 140  
 Dictamnus L. 255  
 — dasycarpus Turcz. 255  
 Diervilla Moench. 378  
 — florida Kom. non Sieb. et Zucc.\* 378  
 Digitaria Heist. 66, 74  
 — asiatica Tzvel. 72, 74  
 — ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muehl. 74  
 Digraphis Trin. 67, 76  
 — arundinacea (L.) Trin. 76  
 Dimeria R. Br. 66, 70  
 — neglecta Tzvel. 70  
 Dioscoreaceae R. Br. 11, 124  
 Dioscorea L. 124  
 — nipponica Makino 124, 126  
 — polystachya Turcz.\* 124  
 Diplachne Beauv.\* 84  
 Dipsacaceae Juss. 10, 384  
 Disporum Salisb. 116, 122  
 — viridescens (Maxim.) B. Fedtsch. 122  
 Doellingia Nees 395, 399  
 — scabra (Thunb.) Nees 399  
 Dostoevskia Andrz. 195, 200  
 — dentatus Ldb. 200  
 — hispidus Maxim. 200  
 — integrifolius (L.) C. A. Mey. 200  
 — micranthus C. A. Mey. 200  
 — pectinatus Ldb. 200  
 Draba L. 196, 200  
 — cardaminiflora Kom. 200  
 — nemorosa L. 200  
 — sachalinensis (Fr. Schmidt) N. Busch 200  
 — ussuriensis Pohle 200  
 Draccephalum L. 345, 346, 348  
 — argentea Fisch. 349, 350  
 — moldavica L. 350  
 — multiflorum Kom. 349, 350  
 — nutans L. 350  
 — stelleriana Hildebr. 350  
 — thymiflorum L. 348  
 Droseraceae Salisb. 15, 202  
 Drosera L. 202  
 — anglica Huds. 202  
 — longifolia L.\* 202  
 — rotundifolia L. 202  
 Dryas L. 214, 228, 435  
 — ajanensis Juz. 227, 228  
 — tchonoskii Juz. 228  
 Dryothyrum pterohachis (H. Christ) Ching\* 35  
 Dryopteris Adams. 20, 93  
 — amurensis H. Christ 20, 93  
 — austriaca (Jacq.) Weynand 29, 30  
 — barbellata Fom. 26  
 — buschiana Fom. 26, 27  
 — coreano-montana Nakai 27, 30  
 — crassirhiza Nakai 26, 27  
 — fragrans Schott 26  
 — linneana C. Christ 26  
 — miqueliana (Maxim.) H. Christ 29, 30  
 — nipponica (Franch. et Sav.) C. Christ. 26  
 — phegopteris (L.) C. Christ. 26  
 — robertiana (Hoffm.) C. Christ. 26  
 — sichotensis Kom. 26  
 — subpinnata (Miq.) Kuntze 28, 30  
 — thelypteris (L.) A. Gray 26  
 — wladivostokensis B. Fedtsch. 30  
 Dysophylla Blume 346, 356  
 — jatebana Makino 358  
 Echinochloa Beauv. 67, 74  
 — caudata Roshev. 74  
 — crus-galli (L.) Rostk. et Schmidt. 74, 76  
 — var. longistria Doell 76  
 — var. mutica Hook. 74  
 — frumentacea (Roxb.) Link 74  
 — oryzicola Vasing. 74  
 — var. aristata Vasing. 74  
 — var. mutica Vasing. 74  
 Echinocystis Torr. et Gray 386  
 — echinata (Muehl.) Vass. 386  
 Echinopanax Deene et Planch. 288, 439  
 — elatum Nakai 287, 288  
 Echinops L. 392, 421  
 — dissectus Kitag. 421  
 — gmelinii auct. non Turcz.\* 421  
 — latifolius auct. non Tausch\* 421  
 Echium L. 340, 342  
 — vulgare L. 342  
 Eclipta L. 391, 404  
 — alba (L.) Hasskarl 404  
 Elatinaceae Dum. 12, 274  
 Elatine L. 274  
 — orthosperma Dneben 274  
 — triandra Schukhr 274  
 Eleocharis R. Br. 93, 98  
 — acicularis (L.) Roem. et Schult. 98  
 — afflata Steud. 100  
 — intersita Zunkerl. 100  
 — kamtschatica (C. A. Mey.) Kom. 100  
 — mamillata Lindb. I. 99, 100



- Eleocharis maximoviczii* Zinslerl. 98, 99  
 — *ovata* (Roth) Roem. et Schult. 98  
 — *palustris* auct., non R. Br.\* 100  
 — *parvula* (Roem. et Schult.) Link 98  
 — *petasata* (Maxim.) Zinslerl. 98, 99  
 — *sachalinensis* Kom.\* 100  
 — *svensonii* Zinslerl. 98  
 — *ussuriensis* Zinslerl.\* 100  
*Eleutherococcus* Maxim. 288, 440  
 — *senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. 288, 289  
*Elsholtzia* Willd. 345, 356  
 — *patrinii* (Lepsch.) Garcke 356  
 — *pseudo-cristata* Lévl. et Vaniot 356  
 — *serotina* Kom. 356  
*Elymus* L. 70, 91  
 — *dahuricus* Trin. 91  
 — *excelsus* Turcz. 91  
 — *mollis* Trin. 91, 92  
 — *sibiricus* L. 91, 92  
*Elytrigia* Desv. 70  
*Empetraceae* S. Gray 14, 259  
*Empetrum* L. 259, 435  
 — *nigrum* L. s. l. 259, 260  
*Enemion* Raf. 179, 180  
 — *raddeanum* Rgl. 180  
*Ephedraceae* Wettst. 8, 53  
*Ephedra* L. 8, 53  
 — *monosperma* C. A. Mey. 51, 53  
*Epiphiatthus* Rchb. 130, 132  
 — *sachalinensis* Rchb. 132, 133  
 — *schmidtii* Rchb.\* 132  
*Epilobium* L. 282  
 — *amurense* Hausskn. 284  
 — *angulatum* Kom. 282  
 — *calycinum* Hausskn. 284  
 — *cylindrostigma* Kom. 284  
 — *davuricum* Fisch. 282  
 — *gladulosum* Lehm. 284  
 — *nudicarpum* Kom.\* 284  
*Epilobium* palustre L. 282  
 — *tenuis* Kom. 282  
*Epimedium* L. 15, 190  
 — *koreanum* Nakai 190, 191  
*Epipactis* Adams. 130, 134  
 — *papillosa* Franch. et Sav. 134, 135  
 — *thunbergii* A. Gray 134, 35  
*Epipogon* S. G. Mel. 129, 136  
 — *aphyllum* (Fr. Schmidt) Sw. 136  
*Equisetaceae* Rich. 8, 40  
*Equisetum* L. 40  
 — *arvense* L. 43, 44  
 — *hiemale* L. 43, 44  
 — *hincosum* L. 44  
 — *palustre* L. 44  
 — *pratense* Ehrh. 43, 44  
 — *scirpoides* Michx. 44  
 — *silvaticum* L. 43, 44  
 — *variegatum* Schlecht. 44  
*Eragrostis* Host 69, 84  
 — *minor* Host 83, 84  
 — *pilosa* (L.) Beauv. 83, 84  
*Eranthis* Salisb. 479, 180  
 — *stellata* Maxim. 480, 181  
*Ericaceae* Juss. 15, 16, 316  
*Erigeron* L. 394, 395, 399, 437  
 — *acer* L. 400  
 — *annuus* (L.) Pers.\* 399  
 — *canadensis* L. 400  
 — *elongatus* Ldb. 400  
 — *kamtschaticus* DC. 400  
 — *ochraei* (Nakai) Botsch. 395, 399, 437  
 — *strigosus* Muehl. ex Willd. 399  
*Eriocaulaceae* Desv. 10, 110  
*Eriocaulon* L. 110  
 — *chinossicum* Kom. 110, 111  
 — *decemflorum* Maxim. 110  
 — *robustum* (Maxim.) Makino 110  
 — *ussuriensis* Koern. 110, 111  
*Eriochloa* H. B. K. 67, 74  
 — *villosa* (Thunb.) Kunth 74  
*Eriophorum* L. 93, 94  
 — *alpinum* L.\* 94  
 — *angustifolium* Roth.\* 94  
 — *asiaticum* V. Vassil.\* 94  
 — *brachyantherum* Trautv. 94  
 — *chamissonis* C. A. Mey. 94  
 — *coreanum* Pall. 94, 96  
 — *gracile* auct., non Koch.\* 94  
 — *japonicum* Maxim. 98  
 — *komarovii* V. Vassil.\* 94  
 — *latifolium* Hoppe 94  
 — *polystachyon* L. 94  
 — *ruesselii* Fries 94  
 — *vaginatum* L. 94  
*Eritrichium* Schrad. 338, 344  
 — *incanum* (Turcz.) DC. 343, 344  
 — *maackii* Maxim. 344  
 — *sichotense* M. Pop. 344  
*Erodium* L' Her. 250, 254  
 — *cicutarium* (L.) L' Her. 254  
 — *stephanianum* Willd. 254  
*Eryngium* L. 292, 294  
 — *planum* L. 294  
*Erysimum* (Tourn.) L. 195, 197  
 — *aurantiacum* (Rgl.) Maxim. 197  
 — *cheiranthoides* L. 198  
 — *marshalianum* Andr. 198  
*Eu-agropyrum* Nevski 69  
*Eucledium* R. Br. 196, 200  
 — *syriacum* (L.) R. Br. 200  
*Euoynia* L. 260, 436  
 — *alata* Kom., non Thunb.\* 260  
 — *maackii* Rupr. 260, 261  
 — *macroptera* Rupr. 260, 261  
 — *maximovicziana* Prokh. 260, 261  
 — *pauciflora* Maxim. 260, 261  
 — *sachalinensis* Kom., non Maxim.\* 260  
 — *sacrosancta* Koidz. 260, 261  
*Eupatoriaceae* L. 391, 396  
 — *hindleyanum* DC. 396  
*Euphorbiaceae* Juss. 12, 255  
*Euphorbia* L. 255, 256  
 — *chankovae* Worosch. 256  
 — *cyparissias* L. 256  
 — *discolor* Ldb. 256  
 — *humifusa* Willd. 256  
 — *komaroviana* Prokh. 256  
 — *lucorum* Rupr. 256  
 — *maculata* L. 256  
 — *mandshurica* Maxim. 256  
 — *savayana* Kiss. 256  
*Euphrasia* L. 360, 368  
 — *amurensis* Freyn 368  
 — *maximoviczii* Wettst. 367, 368  
 — *ussuriensis* Juz. 368  
*Euryale* Salisb. 178  
 — *lerox* Salisb. 175, 177, 178  
*Fagaceae* Dum. 13, 156  
*Fagopyrum* Mill. 162, 167  
 — *sagittatum* Gilib. 168  
 — *tataricum* (L.) Gaertn. 167  
*Falcata* Gmel. 234, 250  
 — *japonica* (Oliv.) Kom. 250, 251  
*Festuca* L. 69, 90  
 — *extremiorientalis* Ohwi 89, 90  
 — *jacutica* Drob. 90  
 — *lenensis* Drob. 90  
 — *mollissima* V. Krecz. et Bohr. 90  
 — *pratensis* L. 90  
 — *pseudosulcata* Drob. 89, 90  
 — *rubra* L. 90  
 — *supina* Schur 90  
*Festuceae* Nees 66, 68  
*Filifolium* Kitam. 393, 407  
 — *sibiricum* (L.) Kitam. 407, 409  
*Filipendula* Adans. 211, 212, 228  
 — *angustiloba* Maxim. 228  
 — *coreana* Nakai 228  
 — *glaberrima* Nakai 228  
 — *intermedia* (Glehn.) Juz. 228  
 — *palmaria* Maxim. 228  
*Fimbristylis* Vahl 93, 100  
 — *leiocarpa* Maxim. 100  
 — *squarrosa* Vahl 100  
 — *verrucifera* (Maxim.) Makino 100  
*Fragaria* L. 210, 220  
 — *orientalis* Losinsk. 220  
*Fraxinus* L. 12, 328, 441  
 — *mandshurica* Rupr. 328, 327  
 — *rhynchophylla* Hance 326, 327  
*Fritillaria* L. 115, 120  
 — *camtschaticensis* (L.) Fisch. 120, 121  
 — *maximoviczii* Freyn 120, 121  
 — *ussuriensis* Maxim. 120, 121  
*Fumariodeae* 13  
*Funkia* Spreng. 115, 116  
 — *lanceifolia* Spreng. 116  
*Gagea* Salisb. 115, 118  
 — *coreana* Nakai.\* 118  
 — *hiensis* Pascher 118  
 — *longiscapa* Grossh. 118  
 — *lutea* auct., non Ker-Gawl.\* 118  
 — *nakaii* K. Kug. 118  
 — *pauciflora* Turcz. 118  
*Galatella* Cass. 394, 399  
 — *dahurica* DC. 399  
*Galeopsis* L. 345, 350  
 — *bifida* Boenn. 350  
 — *ladanum* L. 350  
 — *speciosa* Mill. 350  
*Galeorchis* Rydb. 130, 138  
 — *cycloclitus* (Franch. et Sav.) Nevski 138  
*Galinsoga* Ruiz et Pav. 391, 404  
 — *parviflora* Cav. 404  
 — *quadriradiata* Ruiz et Pav. 404  
*Galium* L. 376  
 — *amurense* Pobed.\* 376  
 — *baicalense* Pobed. 376  
 — *boreale* L. 376  
 — *dahuricum* Turcz. 375, 376  
 — *kamtschaticum* Burejsh. 375, 376  
 — *lacteum* Pobed.\* 376  
 — *lactiflorum* Pobed.\* 376  
 — *paradoxum* Maxim. 376  
 — *septentrionale* Roem. et Schult.\* 376  
 — *spurius* L. 376  
 — *trifidum* L.\* 376  
 — *trilobiflorum* Kom.\* 378  
 — *trilobum* Michx. 376  
 — *verum* L. 376  
*Gastrodia* R. Br. 129, 136  
 — *elata* Blume 136  
*Gentianaceae* Juss. 17, 328  
*Gentiana* L. 328  
 — *algida* Pall. 328  
 — *auriculata* Pall. 329  
 — *barbata* Frael. 330  
 — *komarovii* Grossh. 330  
 — *macrophylla* Pall. 328  
 — *nipponica* Maxim. 329  
 — *scabra* Bge. 328, 331  
 — *squarrosa* Ldb. 328, 331  
 — *triflora* Pall. 328  
 — *zollingeri* Fawcett 328, 331  
*Geraniaceae* Juss. 16, 250  
*Geranium* L. 250  
 — *dahuricum* DC. 253, 254  
 — *erianthemum* DC. 254  
 — *eriosomon* Fisch. 250  
 — *maximoviczii* Rgl. et Maack 250  
 — *rotundifolium* L. 250  
 — *sibiricum* L. 250  
 — *sieboldii* Maxim. 253, 254  
 — *soboliferum* Kom. 253, 254  
 — *vlassovianum* Fisch. ex Link 253, 254  
 — *wilfordii* Maxim. 250  
*Gerbera* andrassia Sch. Bip.\* 430  
*Geum* L. 211, 226  
 — *allepicum* Jacq. 226  
*Girardinia* Gaud. 160, 161  
 — *cuspidata* Wedd. 159, 161  
*Glaux* L. 322, 326  
 — *maritima* L. 328  
*Glechoma* L. 346, 348  
 — *hederacea* L. 348  
 — *longituba* (Nakai) Kuprian. 348  
*Glehnia* Fr. Schmidt 292, 306  
 — *littoralis* Fr. Schmidt 306, 310  
*Glyceria* R. Br. 69, 88  
 — *leptorhiza* (Maxim.) Kom. 88  
 — *lithuanica* (Gorsk.) Lindm. 88  
 — *natans* Kom. 88  
 — *spiculosa* (Fr. Schmidt) Roshev. 88  
 — *triflora* (Korsch.) Kom. 88  
 — *ussuriensis* Kom. 88  
*Glycyne* L. 234, 250  
 — *hispidia* (Moench) Maxim. 250  
 — *ussuriensis* Rgl. et Maack 250, 251  
*Glycyrrhiza* L. 234, 242  
 — *pallidiflora* Maxim. 242, 243  
*Gnaphalium* L. 394  
 — *mandshuricum* Kirp.\* 402  
 — *tranzschellii* Kirp.\* 402  
 — *uliginosum* L., s. l. 402  
*Gnetinae* 53  
*Goodyera* R. Br. 130, 136  
 — *repens* (L.) R. Br. 136  
*Gramineae* Juss. 40  
*Gratiola* L. 360, 362  
 — *japonica* Miq. 362  
*Crossularia* Mill. 18, 240, 210  
 — *burejshii* (Fr. Schmidt) Berger 269, 210, 439  
 — *reclinata* (L.) Mill. 210  
*Guelldenstaedtia* Fisch. 236, 240



- Gneldstaedtia pauciflora* Fisch. 240  
*Guttiferae* Juss. 14, 272  
*Gymnadenia* R. Br. 130, 138  
— *conopsea* (L.) R. Br. 138  
*Gymnocarpium robertianum* Newm. \* 26  
*Gymnospermae* L. 171, 174  
*Gypsophila* L. 171, 174  
— *muralis* auct., non L.\* 174  
— *pacificia* Kom. 174  
— *serotina* Hayne 174  
— *violacea* (Ldb.) Fenzl 174  
  
*Habenaria* Willd. 430, 136  
— *dianthoides* Nevski\* 136  
— *linearifolia* Maxim 136  
— *radiata* Kraenzl. 136  
*Hackelia* Opiz 340, 344  
— *deflexa* (Wahl.) Opiz 343, 344  
— *thymifolia* (DC.) M. Pop. 344  
*Halenia* Borkh. 328, 330  
— *corniculata* (L.) Cornaz 330, 333  
*Halerpestes* Green 178  
— *salsuginosa* (Pall.) Green  
*Haloragidaceae* Lindl. 12, 286  
*Hedysarum* L. 235, 242  
— *alpinum* L. 242  
— *dahuricum* Turcz. 242, 243  
— *setigerum* Turcz. 242  
— *ussuriense* J. Schischk. et Kom. 242, 243  
*Helictotrichon* Bess. 68, 82  
— *schellianum* Bess. 82  
— *dahuricum* (Kom.) Kitag. 82  
*Hemarthria* R. Br. 66, 70  
— *sibirica* (Good.) Ohwi 70  
*Hemerocallis* L. 115, 116  
— *damortieri* Morr. 118  
— *flava* L.\* 116  
— *middendorffii* Trautv. et Mey. 117, 118  
— *minor* Mill. 116, 117  
*Hepatica* Mill. 178, 187  
— *asiatica* Nakai 187  
— *nobilis* auct., non Mill.\* 187  
*Heracleum* L. 293, 312  
— *dissectum* auct., non Ldb.\* 312  
— *dulce* Fisch. 312  
— *moellendorffii* Hance 312, 315  
— *voroschilovii* Gorovoi 312  
*Hernimium* R. Br. 129, 136  
— *monorchis* (L.) R. Br. 136  
*Heteropappus* Less. 394, 396  
— *decipiens* Maxim.\* 398  
— *hispidus* (Thunb.) Less. 396  
— *meyendorffii* (Bgl. et Maack.) Kom. et Aliss. 398  
— *nonifolius* Tamamsch.\* 398  
— *pinetorum* Kom.\* 398  
— *saxamarinus* Kom. 398  
— *sibiricus* Kom.\* 398  
— *tataricus* (Lindl.) Tamamsch. 398  
— *villosus* Kom. 398  
*Hibiscus* L. 270, 272  
— *trionum* L. 272  
*Hieracium* L. 392, 434  
— *coreanum* Nakai 433, 434  
— *hololeion* Maxim. 434  
— *umbellatum* L. 434  
— *virosus* Pall. 434  
*Hierochloa* R. Br. 67, 76  
— *alpina* (Liljehl.) Roem. et Schult. 76  
— *bungeana* Trin. 78  
— *glabra* Trin. 78  
— *odorata* (L.) Wahl. 78  
*Hippuridaceae* Link 286  
*Hippuris* L. 286  
— *tetraphylla* L. f. 285, 286  
— *vulgaris* L. 285, 286  
*Holopogon* Kom. et Nevski\* 129  
— *ussuriense* Kom. et Nevski\* 129  
*Hordeaceae* Benth. 66  
*Hordeum* L. 70, 93  
— *breviusculatum* (Trin.) Link 93  
— *jubatum* L.\* 93  
— *nodosum* L. 93  
*Humulus* L. 158  
— *japonicus* Sieb. et Zucc. 158  
— *lupulus* L. 160  
*Hydrilla* Rich. 62, 64  
— *verticillata* (L. f.) Rich. 64, 65  
*Hydrocarpaceae* Raimann 9, 284  
*Hydrocharis* L. 62, 64  
— *asiatica* Miq. 64, 65  
*Hydrocharitaceae* Juss. 11, 62  
*Hylomecon* Maxim. 192  
— *vernalis* Maxim. 192  
*Hymenophyllaceae* Gaudich. 7, 20  
*Hymenophyllum* J. Smith 19, 20  
— *wrightii* Bosch 20, 21  
*Hyoscyamus* L. 358, 359  
— *bohemicus* Schmidt 359  
— *niger* L. 359  
*Hypericum* L. 272  
— *ascyron* L. 272, 275  
— *attenuatum* Choisy 274, 275  
— *gebleri* Ldb. 272  
— *kamtschaticum* Ldb. 274  
*Hypochaeris grandiflora* Ldb.\* 430  
*Hypochaeris* Adams. 316  
— *monotropa* Crantz 316, 319  
  
*Ilex* L. 260, 435  
— *rugosa* Fr. Schmidt 259, 260  
*Impatiens* L. 263  
— *furcellata* Hemsl. 266  
— *komarovii* Pobed. 266  
— *maackii* Hook. 266  
— *noli-tangere* L. 266  
— *roylei* Walp. 263  
— *textori* Miq. 266  
*Incarvillea* Juss. 370  
— *sinensis* Lam. 370  
*Inula* L. 393, 395, 402  
— *britannica* L. 402  
— *japonica* Thunb. 402  
— *linearifolia* Turcz. 402  
— *salsicina* L. 402  
*Ipomoea* L. 334, 336  
— *sibirica* (L.) Pers. 336  
*Iridaceae* Juss. 11, 128  
*Iris* L. 128  
— *bloudowii* Idb. 129  
— *dichotoma* Pall. 128  
— *ensata* Thunb. 127, 128  
— *flavissima* Pall. 129  
— *kamptleri* Sieb. 128  
— *laevigata* Fisch. 128  
— *orientalis* Thunb. 128  
— *setosa* Pall. 128  
— *uniflora* Pall. 128  
— *ventricosa* Pall. 127, 128  
*Isatis* L. 195, 200  
— *japonica* Miq. 200  
*Isotactales* Rich. 7, 46  
*Isotactes* 46  
*Isotetes* L. 46  
— *asiatica* Makino 46, 47  
*Jeffersonia* Barton 190  
— *dubia* Benth. et Hook. 190  
*Juglandaceae* A. Rich. ex Kunth 12, 148  
*Juglans* L. 148, 440  
— *manshurica* Maxim. 148, 150  
*Juncaceae* Vent. 10, 112  
*Juncaginaceae* Rich. 11, 60  
*Juncellus serotinus* Clarke\* 94  
*Juncus* L. 112  
— *ambiguus* Guss. 114  
— *amurensis* (Maxim.) V. Krecz. et Gontsch. 114  
— *brachyspathus* Maxim. 114  
— *bufonius* L. 114  
— *decipiens* (Buch.) Nakai 114  
— *filiformis* L. 114  
— *gracillimus* V. Krecz. 114  
— *naenkei* E. Mey. 113, 114  
— *leschenaultii* J. Gay 114  
— *raparius* Song, et Pers. ex Billot\* 114  
— *stygius* L. 114  
— *tenius* Willd. 114  
— *turczaninowii* V. Krecz. 114  
— *virens* Buch. 114  
*Juniperus* L. 8, 9, 53  
— *dahurica* Pall. 48, 53  
— *rigida* Sieb. 48, 53  
— *sibirica* Burgsd. 48, 53  
  
*Kalimeris incisus* (Fisch.) DC.\* 398  
*Kalopanax* Miq. 288, 439  
— *septemlobum* (Thunb.) Koidz. 288, 290  
*Knautia* L. 384  
— *arvensis* (L.) Coult. 384  
*Kochia* Roth 408, 169  
— *scoparia* (L.) Schrad. 169  
*Koeleria* Pers. 68, 84  
— *askoldensis* Roshev. 84  
— *asiatica* Domin 84  
— *gracilis* Pers. 84  
— *tokiensis* Domin var. *kensongensis* Domin 84  
*Krascheninnikovia* Turcz. 171  
— *davidii* Franch. 172  
— *japonica* Korsh. 172  
— *maximowicziana* Franch. et Sav. 172  
— *rigida* Kom. 172  
— *rupestris* Turcz. 172  
— *silvatica* Maxim. 172  
*Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino\* 243  
— *striata* (Thunb.) Schindl.\* 243  
*Kyllinga* Rottb. 93, 94  
— *brevifolia* Rottb. 94, 96  
  
*Labiatae* Juss. 13, 344  
*Lactuca* L. 392, 432  
— *denticulata* (Houtt.) Maxim. 431, 434  
— *raddeana* Maxim. 431, 432  
— *repens* (L.) Maxim. 429, 432  
— *saxatilis* A. Baran. 434  
— *sonchifolia* (Bge.) Deb. 434  
— *spargosa* (Thunb.) Miq. 432  
— *triangularis* Maxim. 431, 432  
— *versicolor* (Fisch.) Sch. Bip. 431, 434  
*Lagotis* Gaertn. 360, 366  
— *minor* (Willd.) Standl. 366  
*Lamium* L. 345, 346, 350  
— *album* L. 350  
— *amplexicaule* L. 350  
— *barbatum* Sieb. et Zucc. 350  
*Laportea* Gaud. 160  
— *bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd. 159, 160  
*Lappula* Gilib. 340  
— *anisanchita* (Turcz.) Guericke 340  
— *echinata* Gilib.  
*Larix* Miller 8, 50  
— *dahurica* Turcz., s. l. 50  
— *komarovii* Kolesn. 50  
— *kurilensis* Mayr 50  
— *lubarskii* Sukacz.\* 50  
— *maritima* Sukacz. 50  
— *middendorffii* Kolesn. 50  
— *ochotensis* B. Kolesn. 50  
— *olgensis* A. Henry 50, 51  
— *principis-rupprechtii* Mayr 50  
*Lastrea nipponica* (Franch. et Sav.) Copeland\* 26  
— *palustris* (Salisb.) J. Smith\* 26  
*Lathyrus* L. 236, 248  
— *alatus* (Maxim.) Kom. 248  
— *davidii* Hance 248  
— *humilis* Fisch. 248, 249  
— *japonicus* Willd. 248  
— *komarovii* Ohwi 248, 249  
— *maritimus* Bigel. 248  
— *palustris* L. 248  
— *pilosus* Ciam. 248, 249  
— *quinnianus* (Miq.) Litv. 248, 249  
— *subrotundus* Maxim. 248  
— *tuberosus* L. 248  
*Ledum* L. 316, 318, 435  
— *decumbens* (Ait.) Small 318  
— *hypoleucum* Kom. 318  
*Macropodium* Tolm. 318  
— *palustre* L. 318  
*Leersia* Sw. 67, 76  
— *oryzoides* (L.) Sw. 75, 76  
*Leguminosae* Juss. 13, 234  
*Leibnitzia* Cass. 391, 428  
— *anandria* (L.) Turcz. 430  
— *f. autumnalis* Turcz. 430  
— *f. vernalis* Turcz. 428  
*Lemnaceae* S. Gray 9, 109  
*Lemna* L. 109, 110  
— *minor* L. 110  
— *triselcula* L. 110  
*Lentibulariaceae* Rich. 13, 374  
*Leontodon* L. 392, 430  
— *autumnale* L. 430  
*Leontopodium* R. Br. 393, 400  
— *discolor* Beauverd 400  
— *kurilense* Takeda 400  
— *leontopodioides* (Willd.) Beauverd 400  
— *ochroleucum* var. *conglobatum* (Turcz.) Grub. 400  
— *palibianum* Beauverd 400  
*Leonurus* L. 345, 351  
— *quinquilobatus* Gilib. 351  
— *heterophyllus* Sweet 351



- Leonurus macranthus* Maxim. 351, 352  
*Lepidium* L. 12, 197, 201  
— *apetalum* Willd. 201  
— *virginianum* L. 201  
*Leptoprum* Rchb. 179, 180  
— *funarioides* (L.) Rchb. 180  
*Leptorumohra miqueliana* (Maxim.) T. Ito\* 30  
*Lespedeza* Rich. 234, 242, 440  
— *bicolor* Turcz. 237, 242  
— *cyrtobotrya* Miq. 237, 242  
— *dahurica* (Lam.) Schindl. 245, 246  
— *hedyosaroides* (Pall.) Kitag. 243, 245  
— *juncica* Pers.\* 243  
— *stipulacea* Maxim. 243, 245  
— *striata* (Thunb.) Hook. et Arn. 243, 245  
— *tomentosa* (Thunb.) Sieb. 245, 246  
— *trichocarpa* Pers.\* 246  
*Leucanthemum* Mill. 395, 396, 406  
— *arcticum* (L.) DC. 406  
— *lineare* (Matsum.) Worosch. 406  
— *vulgare* Lam. 406  
*Leucopoa* Griseb. 69, 88  
— *albida* (Turcz.) V. Krecz. 88  
*Libanotis* L. 293, 302  
— *amurensis* Schischk. 302  
— *condensata* (L.) Crantz 302  
— *seseloides* (Fisch. et Mey.) Turcz. 302  
— *vulgaris* DC. var. *riviniana* Ldb.\* 302  
*Ligularia* Cass. 394, 420  
— *calthifolia* Maxim. 419, 420  
— *fischeri* (Ldb.) Turcz. 420  
— *jaluensis* Kom. 420  
— *katalpina* Nakai 420  
— *longipes* Pojark. 420  
— *mongolica* (Turcz.) DC. 420  
— *sachalinensis* Nakai 420  
— *schmidtii* (Maxim.) Makino 419, 420  
— *sibirica* auct., non Cass.\* 420  
— *sibirica* (L.) Cass. 420  
— *sichotensis* Pojark. 420  
— *speciosa* Fisch. et Mey.\* 420  
— *splendens* (Lévl. et Vaniot) Nakai 419, 420  
*Ligusticum* L. 292, 302  
— *buteinii* Fern. 302  
— *purpureopetalum* Kom. 304, 305  
*Ligustrina amurensis* Rupr.\* 326  
*Liliaceae* Hall. 11, 115  
*Lilium* L. 115, 120  
— *avonacorum* Fisch.\* 120  
— *callosum* Sieb. et Zucc. 120  
— *cernuum* Kom. 120  
— *dahuricum* Ker-Gawl. 119, 120  
— *distichum* Nakai 119, 120  
— *maximoviczii* Rgl. 120  
— *medeoloides* A. Gray 120  
— *pulchellum* Fisch. 119, 120  
— *tenatifolium* Fisch. 120  
— *tigrinum* Ker-Gawl. 120  
*Limonchis* Rydb. 130, 133  
— *hologlottis* (Maxim.) Nevski 138  
*Limnophila* L. 359, 362  
— *aquatica* L. 362, 365  
*Linaceae* Dumort. 15, 254  
*Linaria* Mill. 359, 362  
— *japonica* Mir. 362  
— *melampyroides* Kuprian. 362  
— *vulgaris* Mill. 362  
*Lindernia* All. 360, 364  
— *pyxidaria* All. 364, 365  
*Linnaea* Gronov. 378, 435  
— *borealis* L. 380, 381  
*Linum* L. 254  
— *amurensis* Alef. 254  
— *stelloroides* Planch. 254  
*Liparis* Rich. 130, 132  
— *japonica* (Miq.) Maxim. 132  
— *makinoana* Schlechter 132  
*Listera* A. Br. 130, 134  
— *cordata* (L.) R. Br. 133, 134  
— *major* Nakai\* 134  
— *nipponica* Makino 133, 134  
— *yatabei* Makino 134  
*Lithospermum* L. 340  
— *arvense* L. 340  
— *erythrorhizon* Sieb. et Zucc. 340  
*Lloydia* Salisb. 415, 122  
— *serotina* (L.) Schb. 122  
— *triflora* (Ldb.) Baker 122  
*Lobeliaceae* R. Br. 17, 390  
*Lobelia* L. 390  
— *sessilifolia* Lamb. 391  
*Loiseleuria* Desv. 318, 320, 435  
— *procumbens* (L.) Desv. 320  
*Lolium* L. 68, 90  
— *perenne* L. 90  
— *remotum* Schrank 90  
*Lomatogonium* A. Br. 328, 330  
— *retatum* (L.) Fries 330  
*Lonicera* L. 378, 380, 436  
— *chamissoi* Bge. 380  
— *chrysantha* Turcz., p. p.\* 382  
— *edulis* Turcz. 382  
— *gibbiflora* (Rupr.) Dippel 382, 383  
— *maackii* Rupr. 380, 383  
— *maximoviczii* (Rupr.) Rgl. 382, 383  
— *praeflorens* Batal. 382  
— *ruprechtiana* Rgl. 382, 383  
— *subspicienda* Nakai 382  
— *turczaninowii* Pojark. 382  
*Loranthaceae* Juss. 9  
*Lotus* L. 234, 238  
— *complanatus* L. 238  
*Ludwigia* L. 282  
— *prostrata* Roxb. 282  
*Lunathrium pycnosorum* (H. Christ) Koidz.\* 35  
*Luzula* DC. 114  
— *multiflora* (Ehrh.) Lej. 114  
— *pallens* Bess. 113, 114  
— *parviflora* (Ehrh.) Desv. 114  
— *infescens* Fisch. ex E. Mey. 113, 114  
*Lychnis* L. 171, 174  
— *alba* Mill. 174  
— *brachypetala* Horn.\* 174  
— *cognata* Maxim. 174  
— *fulgens* Fisch. 174  
— *sibirica* L. 174  
— *wilfordii* (Rgl.) Maxim. 174  
*Lyopodiaceae* Rich. 8, 44  
*Lyopodiaceae* L. 44  
*Lyopodium* L. 44  
— *alpinum* L. 44  
— *anceps* Wallr.\* 44  
— *anatum* L. 45, 46  
— *chinense* H. Christ 44  
— *clavatum* L. 45, 46  
— *complanatum* L. 44  
— *juniperoides* Sw. 44, 45  
— *obscurem* L. 44  
— *pungens* La Pyl. 46  
— *selago* L. 44  
— *serratum* Thunb. 44, 45  
*Lyceum* L. 345, 346, 354  
— *hirtellus* Kom. 356  
— *lucidus* Turcz. 353, 354  
— *maackianus* (Maxim.) Makino 353, 356  
— *maackianus* X. Ldb. 356  
— *parviflorus* X. maackianus 356  
*Lysichiton* Schott 107  
— *camtschatcense* (L.) Schott 107  
*Lysimachia* L. 322, 324  
— *barystachys* Bge. 324  
— *clethroides* DuRoi 324  
— *davurica* Ldb. 324  
*Lythraceae* Jaume 282  
*Lythrum* L. 282  
— *intermedium* Ldb. 282  
— *salicaria* L. 282  
*Maackia* Rupr. et Maxim. 234, 236, 441  
— *amurensis* Rupr. et Maxim. 236, 237  
*Macropodium* R. Br. 195, 197  
— *pterispermum* Fr. Schmidt 197  
*Magnoliaceae* Juss. 192  
*Majanthemum* Wigg. 116, 122  
— *bifolium* (L.) Schmidt 122  
—  *dilatatum* (Hornell) Nels. et Macbr. 122  
— *intermedium* Wessch. 122  
— *kamtschaticum* Kom.\* 122  
*Malus* Mill. 212, 216, 439  
— *manschurica* (Maxim.) Kom. 216  
— *pallasiiana* Juz. 216  
— *sibirica* (Maxim.) Kom.\* 216  
*Malvaceae* Juss. 14, 270  
*Malva* L. 270  
— *mauritanica* L. 270  
— *molleviensis* Downar 270  
— *pusilla* Smith 270  
*Matricaria* L. 396, 406  
— *chiamomilla* L.\* 406  
— *discoidea* DC.\* 406  
— *indora* L. 406  
— *lincea* (Maxim.) Kudo 406  
— *matricarioides* (Less.) Porter et Britt. 406  
— *recutita* L. 406  
— *suaveolens* Buch.\* 406  
— *tetragonosperma* (Fr. Schmidt) Hara et Kitam. 406  
*Matteucia* Todar. 20, 21  
— *struthiopteris* (L.) Todaro 22, 25  
*Mazus* Lour. 362  
— *japonicus* (Thunb.) Kuntze 362, 363  
— *stachydfolius* (Turcz.) Maxim. 362, 363  
*Medicago* L. 234, 236  
— *falcata* L. 236  
— *gordijevii* Kom.\* 236  
— *lupulina* L. 236  
— *ruthenica* Kom. et Alis., p. p. non L.\* 236  
— *platycarpus* Ldb. 236  
— *sativa* L. 236  
— *sativa* X. *falcata* 238  
*Mechania* Britt. 346, 348  
— *articifolia* (Miq.) Makino 348  
*Melampyrum* L. 360, 366  
— *roseum* Maxim. 366  
— *setaceum* (Maxim.) Nakai 366  
*Melandrium* Rosl. 171, 174  
— *album* (Miq.) Garcke 174  
— *apricum* (Turcz.) Rohrb. 174  
— *brachypetalum* (Horn.) Fenzl 174  
— *firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 174  
— *notiflorum* (L.) Fries 174  
— *olgae* Maxim. 174  
*Melica* L. 69, 84  
— *komarovii* Laznik 84, 85  
— *nutans* L. 84, 85  
— *turczaninowiana* Ohwi 84, 85  
*Melilotus* Adans. 234, 238  
— *albus* (L.) Desr. 238  
— *suaveolens* Ldb. 238  
*Menispermaceae* Nutt. 11, 190  
*Menispermum* L. 190, 439  
— *dahuricum* DC. 192, 193  
*Mentha* L. 346, 356  
— *dahurica* Fisch. 356  
— *haplocalyx* Briq. 356  
*Menyanthes* Dum. 16, 330  
*Menyanthes* L. 330  
— *trifoliata* — 330  
*Mertensia* Roth 338, 340, 342  
— *asiatica* Macbr. 342  
— *rivularis* (Turcz.) DC. 342  
*Metaplexis* R. Br. 332  
— *japonica* (Thunb.) Makino 332, 335  
*Microbiota* Kom. 8, 53  
— *decussata* Kom. 8, 53  
*Microlepis* Presl. 20, 30  
— *pilosella* Moore 30, 32  
— *wilfordii* Moore 30, 32  
*Microstegium* Nees 66, 70  
— *nodosum* (Kom.) Tavel. 70  
*Microseris* Decne. 212, 218, 439  
— *affinis* (Sieb. et Zucc.) Koehne 217, 218  
*Microstylis* Nutt. 130, 132  
— *monophyllus* (L.) Lindl. 132  
*Milium* L. 68, 78, 79  
— *effusum* L. 78, 79  
*Minulus* L. 330, 332  
— *stolonifer* (Maxim.) Novopokr. 332, 363  
— *tenellus* Bge. 362, 363  
*Minuartia* L. 171, 173  
— *gracilis* Kom. 173  
— *laricina* (L.) Mattf. 173  
*Miscanthus* Anders. 66, 70  
— *purpurascens* Anders. 70, 71  
— *sacchariflorus* (Maxim.) Hack. 70, 71  
*Mitella* Tournef. 204, 207  
— *nuda* L. 207  
*Moehringia* L. 171, 173  
— *elongata* Schischk. 173  
— *lateriflora* (L.) Fenzl 173  
*Monarda* Salisb. 314  
— *uniflora* (L.) A. Gray 314  
*Monochoria* Presl. 110  
— *korsakovii* Rgl. et Maack 110, 111  
— *plantaginifolia* (Roxb.) Kunth 110, 111  
*Monocotyledoneae* 53  
*Monotropaceae* Nutt. 9, 316  
*Monotropa* Nutt. 316  
— *hypopitys* L.\* 316  
— *uniflora* L. 316, 319  
*Montia* L. 14, 170



*Montia lamprosperma* Cham. 170  
 Moraceae Link 13, 158  
 Morus L. 158, 437, 439  
 — alba L. 158  
 Mosla grosseserrata Maxim.\* 356  
 Muehlenbergia Schreb. 67, 78  
 — hügelii Trin. 78, 79  
 — japonica Steud. 78, 79  
 Mulgedium L. 392, 432  
 — sibiricum (L.) Less. 432  
 Myosotis L. 340, 342  
 — caespitosa Schultz 342  
 — suaveolens Waldst. et Kit. 342  
 Myricaceae Blume 12, 148  
 Myrica L. 148, 438  
 — tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn.  
 148, 149  
 Myriophyllum L. 286  
 — spicatum L. 286  
 — ussuriense Maxim. 285, 286  
 — verticillatum L. 285, 286  
 Najadaceae Juss. 10, 60  
 Najas L. 60  
 — flexuolata A. Br. 60  
 — marina L. 60  
 — minor All. 60  
 Nardosmia Cass. 391  
 — palmata (Ait.) Hook. 416  
 — saxatilis Turcz. 416  
 Naumburgia Moench. 322, 324  
 — thyrsiflora (L.) Rehb. 324  
 Nelumbium Juss. 175  
 — komarovii Grossh. 175, 176  
 Neottia Sw. 129, 134  
 — asiatica Ohwi 134  
 — papilligera Schlechter 134  
 Neottianthe Schlechter 130, 136  
 — cucullata (L.) Schlechter 138  
 Nepeta L. 346, 348  
 — cataria L. 348  
 — manchuriensis S. Moore 348  
 Neslia Desv. 196, 202  
 — paniculata (L.) Desv. 202  
 Nicandra Adams. 358, 359  
 — physaloides (L.) Gaertn. 359  
 Nonea Medic. 340, 342  
 — rossica Stev. 342  
 Nuphar Smith 175, 178  
 — japonicum DC. 178  
 — pumilum (Hoffm.) DC. 177, 178  
 Nymphaeaceae Salisb. 11, 14, 175  
 Nymphaea L. 175, 178  
 — tetragona Georgi 177, 178  
 Nymphoides Hill 330  
 — koreanum (Levl.) Hara 332  
 — peltatum (S. G. Gmel.) O. Kuntze 330  
 Odontites Zinn 360, 368  
 — serotina (Lam.) Dum. 368  
 Oenanthe L. 293, 302  
 — decumbens (Thunb.) K.-Pol. 302  
 — stolonifera DC.\* 302  
 Oleaceae Hoffm. et Link 12, 16, 326  
 Omphalotrix Maxim. 360, 368  
 — longipes Maxim. 367, 368  
 Onagraceae Juss. 17, 282  
 — nigra Adams. 282, 284  
 — biennis (L.) Scop. 284  
 — muricata (L.) Moench 284

Onoclea L. 19, 22  
 — sensibilis L. 22  
 Ophelia D. Don 328, 330  
 — chinensis Bge. 330, 333  
 — tetrapetala (Pall.) Grossh. 330  
 — tschorskyi (Kom.) Grossh. 330  
 — willfordii Kerner 330  
 Ophioglossaceae R. Br. 8, 40  
 Ophioglossum L. 19, 40  
 — vulgatum L. 40, 42  
 Orchidaceae Lindl. 9, 11, 129  
 Oreochis Lindl. 130, 134  
 — patens Lindl. 134  
 Origanum L. 346, 352  
 — vulgare L. 352  
 Orobanchaceae Vent. 9, 372  
 Orobanche L. 372  
 — amurensis (G. Beck) Kom. 371, 372  
 — coerulescens Steph. 372  
 — korschinskyi Novopokr. 372  
 — pycnostachya Hance 372  
 Orostachys Fisch. 202, 303  
 — cartilaginea Boriss. 203  
 — iwagense (Makino) Hara 204  
 — malacophylla (Pall.) Fisch. 204  
 — spinosa (L.) C. A. Mey. 203  
 Orthodon Benth. 345, 356  
 — grosseratum (Maxim.) Kudo 356  
 Orzya Kunth 64, 67  
 Osmorhiza Rafin. 292, 298  
 — aristata (Thunb.) Makino et Yabe 297, 298  
 Osmundaceae R. Br. 7, 40  
 Osmunda L. 20, 40  
 — cinnamomea L. 40, 41  
 — claytoniana L. 40, 41  
 Otella Pers. 64  
 — alismoides (L.) Pers. 64, 65  
 Ovinia 88  
 Oxalidaceae Lindl. 15, 254  
 Oxalis L. 254  
 — acetosella L. 254  
 — corniculata L. 254  
 — obtusifolia Maxim. 254  
 — stricta L. 254  
 Oxycoxae Adams. 321, 435  
 — microcarpus Turcz. 321  
 — palustris Pers.\* 321  
 — quadrifidus Gilib. 321  
 Oxyria Hill 162, 164  
 — digyna (L.) Hill 164  
 Oxytropis DC. 236, 241  
 — campestris (L.) DC., p. p.\* 241  
 — chancanensis Jurtz. 241  
 — mandshurica Bge. 242  
 — oxyphylla auct., non DC.\* 241  
 — ruthenica Vass. 242  
 — sordida (Willd.) Pers. 241  
 — strobilacea Bge. 242  
 Padus Mill. 212, 232, 438  
 — asiatica Kom. 232  
 — maackii (Rupr.) Kom. 232  
 Paeonia L. 179  
 — albiflora Pall.\* 179  
 — japonica Miyabe et Takeda 179  
 — lactiflora Pall. 179  
 — obovata Maxim. 179  
 — vernalis Mandl 179  
 Panax L. 287, 292

— ginseng C. A. Mey. 292  
 Paniceae R. Br. 64, 66  
 Panicum L. 67, 76  
 — acroanthum Steud. 76  
 — miliaceum L. 76  
 Papanovaceae Juss. 14, 192  
 Papaver Tourm. 192  
 — nudicaule L. subsp. amurensis N. Busch 192  
 — orientale L. 192  
 — somniferum L. 192  
 Parietaria L. 160, 161  
 — micrantha Ldb. 161  
 Parnassia L. 15, 204, 207  
 — palustris L. 207  
 Paris L. 115, 124  
 — hexaphylla Cham. 124  
 — manshurica Kom. 124  
 Parthenocissus Planch. 266, 268, 439  
 — tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. 268  
 Pastinaca L. 292, 312  
 — silvestris Garsault 312  
 Patrinia Juss. 384  
 — hispida Bge.\* 384  
 — rupestris (Pall.) Dufur. 384  
 — scabiosifolia Fisch. ex Link 384  
 — sibirica (L.) Juss. 384  
 Pedaliaceae R. Br. 17, 372  
 Pedicularis L. 360, 368  
 — grandiflora Fisch. 370  
 — kuznetsovii Kom. 368  
 — labradorica Wirs. 370  
 — lapponica L. 370  
 — mandshurica Maxim. 369, 370  
 — resupinata L. 369, 370  
 — sceptrum-carolinum L. 369  
 — spicata Pall. 368  
 — striata Pall. 370  
 — venusta (Bge.) Schang. 370  
 — verticillata L. 368  
 Penthorum Gronov. 202, 204  
 — chinense Pursh 204  
 — humile Rgl. et Maack 204  
 Perilla L. 345, 356  
 — nankinensis (Lour.) Deane. 356  
 — oxyoides L. 356  
 Perularia Lindl. 130  
 — fuscescens (L.) Lindl. 138  
 — ussuriensis (Maxim.) Schlechter 138  
 Petasites palmatus A. Gray\* 416  
 — saxatilis Kom.\* 416  
 Pencedanum L. 294, 306  
 — deltoideum Makino 312  
 — elegans Kom. 306  
 — eryngiifolium Kom. 306  
 — fornosanum Hayata 312  
 — litorale Worsch. et Gorovoi 312, 313  
 — paishanense Nakai 306  
 — terebinthaceum Fisch. 312  
 — terebinthaceum Fisch., p. p.\* 306, 312  
 Phacelanthus Sieb. et Zucc. 372  
 — continentalis Kom.\* 372  
 — tubiflorus Sieb. et Zucc. 371, 372  
 Phalarideae Link 66, 67  
 Phaeopteris dryopteris Fée\* 26  
 Phellodendron Rupr. 255, 441  
 — amurensis Rupr. 255  
 Phellipterus Hittorlii Benth. et Hook.\* 306

Philadelphus L. 17, 204, 207, 436  
 — schrenkii Rupr. et Maxim. 308  
 — tenuiflorus Rupr. et Maxim. 207  
 Phleum L. 67, 78  
 — alpinum L. 78  
 — pratense L. 78  
 — phleoides (L.) Simk. 78  
 Philodendron Turcz. 294, 306  
 — komarovii Gorovoi 306  
 — sibiricus (Steph.) K.-Pol. 306  
 Phlomis L. 346, 350  
 — koraiensis Nakai 350  
 — maximoviczii Rgl. 350  
 — tuberosa L. 350  
 Phragmites Adams. 68, 82  
 — communis Trin. 82  
 — japonica Steud. 84  
 — serotina Kom. 84  
 Phrymacea Schauer 13, 374  
 Phryma L. 374  
 — leptostachya L. 373, 374  
 Phterospermum Bge. 360, 368  
 — chinense Bge. 368  
 Phyllanthus L. 255, 256  
 — ussuriensis Rupr. et Maxim. 256, 258  
 Phyllodode Salisb. 316, 320, 435  
 — coerulea (L.) Bab. 320  
 Phyllitis Ludw. 19, 35  
 — japonica Kom. 35, 36  
 Phyllospadix Hook. 60  
 — iwatsensis Makino\* 60  
 — scouleri Hook. 60  
 Physalistrum Makino 358, 359  
 — echinatum (Yatabe) Makino 357, 359  
 Physalis L. 358, 359  
 — glabripes Pojark. 357, 359  
 — pubescens L. 359  
 Physocarpus Maxim. 212, 440  
 — amurensis Maxim. 212, 213  
 — ribesifolia Kom. 213, 214  
 Physoclaia G. Don 358, 359  
 — physaloides (L.) G. Don 359  
 Picea Dietr. 9, 50  
 — ajanensis Fisch. 49, 50  
 — komarovii V. Vassil. 50  
 — koraiensis Nakai 50  
 — microsperma (L.) Carr. 50  
 — obovata Ldb. 49, 50  
 Piceis L. 161, 392, 430  
 — koreana (Kitam.) Worosch. 430  
 Pilea Lindl. 160  
 — pepioides Hook et Arn. 161  
 — viridissima Makino 161  
 Pimpinella L. 293, 304  
 — brachycarpa (Kom.) Nakai\* 300  
 — thunglingiana Wolff 300  
 Pinaceae Lindl. 8, 49  
 Pinguicula L. 374  
 — villosa L. 374  
 Pinus L. 8, 50  
 — densiflora Sieb. et Zucc.\* 50  
 — funebris Kom. 50, 52  
 — koraiensis Sieb. et Zucc. 52, 53  
 — pumila Rgl. 52, 53  
 — silvestris L. 52, 53  
 Plantaginaceae Juss. 16, 374  
 Plantago L. 374  
 — cantschatica Link 374  
 — depressa Willd. 374  
 — fontis-curvae Kom.\* 374



- Plantago indica* L. 374  
 — *lanceolata* L. 374  
 — *major* L. 374  
 — *media* L. 374  
*Platanthera* L. C. Rich. 130, 138  
 — *extremiorientalis* Nevski 138  
 — *freylii* Kraenzl. 138  
 — *maximoviciana* Schlechter 138  
 — *tipuloides* (L.) Lindl. 138  
*Platyedon* A. DC. 386, 390  
 — *grandiflorus* (Jacq.) A. DC. 390  
*Plectranthus* L'Hér. 346, 358  
 — *excisus* Maxim. 355, 358  
 — *glaucoalyx* Maxim. 355, 358  
 — *serra* Maxim. 355, 358  
*Pleurosoropsis* Fom. 19, 37  
 — *makinoi* (H. Christ) Fom. 37, 38  
*Pleurospermum* Hoffm. 293, 298  
 — *cantschiaticum* Hoffm. 298  
*Plumbaginaceae* Juss. 16, 326  
*Poa* L. 69, 86  
 — *angustifolia* L. 86  
 — *angustiglumis* Roshev. 86  
 — *annua* L. 86  
 — *arctica* R. Br. 88  
 — *botryoides* Trin. 88  
 — *compressa* L. 86  
 — *eminentis* Presl 86  
 — *macrocalyx* Trautv. et Mey. 86  
 — *memoralis* L. 86  
 — *palustris* L. 88  
 — *pratensis* L. 86  
 — *radula* Pr. et Sav. 86  
 — *sibirica* Roshev. 86  
 — *sphondyliodes* Trin. 86  
 — *subfastigiata* Trin. 86  
 — *ussuriensis* Roshev. 86  
*Pogonia* Juss. 129, 134  
 — *japonica* Rchb. 133, 134  
*Polemoniaceae* Juss. 16, 338  
*Polemonium* L. 338  
 — *liniflorum* V. Vassil. 338  
 — *villosum* J. Rudolph ex Georgi 338  
*Polinia imberbis* auct., non Nees\* 70  
*Polygalaceae* R. Br. 13, 255  
*Polygala* L. 255  
 — *japonica* Houtt. 255, 257  
 — *sibirica* L. 255, 257  
 — *tatarinowii* Rgl. 255, 257  
 — *tenifolia* Willd. 255, 257  
 — *triphylla* Buch.-Ham. ex D. Don non Burm. f.\* 255  
*Polygonaceae* Juss. 11, 14, 162  
*Polygonatum* Adans. 116, 124  
 — *acuminatifolium* Kom. 124, 125  
 — *desoulavii* Kom. 124, 125  
 — *humile* Fisch. ex Maxim. 124, 125  
 — *inflatum* Kom. 124  
 — *involutum* (Franch. et Sav.) Maxim. 124, 125  
 — *odoratum* (Mill.) Druce 124, 125  
 — *officinale* All.\* 124  
 — *stenophyllum* Maxim. 124, 125  
*Polygonum* L. 102, 164  
 — *japonense* (Nakai) Grig. 166  
 — *alatum* A. Hamilt. 167  
 — *alopecuroides* Turcz. 166  
 — *alpinum* All. 167  
 — *amphibium* auct., non L.\* 165  
 — *amurense* Niew. 165  
 — *angustifolium* Pall. 166  
 — *aviculare* L. 164  
 — *belophyllum* Litw. 167  
 — *blumei* Meissn.\* 165  
 — *bungeanum* Turcz. 165  
 — *buxifolium* Nutt. 164  
 — *caespitosum* Blume\* 165  
 — *calcatum* Lindb. 164  
 — *convolvulus* L. 167  
 — *dentato-alatum* Fr. Schmidt 167  
 — *disstiflorum* Hemsl. 167  
 — *divaricatum* L. 167  
 — *dumetorum* L. 167  
 — *ellipticum* Willdard 166  
 — *excurrens* Steverd 165  
 — *foliosum* Lindb. 165  
 — *fusco-ochreatum* Kom. 164  
 — *humifusum* var. *mandschuricum* Skvorts.\* 164  
 — *schisticum* Kom. 165  
 — *hydropiper* L. 165  
 — *intricatum* Kom. 165  
 — *korsinskianum* Nakai 167  
 — *lapathifolium* L. 165  
 — *laxmanni* Lepech. 166  
 — *liatungense* Kitag.\* 164  
 — *limosum* Kom. 166  
 — *longisetum* De Bruyn. 165  
 — *luxurians* Grig., non Danser\* 166  
 — *maackianum* Rgl. 167  
 — *makinoi* Nakai\* 165  
 — *mandschuricum* Skvorts.\* 164  
 — *manshurienae* V. Petrov 166  
 — *minus* auct., non Huds.\* 165  
 — *nodosum* Pers.\* 165  
 — *orientale* L. 165  
 — *pacificum* V. Petrov 166  
 — *parviflorum* Chang et Li, non Schott.\* 164  
 — *pauciflorum* Maxim. 167  
 — *perfoliatum* L. 167  
 — *persicaria* L. 165  
 — *planum* Skvorts.\* 164  
 — *platyphyllum* Li et Chang 166  
 — *plebejum* R. Br. 164  
 — *polymorphum* Ldb.\* 167  
 — *posumbu* A. Hamilt. 165  
 — *procumbens* Gilib. 164  
 — *prostratum* Skvorts., non R. Br.\* 164  
 — *regelianum* Kom.\* 166  
 — *relictum* Kom. 166  
 — *rigidum* Skvorts.\* 164  
 — *roseoviride* (Kitag.) Li et Chang\* 165  
 — *sagittatum* var. *ussuriense* Rgl.\* 167  
 — *salinum* A. Baran. et Skvorts.\* 164  
 — *senticosum* Meissn. 167  
 — *sieboldii* Meissn. 167  
 — *strigosum* R. Br. 167  
 — *subarticulatum* V. Petrov 166  
 — *sylvaticum* Skvorts. 164  
 — *thunbergii* Sieb. et Zucc. 167  
 — *trigonocarpum* (Nakai) Kudo et Masam. 165  
 — *tripterocarpum* A. Gray 166  
 — *undulatum* Murr., non Berg.\* 167  
 — *ussuriense* V. Petrov 166  
 — *viscoferum* Makino 165  
 — *viscosum* A. Hamilt. 165  
 — *viviparum* L. 166  
 — *zeense* Kom.\* 166  
*Polyodiaceae* R. Br. 8, 22  
*Polypodium* L. 19, 20, 37  
 — *ussuriense* Rgl. 19, 36, 37  
 — *virginianum* L. 36, 37  
*Polystichum* Roth 20, 30  
 — *Braunii* Fée 30, 31  
 — *craspedosorum* (Maxim.) Diels 30, 31  
 — *tripteron* (O. Kuntze) Presl 30, 31  
*Pontederiaceae* Kunth 11, 110  
*Populus* L. 140, 438  
 — *amurensis* Kom. 140  
 — *dauriana* Dode 140, 141  
 — *koreana* Rehder 141, 142  
 — *maximoviczii* A. Henry 141, 142  
 — *suaveolens* Fisch. 140  
 — *ussuriensis* Kom. 140  
*Portulacaceae* Juss. 14, 17, 170  
*Portulaca* L. 18, 170  
 — *oleracea* L. 170  
*Potamogetonaceae* Dum. 10, 55  
*Potamogeton* L. 55  
 — *asiaticus* Benn.\* 58  
 — *crispus* L. 58  
 — *cristatus* Rgl. et Maack 58, 59  
 — *distinctus* A. Benn. 58  
 — *gramineus* L. 58  
 — *javanicus* Hassk. 58  
 — *limosifolius* Maxim. 58  
 — *maackianus* A. Benn. 55, 57  
 — *malinus* Miq. 57, 58  
 — *manshuriensis* A. Benn. 58  
 — *midukikimo* Makino 57, 58  
 — *natans* L. 58, 59  
 — *oxyphyllus* Miq. 57, 58  
 — *perfoliatus* L. 57, 58  
 — *praelongus* Wulf. 58  
 — *pusillus* L. 55  
 — *tenifolius* Raf. 58, 59  
 — *zosterifolius* Schum. 58  
*Potentilla* L. 211, 212, 220  
 — *acaulis* L. 222  
 — *aemulans* Juz. 224  
 — *amurensis* Maxim. 222  
 — *anserina* L. 224  
 — *bifurca* L. 223, 224  
 — *centigrana* var. *manshurica* Maxim. 220, 222, 223  
 — *chinesis* Ser. 223, 224  
 — *cryptotaeniae* Maxim. 222, 223  
 — *discolor* Bge. 222  
 — *elegans* Cham. et Schlecht. 222  
 — *filipedata* Willd. 226  
 — *flagellaris* Willd. 222, 223  
 — *fragarioides* L. 226  
 — *fragrifolius* Willd. 222  
 — *freyaniana* Borm. 222  
 — *inopelta* Wahl. 222  
 — *inquanans* Turcz. 224  
 — *kleiniana* Wight et Arn. 222  
 — *leucophylla* Pall. 220  
 — *multifida* L. 224  
 — *nivea* L. 220  
 — *norvegica* L. 222  
 — *pacifica* Howell 224  
 — *semilabra* Juz. 224  
 — *sp.* 220  
 — *sprengelliana* Lehm. 226  
 — *supina* L. 226  
 — *transschellii* Juz. 224  
 — *ussuriensis* Juz. 224  
 — *verticillaris* Steph. ex Willd. 224  
 — *viscosa* J. Don 226  
*Prenanthes* L. 392, 434  
 — *maximoviczii* Kirp. 434  
 — *tatarinowii* Maxim. 434  
*Primulaceae* Vent. 17, 322  
*Primula* L. 322  
 — *cuneifolia* Ldb. 322, 323  
 — *farinosa* L. 322  
 — *fistulosa* Turcz. 322, 323  
 — *patens* Turcz. 322, 323  
 — *sachalinensis* Nakai 322  
*Prinsepia* Royle 211, 232, 437  
 — *sinensis* (Oliv.) Kom. 232, 235  
*Prunella* L. 346, 350  
 — *vulgaris* L. 350  
*Prunus* Mill. 212, 232, 438  
 — *salicina* Lindl. 232  
 — *ussuriensis* Koval. et Kost. 232  
*Ptarmica* DC. 395, 396, 404  
 — *acuminata* Ldb. 404  
 — *alpina* (L.) DC. 406  
 — *mongolica* (Fisch. ex Spreng.) DC. 406  
 — *ptarmicoides* (Maxim.) Worosch. 406  
 — *sibirica* Ldb.\* 406  
*Pteridium* Gled. 20, 37  
 — *aquilinum* Kuhn 37, 38  
*Pteridophyta* 7  
*Ptilagrostis* Griseb. 67, 78  
 — *mongolica* (Turcz.) Griseb. 77, 78  
*Ptilopteris triptera* (O. Kuntze) Hayata\* 30  
*Puccinellia* Parl. 69, 88  
 — *hauptiana* V. Krecz. 88  
 — *kurilensis* Takeda 88  
 — *paupercula* Fern. et Weath. 88  
*Pueraria* DC. 234, 250, 440  
 — *hirsuta* (Thunb.) Schmidt. 250, 252  
*Pulicaria* Gaertn. 383, 402  
 — *prostrata* (Gilib.) Aschers. 402  
*Pulsatilla* Adans. 178, 187  
 — *cernua* (Thunb.) Bercht. et Opiz 187  
 — *chinesis* (Bge.) Rgl. 187  
 — *dahurica* (Fisch.) Spreng. 187  
 — *kissii* Mandl 187  
 — *multifida* Juz. 187  
 — *turczanowii* Krul. et Serg. 187  
*Pycnostelema* Bge. 332  
 — *paniculata* (Bge.) Schumann 332, 335  
*Pycnos eragrostis* Pall.\* 94  
 — *limosus* Schischk.\* 94  
 — *nilagricus* Schischk.\* 94  
 — *setiformis* Schischk.\* 93  
 — *pratensis* Schischk.\* 93  
*Pyrethrum parthenium* (L.) Smith 407  
*Pyrolaceae* Dum. 15  
*Pyrola* L. 314  
 — *dahurica* (H. Andres.) Kom. 314  
 — *incarnata* Fisch. 314  
 — *japonica* Sieb. 314  
 — *minor* L. 314  
 — *renifolia* Maxim. 314  
 — *subaphylla* Maxim. 314  
*Pyrus* L. 212, 216, 439  
 — *ussuriensis* Maxim. 216  
*Quercus* L. 13, 156, 437  
 — *crispula* Blume 156  
 — *dentata* Thunb. 156, 457  
 — *mongolica* Fisch. 156, 457  
*Quinaria* Raf.\* 268



- Ramischia Opiz* 314, 316  
 — *obtusata* (Turcz.) Freyn 316  
 — *secunda* (L.) Garcke 316  
*Ranunculaceae* Juss. 13, 14, 178  
*Ranunculus* L. 178, 188  
 — *amurensis* Kom. 188  
 — *chimensis* Bge. 188  
 — *divaricatus* Schrank 188  
 — *eradicatus* (Fries) Nevski 188  
 — *gmelinii* DC. 188  
 — *japonicus* Thunb. 189  
 — *kauffmannii* Clerc 188  
 — *monophyllus* Ovcz. 189  
 — *propinquus* C.A.Mey. 189  
 — *repens* L. 188  
 — *reptans* L. 188  
 — *sceleratus* L. 188  
 — *tachirei* Franch. et Sav. 189  
 — *ussuriensis* Kom. 189  
*Raphanus* L. 196, 201  
 — *raphanistrum* L. 201  
*Rhamnaceae* Juss. 16, 266  
*Rhamnus* L. 266, 438  
 — *dahurica* Pall. 266  
 — *diamantiaca* Nakai 266  
 — *ussuriensis* J. Vassil. 266  
*Rhaponticum* Adams 392, 428  
*Rh. satzperovii* Sisk. 428  
 — *uniflorum* (L.) DC. 428  
*Rheum* L. 162, 164  
 — *compactum* L. 164  
*Rhinanthus* L. 360, 368  
 — *minor* L. 368  
*Rhodiola* L. 202  
 — *komarovii* Boriss.\* 203  
 — *rosea* L. 202  
*Rhododendron* L. 318, 435, 438  
 — *aureum* Georgi 320  
 — *chrysanthum* Pall.\* 320  
 — *dahuricum* L. 318  
 — *hypopytis* Pojark. 320  
 — *kamtschaticum* Pall. 320  
 — *mucronulatum* Turcz. 318  
 — *parvifolium* Adams 318  
 — *redowskianum* Maxim. 320  
 — *schlippenbachii* Maxim. 320  
 — *sichotense* Pojark. 318  
*Rhynchospora* Vahl 93, 100  
 — *alba* (L.) Vahl 100  
 — *fauriei* Franch. 100  
*Ribes* L. 18, 204, 208, 439, 440  
 — *dikusha* Fisch. 210  
 — *fragrans* Pall. 210  
 — *horridum* Rupr. 208, 209  
 — *komarovii* Pojark. 208  
 — *manshuricum* (Maxim.) Kom. 208  
 — *maximoviczianum* Kom. 208, 209  
 — *nigrum* L. 20  
 — *palczewskii* Pojark. 208  
 — *pallidiflorum* Pojark. 210  
 — *pauciflorum* Turcz. 210  
 — *procumbens* Pall. 210  
 — *triste* Pall. 208  
 — *vulgare* Lam. 210  
*Roechneria* C. Koch 69, 91  
 — *amurensis* (Drob.) Nevski 91  
 — *ciliaris* (Trin.) Nevski 91  
 — *confusa* (Roshev.) Nevski 91  
 — *pendulina* Nevski 91  
 — *trachycaulon* (Link) Nevski 91  
 — *turczaninowii* (Drob.) Nevski 91  
*Rorippa* Scop. 197, 198  
 — *globosa* (Turcz.) Vass. 198  
 — *hispidia* (DC.) Britt. 198  
 — *islandica* (Oeder) Borb. 198  
 — *microsperma* (DC.) Vass. 198  
*Rosaceae* Juss. 14, 17, 210  
*Rosa* L. 210, 230, 440  
 — *acicularis* Lindl. 230, 233  
 — *avurica* Pall. 230, 233  
 — *gracilipes* Chrsan. 230, 233  
 — *maximovicziana* Rgl. 230, 231  
 — *rugosa* Thunb. 230, 231  
 — *sichotelinensis* Kolesn. 230  
 — *ussuriensis* Juz. 230  
*Rubiaceae* Juss. 18, 376  
*Rubia* L. 376, 378  
 — *chinesis* Rgl. et Maack 377, 378  
 — *cordifolia* f. *silvatica* Maxim.\* 378  
 — *grandis* Fr. Schmidt\* 378  
 — *joseensis* (Miq.) Miyabe et Miyake 377, 378  
 — *pratensis* (Maxim.) Nakai 378  
 — *silvatica* (Maxim.) Nakai 377, 378  
*Rubus* L. 210, 212, 218, 439, 440  
 — *articus* L. 218, 221  
 — *chaemaemorus* L. 218, 221  
 — *crataegifolius* Bge. 220, 221, 439  
 — *humifolius* C.A.Mey. 218  
 — *komarovii* Nakai 220, 221  
 — *sachalinensis* Lév. 220, 221  
 — *saxatilis* L. 220  
*Rumex* L. 162  
 — *acetosa* L. 162  
 — *acetosella* L. 162  
 — *amurensis* Fr. Schmidt 162  
 — *aquaticus* auct., non L.\* 164  
 — *crispus* L. 164  
 — *domesticus* Hartm.\* 164  
 — *gmelinii* Turcz. 162  
 — *longifolius* DC. 164  
 — *maritimus* L. 162  
 — *patentia* L. 162  
 — *protractus* Rech. f. 164  
 — *stenophyllus* Ldb. 162  
 — *thyrsofolius* Fingerh. 162  
 — *ussuriensis* Losinsk.\* 162  
*Rupia* L. 55, 58  
 — *maritima* L. 58  
 — *spiralis* L. 58  
*Rutaceae* Juss. 16, 255  
*Sagina* L. 171  
 — *littoralis* Hult.\* 173  
 — *maxima* A. Gray 173  
*Sagittaria* L. 62  
 — *natans* Pall. 62, 63  
 — *trifolia* L. 62, 63  
*Salicaceae* Mirbel 12, 140  
*Salicornia* L. 168, 169  
 — *europaea* L. 169  
*Salix* L. 140, 142, 436, 438  
 — *bebbiana* Sarg. 143  
 — *berberifolia* Pall. 147  
 — *braucheriana* (Trautv. et Mey.) Kom. 143, 146  
 — *caprea* L. 145, 146  
 — *cardiophylla* Trautv. et Mey. 143, 147  
 — *chlorostachya* Turcz. 147  
 — *cuneata* Turcz. 146  
 — *dahurica* Turcz. 144, 145  
 — *dasyclados* Wimm. 146  
 — *divaricata* Pall. 144, 148  
 — *dolichostyla* O. v. Seem. 142, 145  
 — *fumosa* Turcz. 147  
 — *fuscescens* Anderss. 146  
 — *glauca* L. 146  
 — *gracilistyla* Miq. 143, 146  
 — *hastata* L. 144, 148  
 — *integra* Thunb. 142, 143, 436  
 — *kangensis* Nakai 144  
 — *kochiana* Trautv. 147  
 — *krylovii* E. Wolf 143  
 — *lepidostachys* O. v. Seem. 144, 147  
 — *livida* Wahlb. 147  
 — *maximoviczii* Kom. 143, 146  
 — *mixta* Horsh.\* 142  
 — *mongolica* Siuzew 144  
 — *myrsinites* L. 147, 148  
 — *myrtilloides* L. 143, 148  
 — *nipponica* Franch. et Sav. 144  
 — *oblongifolia* Trautv. et Mey. 147  
 — *opaca* Anderss. 146  
 — *ovalifolia* Trautv. 147  
 — *pentandra* L. 146  
 — *pietrolia* Miq. 144  
 — *pyrofolia* L. 147  
 — *raideana* Laksch. 148  
 — *rorida* Laksch. 145, 145  
 — *sachalinensis* Fr. Schmidt 144  
 — *saxatilis* Turcz. 147  
 — *schwerinii* E. Wolf 145—147  
 — *siuzewii* O. v. Seem. 142, 145  
 — *starkeana* Willd. 147  
 — *tenuifolia* Turcz. 142  
 — *triandra* L. 144  
 — *tortulosa* Trautv. 146  
 — *udensis* Trautv. et Mey. 144  
 — *viminalis* L.\* 146  
 — *viridula* Anderss. 147  
 — *xerophila* Floder. 148  
*Salsola* L. 168, 169  
 — *collina* Pall. 169  
 — *komarovii* Iljin 169  
*Salvia* L. 345, 352  
 — *plebeja* R. Br. 352  
*Salvinia*aceae Dunn 7, 40  
*Salvinia* Micheli 40  
 — *natans* (L.) All. 40, 42  
*Sambucus* L. 378, 440  
 — *coreana* (Nakai) Kom. et Aliss. 380  
 — *latipinna* Nakai 378  
 — *manshurica* Kitag. 378, 379  
 — *sibirica* Nakai 378, 379  
*Sanguisorba* L. 211, 228  
 — *glandulosa* Kom. 228  
 — *magnifica* Schischk. et Kom. 229, 230  
 — *officinalis* L. 230  
 — *parviflora* (Maxim.) Takeda 228  
 — *sitchensis* C. A. Mey. 229, 230  
 — *tenuifolia* Fisch. 229  
*Sanicula* L. 292, 294  
 — *chinesis* Bge. 294  
 — *clata* auct., non Hamilt.\* 294  
 — *rubriflora* Fr. Schmidt 294, 295  
*Santalaceae* R. Br. 17, 161  
*Saponaria* L. 171, 175  
 — *officinalis* L. 175  
*Saposhnikovia* Schischk. 293, 306  
 — *divaricata* (Turcz.) Schischk. 306, 311  
*Satureja* L. 345, 352  
 — *hortensis* var. *manshurica* Boriss. 352  
*Saussurea* DC. 422  
 — *amurensis* Turcz. 422, 423  
 — *dubia* Freyn 424  
 — *elongata* DC.\* 425  
 — *grandifolia* Maxim. 423, 424  
 — *japonica* auct., non Thunb.\* 425  
 — *japonica* var. *alata* Kom., non Rgl.\* 425  
 — *karoii* Freyn\* 424  
 — *kitamurana* Miyabe et Tatewaki 424  
 — *manshurica* Kom. 425  
 — *maximoviczii* Herd. 425  
 — *neopulchella* Lipsch. 425  
 — *nesorata* Nakai 424  
 — *odontolepis* Sch. Bip. 425  
 — *petiolata* Kom. 424  
 — *polypodiifolia* Kom., non DC.\* 425  
 — *porcellanea* Lipsch. 424  
 — *pulchella* Fisch. 425  
 — var. *subintegra* Rgl. 425  
 — *recurvata* (Maxim.) Lipsch. 423—425  
 — *rosea* Kom.\* 424  
 — *sinuata* Kom. 425  
 — *socavae* Lipsch. 422  
 — *sovetica* Kom. 422  
 — *splendida* Kom. 422  
 — *subtriangulata* Kom. 423, 424  
 — *tomentosa* Kom. 422  
 — *triangulata* Trautv. et Mey. 424  
 — *umbrosa* Kom. 424  
 — *ussuriensis* Maxim. 425  
 — var. *firmifolia* Lipsch. 424  
 — var. *genuina* Maxim. 425  
 — var. *incisa* Maxim. 425  
 — var. *pinnatifida* Maxim. 425  
*Saxifragaceae* Juss. 15, 17, 18, 204  
*Saxifraga* L. 204, 206  
 — *astilboides* Losinsk. 206  
 — *bronchialis* L. 206  
 — *cernua* L. 207  
 — *cherlerioides* D. Don 206  
 — *cortusifolia* Sieb. et Zucc. 205, 206  
 — *foliolosa* R. Br. 206  
 — *korshinskii* Kom. 206  
 — *manchurica* (Engl.) Kom. 206  
 — *nelsoniana* D. Don 206  
 — *nudicaulis* D. Don 206  
 — *oblongifolia* Nakai 206  
 — *punctata* L. 206  
 — *redowskiana* Sternb. 207  
 — *sibirica* L. 207  
 — *spindosa* Adams 206  
*Scabiosa* L. 354  
 — *lacomphylla* Kitag. 354  
*Scheuchzeria* L. 60, 62  
 — *palustris* L. 61, 62  
*Schizachne* Hack. 69, 90  
 — *callosa* (Turcz.) Roshev. 89, 90  
*Schizandra* Rich. 45, 192, 436  
 — *chinesis* (Turcz.) Baill. 192  
 — *schinenepeta* Briq. 345, 348  
 — *multifida* (L.) Briq. 348  
*Schizopepon* Maxim. 386  
 — *broniifolius* Maxim. 385, 386  
*Scilla* L. 115, 122  
 — *japonica* (Thunb.) Baker 122  
*Scirpus* L. 93, 98  
 — *compactus* Hoffm. 97, 98  
 — *depauperatus* Kom. 98



*Scirpus* dessoulavii Krecz. 98  
 — erectus Poir. 98  
 — japonicus Fern., non Franch. et Sav.\*  
 — 98  
 — komarovii Roshev. 98  
 — lacustris L. 98  
 — maritimus auct., non L.\* 98  
 — var. compactus Ldb.\* 98  
 — maximoviczii Clarke 98 \*  
 — michelianus L. 94  
 — mucronatus L. 98  
 — orientalis Ohwi 98  
 — radicans Schk. 98  
 — tabernaemontani C. C. Gmel. 98  
 — triquetus L. 97, 98  
 — wicburai Beklr. 98  
*Scleranthus* L. 12, 170, 173  
 — annuus L. 173  
*Scorzonera* L. 392, 430  
 — albicaulis Bge. 429, 430  
 — radiata Fisch. 429, 430  
*Scrophulariaceae* Juss. 13, 17, 359  
*Scrophularia* L. 360, 361  
 — amurensis Fr. Schmidt 361, 362  
 — grayana Maxim. 362  
 — maximoviczii Gleue 361, 362  
 — oldhami Oliv. 361, 362  
*Scutellaria* L. 246, 347  
 — baicalensis Georgi 343, 347  
 — dependens Maxim. 343, 347  
 — ikonnikovii Juz. 347  
 — krasavii Kom. et I. Schischk. 348  
 — moniflorata Kom. 348  
 — pacifica Juz. 347  
 — polyphylla Juz. 347  
 — regeliana Nakai 347  
 — scordifolia Fisch. 347  
 — taquetii Lévl. et Vaniot 347  
 — tuminensis Nakai 348  
 — ussuriensis (Rgl.) Kudo 347  
*Secale* L. 70  
*Securinega* Comm. 13, 255, 256, 437  
 — suffruticosa (Pall.) Rehd. 256, 258  
*Sedum* L. 202, 203  
 — aizoon L. 203  
 — cyaneum J. Rudolph 203  
 — elaeocharianum Praeger 203  
 — eupatorioides Kom.\* 203  
 — hyperaizoon Kom.\* 203  
 — kamczaticum Fisch. 203  
 — litorale Kom.\* 203  
 — maximoviczii Rgl. 203  
 — middendorffianum Maxim. 203  
 — pallidum Freyn 203  
 — polytrichoides Hems. 203  
 — purpureum (L.) Schult. 203  
 — salskianum Rgl. et Maack 203  
 — scitotenense Vorosh. 203  
 — ussuriense Kom. 203  
 — viviparum Maxim. 203  
*Selaginellaceae* Mett. 8, 46  
*Selaginella* Spring 46  
 — borealis Spring 46, 47  
 — helvetica Link 46, 47  
 — involvens Spring 46, 47  
 — rossii (Bak.) Vach. 46, 47  
 — sanguinolenta Spring 46  
 — shakotanensis Miyabe et Kudo 46, 47  
 — sibirica (Milde) Hieron. 46, 47  
*Semiaquilegia* Makino 179, 180

— manshurica Kom. 180, 182  
*Senecio* L. 393—395, 416  
 — ambraceus Turcz. 418  
 — amurensis Schischk. 417, 418  
 — arcticus Rupr. 418  
 — argenteus Turcz. 417, 418  
 — campestris auct., non DC.\* 418  
 — cannabifolius Less. 418  
 — hammeus Turcz. 417, 418  
 — hieraciformis Kom. 420  
 — litvinovii Schischk. 418  
 — nemorensis L. 417, 418  
 — otophorus auct., non Wedd.\* 418  
 — palmatus Pall.\* 418  
 — pseudoarctica Less. 418  
 — scitotenensis Kom. 418  
 — subcaposus Kom. 420  
 — viscosus L. 418  
 — vulgaris L. 417, 418  
*Serratula* L. 395, 428  
 — atriplicifolia Benth. et Hook.\* 428  
 — coronata L. 428  
 — komarovii Iljin 428  
*Setaria* Beauv. 66, 76  
 — gigantea (Fr. et Sav.) Makino 76  
 — glauca (L.) Beauv. 76  
 — italica (L.) Beauv. 76  
 — macrocarpa Lucznik 76  
 — viridis Beauv. 76  
*Seutera willfordii* (Franch. et Sav.) Pobed.\*  
 334  
*Sibbaldia* L. 211, 226  
 — macrophylla Turcz. 226  
*Siegesbeckia* L. 391, 403  
 — glabrescens Makino 403  
 — orientalis L. 403  
*Sieviersia* Willd. 211, 226, 441  
 — pentapetala (L.) Greene 226, 227  
 — pusilla (Gaertn.) Hult. 226, 227  
*Silene* L. 171, 173  
 — aprica Turcz.\* 174  
 — cucubalus Wib. 173  
 — firma Sieb. et Zucc.\* 174  
 — foliosa Maxim. 174  
 — jenseensis Willd. 174  
 — koreana Kom. 174  
 — latifolia Rendle et Britt.\* 173  
 — macrostyla Maxim. 174  
 — noctiflora L.\* 174  
 — olgae Rohrb.\* 174  
 — repens Patrén 174  
 — stenophylla Ldb. 173  
 — vulgaris Gärcke 173  
*Siler divaricatum* Benth. et Hook.\* 306  
*Sinapis* L. 196, 201  
 — arvensis L. 201  
*Siphonostegia* Benth. 360, 370  
 — chinensis Benth. 370  
*Sisymbrium* L. 195—197  
 — laeseli L. 197  
 — luteum (Maxim.) O. E. Schulz 197  
 — officinale (L.) Scop. 197  
*Sisyrinchium* L. 129  
 — angustifolium Mill. 129  
*Sium* L. 293, 302  
 — cicutaeformis Gmel.\* 302  
 — suave Walt. 302  
 — var. angustifolium Kom. 302  
 — tenue Kom. 302  
*Smelovskia* C. A. Mey. 196, 197

— alba (Pall.) Rgl. 197  
 — inopinata Kom. 197  
*Smilacina* Desf. 116, 122  
 — laburica Turcz. 122  
 — hirta Maxim. 122  
 — trifoliata Desf. 122  
*Smilax* L. 115, 124  
 — oldhamii Miq. 123, 124  
*Solanaceae* Juss. 16, 17, 358  
*Solanum* L. 16, 358, 436, 441  
*Solanum depilatum* Kitag. 357, 358  
 — mesocarpum Koidz. 358  
 — nigrum L. 358  
*Solidago* L. 394, 396  
 — canadensis L. 396  
 — pacifica Juz. 396  
 — virgaurea L., p. p.\* 396  
*Sonchus* L. 392, 432  
 — arvensis L. 432  
 — asper (L.) Hill 432  
 — brachyotus DC. 432  
 — oleraceus L. 432  
*Sophora* L. 235, 236  
 — flavescent Ait. 236, 237  
*Sorbaria* A. Br. 211, 216, 441  
 — alpina Dipp.\* 216  
 — pallasi (G. Don) Pokark. 216, 217  
 — rhodolia Kom. 216, 217  
 — sorbifolia (L.) A. Br. 216  
*Sorbus* L. 211, 216, 441  
 — amurensis Koehne 218  
 — sambucifolia Roem. 218  
 — schneideriana Koehne 218  
 — sibirica Hedl. 218  
*Sparganiaceae* Rudolph 10, 55  
*Sparganium* L. 55  
 — glomeratum Laest. 55, 56  
 — japonicum Rothert 55  
 — stenophyllum Maxim. 55, 56  
 — simplex Huds. 55, 56  
 — stoloniferum Buch.-Ham. 55, 56  
*Spergula* L. 171, 173  
 — arvensis L. 173  
 — maxima Weib. 173  
 — vulgaris Benn.\* 173  
*Spergularia* Presl 171, 173  
 — campestris Aschers. 173  
 — media Presl\* 173  
 — rubra (L.) Presl 173  
 — salina Presl 173  
*Sphalloneurus* Bess. 293, 294  
 — gracilis (Bess.) K.-Pol. 294  
*Spiraea* L. 211, 214, 438  
 — beauverdiana C. K. Schm. 214  
 — betulifolia Pall. 213, 214  
 — elegans Pokark. 213, 214  
 — flexuosa Fisch. 214  
 — humilis Pokark. 214  
 — media Schmidt 214  
 — pubescens Turcz. 214, 215  
 — salicifolia L. 214, 215  
 — sericea Turcz. 214, 215  
 — ussuriensis Pokark. 214, 215  
*Spiranthes* Rich. 123, 436  
 — amoena (M. B.) Spring. 126  
 — sitensis (Pers.) Ames 126, 137  
*Spirodela* Scheid. 109, 110  
 — polyrrhiza (L.) Scheid. 110  
*Spodiopogon* Trin. 68, 70  
 — sibiricus Trin. 70, 71

*Spuriopimpinella* Kitag. 292, 300  
 — calycina (Maxim.) Kitag. 300  
*Stachys* L. 346, 352  
 — annua L. 352  
 — baicalensis Fisch. 352  
 — chinensis Bge. 352  
 — japonica Miq. 352  
 — komarovii Knorr. 352  
*Stellaria* L. 171  
 — alsine Grimm. 172  
 — hungarica Feenzl. 171  
 — cherleriae (Fisch.) Willd. 171  
 — dichotoma L. 172  
 — diffusa Willd. 172  
 — discolor Turcz. 172  
 — chreataea Kom. 171  
 — fenzlii Rgl. 172  
 — humifusa Rottb. 172  
 — jaluana Nakai 172  
 — media (L.) Cyr. 171  
 — mesquensis M. B.\* 172  
 — radicans L. 171  
 — ruscifolia Pall. 172  
 — uliginosa Murr.\* 172  
*Stellera* L. 280  
 — chamaejasme L. 281, 282  
*Stenactis strigosus* (Muehl.) DC.\* 399  
*Stevensia* Adams et Fisch. 195, 199  
 — cheiranthoides DC. 199  
*Stipa* L. 67, 78  
 — baicalensis Roshev. 77, 78  
 — effusa Nakai 77, 78  
 — mongolica Turcz.\* 78  
 — sibirica (L.) Lam. 78  
*Streptopus* Rich. 116, 122  
 — amplexicaulis (L.) DC. 123, 124  
 — streptopoides (Ldb.) Nels. et Macbr.  
 122, 123  
*Struthiopteris* Willd.\* 20, 22  
 — filicastrum All.\* 22  
*Suaeda* Forsk. 168, 169  
 — glauca Bge. 169  
 — ussuriensis Iljin 169  
*Sweria* L. 328, 330  
 — obtusa Ldb. 330, 333  
 — veratroides Maxim. 330  
*Symphlocarpus* Maxim. 393, 400  
 — exilis Maxim. 400  
*Symplocarpus* Salisb. 407  
 — foetidus Salisb. 407, 108  
*Syneilesis* Maxim. 393, 416  
 — acontifolia Maxim. 416  
*Synurus* Iljin 393, 428  
 — deltoideus (Ait.) Nakai 428  
*Syringa* L. 16, 326, 436  
 — amurensis Rupr. 326  
 — wolffii C. K. Schneid., S. robusta Nakai  
 326, 329  
*Tanacetum* L. 396, 406  
 — boreale Fisch. ex DC. 406  
 — sibiricum L.\* 406  
 — vulgare L.\* 406  
*Taraxacum* Wigg. 391, 430  
 — brassicifolium Kitam. 432  
 — ceratophorum (Ldb.) DC. 432  
 — coreanum Nakai 430  
 — mongolicum Hand-Mazz. 432  
 — multisectum Kitam. 430  
 — officinale Web. 430



*Taraxacum ussuriense* Kom. 432  
 — vulgare Schrank 430  
*Taxaceae* Lindl. 9, 46  
*Taxus* L. 9, 46  
 — cuspidata Sieb. et Zucc. 46, 48  
*Teucrium* L. 345, 347  
 — ussuriense Kom. 347  
*Thalictrum* L. 479, 489  
 — amurense Maxim. 190  
 — appendiculatum C. A. Mey. 189  
 — baicalense Turcz. 189  
 — contortum L. 189  
 — filamentosum Maxim. 189  
 — foetidum L. 489  
 — minus L. 489  
 — petaloideum L. 189  
 — simplex L. 190  
 — sparsiflorum Turcz. 189  
 — squarrosum Steph. 189  
 — strictum Ldb. 190  
 — thunbergii DC. 189  
 — tuberosum Maxim. 189  
*Thelycrania* (Dum.) Four. 312, 436  
 — alba (L.) Pojark. 314, 317  
*Thermopsis* R. Br. 234, 236  
 — fabacea (Pall.) DC.\* 236  
 — lupinoides (L.) Link 236  
*Thesium* L. 161  
 — chinense Turcz. 161  
 — refractum C. A. Mey. 161  
 — saxatile Turcz. 161  
*Thladiantha* Bge. 384, 386  
 — dubia Bge. 385, 386  
*Thlaspi* (Tourn.) L. 196, 201  
 — arvense L. 201  
 — cochleariforme DC. 201  
*Thymelaeaceae* Juss. 14, 280  
*Thymus* L. 344, 352, 436  
 — amurenensis Klok. 354  
 — arsenijevii Klok. 354  
 — chankovianus Klok. 354  
 — curtus Klok. 354  
 — disjunctus Klok. 354  
 — inaequalis Klok. 354  
 — komarovii Serg. 354  
 — nervulosus 354  
 — przewalskii Kom. 354  
 — semigalaber Klok. 354  
 — ussuriensis Klok. 354  
*Tiliaceae* Juss. 14, 268  
*Tilia* L. 268, 437  
 — amurenensis Rupr. 270, 271  
 — divaricata Ig. Vassil. 268  
 — komarovii Ig. Vassil. 270  
 — koreanica Nakai 270, 271  
 — manshurica Rupr. et Maxim. 268, 270, 271  
 — mongolica Maxim. var. *austrorussien-*  
*sis* Ig. Vassil. 268  
 — pekinensis Rupr. 268, 271  
 — taquetii C. K. Schneid. 270  
*Tillaea* L. 202  
 — aquatica L. 202  
*Tofieldia* Huds. 115, 116  
 — nutans Willd. 116  
*Torilis* L. 292, 298  
 — japonica (Houtt.) DC. 298  
*Torreya* Church.\* 83  
 — *natans* (Kom.) Church.\* 83  
*Tournefortia* L. 338, 340

— *sibirica* L. 340  
*Trapa* L. 284  
 — *amurenensis* Fler. 286  
 — *chinensis* Fler., non Lour.\* 286  
 — *incisa* Sieb. et Zucc. 284  
 — *japonica* Fler. 286  
 — *komarovii* V. Vassil.\* 286  
 — *korshinskyi* V. Vassil.\* 286  
 — *litwinowii* V. Vassil. 286  
 — *manshurica* Fler. 286  
 — *maximowiczii* Korsch. 284  
 — *potaninii* V. Vassil. 286  
 — *pseudoincisa* Nakai 286  
 — *tranzschellii* V. Vassil.\* 286  
 — *tuberculata* V. Vassil.\* 286  
*Trapella* Oliv. 372  
 — *sinensis* Oliv. 371, 372  
*Trautvetteria* Fisch. et Mey. 178, 188  
 — *japonica* Sieb. et Zucc. 188  
*Triadenum* Raf. 272  
 — *japonicum* (Blume) Makino 272, 275  
*Trichomanes* L. 19, 20  
 — *parvulum* Poir. 20, 21  
*Trichophorum* Pers. 93, 94  
 — *alpinum* 94, 96  
*Trientalis* L. 322, 324, 326  
 — *arctica* Fisch. ex Hook.\* 326  
 — *europaea* L. 326  
*Trifolium* L. 234, 238  
 — *arvense* L. 238  
 — *campestre* Schreb. 238  
 — *hybridum* L. 238  
 — *lupinaster* L. 238, 239  
 — *pacificum* Bobr. 238, 239  
 — *pratense* L. 238  
 — *repens* L. 238  
*Triglochin* L. 60  
 — *maritimum* L. 60, 61  
 — *palustris* L. 60, 61  
*Trigonella* L. 234, 236  
 — *gordijevii* (Kom.) Grossh. 236  
 — *korshinskyi* Grossh. 236  
 — *platycarpus* L. 236  
*Trigonotis* Stev. 340, 342  
 — *koreana* Nakai 342  
 — *myosotidea* Maxim. 342  
 — *peduncularis* (Trev.) Benth. 342  
 — *radicans* (Turcz.) Stev. 342  
*Trillium* L. 115, 124  
*T. camtschatcense* Ker-Gawl. 124  
 — *camtschaticum* Pall. 124  
 — *rhombifolium* Kom. 124\*  
*Triosteum* L. 48, 378, 380  
 — *sinuatum* Maxim. 380  
*Tripleurospermum inodorum* Sch. Bip.\*  
 406  
*Tripogon* Roth 68, 82  
 — *chinensis* (Franch.) Hack. 82, 83  
*Tripolium vulgare* Nees\* 398  
*Trisetum* Pers. 68, 82  
 — *sibiricum* Rupr. 82  
 — *spicatum* (L.) Richt. 82  
*Tristeginae* Nees 64, 66  
*Triticum* L. 70  
*Trollius* L. 180  
 — *chinensis* Bge. 180  
 — *ledebourii* Rchb. 180  
 — *riederianus* Fisch. et Mey. 180  
*Turczaninowia* DC. 394, 399  
 — *fastigiata* (Fisch.) DC. 399

*Viola uniflora* L. 278  
 — *variegata* Fisch. 277, 278  
 — *verecunda* A. Gray 276, 279  
*Viscum* L. 161, 435  
 — *coloratum* (Kom.) Nakai 161  
*Vitaceae* Juss. 16, 266  
*Vitis* Tourn. 266, 439  
 — *amurenensis* Rupr. 268, 269

*Waldsteinia* Willd. 210, 212, 226  
 — *ternata* (Steph.) Fritsch 225, 226  
*Weigela* Thunb. 378, 382, 436  
 — *middendorffiana* (Carr.) G. Koch. 379, 380  
 — *praecox* (Lemoine) Bailey 379, 382  
 — *suavis* (Kom.) Bailey 379, 382  
*Woodsia* R. Br. 20, 22  
 — *glabella* R. Br. 22, 23  
 — *ilvensis* R. Br. 22, 23  
 — *intermedia* Tagawa 22, 24  
 — *macrochaena* Mett. 22, 24  
 — *manchuriensis* Hook. 22, 23

— *polystichoides* Eaton 22, 23  
 — *sinuata* (Hook.) H. Christ\* 22

*Xanthium* L. 391, 402  
 — *sibiricum* Patr. 403  
 — *spinosa* L. 403

*Zannichellia* L. 55, 60  
 — *palustris* L. 60  
*Zizania* L. 67, 76  
 — *latifolia* Turcz. 75, 76  
*Zoisiae* Mig. 64, 66  
*Zosteraceae* Dum. 9, 60  
*Zostera* L. 60  
*Zostera asiatica* Miki\* 60  
 — *japonica* Aschers. et Graebn. 60  
 — *marina* L. 60  
 — *pacifica* Wats. 60  
*Zoysia* Willd. 66, 74  
 — *japonica* Steud. 73, 74  
*Zygadenus* Rich. 115, 116  
 — *sibiricus* (L.) A. Gray 116

*Araxacum ussuriense* Kom. 432  
 — vulgare Schrank 430  
*Raxaceae* Lindl. 9, 46  
*Taxus* L. 9, 46  
 — cuspidata Sieb. et Zucc. 46, 48  
*Teucrium* L. 345, 347  
 — ussuriense Kom. 347  
*Thalictrum* L. 479, 489  
 — amurense Maxim. 490  
 — appendiculatum G. A. Mey. 189  
 — baicalense Turcz. 189  
 — contortum L. 189  
 — filamentosum Maxim. 189  
 — foetidum L. 189  
 — minus L. 189  
 — petaloides L. 189  
 — simplex L. 190  
 — sparsiflorum Turcz. 189  
 — squarrosum Steph. 189  
 — strictum Ldb. 190  
 — thunbergii DC. 189  
 — tuberiferum Maxim. 189  
*Thelycrania* (Dum.) Fourr. 312, 436  
 — alba (L.) Pokark. 314, 317  
*Thermopsis* R. Br. 234, 236  
 — fabacea (Pall.) DC.\* 236  
 — lupinoides (L.) Link 236  
*Thesium* L. 181  
 — chinense Turcz. 161  
 — refractum C. A. Mey. 161  
 — saxatile Turcz. 161  
*Thladiantha* Bge. 384, 386  
 — dubia Bge. 385, 386  
*Thlaspi* (Tourn.) L. 196, 201  
 — arvense L. 201  
*Cochlearifera* DC. 204  
*Thymelaeaceae* Juss. 14, 280  
*Thymus* L. 344, 352, 436  
 — amurensis Klok. 354  
 — arsenijevii Klok. 354  
 — chankouan Klok. 354  
 — curtus Klok. 354  
 — disjunctus Klok. 354  
 — inaequalis Klok. 354  
 — komarovii Serg. 354  
 — nervosus 354  
 — przewalskii Kom. 354  
 — semiglaber Klok. 354  
 — ussuriensis Klok. 354  
*Tiliaceae* Juss. 14, 268  
*Tilia* L. 268, 437  
 — amurensis Rupr. 270, 271  
 — divaricata Ig. Vassil. 268  
 — komarovii Ig. Vassil. 270  
 — koreana Nakai 270, 271  
 — mandshurica Rupr. et Maxim. 268, 270, 271  
 — mongolica Maxim. var. *austrourssien-*  
*sis* Ig. Vassil. 268  
 — pekinensis Rupr. 268, 271  
 — taquetii C. K. Schmeid. 270  
*Tillaea* L. 202  
 — aquatica L. 202  
*Tofieldia* Huds. 115, 116  
 — nutans Willd. 116  
*Torilis* L. 292, 298  
 — japonica (Houtt.) DC. 298  
*Torreochloa* Church\* 83  
 — natans (Kom.) Church\* 88  
*Tournefortia* L. 338, 340  
 — sibirica L. 340  
*Trapa* L. 284  
 — amurensis Fler. 286  
 — chinensis Fler., non Lour.\* 286  
 — incisa Sieb. et Zucc. 284  
 — japonica Fler. 286  
 — komarovii V. Vassil.\* 286  
 — korschinskyi V. Vassil.\* 286  
 — litwinowii V. Vassil. 286  
 — manshurica Fler. 286  
 — maximowiczii Korsch. 284  
 — potanini V. Vassil. 286  
 — pseudoincisa Nakai 286  
 — tranchellii V. Vassil.\* 286  
 — tuberculata V. Vassil.\* 286  
*Trapella* Oliv. 372  
 — sinensis Oliv. 371, 372  
*Trautvetteria* Fisch. et Mey. 178, 188  
 — japonica Sieb. et Zucc. 188  
*Triadenum* Raf. 272  
 — japonicum (Blume) Makino 272, 275  
*Trichomanes* L. 19, 20  
 — parvulum Poir. 20, 21  
*Trichoporum* Pers. 93, 94  
 — alpinum 94, 96  
*Tridentaria* L. 322, 324, 326  
 — arctica Fisch. et Hook.\* 326  
 — europaea L. 326  
*Trifolium* L. 234, 238  
 — arvense L. 238  
 — campestre Schreb. 238  
 — hybridum L. 238  
 — lupinaster L. 238, 239  
 — pacificum Boehr. 238, 239  
 — pratense L. 238  
 — repens L. 238  
*Triglochin* L. 60  
 — maritimum L. 60, 61  
 — palustris L. 60, 61  
*Trigonella* L. 234, 236  
 — gordijevi (Kom.) Grossh. 236  
 — korschinskyi Grossh. 236  
 — platycarpus L. 236  
*Trigonotis* Stev. 340, 342  
 — koreana Nakai 342  
 — myosotidea Maxim. 342  
 — peduncularis (Trev.) Benth. 342  
 — radicans (Turcz.) Stev. 342  
*Trillium* L. 115, 124  
 — *camtschaticense* Ker-Gawl. 124  
 — *chamtschaticum* Pall. 124  
 — *rhombifolium* Kom. 124\*  
*Triosteum* L. 18, 378, 380  
 — sinuatum Maxim. 380  
*Tripleurospermum inodorum* Sch. Bip.\*  
 406  
*Triptogon* Roth 68, 82  
 — chinensis (Franch.) Hack. 82, 83  
*Triptolium vulgare* Nees\* 398  
*Trisetum* Pers. 68, 82  
 — sibiricum Rupr. 82  
 — spicatum (L.) Richt. 82  
*Tristeginea* Nees 64, 66  
*Triticum* L. 70  
*Trollius* L. 180  
 — chinensis Bge. 180  
 — ledebourii Rehb. 180  
 — riederianus Fisch. et Mey. 180  
*Turczaninowia* DC. 394, 399  
 — fastigiata (Fisch.) DC. 399

*Turritis* (Tourn.) L. 195, 199  
 — glabra L. 199  
*Tussilago* L. 391, 416  
 — farfara L. 416  
*Typhaceae* Juss. Hil. 9, 53  
*Typha* L. 53  
 — angustata Bory et Chauf. 55  
 — latifolia L. 53, 54  
 — laxmannii Lepech. 54, 55  
 — orientalis Presl 55  
*Ulmaceae* Mirbel 158  
*Ulmus* L. 158, 437, 439  
 — laciniata (Trautv.) Mayr 158, 439  
 — macrocarpa Hance 158  
 — propinqua Koidz. 158  
 — var. laevis Kom. 158  
 — var. puberula Kom. 158  
 — var. saxatilis Kom. 158  
 — var. scabra Kom. 158  
 — pumila L. 158  
*Umbelliferae* Juss. 18, 292  
*Urticales* Juss. 12, 160  
*Urtica* L. 160  
 — angustifolia Fisch. 160  
 — cannabina L. 160  
 — cynosuroides Kom. 160  
 — laetevirens Maxim. 160  
 — urens L. 160  
*Utricularia* L. 374  
 — intermedia Hayne 374  
 — minor L. 374  
 — vulgaris L. 374  
*Vaccaria* Medic. 170, 175  
 — sagittalis (Neck.) Garcke 175  
*Vacciniaceae* S. Gray 18, 321  
*Vaccinium* L. 321, 435, 438  
 — myrtillus L. 321, 438  
 — ovalifolium Smith 321  
 — praestans Lam. 321, 438  
 — vitis-idaea L. 321, 438  
 — vitis-idaea L. 321  
*Valerianaceae* Batsch 18, 384  
*Valeriana* L. 384  
 — altemifolia Ldb. 384  
 — amurensis Smirn. ex Kom. 384  
 — chinensis Kreyer, non L.\* 384  
 — corean. Briq. 384  
 — lauriei Briq. 384  
 — pseudomambrosa Worosch.\* 384  
 — stubendorffii Kreyer ex Kom. 384  
 — transjensensis Kreyer 384  
*Valisneria* L. 64  
 — spiralis L. 64  
*Verbascum* L. 359, 360  
 — thapsus L. 362  
*Verbenaceae* Jaume 16, 344  
*Verbena* L. 344  
 — bracteosa Michx. 344  
*Veratrum* L. 115, 116  
 — calycatum Kom. 116  
 — dahuricum Loos. 116  
 — lobelianum Bernh. 116  
 — maackii Rgl. 116  
 — nigrum auct., non L.\* 116  
 — oxyspalum Turcz. 116  
 — ussuriense Nakai 116  
*Veronica* L. 359, 364  
 — anagallis-aquatica L. 366  
 — anagallodes Guss. 366  
 — cerasifolia Monjuschko 364  
 — chamadrys L. 366  
 — dahurica Stev. 365, 366  
 — incana L. 366  
 — komarovii Monjuschko 364  
 — linearifolia Pall. 364  
 — longifolia L. 364  
 — oligensis Kom. 364  
 — peregrina L. 364  
 — persica Poir. 366  
 — scutellata L. 366  
 — serpyllifolia L. 364  
 — sibirica L. 364  
 — stellaria Pall. 364, 365  
 — tubiflora Fisch. et Mey. 364  
*Viburnum* L. 378, 380, 436  
 — burejaticum Rgl. et Herd. 380, 381  
 — sargentii Koehne 380  
*Vicia* L. 236, 246  
 — amurensis Fisch. 246, 247  
 — amurensis Oett. 247, 248  
 — angustifolia L. 246  
 — baicalensis (Turcz.) B. Fedtsch. 248  
 — cracca L. 247  
 — hirsuta (L.) S. F. Gray. 246  
 — japonica A. Gray. 247, 248  
 — macrophylla (Maxim.) B. Fedtsch. 247  
 — multicaulis Ldb. 246, 247  
 — pseudorubra Fisch. et Mey. 246, 247  
 — ramuliflora (Maxim.) Ohwi 248  
 — sativa L. 246  
 — sepium L. 246  
 — subrotunda (Maxim.) Czebr. 248  
 — unguia A. Br. 246  
 — ussuriensis Kom., non Oett.\* 248  
 — venosa (Willd.) Maxim. 248  
*Violaceae* Batsch 14, 274  
*Viola* L. 274  
 — acuminata Ldb. 276, 277  
 — alisoviana Kiss 278  
 — amurica W. Bckr. 274, 280  
 — austro-ussuriensis Kom. 276  
 — biflora L. 274  
 — brachysepalia Maxim. 276, 280  
 — brachycaeras Turcz. 278  
 — chaerophyllodes (Rgl.) W. Bckr. 274  
 — collina Bess. 277, 280  
 — dactyloides Roem. et Schult. 274, 277  
 — dissecta Ldb. 274  
 — gmeliniana Roem. et Schult. 278  
 — hirtipes S. Mory 278  
 — incisa Turcz. 274  
 — kusnezowiana W. Bckr. 280  
 — mandshurica W. Bckr. 278, 279  
 — montana L. 276  
 — muelendorffii Kiss 276  
 — orientalis (Maxim.) W. Bckr. 276, 279  
 — pacifica J. P. W. Schum. 276  
 — patrinii Ging. 278, 279  
 — phalarocarpa Maxim. 278  
 — prionantha Bge. 278  
 — raddeana Rgl. 274  
 — repens Turcz. 280  
 — rossii Hemsl. 279, 280  
 — rupestris P. W. Schum. 276  
 — sachalinensis Boissieu 276  
 — selkirkii Pursh 279, 280  
 — trichosepala (W. Bckr.) Juz. 280  
 — turczaninowii Juz. 276



- Viola uniflora* L. 278  
 — *variegata* Fisch. 277, 278  
 — *verecunda* A. Gray 276, 279  
*Viscum* L. 161, 435  
 — *coloratum* (Kom.) Nakai 161  
*Vitaceae* Juss. 16, 266  
*Vitis* Tourn. 266, 439  
 — *amurensis* Rupr. 268, 269  
*Waldsteinia* Willd. 210, 212, 226  
 — *ternata* (Steph.) Fritsch 225, 226  
*Weigela* Thunb. 378, 382, 436  
 — *middendorffiana* (Carr.) C. Koch. 379, 380  
 — *praecox* (Lemoine) Bailey 379, 382  
 — *suavis* (Kom.) Bailey 379, 382  
*Woodsia* R. Br. 20, 22  
 — *glabella* R. Br. 22, 23  
 — *ilvensis* R. Br. 22, 23  
 — *intermedia* Tagawa 22, 24  
 — *macrochaena* Mett. 22, 24  
 — *manchuriensis* Hook. 22, 23  
 — *polystichoides* Eaton 22, 23  
 — *sinuata* (Hook.) H. Christ\* 22  
*Xanthium* L. 391, 402  
 — *sibiricum* Patr. 403  
 — *spinosa* L. 403  
*Zannichellia* L. 55, 60  
 — *palustris* L. 60  
*Zizania* L. 67, 76  
 — *latifolia* Turcz. 75, 76  
*Zoisa* Miq. 64, 66  
*Zosteraceae* Dum. 9, 60  
*Zostera* L. 60  
*Zostera asiatica* Miki\* 60  
 — *japonica* Aschers. et Graebn. 60  
 — *marina* L. 60  
 — *pacifica* Wats. 60  
*Zoysia* Willd. 66, 74  
 — *japonica* Steud. 73, 74  
*Zygadenus* Rich. 115, 116  
 — *sibiricus* (L.) A. Gray 116

манзатка - лотак